

6
ELEMENTA
PHYSIOLOGIÆ
CORPORIS HUMANI.

AUCTORE

ALBERTO v. HALLER,

DOMINO IN GOUMOENS LE JUX, ET FEUDI ECLAGNENS.
PRÆSIDE SOCIETATIS REG. SCIENT. GOETTING.
SODALI ACADD. REG. SCIENT. PARIS. REG. CHIR. GALL.
IMPER. BEROLIN. SUECIC. BONONIENS. ARCAD. BAVAR.
SOCIET. SCIENT. BRITANN. UPSAL. BOT. FLOR. BATAVIC.
HELVET. ŒCONOM. BERNENS.
IN SENATU SUPREMO BERNENSI DUCENTUMVIRO.

TOMUS SEXTUS.

DEGLUTITIO. VENTRICULUS. OMENTA. LIEN.
PANCREAS. HEPAR.

EDITIO SECUNDA AUCTA ET EMENDATA.



LAUSANNÆ;

Apud JULIUM HENRICUM POTT, & Socios.

M. DCC. LXXVII

16719



P R Æ F A T I O.

ETSI ad sextum tomum hic videor præfari perorationem tamen ad universum opus trado; quod mense Februario anni 1764. à me obfolutum, & ad prelum paratum fit. Annus omnino, a quo physiologica scribere primum sum molitus, effluxit tricesimus quintus: a commentariorum in BOERHAAVII prælectiones libro ultimo annus vigesimus Hoc opus non licuit mihi totum huic dare labori. Multam partem ab his decem annis sibi res publica vindicavit, aliam amor plantarum, & enumerationis stirpium Helveticarum emendandæ & augendæ cupido, quam nunc continuo pariter ad prelum perficiam.

Multos vides annos, LECTOR BENEVOLE, impensos legendis scriptoribus, incidendis cadaveribus, & vivorum animalium numerosissimis incisionibus. Non ideo velim spem Tuam promissis meis nimium augere. Multa fuerunt, quæ hominem veri cupidum, neque parcum laboris, tamen non siverunt, eam operis sui perfectionem adstringere, quam mente facile concipias.

Cadaverum humanorum defectus multo mihi impedimento fuit. De iis incidendis, postquam inter patriæ magistratum locum occupavi, ne

cogitari quidem poterat. Ergo, quæ viginti & septem annorum incisionibus, ab anno 1728 ad 1753. fatis certe frequentibus videram, & in tabulas retuleram, iis me oportuit esse contentum; sæpe tamen hæsi in aliqua parte descriptionis. Sæpe de meis dubitavi, quando cum summorum virorum vocibus meas videbam non posse conciliari.

Supererat, ut, quæ mihi deessent, ex optimis adstruerem auctoribus. Si quæ haberem contraria placitis virorum in re anatomica exercitatorum, ita cedere malui, ALBINO aliquoties, etiam aliis præcipuis scriptoribus, etiam ZINNIO, olim meo, meisque præferre, quæ ipsi viderentur melioribus adminiculis, minutius, & frequentius vidisse.

Hoc summum vitium est, reliqua paulo tolerabiliora. Primum non evitaui, quin subinde eadem repeterem. Longo in opere utique prævidebam, num alio loco non aptius de iisdem esset dicendum. Parui præsentī necessitati; & dum cordis dabam historiam, multa præmisi, de cerebello, de cerebro, de vi irritabili, quæ suis locis necesse esset retractare, & fusius dicere. Hoc vitium in nova editione vitari potest, nunc quidem non potuit. Non tamen credo extra propositum, & *αδιανυσως* aliqua me dixisse, etsi pote-

rant ad alium locum fervari. Certe anno 1756. dum negebam nervos a cerebello in cor missos peculiariter vitæ præesse, nisi fallor, justæ me exposuissem expostulationi, si fidem mihi ideo voluissem dari, quod promitterem, anno 1762. me editurum esse quartum tomum, in quo demonstratio eorum foret proditura, quæ nunc mihi sumebam.

Nimia passim aliqua video. Etiam in hoc IV. tomo in comparata anatome puto me luxuriasse, nimiumque indulsisse enumerationi animalium, in quibus hoc, aut alio modo, se aut hepar haberet, aut pancreas. Poruissem longi catalogi tædium occupare, si in classem contraxissem eas bestias, quarum fabrica consentiret. Non ausus tamen sum absque inductione fidem a lectore sperare: adeoque me permisi arido labori, enumerandorum singulorum animalium, in quibus communis esset fabrica. Possunt etiam errores intercessisse, potissimum in avium ventriculis, quorum paucos vidi.

Nimium numerum citationum tertio loco pono. Visum est mihi, aperiendum esse tironibus aditum ad Cl. Virorum testimonia, ut quæ brevissimis verbis mihi postulasset, ea per integras historias viderent confirmari. Et tamen bene multa loca omisi, quæ in adversaria receperam.

Inter eos locos scriptorum adeo nimis numerosos, possunt esse qui vel alienis cum numeris citentur (*a*), neque adeo eo loco reperiantur, quo sunt indicati: aut in quibus aliquid aliud fit, quam lector sibi promiserit. Utrumque vitiosum; primum ne tunc quidem excusabile, quando idem auctor vere quidem, sed alia tamen pagina, ea protulit, ob quæ citatur. Alterum non semper adeo obnoxium est condemnationi; sæpe enim de industria auctorem citavi, qui alia dixisset a meis. Non semper indicat citatio auctoritatem mearum vocum; remittit unice lectorem ad scriptoris locum, quem credam cum libro meo conferendum esse.

Si præter ista vitia errores anatomici, si non veræ descriptiones intercesserunt, tunc quidem veniam ne peto quidem. Potuit id tamen vitium in longo opere, vel ideo mihi obrepfisse, quod paucas, aut negligentes meas dissectiones describam, cum meliora mihi non innotuissent; vel quod auctorem sim secutus, qui & ipse humanis obnoxius erroribus, eum locum male tractasset. Non tamen spero, multa fore ejusmodi menda, cum nihil simile hætenus viderim mihi exprobrari, cum tot habeam viros, nunquam

(*a*) Quæ Cl. *Antonius de HAEN* in VII. L. *rat. medend.* carpsit, ea loca omnia relegi, neque quidquam inveni. in quo non recte citassem.

certe a me læsos, quibus tamen dignum videatur suis laudibus mihi facere convitium.

Peculiarior aliqua loca his in tribus tomis, qui edendi supersunt, non potui ad perfectionem perducere, ut plenam vasorum lymphaticorum historiam, musculorum urethræ uberiores descriptionem, si quid plenius ALBINIANIS desideratur: deinde in magno illo & intricatissimo negotio generationis, mulorum, & hybridum accuratam descriptionem, & experimentorum in conceptione speculanda numerum, quem desiderarem ipse. Illud quidem vitium tollet forte insignis vir, & noster peculiaris amicus, RASTIUS junior, qui in *veterinaria schola* adulteria bestiarum conciliare, fetusque ex diversis parentibus mistos incidere recepit. Prægnantes, aut quæ marem admisissent, bestias varii generis ad nauseam usque ipse incidi, neque tamen a die 1. ad 12. aut. 18. quadrupedum primordium satis frequenter videre potui. Est in his experimentis molestia incredibilis, cum sæpissime animalia non concipiant, quæ pro fetis emeris, cum contra feta vendantur pro virginibus, & quæ sunt alia id genus.

Atque ita accipe lætus CANDIDE LECTOR vitæ meæ integræ laborem, eoque utere, fidenter, si amor veri in auctore fiduciam potest inspirare:

caute, siquidem is auctor peccasse potuit, neque omnia conjunxit præsidia, quæ ad operis perfectionem pertinent. Exstet utinam alius, cui par sit veritatis amor, & par constantia laboris, cum melioribus ad eruendum verum præsidiis. Habebit me primum laudatorem; &, qui tamen meminero, quantum in his voluminibus sit laboris, feliciorum solertiam non ignarus prædicabo.

Interim, cum *compilatoris* famosum titulum videam a summis viris mihi impingi, qui putant idem esse colligere & compilare, da, quæso, LECTOR dolori meo hoc levamen, ut separes a collectore, cui nihil est proprium, eum auctorem, qui sua cum alienis comparat. Mea vero esse, quæ telam totius operis faciunt, crede vel diuturnis laboribus, in illustri Academia tot coram ~~ten~~ibus sustentatis: & pene quadringentis mea manu dissectis hominum cadaveribus; crede discipulis in arte sua summis, qui de schola mea prodierunt: crede iconibus anatomicis, pene centum, omnibus ad præsens cadaver factis, quarum plerasque edidi, aliquas mecum servo, non perinde bonis omnibus, sed certe meis; crederes, si videres, viginti voluminibus adnotationum anatomicarum mea manu ad præsens cadaver descriptarum, quibus a prima juventute, quæ vidi, continuo conservanda tradidi: crederes denique

denique voluminibus gallice editis (*a*), in quibus nihil non meum est. Da demum dolori meo, quod idem summi viri (*b*), nemine provocante, sibi indulserunt, enumerationem, quam subjicio, eorum, quæ aut noviter a me visa, & in anatomicen, vel physiologiam introducta sunt: aut certe post breviores priorum scriptorum voces minutius elaborata; aut post dubias & labantes opiniones per experimenta constituta sunt, quæ, si pauca quis putaverit, si levia, tamen nemo negaverit nata esse ex propriis incisionibus, neque a compilatore potuisse proficisci. Si vana hæc Tibi cura videtur, lege quæso convitia, quæ passus sim, & æquus judica, annon ad vindicandum me ipsum ab ipsa necessitate compellar, quæ omnia excusat, quæcunque nobis extorsit.

Rupe Veragrica 11. Mart. 1764.

(*a*) *Sur les parties irritables & sensibles.*

Sur le mouvement du sang.

Sur la formation du poulet.

Sur la formation des os.

Sur la respiration.

(*b*) *Jac. DOUGLAS in myolog. compar. spec. B. S. ALBINUS in musculorum historia*

P R O P R I A A U C T O R I S.

FABRICA pene totius corporis animalis ex cellulosa tela per experimenta evicta (a).

Pericardii vera hiftoria & adhæfiones (b).

Constitutus anulus venofus valvularum cordis continuus (c), & minutæ earum valvularum adfectiones.

Cordis evolutio (d) Primigenius finifter ventriculus eft; poft eum fenfim fubnafcitur dexter: auris communis primum extra cor eft, tunc in cor retrahitur, & in duas aures difcedit.

De cordis motu: non pallere (e); idem & de aliis ejus adfectionibus.

Cordis maxima irritabilitas (f), & inde natus motus perpetuus per vim ftimuli continuatus.

Experimentum, quo oftenditur, ablato fanguine venofò dextro finiftras cordis partes fupervivere ultimas (g).

Sanguinis motus non multum tardatur in nimis (h) vafis, per experimenta.

(a) *Elem.* I. p. 19. 22. Non ita ALBINUS, fed cuique parti fuam fubftantiam præter vafa. *Adnot.* L. III. p. 11.

(b) I. p. 269. feq.

(c) *Ann.* 1737. in difp. de mot. fang.

(d) *Ibid.* form. du poulet. T. II. Sect. VI.

(e) *Oper. min.* p. 171.

(f) *Oper. min.* T. I. p. 169. in experim. & in *Comm. Gott.* T. II.

(g) *Comm. Gott.* T. I.

(h) L. VI. p. 195.

Ponderis vis in sanguinem venosum (*i*).

Vasa minima non sunt contractilia (*k*).

Vis derivationis & revulsionis (*l*).

Motus sanguinis a morte superstes ab adtractione (*m*) natus.

Ancurysma verum & varix, artificio parari possunt (*n*).

Major crassities tunicarum arteriosarum a debili sanguinis motu : minor crassities a plethora (*o*).

Pulsus venosus ab inspirationis viribus (*p*) natus, qui sanguinem in pulmones invitat.

Pulsus venæ pulmonalis (*q*).

Musculos intercostales omnes costas levare debemus per experimenta evictum (*r*).

Costarum rotatio (*s*) &c.

Mammariarum arteriarum rami magni ad diaphragma (*t*).

Earum pulcherrimi anuli, & anastomoses cum vasis thoracis externis (*u*).

Trunci quatuor arteriosi thoracici constituti (*w*).

(*i*) *Oper. min.* T. I. p. 129.

(*k*) L. VI. p. 210. *Oper. min.* I. p. 88.

(*l*) L. VI. p. 214. post aliqua experimenta Cl. de HEYDE.

(*m*) *Oper. min.* I. p. 128. seq.

(*n*) *Oper. min.* p. 85. 99.

(*o*) *Oper. min.* p. 88.

(*p*) *Conf.* L. VI p. 332. *Oper. min.* I. p. 131. seq.

(*q*) *Oper. min.* I. p. 144.

(*r*) *Oper. min.* T. I. p. 283. seqq.

(*s*) *Ibid.* p. 288. seqq.

(*t*) *Fascic.* VI. In venis aliquid simile FALLOPIUS habet.

(*u*) *Ibid.*

(*w*) *Ibid.*

Aerem nullum esse in thorace (x) per experimenta ita evici, ut neminis nunc meminerim, qui contrariam opinionem tueatur.

Tendines sunt infenfiles (y).

Et ligamenta (z)

Et dura cerebri membrana (a).

Cerebri piscium fabrica (b).

Arteriæ cerebelli & cerebri pleræque constitutæ (c).

Et arteriæ medullæ spinalis (c^*).

Emissaria pluscula (d).

Constitutus. Motus cerebri, qui respirationi obedit (e).

Cerebelli nulla major dignitas (e^*), nec callosi corporis (e^\dagger).

Nervi molles ab intercostali (f) ganglio primo, post aliquas LANCISII VOCES.

Thyreoidea arteria inferior pene tota (f^*).

Vis insita musculorum per suos limites constituta (g).

(x) *Oper. min.* I. p. 301.

(y) *Oper. min.* I. p. 332. seq. *Comm. Gott.* T. II. p. 113.

(z) p. 341.

(a) p. 345.

(b) *Elem. physiol.* IV. *fine*.

(c) *Fascic.* VII.

(c^*) *Ibid.*

(d) *Fascic.* I & *Elem.* T. IV. p. 166. 167.

(e) *Comm. Gott.* T. II. & *Elem.* T. IV. p. 171. &c.

(e^*) *Element.* T. IV. p. 353.

(e^\dagger) *Etiam eo loco.*

(f) *Art. max. tab. ad fin Orig. nerv. intercost. n. 17. Elem.* T. IV. p. 256.

(f^*) *Fasc.* III.

(g) *Comm. Gott.* T. II. *Elem.* IV. p. 449. seq.

Vis nervosa non eget continuitate cum cerebro (*g*^{*}).

Vasa vitrei corporis in piscibus (*h*).

Et campanula lentis cristallinæ (*i*).

Zona ciliaris avium (*k*).

Arteria ophthalmica pene tota (*l*).

Iris non irritabilis (*m*).

Arteriæ dentales pleræque (*n*).

Ductus ad STENONIANUM Accessorius (*o*).

Sublinguales ductus, longi & breves (*p*).

Arteriæ œsophageæ pleræque (*q*).

tum palatinæ (*r*).

pharyngeæ (*r*^{*}).

Ventriculi fabrica musculosa & stratum intimum (*r*^{**}).

Ventriculi cellulosa tela post paucas voces priorum (*s*).

(*g*^{*}) *Elem.* IV. p. 364.

(*h*) *Elem. physiol.* V. p. 391. 392.

(*i*) p. 390.

(*k*) *Form. du poulet.* T. II.

(*l*) *Fascic.* VII.

(*m*) *Oper. min.* p. 372.

(*n*) *Tab. art. maxill. & Fascic.* VIII. & *Elem.* T. V. p. 30.

(*o*) *Fascic.* III. *tab. art. lab.*

(*p*) *Elem. phys.* VI. p. 48.

(*q*) *Fascic.* III.

(*r*) *Fascic.* II. *tab. art. maxill. Fascic.* III. *tab. art. pharyng.*

(*r*^{*}) *Comm.* BOERHAAV. T. II. & *Fascic.* III.

(*r*^{**}) Cl. FOUCHY *hist. de l'Acad.* 1761. p. 32. Cl. BERTINO tribuit, qui anno 1746. cum de equi ventriculo ageret, ejus inventi fecerit mentionem, cum ego anno demum 1751. eadem describerim. Non recte. Descripsi ann. 1747. Voces enim ejus editionis *prim. lin.* n. 624. eadem sunt cum vocibus editionis ann. 1751. Deinde tomus Commentariorum ann. 1746. anno demum 1751. aliquot adeo post meas primas lineas annis prodiit: Quæ ita dicta volo, nihil ut inde decedat Cl. BERTINI laudibus

(*s*) *Elem.* T. VI. p. 132.

Omentum colicum (*t*).

Omenti lamina posterior veterum, verum est mesocolon (*u*).

Arteriæ pancreaticæ pleræque [*w*].

Vena umbilicalis in fetu [*x*] ramos dat in hepar, qui in homine adulto fiunt rami venæ portarum.

Intestinorum tela cellulosa tertia (*y*) post paucas voces priorum.

Mechanismus quo coli facies mutatur. (*z*).

Valvularum coli mensuræ & varietates [*a*]:

Arteriarum capsularium tres classes (*b*).

Uretericæ (*c*).

Hæmorrhoidæ media [*d*].

Perforantes magnæ femoris, utræque præter aliqua priorum [*e*] vestigia.

Articulares genu præter aliqua verba priorum (*f*).

Anastomoses ramorum superiorum cum inferioribus sub genu, præter priorum paucas voces (*g*).

(*t*) *Progr.* anni 1742.

(*u*) *Ibid.*

(*w*) *Fascic.* II. & *Elem.* T. VII. p. 431. seq.

(*x*) *De fetu bicipite* ann. 1739. tum in *prim. lin.* n. 833.

(*y*) *Prim. lin.* n. 705.

(*z*) *Prim. lin.* n. 730.

(*a*) *Progr.* anni 1742.

(*b*) *Fascic.* III.

(*c*) *Ibid.*

(*d*) *Fascic.* IV.

(*e*) *Fascic.* V.

(*f*) p. 23.

(*g*) *Ibid.*

Sic arteria tarsea (*b*)

Perforantes tarfi, &c. [*i*].

Arteriarum superiorum cubiti cum inferioribus
pleræque stomoses (*l*)

Arcus dorsalis cubiti (*m*).

Arcus carpeus [*n*].

Perforantes carpi [*o*].

Interosseæ dorsales [*p*].

Interosseæ medietæ [*q*].

Herniæ congenitæ : vagina pro teste præpa-
rata [*r*].

Testis in peritonæi cavea est, dum homo in
utero geritur (*r**).

Vascula efferentia testis; & rete testis [*s*]
cellulosum vasculosumque.

Vesicula seminalis est intestinum ramosum (*t*).

Corpus luteum oritur ex conceptione (*u*).

Urachus est apertus ductus ad vesicam usque;
quem replere facile fit (*w*).

(*i*) Ibid.

(*l*) Fascic. VI.

(*m*) Ibid.

(*n*) Ibid.

(*o*) Ibid.

(*p*) Ibid.

(*q*) Ibid.

(*r*) Progr. ann. 1749. *Elem. physiol* T. VI. p. 373. T. VII. & *opusc. pathol.* p. 53.

(*r**) Ibid.

(*s*) Progr. ann. 1745. edit. & *Phil. transf.* Tum *Elem. physiol.* T. VII.

(*t*) Ibid.

(*u*) *Præf.* ad T. II operis BUFFONIANI versionem Germanicam.

(*w*) *Prim. lin.* n. 837.

Foraminis ovalis & ductus arteriosi proportion-
tiones, & causa commutationis (x).

Fabrica vitelli (y).

Incrementa ossium [z].

Mutatio ex cartilagineo gelu, rimæ, opaci-
tas &c. [a].

Vasa ossis longa [b].

Circuli vasculosi [c].

Hemisphærium vasculosum [d].

Vascula cartilaginum [e].

Formatio partis alveolaris [f].

Et nuclei ossei [g].

(x) *Progr. de valv. EUSTACH. in Fascic. IV. tum Elem. T. VIII.*

(y) *Ibid. Sect. XI.*

(z) *Traité de l'accroissement des os.*

(a) *Ibid.*

(b) *Sect. VI.*


(c) *Ibid.*

(d) *ibid.*

(e) *p. 201. &c.*

(f) *Sect. V.*

(g) *Ibid.*



ELEMENTA PHYSIOLOGIÆ

TOMUS SEXTUS.

LIBER XVIII.

CIBI ITER IN VENTRICULUM.

SECTIO I.

MANDUCATIO.

§. I.

HActenus humani corporis ea membra descripsimus, quæ vel motus ad vitam tuendam necessarios, vel animæ imperia exsequuntur. *Vitam facultatem*, & *animalem* Veteres dixerunt. Sequitur, ut ad ea transeamus membra, quæ vel fluxum hominis corpus & sponte caducum sustentant, vel novos homines generi alioquin interlapsuro substituunt. *Naturalem* illam *facultatem* dixerunt veteres, hanc *genitalem*.

Ostendimus magnam partem humorum nostrorum per cutem difflari (a): non minimam per pulmonem (b): ostendetur subinde, & jam indicatum est, non minorem portionem per lotium eliminari (c); supersunt aliæ per sputum, per alvum, aliasque vias jacturæ. Eæ universæ, cum in die 24. horarum non sint multo pauciores sex libris, hominem celeriter consumerent, nisi nova materies id detrimentum sarciret. Hæc interim, etsi satis novimus, alias multo vehementiores famis sitisque causas, atque adeo necessitates esse, propter quas non possumus esse absque cibo & potu. Sed ea omnia non bene intelliguntur, nisi descriptis organis, in quibus uterque *instinctus* habitat. Sufficit interim recepisse,

(a) L. XII. Sect. II.

(b) L. VIII. p. 353.

(c) L. XXVI. & L. XII. Sect. II. p. 67.

ut in universum dolor (*d*), & voluptas corpus humanum regunt, ita etiam ad cibum potumque capiendum nos saporis gratia invitari (*e*), cogi vero a crudelissima industriæ matre fame, cogi a magis inexorabili promtiusque enectura siti, & intolerabili a miseria urgeri, ut utrumque præsidium corpori nostro suppedamus. Oportet autem eas corporis partes describere, per quas cibus, aut potus subit, ut destinatum auxilium ruituro corpori præstent.

§. II. *Cibus in os recipitur.*

Animalia pleraque potum lingua sua excavata, inque haustrum formata sumunt, & aquam in os adtrahunt, cujus aerem per inspirationem debilitaverint: insecta etiam per cavos aculeos (*f*), cavosve tubos (*g*), quos motus peristalticus ultra cibum dilatat, post cibum constringit. Cibus animalia fere maxillis ipsis comprehendunt, nam pauca aliquid habent manuum simile, eaque necessitas fecit, ut maxilla omnium animalium quadrupedum, quam homini longior, & antierius in gracilitatem educta sit, quo altius os aperiri, & facilius, subque angulis rectis, cibus comprehendi queat. Homini manuum ministerium cibus (*h*) in os suggerit; potumque infundit, quem tamen etiam sugendo possumus adducere. Prima vero via in os est, quod alias descripsimus quantum necesse est in parte, quam oculis suis quisque potest usurpare.

§. III. *Cibi subactio in ore.*

Sed plurimi cibi duriores sunt, majoribusque buccis in os suggeruntur, ut omnino deglutiri nequeant, aut certe ventriculo molesti forent, nisi in minores particulas, & massam molliorem reformarentur. Deinde etiam molles qui sint, ipsaque potulenta, debent tamen a labiis ad gulam iter percurrere, quod ut legere possit, suis egent organis. Huc ergo dentes pertinent, & maxillæ, tum varii muscoli, qui vel regunt ea ossa, aut cibum in varias oris sedes promovent.

(*d*) L. XVII. p. 577.

(*e*) L. XIII. p. 123.

(*f*) Pediculus SWAMMERDAM *biol.* p. 78. Per cavum dentem vermis aquaticus *ibid.* p. 326.

(*g*) Per proboscidem papilio SWAMMERDAM p. 598. & 449.

(*h*) Conf. BUFFON *histoire naturel.* T. IV. p. 197.

§. IV. *Maxilla superior.*

In homine, quadrupede, ave & pisce, non ita vero in tribu (*i*) insectorum, machina, quæ os fundat, & eadem cibos terit, duabus fit maxillis, quarum inferior superiori innititur: hanc enim stabilem esse necesse fuit, quæ cerebrum contineat. In lacertarum equidem genere (*k*) superior maxilla non valde major, neque multo stabilius est, quam quidem inferior, & eadem, dum vasto rictu os diducitur, cum toto capite retrorsum elevatur (*l*): non tamen ut ideo inferior motu destituatur (*m*). Id in lacerta majori viridi, pulcherrimo animale, accurate vidi. In psittaco (*n*), alcyone (*o*), hirundine (*p*), alauda (*q*), aliisque avibus (*r*), maxilla superior a cranio distincta, & seorsim mobilis est, eademque videtur in serpentibus esse fabrica (*s*), in quam non inquiri. Sed etiam in homine, quando maxilla inferior firmiter columnæ (*t*) incumbit, universum caput, & una superior maxilla retrorsum elevatur, & adeo os hactenus aperiri potest. Et absque columna, caput tamen, dum os aperitur, super condylos maxillæ inferioris retrorsum move-

(*i*) His enim vel plerisque maxillæ laterales sunt REAUMUR *Mémoires sur l'histoire des insectes* I. p. 120. V. p. 283. vel omnibus LYONNET *Théolog. des insect.* p. 79.

(*k*) Crocodilus solus maxillam superiorem movet ARISTOTELES *hist. anim.* L. I. c. 2. L. III. c. 7. part. IV. c. 1. PLINIUS L. VIII. c. 25. Moveri etiam JESUITÆ in *obs. de mathem. & de physique* p. 15. 42. O. BORRICHIVS *hermet. aegypt. sap.* p. 270. HAMME *de crocod.* p. 105. 106. tum in *tockaye* ex eodem genere iidem JESUITÆ. Add. FERREIN p. 518.

(*l*) VESLING *epist. posth.* V. BARTHOLIN *hist.* III. n. 86. PLUMIER *Mém. de Trévoux* 1705. fevrier. Hinc negant vere maxillam superiorem in Crocodilo moveri DUVERNEY apud *siamenses Jesuitas* p. 15. 42. du HAMEL *hist.* p. 193. PERRAULT *eff.* T. III. p. 191. cum eadem, quæ in aliis animalibus sit articulatio GREW *mus.* p. 42. Labrus rufus habet maxillam superiorem a capite remotam, & pro piscis arbitrio mobilem. *Natural. hist. na t'gestell van Linne*, T. VII. p. 418.

(*m*) ARISTOTELES *hist. anim.* L. III. c. 7. *Isag. anat.* c. 56. PHILE p. 297. SEBASTHES. L. I. p. 168.

(*n*) MEYER *squelet der Thiere* t. 40. Tom. 2. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1746. p. 171. 172. add. ALDROVAND *ornitholog.* I. p. 639. 640. 642. VERDUC *usage des part.* I. p. 142. SEVERIN *vip. pyth.* p. 239. BUFFON *hist. nat.* T. II. p. 528.

(*o*) FRISCH *Miscell. Berol. Contin.* II.

(*p*) ALBERTI *kleine Schriften* p. 517.

(*q*) IDEM *ibid.* & in aliis avibus.

(*r*) Plerisque *Mém. de l'Acad.* 1748. p. 346.

(*s*) In caudifona vipera TYSON *Phil. trans.* n. 144. MEAD *of poisons* p. 59. 60. MEYER *squelet* T. II. t. 17.

(*t*) BOERHAAVE *Pract.* T. I. p. 148. ALBIN *de ossib.* p. 209. MONRO *Essays of a Societ. at Edimb.* T. I. p. 139. 140.

tur (*u*), per novem (*x*) omnino lineas, & sextam, quintam, quartamve (*y*) partem longitudinis, quæ ab inferiori maxilla percurritur, Cl. vir ostendit.

Sed tamen homini præcipuum fulcimentum in eo toto motu est in maxilla superiori, motus liberior in inferiori.

Ea pars maxillæ superioris, quæ ad os pertinet, margine suo terminatur, qui dentes recipit (*z*), & parabolæ habet speciem, cujus vertex & medius est, & anterior, crura retrorsum recedunt. Hujus ad marginem descendentis maxillæ facies anterior, quæ & sub naso est, & sub jugo, planitiem habet eminentibus colliculis (*a*), sed in medio magis conspicuis, distinctum, quæ sunt dentium alveoli. Quæ vero pars inferior est, & respicit inferiorem maxillam, qua parabolam plenam (*b*) efficit, ea marginem habet deorsum insigniter eminentem, dum intima maxillæ pars multo minus deorsum producit, ut tota valleculam efficiat, vallo comprehensam. Eam in osse sicco linea media bipertit (*c*), quæ vestigium est duorum ossium, similibus & æqualibus, in quæ hæc maxilla dissoluta scedit.

Est in ea linea canalis (*d*) in sceleto cavus, & apertus (*e*), antèrius in planitiem eductus, posterius in angulum resectus, qui dum adscendit, in duos abit tubulos (*f*), quorum quisque suam in narem, inque naris meatum infimum, aperitur. Sed in homine integro membrana hos tubulos replet, nullo pervia canali; quæ unice vasa (*g*) a palatinis arteriis in nares adscendentia admittat. Quare neque lacru-

(*u*) FERREIN *Mém. de l'Acad.* 1744. p. 514. 517. 538. 544. 545. Conf. SOULIER: *conspectus physiol.* p. 3. & ipse MONRO *Essays &c.* T. III. ed. IV. p. 226. Hic emenda in L. XI. hujus nostri operis p. 419. l. 3. & pro *ventre secundo*, lege primum.

(*x*) p. 512. 514.

(*y*) p. 516. per experimenta.

(*z*) Conf. ALBIN. *tab. off.* T. I. f. 13. SUE T. V. t. 2. f. 1.

(*a*) ALBIN l. c. SUE t. V. f. 1. 2. t. X. f. 3.

(*b*) SUE t. 9. f. 2.

(*c*) Conf. ALBIN. t. 1. f. 2. t. 2. f. 1.

(*d*) Ostium SUE t. 9. f. 2. ALBIN. *ibid.* VINK t. 3. f. 2.

(*e*) Apertum esse DUVERNEY in *icone posth.* tab. 14. f. 1. 4. KULMUS *anat.* p. 64. tab. II. G. BIDLOO *tab.* 14. f. 2. 4. RUYSCH *Thef.* VI. n. 3. WENKER *ulc. ventric.* cor. 7. Transmittere liquorem PALFYN *anat. Chir.* T. II. p. 63. *nouv. osteolog.* p. 170.

(*f*) STENONIUS nonnunquam. MORGAGN. *adv. anat.* VI. p. 116. 117. SANTORIN c. 5. n. 13. CHESELDEN *osteogr.* c. 2. la CHARRIERE p. 120.

(*g*) *Fascic. anat.* II. & VIII. BERTIN *osteol.* T. II. p. 419. Nervos etiam COWPER l. c. Primus verum vidit SCULTETUS *armam. obs.* 24. Rami ab his vasculis ad alveolos incisivos eunt BERTIN II. p. 396.

nam (*h*) transmittit, neque a naribus aliquid ad os adfert (*i*), neque ullo modo in numerum canalium salivalium potest admitti. In bestiis patere non recuso (*k*), qui nondum quæsierim; in homine Cl. viri ante me viderunt non patere (*l*), ego vero sæpe, & de industria inquisivi. Ad latus hujus foraminis transversa sæpe futura (*m*) in teneris corporibus palatum dividit (*n*), quæ per ætatem evanescit.

Postrema pars parabolæ ab anteriori linea dentata antrorsum convexa separatur, cum ad aliud os, *palatinum* (*p*), pertineat. Eadem versus fauces æquabili, solidoque margine terminatur (*q*); cujus media pars, qua duo ossa paria coalescunt, in mucronem (*r*) producit. A latere utroque processus ad cunei modum inter maxillæ finem posteriorem, & processum pterygoideum anteriorem se interponit (*s*).

§. V. *Maxilla inferior.*

Univerſa hæc maxilla in homine ex duobus (*t*) pariter ossibus coalescit, quæ in medio membranaceis (*u*) primo vinculis unita, demum in homine adulto in unam continuam (*x*) ossæam naturam abeunt.

(*h*) STENONIUS *obs. anat.* p. 107. HOYER *de saliv.* p. 9. la. CHARRIERE p. 120. DEIDIER *physiolog.* p. 54.

(*i*) BARTHOLIN. *specim. anat.* p. 40. MUCUM RAV. *osteolog.* p. 37. & olim SANCTORIUS *method. vitand. error.* p. 181. 182. qui ab eorum ductuum amplitudine traucos fieri suspicatur.

(*k*) In bove COWPER. ad BIDE. t. 14. f. 3. In equo BERTIN. II. p. 419. in ruminantibus I. B. *cephalot.* p. 413. In homine SANTORIN. p. 94. KURELLA *de saliv. var. secret.*

(*l*) HEISTER *comp. anat.* n. 59. BERTIN p. 421. NOGUEZ *abregé* p. 321. J. B. I. c. PETIT ad PALFYN p. 83. HEUERMANN III. p. 259. GORTER *Chir.* n. 842. Obscure patere RUYSCH *Thef.* VI. n. 21. & MORGAGNUS I. c.

(*m*) BERTIN II. ALBIN. t. 2. f. 1.

(*n*) Cl. JANKE, diligentissimus incisor *diff.* I. *de pueri septennis maxill.* ante septimum annum evanescere docet.

(*p*) ALBINUS *tab.* 2. f. 1.

(*q*) IDEM T. I. f. 2. SUE t. 9. f. 2.

(*r*) SUE *ibid.*

(*s*) IDEM *ibid.* ALBIN t. 2. f. 1.

(*t*) BERTIN. T. II. p. 219. VESAL. L. I. c. XI. & *de rad. Chin.* KERKRING. *osteog.* c. 9. INGRASSIAS. ALBIN. *Ie. off. fet.* XLIII. Ad primum annum FALLOP. *obs. anat.* p. 52.

(*u*) RUYSCH *Mus. rar.* p. 110. NESBIT p. 94. FERREIN. *Mém. de l'Acad.* 1744. p. 428.

(*x*) Raro exemplo unica in recens nato RUYSCH *Cat. Mus.* p. 187. Non bene adeo veteres duo distincta ossa describunt ARISTOT. *hist. anim.* III. c. 7. GALEN. *de off.* c. 5. text. ORIBAS. p. 144. quod maxilla cocta in duo ossa solveretur. Unicum os fuisse in fracta per pugnam plateensem maxilla pro re rara habuerunt HERODOTUS p. m. 540. Inter conjuncta ossa supernumerarium ossiculum vidit RUYSCH *thes.* V. *locul. magn.*

Ejus maxillæ figura in universum parabolæ (*y*) est, cujus anterior pars, simplex, & duabus pene parallelis lineis comprehensa, longitudinem eandem habet, quæ est maxillæ superioris, cui parallela adoptatur.

Ejus ipsius partis facies anterior in universum æquabilis, tamen alveolis dentium mediorum, & eminentia (*z*), quæ est in ima symphyssi, vicinaque utrinque vallecula distinguitur (*a*).

Eadem posterius levis, & cava, sub dentibus longam eminentem lineam (*b*) habet, pene oræ parallelam, subque ea excavatam levemque (*c*) vallem, quam in symphyssi eminens processus distinguit (*d*).

Sed qua dentium alveoli desinunt, maxilla inferior inflexa quasi sursum dilatatur, & retrorsum, duobusque finitur processibus.

Eorum anterior (*e*), jugo protectus, planus, hinc convexo fine terminatur, inde sinu excinditur, qui in alterum processum continuatur. *Coronoideum* vocant.

Posterior (*f*) iste, durior, & solidior, sursum in crassitiem abit, quæ capitulo articulari finitur. *Condylodeus* dicitur.

Ejus latus, in universum, est finis, & duobus, non altis, eminentibus colliculis terminatur, ita positus, ut terminus exterior paulo anterior sit (*g*), interior idem paulum posterior. In ejus capituli facie superiori, cartilaginea crusta est, convexa (*h*), & retrorsum planior.

Cæterum universum os lamina exteriori utrinque levi, & media cellulosa reticulata natura constat. In ejus crassitie canalis exsculpitur, cujus lacerum (*i*), & amplum ostium est, sub secessu duorum processuum, in facie interna ossis, aque ea vestigium per ossis superficiem antrorsum descendit (*k*).

(*y*) SUE T. 10. f. 14.

(*z*) IDEM T. 5. f. 1. 2. WINSLOW n. 450.

(*a*) SUE ibid.

(*b*) ALBIN. tab. 1. f. 2. BERTIN p. 220.

(*c*) BERTIN p. 221.

(*d*) IDEM p. 220.

(*e*) WINSLOW n. 455.

(*f*) IDEM n. 456.

(*g*) Confer & MONRO p. 127. WINSLOW n. 456. BERTIN p. 228.

(*h*) CASSER L. II. T. 7. f. 2. post SPIGELIUM.

(*i*) BERTIN p. 221. SUE f. 30.

(*k*) MONRO Ed. 2. p. 161.

In senibus maxilla inferior figuram mutat, & inanibus alveolis contractis (*l*), & quasi concrefcentibus, multum nunc de sua altitudine amittit, fitque continuus levis & tenuis pro alveolis margo.

§. VI. *Articulatio maxillæ inferioris.*

In osse temporum utrinque ad radicem jugi eminentia est (*m*), pene transversa, hinc in jugum curvata, inde ab alæ pterygoideæ majoris extimo sine comprehensa.

Hæc eminentia, quæ posteriora respicit, in ipso suo margine habet facieculam articulare, crustatam (*n*) cartilagine, non in medio, sed paulo antè depressam, sine utroque eminentem, interiori, & exteriori. Hæc faciecula in fetu major, fere horizonti parallela est, & deorsum respicit; in adulto retrorsum, & aliqua anteriori parte deorsum (*o*).

Ultra eam, parvam certe, facieculam, retrorsum cavea insignis (*p*) intercipitur, inter articulare, quam descripsi, crustam & eminentem colliculum, qui in adulto homine finem anteriorem meatus auditorii limitat. In ea cavea membranæ (*q*) sunt rubentes, crustæ vero cartilagineæ nihil quidquam, deque ea cavea pars minima, quam modo dixi, capsula articulationis continetur, multo minor, quam quæ condylo maxillæ recipiendo sufficiat.

Ad eam tamen facieculam articulare condylus maxillæ inferioris non (*r*) adaptatur. Interponitur enim meniscus (*s*) naturæ ex cartilagine & ligamento mistæ (*t*) ovali longior, utrinque cavus: versus maxillam tamen inferiorem magis æquabili (*u*) sinu, ambitu paulatim

(*l*) RUYSCH *obs.* f. 65. 66. LEMERY *de la nourriture des os.*

(*m*) SUE T. VII. f. 3.

(*n*) WEITBRECHT *Synthesmol.* f. 31. b.

(*o*) Uti condyli maxillæ pars cartilaginea antrosum & sursum FERREIN p. 430.

(*p*) WEITBRECHT f. 31. c. ALBIN. *tab. off.* t. 2. f. 1. m. SUE l. c.

(*q*) Membranæ FERREIN *Mém. de l'Acad.* 1744. p. 429. Glandulosam in ea naturam reperiri MONRO *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. I. p. 125. 126. WALTHER *de oscit.*

(*r*) TARIN p. 114.

(*s*) Jam habet C. STEPHANUS L. l. c. ult. p. 37. & iconem VIDUS T. 17. f. 5. 6. 7. nuper descripsit WINSLOW n. 348. Duos esse meniscos WEITBRECHT p. 80. Sed tamen fatetur alias in unum connasci.

(*t*) VESAL. L. I. c. XI. Membranam pene cartilagineam vocat RUYSCH *thes.* IV. n. 69. Ligamentosum quid esse mavult FERREIN.

(*u*) Exprimit MONRO l. c. f. dextr. nimis fere COURCELLES t. 3. f. 2. 3.

rotunde intumefcente, versus os temporum (*y*) ora utrinque magis ultra mediam depressionem in cylindri speciem eminente instructus. Crassas habet oras, media pars tenuis est, & pene pellucet, & demum nonnunquam foramine (*z*) patet. Hæc cavitas respondet foli facieculæ, quam diximus marginem eminentem ante caveam oblinire in osse temporum; limbi vero eminentes menisci, & ante tuberculum, & pone idem adaptantur, quando nihil mutatum est. Quando vero maxilla retrorsum ducitur, ut dentes inferiores retro superiores ducantur (*a*), tunc meniscus in ipsam caveam, alioquin non ad dearticulationem natam, & inanem, eminentem suo margine posteriori subit. Sibi relicta maxilla sedem in tuberculo ossis temporum repetit. Sic etiam condyli maxillæ pars sola prior cartilaginem habet, nullam posterior (*b*).

Ad capsulam articulare hic meniscus fortiter innascitur (*c*), & ea sede laterali anteriori, innatas sibi fibras (*d*) pterygoidei externi musculi recipit. Capsula articularis ex anteriori sede, totoque ambitu caveæ articularis ossium temporum nata, condylum maxillæ continet (*e*).

De hac articulatione multum pugnatum est, cum veteres (*f*) maxillam inferiorem in posteriorem ossis temporis caveam se inmittere docerent; *J. Jacobus Ravius* vero primus (*g*), ad tuberculum ossis temporum adaptari scriberet. Eum *BOERHAAVIUS* (*h*) secutus est, & alii (*i*) clari viri; dissenserunt alii (*k*); ego vero ita describo, ut frequenter

(*y*) MORGAGN. *Adv.* II. f. 1. 3. CHESELDEN *osteogr.* T. 38. f. 2. Expressit figuram MONRO l. c. lat. fin.

(*z*) Vidit etiam WINSLOW n. 348. & Cl. HEUERMAN *physiol.* T. III. p. 270. & olim C. STEPHANUS.

(*a*) WALTHER p. 8.

(*b*) FERREIN p. 429.

(*c*) MONRO l. c. p. 126. 127. WEITBRECHT p. 80. WINSLOW l. c. n. 353.

(*d*) COURCELLES *tab.* 3. B. p. 58. MONRO p. 127. WALTHER p. 8. Addit MONRO, etiam temporalis & masseteris fibras.

(*e*) WEITBRECHT p. 81 82. f. 31. d. d. f. 32. h. MONRO p. 126. BERTIN p. 237.

(*f*) ORIBAS. p. 144.

(*g*) Apud ERNDL. *it. Angl. bat.* p. 96. ALBIN. *Catal. leg. Rav.* ARDINOIS *de med. fund. anat.* p. 18.

(*h*) I. R. M. n. 59.

(*i*) VOLKERSHOVEN *de juncturis ossium* p. 13. CANT. *impet.* p. 41. *Diff. au sujet du liv. de la maladie des os* II. p. 41. J. LUDOLF *de mirabili fabrica articulationis maxillæ inferioris cum osse temporum* Erford. 1749. 4. PETIT edit. PALFYN p. 96. BÖTTICHER p. 20. BERTIN II. p. 229. Siquidem radicem solam transversam jugi cartilagine ait incrustari.

(*k*) HEISTER *Masticat.* p. 9. FERREIN p. 429. 430. ALBINUS *de ossib.* n. 30. & 110. BOHLIUS *de mofu* p. 19. HEYMANN *Comm.* T. I. p. 452. HEURMANN T. III. p. 275. Johannes PALFYN in editione libri sui *van de beenderen* anni 1702. RAVIUM secutus, ab ALBINO aliter doctus, anno 1727. priorem descriptionem abrogavit.

quenter inspectas partes, veris cum cartilaginibus integras reperi. Sed etiam qui contra RAVIUM sentiunt, illustres viri, ita tamen rem interpretantur, ut & cum finu, & cum tuberculo maxillam ajant dearticulati (l).

§. VII. *Ligamenta ejus articulationis.*

Præter capsulam articulis omnibus communem, est in maxillæ inferioris articulo ligamentum insigne, laterale (m), ortum ab osse temporum, exque ejus fine, quem diximus, posterius & inferius, quam articulatio inferioris maxillæ, & insertum in condyli maxillæ inferioris marginem posteriorem, inter angulum & condylum, supra musculum pterygoideum internum. Super hoc ligamentum arteria maxillaris interna subit.

Duo ligamenta alia describit Cl. FERREIN (n), nova & peculiariora, nata ab eminentia transversali, cui maxilla adaptatur, interius aliud, alterum exterius, & inserta in extremum condylum. Ea videntur alii Cl. viri cum capsula numerasse.

Glandula etiam mucilaginosa in glena (o) ossis temporum, & glebulæ juxta menisci ambitum muciferæ (p) in ea articulatione reperiuntur.

Pertinent ad frictionem impediendam. Ob perpetuum enim in loquendo & edendo motum, hæc articulatio magnam adtritionem patitur, neque solum meniscum perforatum, sed omnino crustam cartilagineam ossis temporum in vetula detritam vidi, inque viginti fere glebularum collectam, quæ capsula articuli comprehendebantur.

Ligamentum ab angulo maxillæ inferioris in musculum styloglossum demissum (q), latum, membranaceum, alterius naturæ est.

(l) ALBINUS, MONRO, WEITBRECHT, FERREIN.

(m) WEITBRECHT p. 82. f. 32. i. An idem WINSLOW IV. n. 557.

(n) p. 430. An non huc ligamentum BERTINI T. II. p. 238.

(o) PITSCHER *axung. artic.* pag.

(p) WEITBRECHT p. 80. PITSCHER n. 5. p. 9. MORGAGN. *Adv.* II. p. 52. COWPER *append.* f. 8.

(q) WEITBRECHT f. 32. i. EUSTACH. t. 41. f. 11. GAUTIER.

S. VIII. *Motus maxilla inferioris.*

Multum & subtiliter nuper inprimis ab ILL. collega nostro FERRENIUS de hoc motu est disputatum. Mihi quidem integro in capite, ita est visum. Maxilla inferior a superiori deducitur, & os aperitur, duobus modis. Vel quiescunt sua in sede condyli, & solus anterior parabola vertex (*s*) descendit: vel in majori motu, una condyli antrorsum moventur (*t*), quantum ipsis capsula articulationis permittit, ipseque meniscus paulo ultra faciem cartilagineam antrorsum migrat (*u*).

Potest etiam maxilla diducta recto, & ad horizontem parallelo, motu antrorsum duci (*x*). Si is motus nimius fuerit, poterit maxilla antrorsum luxari, ut ante eminentiam transversalem delabatur.

Retrorsum facile adparet, ut moveatur, modice quidem (*y*), ut maneat in eminentia transversali, sed in ea parte, quæ respicit glenam ossis temporum, & fere ad perpendicularum descendat. Vehementer denuo retrorsum duci potest, ut meniscus in caveam ossis temporum innitatur, posteriori sua eminentia (*z*).

Motus lateralis & molitorius fit, dum apertæ maxillæ & deorsum ductæ (*a*) alter condylus in sua sede manet, alter antrorsum de eminentia promovetur, & una ad eam partem, ad quam eum volumus ire. Ita certe in recente cadavere reperi, & fusius ostendit ILLUST. FERRENIUS. Potest etiam maxilla antrorsum ducta (*b*) ad latus duci, ut alter una retrorsum cedat, versus quem maxilla ducitur.

Adde denique motum, quo os aperitur, maxilla inferiori non mota, sed capite retrorsum ducto, per biventrem (*c*).

Restitutio est contraria priorum.

(*s*) FERRENIUS videtur admittere l. c. p. 442. 447.

(*t*) IDEM p. 439. 440. 445.

(*u*) Conf. FERREIN. p. 447.

(*x*) IDEM p. 440. &c.

(*y*) Ad semilineam ultra situm sibi nativum FERREIN p. 433.

(*z*) p. 7.

(*a*) FERREIN p. 435. 436. 437. ad quinque lineas p. 436. *Diff. sur le Livre de la maladie des os* p. 20.

(*b*) FERREIN p. 443. 444. 447.

(*c*) p. 3. FERREIN p. 543. seqq.

§. IX. *Instrumenta hujus motus. Temporalis musculus.*

Magnus musculus (*d*), sed in animalibus carnivoris (*e*) major, quibus insignem cranii partem tenet, & comprimit, ut media crista (*f*) sola nuda emineat, in homine, quam in ullo quadrupedum debilior, oritur a magna parte laterali cranii, ex arcu circuli, qui in ipso nudo cranio distinguitur, ab orbitæ fine exteriori futuraque ossis frontis & malæ, retrorsum per partem ossis frontis lateralem nondum infimam, perque ossis sincipitis insignem arcum, ad angulum fere, quem inter os squamosum temporum & mammillare idem interponit (*g*). Deinde infra hunc arcum late ab osse temporum, frontis, & sphenoide, & aliqua parte ossis malæ, ipsoque jugo (*h*).

Ab eo arcu, quo hujus musculi origo circumscribitur, membrana cellulosa (*i*) firma, tamen vera, in lamina resolubilis, undique nascitur, & temporalem musculum protegit, in jugum late innata & in marginem orbitæ externum. Ab eo etiam involucro (*k*) undique fibræ ad temporalem faciendum accedunt, paulo supra jugum potissimum: Adeps etiam subest, qua caro deficit (*l*).

Ipse vero musculus fibras suas radiatas colligit, ut anteriores paulum retrorsum (*m*), posteriores paulum antrorsum, sed pene rectæ (*n*) eant. Eæ fere in tendinem radiatum (*o*), ut stellæ pingi solet, mediis in carnibus anterioribus & posterioribus interceptum, conveniunt, cui transmittendo in jugi parte posteriori sulcus proprius (*p*), de temporum parte squamosa, effoditur.

(*d*) Veteribus hinc proprio nomine dictus *κροταφίτης* RUFO appell. I. p. 95.

(*e*) In genere canum, felium, leone, civetta, etiam in serpentum genere, & testudine, chamæleonte PARISINI.

(*f*) IDEM. PERRAULT *Eff. de phys.* T. III. p. 191. in leone, tigride, urso, lynce. In leone BUFFON *hist. nat.* T. IX. inque tigride IDEM T. X. Conf. BARTHOLIN. Cent. IV. *hist.* 100.

(*g*) Conf. ALBINUM t. 2. WINSLOW n. 832. 836.

(*h*) WINSLOW *Expos.* T. II. *trait. des muscl.* n. 836.

(*i*) ARANTIUS *obs.* p. 86. VERDIER p. 209. Conf. L. XVI.

(*k*) WINSLOW n. 835.

(*l*) IDEM *ibid.*

(*m*) ALBIN. *tab.* 12. f. 12. SANTORIN. t. 1.

(*n*) IDEM *ibid.*

(*o*) Conf. ALBIN. p. 172. t. 12. f. 12. 13. & t. 2. WINSLOW n. 834. 839. 840. ARANT. l. c. Ideo forte duplicatos musculos temporales credit se vidisse MASSA *Isagog.* p. 77.

(*p*) Conf. ALBIN. p. 173. SANTORIN p. 35.

Descendit adeo jugo (*q*) tectus, a quo sæpe multis fibris (*r*) carneis augetur, ea sede crassissimus, tum tendineus; tum aliqua parte carneus; inferitur demum in processum coronoideum inferioris maxillæ, tum in exteriorem (*s*), tum in interiorem faciem (*t*), minus in marginem posteriorem, longius in marginem anteriorem, & in continuatam partem anteriorem semilunaris incisuræ (*u*), quæ processum coronoideum a condyloide separat. In eam sedem caro, in apicem processus coronoidei magis tendo inferitur.

Dum agit, maxillam inferiorem elevat ad superiorem, ad mordendum ergo servit. Quando solus operatur, una maxillam inferiorem retrorsum (*x*) ducit, & antrorsum dimotam suam in situm restituit.

Una cum Massetere agens recta magis maxillam elevat.

§. X. *Masseter* (*y*).

Unici musculi numerum tenent duo (*z*), aut tria (*a*) musculorum strata, satis distincta, quibus commune est, a jugo ossis temporum in maxillam inferiorem descendere, & ipsa crassa, etiam in homine, in animalibus magis, ut feli, & cani molosso, rotundum caput is ipse musculus faciat, quod excarni in sceleto longum est.

Cæterum, quando duo sunt masseteres, tunc *Exterior* (*b*), sive subcutaneus, major, oritur ab osse maxillæ superioris, qua malarum os sustinet (*c*), aque eo malarum osse, ejusque margine inferiori (*d*), & a continuo processu temporum jugali (*e*).

(*q*) COURCELLES tab. 3. ALBIN. t. 12. f. 13.

(*r*) HEISTER de *masfic.* n. XI. SPIEGEL p. 93. 94. COWPER. Negat SANTORINUS.

(*s*) Conf. ALBIN. l. c. f. 12. h. i. WINSLOW. n. 840. SANTORIN p. 36. COURCELLES tab. 5.

(*t*) ALBIN. f. 12. g. COURCELLES tab. 5.

(*u*) DOUGLAS p. 54. BIDLOO tab. 5. f. 12. COURCELLES t. 3. α. α. ALBIN. f. 12.

(*x*) ALBIN. WINSLOW n. 1220. Negat quidem FERREIN p. 547. Verum sulcus jugi utique ostendit fibras ejus musculi antrorsum inclinari.

(*y*) Hinc etiam apud Veteres nomen habent *μασθηριον* RUFO l. c. ORIBAS. p. 182.

(*z*) ALBINUS. VERDIER p. 210. KAAUW. Le CLERC *offic.* p. 100. 101. J. B. Cephal. p. 273. Caput duplex C. BARTHOLIN. p. 304. RIQLAN *Enchir.* p. 339. ut facile in duos separetur IDEM.

(*a*) Tres WINSLOW. DOUGLAS.

(*b*) ALBIN. p. 169. 170. t. 12. WINSLOW n. 828. seqq. COURCELLES t. 1. 2. N. COWPER f. 35.

(*c*) ALBIN. p. 169. t. 12. f. 20. SANTORIN T. I.

(*d*) ALBIN. p. 169. 170. WINSLOW n. 829. DOUGLAS p. 55. SANTORIN l. c.

(*e*) ALBIN. p. 170.

Fortior paulum retrorsum (*f*) tendit, tendine tectus, mistusque (*g*), & inseritur maxillæ inferiori, ab hoc ipso musculo depressæ & inæquali (*h*), pene a fede dentis molaris postremi ad angulum maxillæ (*i*).

Interior (*k*), sive *profundior* Masseter, oritur ab osse jugi, quod ad temporum os pertinet (*l*); & ab osse malæ, ex margine & ex parte cava ejus ossis, sed minori portione (*m*), & a temporalis musculi involucro (*n*). Obductus splendido tendine, descendit retrorsum, sed minus quam prior (*o*), aliquando antrorsum (*p*), & super priorem brevior inseritur, in condyli maxillæ partem inferiorem, & in coronoidei processus radicem, & late sub eo (*q*) processu.

Pars ejus posterior detracta cute nuda eminet (*r*), reliqua priori masseteris parte tegitur, hætenus distincta, ut tamen non penitus ad marginem maxillæ separari possit.

Hujus nunc posterioris partis portio *Exterior* (*s*) nervo intermedio separata nonnunquam peculiare, ob suum proprium, quo tegitur, tendinem, fere nomen tuetur, & a jugo (*t*) in spatium semilunare totum, atque condylum maxillæ inferioris inseritur (*u*).

Cum temporali musculo nonnihil confunditur (*x*). Maxillam recta elevat, compensatis fibrarum suarum contrariis ductibus. Caput ad maxillam depressum, & firmatum deprimit (*y*).

(*f*) IDEM ibid. WINSLOW n. 829. SANTORIN. KAAUW. n. 280.

(*g*) ALBIN. f. 20. 22. b. b. COWPER.

(*h*) WINSLOW n. 829.

(*i*) ALBIN. p. 170. f. 20. COURCELLES t. 3. E.

(*k*) ALBIN. p. 169. 170. tab. 12. f. 21. 22. c. t. 2. o. p. KAAUW n. 281. *Moyenne portion* WINSLOW n. 830. *Second* DOUGLAS p. 56. Habet COURCELLES tab. 4. seqq.

(*l*) WINSLOW n. 830. ALBIN. f. 21. & 20. DOUGLAS.

(*m*) WINSLOW n. 830. ALBIN. p. 170.

(*n*) ALBIN. KAAUW.

(*o*) Chiasmum faciunt fibræ RIOLAN.

(*p*) WINSLOW n. 830.

(*q*) ALBIN. p. 170. conf. f. 21.

(*r*) IDEM f. 21.

(*s*) *Troisième portion* WINSLOW n. 831. ALBIN. f. 22. d. *Third.* DOUGLAS p. 56.

(*t*) WINSLOW n. 831.

(*u*) Conf. EUMD. ibid.

(*x*) LIEUTAUD p. 192.

(*y*) ALBIN. p. 171.

§. XI. *Pterygoideus internus* (y).

Oppositus Masseteri, similis, minor tamen, & nonnunquam trans maxillæ marginem connexus, musculus est, *internus* (z) *Pterygoideus*, non tamen *externo* profundior, sed quod alter a lamina externa processus externi pterygoidei (a) prodeat.

Nascitur a fossa (b) utrique processui interjecta, pene tota; tum a lamina interna processus externi; porro a lamina externa processus interni (c), & ab hamuli inde nati radice, & ab osse palati (d) complente utriusque processus hiatum. Descendit pene rectus, pone maxillam inferiorem, paulum tamen extrorsum, sive retrorsum, ejusque fere margini & parti (e) fauces respicienti, & in initium condyloidis processus, ad usque sedem dentis molaris postremi inferitur.

Elevat, ut priores, maxillam; & cum extrorsum aliquantulum descendat, dexter eam paulum ad sinistra promovet, aut vicissim.

Perinde, ut reliqui levatores, caput potest ad maxillam deductam & firmatam deprimere (f).

§. XII. *Vis horum musculorum magna.*

Conjunctum momentum duorum musculorum temporalium, duorum masseterum, duorum pterygoideorum internorum maxillam inferiorem ad superiorem adducit: id *mordere* dicitur, quoties inter dentes utriusque maxillæ aliquid intercipitur, in quod ipsum maxillæ inferioris sursum ductæ motus insumitur.

Nunc quidem leonum, ferro suos dentes imprimentium (g): murium, qui ferrum, quique argenteos clypeos roserunt (h), exempla omitto. Etiam Lucius piscis, non ponderosior duabus libris, vigenas

(y) Musculi, qui ore continentur ORIBAS. p. 184.

(z) COURCELLES tab. 6. A. A. tab. 7. A. EUSTACHIUS t. 41. f. 13.

(a) I. G. PAULI ad V. v. HORNE microc. p. 20.

(b) ALBIN. p. 261. t. 12. f. 15. 17. WINSLOW n. 843.

(c) Conf. ALBIN. p. 261. WINSLOW n. 843.

(d) ALBIN. p. 262.

(e) IDEM l. c. EUSTACHIUS.

(f) ALBIN. p. 262.

(g) Phil. Transf. n. 310.

(h) PLINIUS L. VIII. c. 75. ÆLIAN L. XVII. c. 17. Plumbum rodere ob dulcedinem BORRICH de nat. dulced. p. 76.

libras dentibus elevavit (*i*). Silices mandebat miser puer, quem nuper vidimus a circulatorum circumduci. Orbem stanneum perforavit alius (*k*). Vidit VESALIUS (*l*), qui ferreum palum, viginti quinque libras pendentem, morficus adprehensum retro se conjecit, ut ad triginta & novem pedum distantiam trahi infixus hæreret.

Alius malum elevavit dentibus (*m*), & rectum in humerum constituit; & alius scabellum ingens dentibus sublevavit (*n*), & dolium alius (*o*), equidem inane, prehensum super caput suum projecit. Alius vas duabus vini mensuris plenum, & elevavit suis dentibus, & ebibit (*p*), & retro se projecit; tum stanneas patinas 12. (*q*). Ejusmodi cantharum 116. unciis (*r*) vini plenum fuisse vidit Vir eruditissimus, quem dentibus potor elevavit. Sed etiam 50. (*s*), & 56. l. (*t*) pondo alii elevaverunt, & demum pondo 160. (*u*), 200. (*x*), 240. 300. (*y*). Mensam sex pedum cum 50. l. extremo fini adpensis alius sustulit (*z*). Amygdali officula, quæ a 200. (*a*) libris demum rumpebantur, & perfici etiam duriora, 300. (*b*) lib. demum pondere superanda officula, sunt qui frangunt, ipseque junior fregi.

Hi conatus, calculis positus, multo sunt majores; cum musculi morfus ministri omnes ad articulationis, sive hypomochlii, viciniam inferantur, morfus vero vel incisivis, vel certe molaribus dentibus ab hypomochlio remotioribus peragatur.

(*i*) RICHTER *ichthyolog.* p. 142.

(*k*) PLEMP. l. c.

(*l*) L. II. c. 15. Conf. hæc jam relata L. XI. p. 486.

(*m*) CARDAN *subtil.* p. 358.

(*n*) RHODIUS *Cent. I. obs.* 97. add. BAGLIV. p. 591.

(*o*) PLEMP. *van spieren* p. 44. BOERHAAVE *Praelect.* T. I. p. 151.

(*p*) ROLFINK *diff. anat.* p. 524.

(*q*) RZASZYNSKI *hist. nat. Polon.* T. II. p. 455.

(*r*) J. Ant. v. der LINDEN *physiolog.* p. 340.

(*s*) RHODIUS l. c.

(*t*) PLOT *natural history of Staffordshire* p. 293.

(*u*) BORELLUS L. I. prop. 87.

(*x*) PLOT.

(*y*) BORELL.

(*z*) DESAGULIERS *Course of natur. Phil.* T. I. p. 290.

(*a*) HEISTER *de masticat.* n. 16.

(*b*) IDEM *ibid.*

Quare vires impensæ ad 900. 1000. & 1800. (c) libras ex hac speculatione æstimantur, etsi vires efficaces infra id pondus subsistunt; & multo major foret calculus, qui Cl. DESAGULIERS experimento innititur.

Adparet adeo, etiam hominem a natura ad cibos dividendos egregie armatum esse, etsi minori vi eget, in tanto instrumentorum adparatu, majori longe feræ, quibus & prædam dentibus potissimum occidere, deinde ipsa ossa in fragmenta dividere necesse sit, ne pars alimenti pereat.

§. XIII. *Pterygoideus externus* (d).

Biceps est musculus, & aliquanto, quam continuo videatur, grandior.

Caput *inferius* (e), vulgo notius, crassius nascitur ab alæ exterioris pterygoideæ lamina externa (f); ab osse palati, quod huic alæ & sinus maxillaris parieti se interponit (g); aque osse sphenoide ad fissuram sphenomaxillarem pertinente, & a vicino osse maxillari (h). Hoc caput potius partim paulum adscendit, qua ex ala oritur, partim antrosum fertur. Inmittitur in cavam foveam condyli, sub capite maxillæ (i), & parte aliqua in principium semilunaris incisuræ (k).

Ab eo interposito arteria nasali separatur caput alterum *superius* (l), *temporale*, potius descendens, natum a spina pterygoidea, seorsumque fere ad dimidiæ lunæ modum, a fossa temporali, pertinente ad alam pterygoideam, ad tuberculum usque in ea fossa positum, & ab eo tuberculo, cum temporali musculo connexum. Fibre inferiores transversim magis decurrunt: superiores descendunt paulum & antrosum feruntur, &

(c) BORELLUS Conf. Prop. 34.

(d) Novi musculi ab alæ facie exteriori, & ab apice acuto sphenoidis FALLOP. p. 73. Ad temporalem refert VESALIUS *Exam. obs.* p. 63.

(e) *One tendineo carneous* DOUGLAS p. 58. Add. ALBIN. t. 12. f. 16. a. b. c. k. &c.

(f) COURCELLES Tab. 7. H. ALBIN. p. 263. WINSLOW, n. 322. EUSTACHIUS t. 47. f. 13.

(g) Habet etiam ALBINUS.

(h) DOUGLAS. ALBIN.

(i) DOUGLAS. COURCELLES t. 3. B. ALBIN. in icon. WINSLOW n. 847. COWPER tab. 24. f. 70.

(k) EUSTACH. COWPER. VIDUS t. 38. f. 24. Q.

(l) *The other* DOUGLAS p. 58. Conf. WINSLOW n. 846. *en remplissant* &c. ALBIN. t. 12. f. 16. g. g.

& sub condylo in foveam ibi sitam, inque semilunarem incisuram inmittuntur, tum in meniscum (*m*), & in capsam articuli maxillæ (*n*).

Hic musculus motui laterali præficitur. Cum ejus directio in univrsam retrorsum, & paulum extrorsum sit, hinc maxillam antrorsum (*o*.) ducit, & inprimis ad suum latus, ut sinister ad sinistra maxillam trahat (*p*), sic ad dextra cogat alterum condylum eminere. Motus autem antrorsum major, ad latera exiguus est.

Iterum, ut priores ad firmatam maxillam caput detrahit (*q*).

§. XIV. *Latissimus colli.*

Ad maxillam quidem deducendam, & os aperiendum multi musculi operas conferunt: biventer etiam potissimum, alias dictus: tum musculi, qui ab osse hyoide in maxillam feruntur, Geniohyoideus, & genioglossus: deinde qui os hyoides (*r*) deorsum ducunt, sternohyoideus, corachyoideus, hyothyreoideus, denique qui laryngem, ut sternothyreoideus.

Neque abest ab hac actione vis musculum, qui os hyoides retrorsum ducunt, ut stylohyoidei utriusque. Quæcunque nempe carnes in maxillam, vel in os aliquod cum maxilla connexum ita inferuntur, ut eam partem deducant deorsum, aut ad os hyoides adtrahant, ii etiam os aperiunt (*r**).

Peculiariter etiam maxillam, antrorsum a Pterygoideis externis ductam, retrorsum restituunt Geniohyoidei, genioglossi, digastrici, stylohyoidei, ut qui posterius quam media maxilla nati, eam retrorsum ducant (*s*).

Est tamen etiam alius musculus, qui peculiariter & carnes lateri maxillæ instratas deprimit, & una ipsam maxillam. Et si enim debilior

(*m*) Vid. p. 8. ALBIN. p. 263. DOUGLAS.

(*n*) ALBIN. WINSLOW n. 847.

(*o*) ALBIN. FERREIN *Mém. de l'Acad.* 1744. p. 549.

(*p*) ALBIN. &c.

(*q*) IDEM. Conf. FERREIN p. 538.

(*r*) Conf. MONRO l. c. p. 140. 145. WALTHER p. 9. Hinc os hyoides conatur descendere, quando maxilla inferior deprimitur FERREIN l. c. p. 536.

(*r**) Una ergo agunt Digastrici venter posterior & stylohyoideus FERREIN p. 538.

(*s*) IDEM l. c. p. 547. 549. MONRO p. 142.

videtur, cujus fibræ valde teneram & latam in laminam explicentur, tamen & magnitudine, qua omnes alios maxillæ musculos superat, tenuitatem compenfat, & præterea tangitur, & percipitur ejus per ipsum pectus conatus, dum maxilla diducitur, uti quidem nunc, dum scribo, experior.

Latus, ut nomen fert, & tenuis musculus est, cuti, & porro adipi subjectus, cujus inferiores fines disjecti per summum pectus oberrant (*t*). ad aliquot sub clavicula uncias, per superficiem pectoralis, deltoidis, & trapezii. A sternone aliqui (*u*), & a clavicula oriri dixerunt. Id non vidi.

Inde colliguntur, in unum continuum stratum, & sursum, introrsum, antrorsum feruntur, subjectasque carnes, & vasa colli protegunt, ut exigua sedes intima in inferiori parte colli nuda supersit (*x*). In mento dexter finistrum attingit & decussat (*y*).

Denique in facie fibræ quidem extimæ pene transversæ trans masseterem ante parotidem incedunt, & dissipatæ evanescunt (*z*). Earum interiores cum musculo risorio veniunt in angulum labiorum, interius quam triangularis. Proximæ cum triangulari (*a*) labiorum intertextæ ad angulum labiorum desinunt. Aliquæ intimarum ad membranas margini maxillæ impositas hætenus adhærescunt (*b*), a symphyssi pene ad triangularem, & e regione triangularis. Iterum interiores triangulari tectæ ad quadratum (*c*) menti tendunt, ibique desinunt.

Ita factus musculus poterit maxillam deducere (*d*), magis tamen labium inferius, angulumque labiorum. Est adeo ex musculis, qui trisittitæ characterem (*d**) faciunt. Potest vicissim, firmatis musculis, cum quibus superius cohæret, eandem cutem elevare (*e*).

(*t*) EUSTACH tab. 30. VESAL. L. II. tab. 3. WINSLOW n. 570. ALBIN. p. 193. Tab. I. & XI. f. 16. JENTY tab. I. f. 1. COWPER tab. 21. 18.

(*u*) DOUGLAS p. 24.

(*x*) C. Aug. a BERGEN pentas obfss.

(*y*) WINSLOW n. 571. LIEUTAUD p. 165. 166. DOUGLAS p. 24.

(*z*) EUSTACH. tab. 30. ALBIN. l. c. COWPER l. c. PARSONS l. c. p. 30.

(*a*) WINSLOW n. 572. 573. ALBIN. ic. cit. d. & tab. 1. p. 193. COURCELLES t. 1. p. EUSTACH tab. 30.

(*b*) DOUGLAS p. 24. WINSLOW n. 570. ALBIN. l. c. & ic. cit. g. g. & tab. 1. COURCELLES tab. 1. m.

(*c*) Conf. SANTORINUM tab. 1. ad Y. WINSLOW. n. 572. & ALBIN p. 193. BERGEN pentas obfss.

(*d*) DOUGLAS.

(*d**) In aponeurosin abire, quæ faciei varietates faciat VERDIER.

(*e*) ALBINUS p. 194.

Fasciculum nonnunquam ad auriculam aberrantem & ILL. Viris visum, hic omitto (*f*).

§. XV. *Dentes in universum.*

Maxilla sola manducationi sufficit in teneris infantibus (*g*), quibus cibi mollissimi soli offeruntur, inque senibus, quibus post delapsos dentes alveoli contracti evanescunt, & maxilla utraque in aciem quamdam abit, callosa (*h*) gingivarum membrana tectam.

Quandoquidem vero maxillæ membrana, tamen sentiente & molli, obducuntur, non potest homo fructuum ossicula frangere, neque ossa animalium, neque durior quamcunque crustam dividere; ita cibus parum adtritum in ventriculum descendit, quem vires multo molliores ejus sacci minime valeant adterere. Et a multis adeo cibis excluderemur, & plerisque parum recte subigeremus, nisi DENTIUM præsidium Natura nobis addidisset. Animalia præterea dentibus & armorum loco ad occidendam prædam, seque ipsa tuenda utuntur: aliqua etiam ad retinendam eam prædam, ne ore recepta fugiat, viva quæ sit, & sensim demum gulam subeat: id in piscibus (*i*) fere locum habet, ut in lucio, cui curvi dentes retrorsum respiciunt, prædamque de ore fugituram mira tenacitate retinent infixi. Demum cavi dentes aliorum animalium, aut venenum funestum in prædam instillant (*k*), aut tubi loco sunt, per quem animal succum nutritium fugat (*l*).

Quare natura universis fere animalibus dentes dedit: quadrupedibus calidis, puto, omnibus: frigidis plerisque; aut certe asperas, ferratas-

(*f*) Lib. XV.

(*g*) Non valde rarum est *dentatos* nasci infantes. M. CURII exemplo, qui ab ea fabrica nomen accepit, & C. PAPIRII CARBONIS, & VALERIÆ apud PLINIUM L. VII. c. 16. Puer cum dentibus molaribus natus RZASCYNSKI *hist. nat. Pol.* T. II. p. 455. Adde RHODIUM *Cent. obs.* 92. L'ECLUSE I. 25. 26. STORCH *Kinderkrankh.* II. p. 242. Etiam in abortu sex mensium dentes Eph. Nat. Cur. Dec. III. Ann. 5. 6. *obs.* 268. & septem HELWIG *obs.* 28. Pueros cum dentibus natos numerosos collegi LECLUSE p. 25. 26. THORESBY *topogr. of Leeds* p. 603. *Bresl. Saml.* 1718. m. Febr. 1723. m. Sept. 1726. m. Decembr. *Phil. Transf.* n. 233. PLOT. *natur. hist. of Staffordshire* p. 271. HILDAN ep. 63. etiam in quinque mensium abortu G. V. SWIETEN comment. T. IV. p. 688.

(*h*) MOUTON. p. 24. 25.

(*i*) CARDAN. p. 264. J. SYLVIUS. RONDELET L. III. c. 7. VALISNERI T. III. p. 448. KELIN *Miff.* IV. p. 4. In angue HODIERNA apud SEVERINUM *vipcr.* p. 255. In rana piscatrice *Phil transf.* n. 492.

(*k*) In vipera caudifona BIRCH I. p. 479. 480. &c.

(*l*) SWAMMERDAM in verme sicario *tab.* 28. f. 5. Cochleæ *Kamboul* denticuli 20000. in maxilla inferiori, & sex series dentium in superiori ADAMSON p. 17.

que maxillas, dentium (*m*) similes, ipsasque etiam linguas dentibus armavit, & palata. Sic in piscibus se habet; his innumerabiles fere dentes in lingua (*n*), in palato (*o*), in pharynge (*p*), inque maxillis dedit, multorum sæpe ordinum (*q*). Etiam in microscopico vorace animalculo totum os ferris asperis intus echinatum est (*r*).

Avibus cartilagineum durumque & insensile rostrum dentium locum hætenus tenet; in multis ferratum (*s*) & in lingua (*t*), palatoque (*u*) demum dentes pariter retinendæ prædæ causa Natura paravit.

Insectis plerisque dentes dati sunt, forte omnibus. Nam etiam polypi prædam retinent, quæ semel os subiit.

In cochlea (*x*), limace (*y*), loligine (*z*), lepade (*a*), aranea (*b*), cancro (*c*), monoculo (*d*) os dentatum est.

(*m*) Ranæ JACOBÆUS p. 80. ROESEL. *Frosche* p. 35. Testudini CALDESI p. 18. Etiam manati duo ossa solida fulcata habet pro dentibus Nov. Comm. Acad. Petr. T I. p. 302.

(*n*) Salmoni GRONOV. *Act. Upsal.* 1741. BONGE p. 10. Lucio stratum exiguum denticulorum in media lingua est Vulpi PERRAULT III p. 173. troctæ p. 172.

(*o*) CARDAN *variet.* p. 264. ARISTOTELES *part. anim.* III. c. 5. ALDROVAND. *paralip.* p. 86. in lucio COLLINS p. 214. SEVERIN 2002. p. 368. in muræna. In xiphia BARTHO-LIN. *Cent. II. hist.* 16. Conf. du HAMEL p. 158. In palato duos majores in rana dentes addit JACOBÆUS p. 80. Palatum dentatum habent, qui testis vivunt *Nouv. obs. sur l'osteol.* p. 23.

(*p*) Troctæ SYLV. *Isag.* p. 76. aselli PERRAULT III. p. 174. In oesophago sepia NEEDHAM l. c.

(*q*) Tres in Raja PERRAULT III. p. 174. sex in cane carcharia ALDROVAND. p. 381. 382. In eodem a duobus ad sex TOWNE apud RAI *epist.* Tres & quatuor ordines, in quorum quovis dentes 30. SPORI in *itiner.* Novem in sepia NEEDHAM p. 26. 27. Dentes fasciculati in rana piscatrice *Phil. transf.* n. 492. Per os in spiram dispositi in lampetra COLLINS p. 63. f. 4.

(*r*) HILL. *microsc. eff.* p. 375.

(*s*) Vulturi Grifoni PARISINI, anati PEYER in multis speciebus.

(*t*) Anseri ALDROVAND L. 19. p. 107. phœnicoptero PARTS. tardæ HARDER.

(*u*) In pico *Phil. transf.* n. 350. in avibus latirostris COLLINS p. 220. in gallopavone GREW *rarit.* p. 64. t. 6. f. 4. in aquila HARDER *obs.* 19. in milvo *huytard* COLLINS t. 6.

(*x*) Dentes habet ARISTOTELES *part. anim.* L. IV. c. 5. PLINIUS L. XI. p. 625. Dens unicus, octo striis & cuspidibus asper LISTER *cochl.* p. 68. Unus dens semimultiplex BRADLEY *account.* 23. Dentes ferratos connexos in unum vocat SWAMMERDAM p. 108.

(*y*) Tricuspis LISTER p. 70. *tah.* 3. f. add. HOOKÈ t. 25. f. 1.

(*z*) Dentes duo curvi LISTER *conchyl. bivalv.* p. XXIII.

(*a*) Maxillæ dentes numerosi decem ordinem ADAMSON p. 29. SWAMMERDAM p. 198.

(*b*) Habet dentes SWAMMERDAM p. 150. Septem GAUTHIER *obs.* p. 199. Maxillas dentatas CLERCQ *Swenska Spindlar.* p. 10.

(*c*) Duo validi ROESEL *Insect. Belust.* T. III. p. 314. t. 56. f. 5. In cancello eremita FANTON *anat.* Ed. nov. p. 114. Add. WELSCH *becatoft.* I. *obs.* 6. 7.

(*d*) SCHÆFFER *Wasserfloh.* p. 34.

Sic vespis (*e*) & apibus (*f*), bombylio (*g*), grylloque (*h*), & formicæ (*i*) duo sunt dentes. Bombyci duæ dentium series (*k*); locustæ duæ (*l*), vel tres (*m*); libellæ quatuor (*n*); hirudini tres secures corneæ (*o*). Eruca habet maxillam dentatam (*p*); duosque dentes; dentesque duos sicarius vermis (*r*), ipsis infornibus animalibus echinis (*s*) bernaclæ (*t*), & hydræ sui dentes sunt (*u*), & lepori marino tamen gengiva dentata (*x*).

Sed in his animalibus etiam alio præter os loco dentes reperiuntur. In ispo astacorum ventriculo dentes tres (*y*), ferrati propriis musculis recti: tum in lerneæ ventriculo (*z*), & in verme afili (*a*).

Videtur latius dentium imperium, quam cordis esse; uti latissime per animalia intestinum regnat.

§. X V. I. Fabrica dentium.

Fundamentum dentis, in fetu (*b*) nudum, in adulto homine follicu-

(*e*) Duo REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1719. p. 233. t. 12. f. 1. *Mémoire pour servir à l'histoire des insectes* T. VI. p. 160.

(*f*) SWAMMERDAM p. 387.

(*g*) REAUMUR *Mém. pour servir à l'histoire des insectes* t. VI. tab. 4. f. 4. 5.

(*h*) Gior. di Parma 1687. p. 64

(*i*) GOULD *englits hants* p. 4. SWAMMERDAM *bloodlooz diertj* II. p. 23.

(*k*) *K Sw. wetensk. handl.* 1745. p. 256. Duo dentes MALPIGH. t. 7. f. 2.

(*l*) KUNDMANN p. 8. ARISTOTELES I. c.

(*m*) ZINANNI *cavallette* tab. 4. RAHTLEF I. p. 184.

(*n*) REAUMUR *ibid.* p. 400.

(*a*) MURALT *vademec.* p. 569. RONDELET p. 227. Sexaginta notatæ denticulis *Mém. de l'Academ.* 1739. p. 260.

(*p*) LYONNET p. 46.

(*r*) SWAMMERDAM. t. 28. f. 5.

(*s*) PLINIUS L. XI. p. 621. RONDELET. p. 528: Quinque dentes canini KLEIN *Echinoderm: tab.* 31.

(*t*) Sex laminae dentatæ NEEDHAM *discov.* p. 99. 100.

(*u*) BOHADSCH p. 92. Anulus 5. dentium connexorum osseorum IDEM p. 90.

(*x*) SCHONEVELD *ichtyogr.* p. 42.

(*y*) ROESEL *Insect. Beaut.* T. III p. 325. t. 58. f. 13. WELSCH I. c. HANOW *Seltenb.* I. p. 514. In cancello eremita tres dentes ferrati; & duo alii SWAMMERDAM *hibl.* p. 202.

(*z*) BOHADSCH *anim. marin.* p. 19. idem enim est lepus marinus.

(*a*) SWAMMERDAM p. 660.

(*b*) HIPPOCR. περί αρχων σαρκων. FALLOP. *obs.* p. 52. 53. EUSTACH. *de dentibus* c. 17. RIOLAN. *tract. isag.* p. 106. GAGLIARDI *de offib.* p. 88. DUVERNEY *Journ. des Sav.* 1689 n. 19. *posth.* p. 534. ZOD. II. p. 1130. RUYSCH *thes.* I. *off.* 2. n. 18. NESBIT p. 97. In nympha apis similis natura est SWAMMERDAM p. 429.

lus est (c), qui aliquam dentis similitudinem habet, & in radices productus, & in coronæ eminentias (d), aut acieni. Fit membrana rubra (e), vasculis plenissima? quæ cum muco (f), in fetu magis conspicuo, nervum (g), arteriam (h), venamque recipit, pluresve nervos, pluraque vascula, ubi plures (i) radices subsunt. Adeunt ea per propria in radice foramina (k); quæ exigua in adulto hominè, in fetu maxima fuerunt, inque puero. Sensus in eo nervo acerrimus est, ut etiam per crustam osseam vitreamve doleat (l), quando ea justam crassitiem amittit. Nudus nervus ipsam auram reformidat, Convulsiones ex discisso nervo supervenerunt, cum dens secaretur (m): & ea vulgo nota sunt.

Ex superficie hujus folliculi succus sudat sub ultima gestationis temporâ, qui paulatim crustam facit (n), qua pars dentis ab alveolo eminus operitur, tenuis eadem, & multo suo dente brevior. In molari circulus primo ferratus, tunc pene plana bractea: in incisivis dentibus cavum quasi digitale est, in fine ferratum (o).

Sed & ea crusta paulatim succrescit, & molles dentis radiculæ (p) natura ossea comprehenduntur, quæ in alveoli ima parte manent, & demum duplex in dente maturies se distinguit.

(c) MALPIGH. *postum.* p. 53. EUSTACH. c. 2. INGRASSIAS ad text. V. GALENI de *offib.* VOLKERSHOVEN *junctur off.* SERMES *Eph. Natur. Cur. Cent.* III. IV.

(d) GAGLIARDI p. 63. UNGEBAUER *dentit. sec.* f. IV. a.

(e) RUISCH MONRO p. 167. 168. DUVERNEY p. 551.

(f) SWAMMERDAM JANKE *diff. I. de maxill. puer. septenn.* p. 29. RUISCH. DUVERNEY. EUSTACH. c. 17. 18.

(g) MALPIGH. HAVERS p. 87. COLOMBUS. EUSTACH. c. 21. GALEN. de *off. text.* 5. BERTIN. l. c.

(h) EUSTACH. c. 21. MALPIGH. RUISCH. *thes.* X. n. 27. RAU apud ERNDL. in *itin. Angl. bat.* FALLOP. *obs.* p. 52. 53. COLUMBUS p. 34. VERHEYRN. p. 497. FAUCHART, *chirurg. dent.* p. 20. DUVERNEY p. 557. BERTIN l. c.

(i) HAVERS. EUSTACH. c. 10. INGRASSIAS ad *texte* V.

(k) EUSTACH. *Syllab. part. corp. hum. petrop. tab.* 2. f. 9. DUVERNEY p. 559. *Eph. Nat. Cur. Cent.* III. *obs.* 95. NUCK *Chirurg.* p. 50. f. 5. WINSLOW n. 480. HAVERS *ibid.* MONRO *of the bones* p. 268. BERTIN. II. p. 242.

(l) FALLOPIUS de *off.* p. 126. a. in se ipso *obs.* p. 52. Conf. de dente fisso RABUM de *dentib.*

(m) C. BARTHOLIN. *anat.* p. 466. T. BATHOLIN. *anat.* p. 727. Conf. COWPER ad BIDL. t. 91. f. 7.

(n) EUSTACH. JANKE I. p. 29. NESBIT *osteogen.* p. 53. t. 3. f. 14. 15. ALBIN. *adnot.* L. II. T. I. f. 5. 7. t. 2. f. 1. &c.

(o) Conf. ALBIN. *ic. cit.* t. 2. f. 23. 48. 49.

(p) Conf. GAGLIARDI p. 64. UNGEBAUER p. 7. DUVERNEY p. 553. *Journal des savants* l. c. ALBIN. t. 1. f. 13, add. 19, &c. t. 2. & olim add. RIOLAN. *tract.* *Isag.* p. 107.

Interior pars dentis tota osseam (*q*), qualis in universo corpore est naturam retinet, laminatam.

Pars exterior (*r*), quæ de alveolo nuda eminent (*r**), obducitur peculiari materie, multo quam ossa duriori, ut & linæ (*s*) nonnunquam, & igni (*t*) resistat, & in antiquissimis cadaveribus sola se sustineat, quando ossa in pollinem collabuntur (*u*), neque ab oleo vitrioli patiatur sibi materiem calcariam eripi, ut quidem pars ossea (*x*). Vitri, albi, metallici, simile quid habet, pariter in angulosas particulas fragilis, adeo dura, ut ignem subinde cum chalybe collisa elicuerit (*y*).

Fabrica ei fibrosa (*z*) est, ut in dentibus potissimum animalium minorum vidi, quales in caverna Schartzfeldienfi reperta Gottingæ inter thesauros academicos reliqui. Videas in iis præmagnis curvisque dentibus albam lapideam materiem, cum altera alternantem, quæ cinerea, striarum parallelarum modo de axi dentis (*a*) extrorsum fertur. In ossea parte eadem fibræ firmantur (*b*). In grandibus animalibus vesiculæ apparent, quæ mucum continent, in id ipsum dentium vitrum abiturum (*c*).

Cæterum alveolus in fetu amplissime patulus circa confirmatum dentem connivet (*c**), ejusque partem unicam, quæ radix est, contractus continet, dum vitrea nuda & absque periosteo eminent. Etiam in sceleto ho-

(*q*) Habet MALPIGH. t. 1. f. 3. In brutis laminata est DUVERNEY *Journal des Savans* l. c. & HAVERS p. 84. Non in homine GAGLIARDI p. 58. 59.

(*r*) BERTIN. T. II. p. 242. add. WINSLOW n. 480. HAVERS p. 83.

(*r**) In radice suprema aliqua est, sed tenuis BERTIN T. II. p. 242.

(*s*) ARISTOTELES *hist. anim.* L. III. c. 7. HAVERS p. 78. DUVERNEY p. 568.

(*t*) PLINIUS L. VII. c. 16.

(*u*) In catacombis *Voyag. histor.* T. II. p. 153. Et in puella, cui costæ emollitæ, ossa ceræ similia, firmi fuerunt dentes.

(*x*) LUDWIG *de cort. dent.*

(*y*) GAGLIARDI p. 62. RHOD *Cent. I obs.* 96. In crocodillo JESUITES *Slam.* p. 12. Vitrea crusta dentium in spiritu nitri fumante: additoque oleo tartari per deliquium dejicitur inpalpabilis. Non habet parenchyma, live cellulosas telas inter laminas osseas, sed est quasi coacti liquoris congelatio HERISSANT *Mem. de l'Acad. ann.* 1758.

(*z*) WINSLOW n. 481. HAVERS p. 79. GAGLIARDI p. 60. *tab.* 2. f. 3. MALPIGH *posthum.* p. 53. t. 1. f. 4. *Hist. de l'Ac.* 1699. 41. 43. Fibras habet in lupo, urso, castore ROBERG *off. tuberos.*

(*a*) Transversim GAGLIARDI p. 60. *Mém.* l. c. p. 41. 43. NUCKIUS. In molaribus eæ fibræ transversæ sunt, in acutis dentibus ad apicem tendunt HAVERS p. 79.

(*b*) GAGLIARDI p. 60. *Mém.* l. c. p. 41.

(*c*) *Mém. de l'Ac.* 1754. p. 433. Pasta mollis in bobus BOURDET *Recherches* T. I. p. 28.

(*c**) FAUCHART p. 15. DUVERNEY p. 565. *Journ. des Sav.* l. c.

minis adulti, sublatis omnibus aliis vinculis, plerumque dentes suis in alveolis fixi manent : & ab eodem elatere fit, ut dens alienus aut proprius in alveolum sibi aptum nuper inanem repositus comprehendat (*d*). Superest etiam post confirmatum dentem hæc natura contractilis alveoli. Nam ubicunque dens amissus est, ibi alveolus evanescit (*e*), etiam omnes in fenibus, unde illa maxillæ, quam diximus, fenilis angustia. Sed & gingiva (*f*) contracta dentem comprehendit, & aliquantum, sed multo minus, nervuli, & arteriolæ radices subeuntes sua cum cellulosa tela (*g*) ad dentem fundandum faciunt.

§. XVII. *Classes dentium. Incisores.*

In maxilla utraque hominis eo modo hi dentes firmantur, ut in profundo osseo utriusve maxillæ alveolo radix defigatur; & corona, sive pars nuda dentis radici ad perpendiculum infideat. Ita vires in morfu integræ explicantur. Tantum adnotatum est, maxillam inferiorem paulum intra superiorem se recipere (*h*), ut dentes superiores una aliquanto anteriores sint: in chinenfibus, ut passim lego, etiam magis, & in nonnullis faciebus, qualem matronam coram video.

Mobiles sunt in paucis animalibus, insectis, rana piscatrice (*i*), tursione (*k*) dentibus veneniferis serpentum (*l*); in piscibus fere ejusdem cum maxilla continuatæ naturæ. In homine & quadrupede diversi a maxilla, sed ei cum firmitate infixi.

(*d*) VERDIER p. 71. FAUCHART. PFAFF. DUVERNEY p. 563. La MOTTE I. p. 99.

(*e*) RUYSCH *obs.* 82. DUVERNEY p. 563. CHESELDIN *osteogr.* t. 6. f. 4. 5. C. BARTHOLIN. *instit. anat.* p. 463. la HIRE *Hist. de l'Acad.* 1699. p. 42.

(*f*) BERTIN. T. II. p. 241. HAVERS p. 85. 86. MONRO edit. II. p. 165.

(*g*) Fibras vocat DUVERNEY p. 567. & tendineas p. 568.

(*h*) EUSTACH. c. 13. BERTIN. T. II. p. 246. ALBIN. *de off.* p. 5. tab. 1. f. 3. SUE t. 5. f. 3. MOUTON *odontotechn.* p. 135. Etiam in carnivoris DUVERNEY *Nouv. découv. sur l'osteol.* p. 10. BUFFON T. VI. in fele. Et in herbivoris, ut in castore *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 251. DUVERNEY *Nouv. obs. sur l'osteol* p. 17.

(*i*) ENT. apud CHARLETON *onomast.* p. 74. *Phil. trans.* n. 492.

(*k*) TYSON p. 33.

(*l*) KLEIN *berpetolog.* p. 13. 44. In cerasse HASSELQUIST *Palastin.* p. 321.

Eorum in aliis & aliis animalibus alia est fabrica. Sunt, quibus unicum dentium est genus; sunt, quibus plura. Homini tria sunt, incisorum, caninorum, molarium (*m*).

Incisivi dentes (*n*) homini cum animalibus & herbivoris (*o*), & carnivoris (*p*) communes sunt, cum suo robore tamen dentium minimi, & debilissimi, in maxilla superiori (*q*) majores, interiores etiam maximi (*r*). Numerus in quavis maxilla (*s*) quatuor (*t*).

Commune est ipsis radicem habere unicam, conicam, compressam (*u*), recta depactam; coronam vero, quæ in aciem scindentem sensim attenuatur.

In eo porro corpore anterior facies plana pene, & modice convexa (*x*) est, figura fere, quæ parabolæ, cujus axis deorsum respiciens aciem facit,

Posterior, quæ linguam respicit, triangularis est, & excavata, fulcisque nonnullis secundum longitudinem percurfa.

Natura in mordendo est cunei. Cum enim ea acies, quæ cibum dividit, tenuior sit, crassior ea pars omnis, quæ ab acie ad radicem pergit, tanto acies plus itineris faciet, quanto tenuior est parte crassa, quæ radici est propior, eruntque vires incisoris dentis in acie, ad vires radici resistentes, ut semidiameter baseos ad dentis longitudinem (*y*).

(*m*) Habet eas classes ARISTOTELES *part. anim.* L. III. c. 1. RUFUS L. I. p. 27. L. II. p. 49.

(*n*) *Tomæus* GALEN. *text.* 3.

(*o*) Ruminantibus in inferiori maxilla, dentes ut homini, in superiori nulli FABRIC. *variet. ventric.* p. 118.

(*p*) Urso, cani &c. incisivi sex DUVERNEY *Nouv. obs. sur l'osteol.* p. 9.

(*q*) WINSLOW n. 468. ALBIN. p. 4. *tab.* 1. f. 1. SUE t. 5. f. 1. Add. BERTIN. l. c. p. 246. ANDRY *orthoped.* II. p. 270. 271.

(*r*) BERTIN. p. 247. WINSLOW l. c. ALBIN. l. c. In maxilla inferiori quatuor incisivi dentes potius æquales sunt.

(*s*) Tantum duo, sed latiores PALFYN c. 9. GENGAL *Anat. Chir.* p. 84.

(*t*) Perinde simiæ BLAS. PARIS. TYSON p. 65.

(*u*) BERTIN. p. 245.

(*x*) IDEM p. 244. ALBIN. f. 3.

(*y*) DESAGULIERS *Course of exper. phil.* I. p. 114. 117. s'GRAVEZANDE *Philos. Newton. Instit.* n. 288. VARIGNON *Mécan.* T. II. p. 161. SWAMMERDAM *bibl.* p. 145.

Tamen cum parvi sint, & tenuis acies, & obnoxia ruptioni, solent ad ea corpora dividenda adhiberi, quæ minus resistunt, ad carnes adeo, & similia discindenda.

Incisivorum in loquendo princeps est utilitas, neque absque iis liquide pronuntiatur.

§. XVIII. *Canini.*

Homini dentium fabrica magis ad herbivora animalia accedit.

Caninus primo in utrovis maxillæ utriusve latere unicus est, ut in universam Caninos quatuor homo habeat. Neque ii satis sunt similes eorum, qui eodem cum nomine sunt in quadrupedibus de raptu viventibus (*y*). Neque enim aut longiores (*z*) adeo reliquis sunt, aut curvi. Herbivora (*a*) animalia ruminantia hac tota classe carent; carnivora ea prædam potissimum enecant, & retinent, in piscibus, in serpentibus vulnus venenant (*b*).

Homini media eorum inter mōlares & incisores natura est, minor nempe corona, quam molaribus magnis, quam parvis potius major, crassior quam incisoribus, non tamen in aciem, sed in coni compressi speciem fastigiata, quem verum acumen terminat, facie anteriori plana (*c*), & triangulari; posteriori rhomboidea (*d*), & fulcis inscripta.

Radix longior (*e*) quam reliquis, & potissimum superioribus, ut in sinum HIGHMORI (*f*) nonnumquam penetret; simplex eadem (*g*).

Robur, quam incisivis, majus est ob teretem naturam, & crassitiem in verticem contractam, ut tota vis denti impressa in unum punctum uniatur.

(*y*) EUSTACH. c. 7. Simiæ jam longiores sunt DUVERNEY p. 20. PARIS. & numero superant TYSON p. 65. In pygmæo similiter ut in homine se habent TYSON ibid.

(*z*) DUVERNEY l. c. p. 9.

(*a*) IDEM p. 12. Neque elephas p. 20.

(*b*) SEVERIN. *viper.* p. 235. 240 418. COITER p. 126.

(*c*) SUE f. 15. s.

(*d*) IDEM ibid. f. 6.

(*e*) BERTIN. II. p. 248. WINSLOW n. 471.

(*f*) BERTIN. II. p. 309. WINSLOW ibid.

§. XIX. *Molares (b).*

Ejusmodi dentes pisces aliquot habent, ut cyprinus (*i*), scarus (*k*), fargus, aurata, dentex (*l*); tum quadrupeda herbivora (*m*); qui enim in carnivoris molares dicuntur, ii vere trifidi (*n*), omnino ab humanis diffident: iis enim coronæ facies, qua sodalem alterius maxillæ quisque dens respicit, plana est omnino, & pene quadrangularis. Frigidis quadrupedibus dentes ferrati sunt (*o*), ut carnivoris, aut certe acuti.

In homine molaribus quidem commune est, latas habere coronarum superficies, & aliquot scrobibus & eminentiis exsculptas, corpus pene parallelopipedon (*p*), radices sæpissime plures. Est tamen inter eos dentes non obscurum discrimen.

Anteriores sive *minores* (*q*) *molares* latera habent conplanata, & coronam transversim, ab anterioribus ad posteriora latiore, naviculæ similem, duabus (*r*) eminentiis distinctam, anteriori & posteriori, vallicula divisis (*s*). Exigui sunt iidem, & caninis potius *minores* (*t*). Radices in superiori primo una (*u*), rarius duæ (*x*), in inferiori primo

(*g*) Raro duplex, triplex FAUCHART T. II. t. 27. f. 12. 13.

(*h*) Τονδισι GALEN. text. 2.

(*i*) PERRAULT eff. T. III. p. 175.

(*k*) ARISTOTELES part. anim. III. c. 14. PLIN. L. XI. p. 621. RONDELET p. 164. reliquis ferrati.

(*l*) Phil. transact. n. 219.

(*m*) DUVERNEY l. c. p. 12. In equo IDEM Nouv. obs. &c. p. 15. elephante MOUTON p. 40. DUVERNEY p. 20. Recte adeo cornua habentium nullum dentes ferratos habere PLINIUS edixit L. XI. p. 621.

(*n*) Leoni PARIS. DUVERNEY ibid. Leoni, tigris, cani, urso DUVERNEY l. c. p. 9. Lynxi ALDROV. quadruped. I. p. 93. unciæ CAIUS can. britann. urso DUVERNEY ibid. mustelæ ALDROV. l. c. p. 311. Sorici LINN. anim. succ. p. 12. muri ALDROVAND. quadruped. L. II. c. 442. vespertilionis LINN. l. c. p. 8. phocæ Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs. 98. ALBIN. adnot. L. III. p. 67. etiam simiæ RIOLAN. simiæ osteol. c. 6. TYSON p. 65. ut foli pygmæo sint humanorum similes TYSON ibid.

(*o*) ARISTOTELES part. anim. L. IV. c. 11.

(*p*) WINSLOW n. 474.

(*q*) IDEM n. 473. BERTIN. T. II. p. 251.

(*r*) WINSLOW n. 475. EUSTACH. c. 8. PALFYN tab. 1. f. 4. C. Internam & externam BERTIN II. p. 251. eodem puto nobiscum sensu. Nonnunquam tres WINSLOW.

(*s*) EUSTACH. c. 8.

(*t*) JANKE II. p. 13.

(*u*) PALFYN tab. 1. f. 4. C. EUSTACH. c. 10 Una omnibus, certe plerumque BERTIN. p. 252.

(*x*) ALBIN. p. 4. EUSTACH. t. 47. f. 10. pro perpetuo VESAL. l. c. XI. INGRASS. t. 2. WINSLOW n. 477. Tres pro raro exemplo FAUCHART. p. 9.

una (y), vel rarius etiam duæ (z). In superiori altero una (a), rarius duæ (b). In secundo inferiori una (c), vel duæ (d). Eæ radices in alveoli sui peculiare recessus divaricantur, & frequentius in finem maxillarem penetrant (e).

Posteriores & *grandiores* molares tres (f) sunt, quando os dentibus plenum est, fatis sui similes omnes, plana quadrangulari parte, quæ vitro illo tegitur, pyramidibus quatuor, breviter conicis, distincta, & interjectis foveis (g), aliquando etiam quinis (h).

Radices horum dentium sunt duæ (i), tres (k), etiam quatuor (l) in superiori maxilla, denique quinque (m), divaricatæ secundum naturam, tamen etiam convergentes, ut curvitate sua se respiciant. In superiori maxilla numerus radicum sæpe (n) unitate superat radicum in maxilla inferiori numerum.

Ultimus, qui fero (o) cum sæpe erumpat, *Sapientiae* dens dictus est, aliquando (p) unicam radicem habet.

- (y) ALBIN. EUSTACH. c. 12. f. 12. perpetuo INGRASSIAS. VESAL.
 (z) EUSTACH. f. 12. INGRASSIAS *text.* II.
 (a) ALBIN. EUSTACH. c. 10. pro perpetuo c. 12.
 (b) EUSTACH. T. 47. f. 10. pro raro VESALIUS. Duæ confusæ, vel unitæ radices MONRO ed. nov. p. 164.
 (c) EUSTACH. f. 12. IDEM pro rariore c. 12. INGRASSIAS. VESAL. MONRO itidem.
 (d) EUSTACHIUS.
 (e) BERTIN. T. II. p. 309. Inde morbus fistulosus FAUCHART I. p. 350.
 (f) BERTIN. T. II. p. 252. WINSLOW &c.
 (g) BERTIN. l. c.
 (h) IDEM II. p. 253. WINSLOW n. 475. Etiam in fetu vidi. Adde MALPIGH. *posth.* p. 5.
 (i) In maxilla inferiori EUSTACH. *tab.* 47. f. 12. VESAL.
 (k) EUSTACH. *tab.* 47. f. 10. Tertius fere ita se habet EUSTACHIUS.
 (l) In quarto molari ALBIN. p. 4. EUSTACH. INGRASS.
 (m) LARINI *de dentib.* p. 55. f. 5. EUSTACH. FAUCHART p. 10. t. 27. f. 7. 8.
 (n) JANUS DAMASCEN. p. 498. ORIBAS. p. 142. AVICENNA p. 96. VESAL. l. c. XI. EUSTACHIUS *tab.* 47. f. 10. 12. CARP. *Isag.* p. 43. L'ECLUSE p. 33. CHESELDEN *osteogr.* c. 2. PAV in CELSUM. Non constanter WINSLOW n. 478. EUSTACH. c. XI.
 (o) Vigesimo anno, vel demum in senio ARISTOTELES *de gener.* L. V. c. 8. Vigesimo quinto SEVERIN. *nov. obs.* c. 17. VESALIO anno 26. dens sapientiae erupit ID. l. c. Quadragesimo anno FAUCH. I. p. 155. Quadragesimo tertio CARDAN. in L. *requis* PETRO della VALLE in ægypto *Voyag.* T. I. p. 401. Quinquagesimo sexto FAUCHART I. p. 31. Septuagesimo BÖHMER *osteol.* p. 185. Octogesimo *Isag. anat.* c. 57. & 81. anno HOFMANN *Idea* p. 300. Octogesimo tertio BARTHOLIN. p. 730.
 (p) WINSLOW n. 478. BERTIN. II. p. 254. EUSTACH. FAUCHART T. 27. f. 20. Duas tamen vel tres, equidem unitas & conjunctas vidit L'ECLUSE p. 32. quatuor ALBIN. p. 4.

Hi dentes lati cum sint, & vicini, peneque subiecti hypomochlio maxillæ, fortiter durissima quæque conterunt, moluntque: iidem tamen longe, quam reliqui citius carie corrumpuntur, & decidunt. Etiam prius detritis mucronibus complanantur (*q*).

Itaque in homine adulto triginta & duo (*r*) dentes sunt, de quo numero non raro unus alterve deest, de ferotina classe, rarius aliquid accedit (*s*), quando sex molares sunt. Est etiam ubi duo pluresve dentes, succo osseo effuso conferruminantur (*t*) in unum, manifesto exemplo, non ex periosteo, quod hic nullum est, dentes vegetare. Est ubi omnes dentes dicuntur in unum coaluisse (*u*). Reliqua rariora exempla omittimus, dentium in palato (*x*) natorum, duplicisve (*y*) seriei, dentium cum duabus (*z*), & tribus (*a*) coronis, dentium ima parte sui rotundorum (*b*), inverforum, ut corona seorsum respiceret (*c*): & alia id genus.

§. XX. *Arteriæ venaque dentium superiorum.*

Cuique radici una arteria (*d*) data est, quæ per proprium foramen folliculum subit, & per periosteum internum, quod fuit folliculus, ramis suis dividitur. Trunci horum ramorum nuper fatis innotuerunt.

(*q*) BERTIN. T. II. p. 253.

(*r*) POLLUX p. 200.

(*s*) Dentes 33. COLUMBUS p. 34. Dentes 33. & 34. vidit FAUCHART Ed. II. T. I. p. 3. Dentes 36. & molares 14. caninos duos, incisivos duos, præter numerum BOURDEU *recherch.* p. 25. Dentes 36. & molares 24. INGRASSIAS *text.* 2.

(*t*) Tres quatuorve connati EUSTACH. c. 29. Multi ut tres tantum in maxilla superiori dentes essent GENGA *Anat. Chir.*

(*u*) PYRRHO dentem fuisse unicum lineis inscriptum, & EURYPTOLEMO cypriorum regi, & aliis hominibus PLUTARCHUS & POLLUX p. 201. & PRUSIÆ R. filio PLINIUS L. VII. c. 16. In elephante multæ coronæ & multæ radices in unam massam coalescunt *Phil. transact.* n. 345.

(*x*) RZASCYNSKI II. p. 455. PLIN. L. XI. p. 622. RUYSCH *cat. rar.* p. 177. EUSTACH. l. c. BODING *disp.* p. 401. qui in porcis funestos esse monet.

(*y*) DAMPIER I. p. 437. In utraque maxilla MUNNIK p. 144. PLINIUS L. XI. p. 623. in Timarcho NICOCCLIS f. In LUDOVICO XIII. C. BARTHOLIN. p. 464. Habet etiam MELANCHTHON apud RIOLANUM p. 482.

(*z*) SUE *tab.* f. 15.

(*a*) FAUCHART II. t. 27. f. 15.

(*b*) LARIN p. 18.

(*c*) POLLICH *increm. off.* p. 25. ALBIN. c. 9. PALFIN. c. 9.

(*d*) Solæ inter ossa maxillæ habent venas HIPPOCRATES *περί αγγων η σαρκων*

In maxilla superiori plures sunt, *alveolares* posteriores arteriæ, tum *infraorbitalium* rami.

Alveolaris arteriæ alter truncus in osse maxillæ & gingiva antrorsum procedit: alter, qui huc pertinet ramus *posterior* (*e*), *dentalis*, in parte posteriori finem maxillarem faciente (*f*) canalem in osse invenit, inque eo super dentium postremorum radices antrorsum tendit, & ad alveolos eorum, & in radices dentium (*g*) furculos dat, minime obscuros, molarium, caninorum, incisivorum. Pergit idem per canalem super dentes incisivos, & iis pariter furculos dat, & denique in nares exit (*h*). Ab eadem arteria furculi finem HIGHMORI subeunt (*i*), in cujus fundo nudus nonnumquam nervus adparet. Est ejus etiam cum palatina arteria anastomosis (*k*).

Infraorbitalis arteria furculum unum (*l*), duos, tres (*m*) per proprium canalem secundum finem HIGHMORI deorsum mittit, nonnumquam in eo finu nudos, cui ramulos dant. Idem cum dentali (*n*) arteria conjunguntur, & eorum aliquando prior solus anteriorem dentalem edit, quæ incisores (*o*) adit; alias & ad molares ramos misit (*p*), quem quidem ramum non reperi, neque ideo rejicio.

Inferiorum dentium unica est arteria, a maxillari nata interna (*q*). Ea trunco suo inter pterygoideos descendit, emittit ramum, comitem buccinatoris musculi; alium ad pterygoideum internum (*r*), alium furculum per sulcum maxillæ inferioris (*s*), cum nervo ad mylohyoideum musculum iturum (*t*). Denique ejus truncus per canalem ejus ossis

(*e*) *Fascic. ic. II. tab. art. max. intern. Add. not. t. & GUNZ art. maxill. p. 31. breviter ille & BERTIN. II. p. 269. 270. 398. & JANKE II. p. 33. & DUVERNEY posth. p. 558. & FAUCHART p. 20. & ILL. MEKEL de nerv. Quint. Par. n. 72. p. 65.*

(*f*) *Fascic. VIII. p. 17.*

(*g*) *BERTIN. p. 270. 264.*

(*h*) *Fascic. VIII. l. c. L. XIV. p. 149.*

(*i*) *Fascic. VIII. p. 17.*

(*k*) *Fascic. II. l. c.*

(*l*) *Fascic. VIII. p. 18. BERTIN. p. 176. 268. 414. DUVERNEY posthum. p. 558. FAUCHART.*

(*m*) Tres facit Cl. JANKE, & anteriores duos IDEM *off. max. septenn. p. 33. 34.*

(*n*) *Fascic. VIII. l. c.*

(*o*) *BERTIN. p. 269. JANKE. DUVERNEY.*

(*p*) Posteriores ad molarem tertium, quartum JANKE *ibid. f. 6. f. p. 34.*

(*q*) *L. X. p. 115.*

(*r*) *GUNZ p. 25. Fascic. II. l. c.*

(*s*) *BERTIN. T. II. p. 221.*

(*t*) *Fascic. II. l. c.*

posterius subit (*t*), subque dentibus antrosum migrat, deque foramine mentali ad dentem molarem anteriorem primum quidem trunco suo ad faciei mentique musculos exit cum labiali varie inosculatus (*u*); ramo autem minori (*x*) sub incisoriis dentibus ad mediam synchondrosin pervenit, obscuriori, perque diploen eunte canali suscepta. Non est exigua arteria, & divulsa periculi plenas hæmorrhagias fecit (*y*).

Ad radices dentium molarium, caninorum & incisivorum, uti de superiori maxilla dictum est, suos emittit furculos.

Venæ arteriarum sunt comites, nondum a quoquam pro dignitate descriptæ. In maxilla inferiori vena proprio canali sub arteria utitur.

Nervi in universum arteriarum comites, nisi quod subinde alio, vicino tamen canali continentur, veniunt in maxilla superiori, & a secundo ramo quinti paris, sodales arteriæ dentalis posterioris (*z*): & ab eodem trunco, quando jam orbitam subiit, sive ab infraorbitali (*a*), & anterior nempe ramus (*b*), comes arteriæ, quam diximus, & posterior (*c*) ad molares dentes.

Rami dentales inferiores sunt a trunco tertio (*d*) quinti paris. Canalis, quam arteriosus superior, vicinus alveolorum, inque ipsis aliquando alveolus nudus est (*e*); rami, ut arteriæ, dentes adeunt.

§. XXI. *Buccæ.*

Non potest manducatio plane intelligi, nisi musculi cogniti habeantur, qui cibum dentibus subministrant, sunt autem ii, præter linguales (*f*) dudum dictos, musculi potissimum, qui *buccas* gubernant. Eo nomine intelligimus hemisphærium fere, cute & extus tectum, & intus,

(*t*) COLUMBUS p. 181. FALLOP. p. 132. DUVERNEY p. 557. *Fasc.* II. *tab. art. maxill. int.* A. 8. not. n.

(*u*) *Fascic.* II. 1. c. *tab. art. lab. Q. Fascic.* VIII. p. 16. COLUMBUS. LIEUTAUD. WINSLOW n. 62.

(*x*) JANKE II. p. 32. MONRO p. 159.

(*y*) SOLINGEN *operat.* p. 322. & forte CHRISTINUS *Cent.* III. *obs.* 12.

(*z*) L. X. p. 214. 215.

(*a*) p. 215.

(*b*) *Ibid.*

(*c*) *Ibid.*

(*d*) p. 217.

(*e*) BERTIN. T. II. p. 278.

(*f*) L. IX. p. 422. *seqq.*

interque utramque cutem carneum, mobile, varieque figurabile. Id velum ab osse malæ jugoque, & a nasi radice, septoque, & a naribus descendit. Dentes utrosque prætendit, ut mobile distet, demumque in maxilla inferiori late secundum ejus marginem inferiorem in cutem redit.

Media fissura finditur, quæ dentibus brevior, cæterum parallela, respondet concurrui utriusque seriei.

Pars genarum, proxima utique dentium ordini, tenerrima cute rubraque tegitur, & molliter tumida *labii* nomine venit; labium vero vocant totam mobilem partem, cutaneam, carneamque, quæ hinc os inter est, & nasum, inde inter os & maxillam inferiorem. Utrumque labium plica elevata internæ cutis in speciem ligamenti ad gingivas firmat (*g*). Inferius minus est (*h*). Infra labium inferius ad maxillæ finem medium mentum est; genæ dicuntur, quæ & ante os mali, & sub eo secundum labiorum latera tument.

Cutis exterior in genis & ipsa tenuis, & præter solitum plena est vasorum, quæ per epidermidem plurima pellucet. Eadem nitet aut retento sanguine, aut vehementius impulso, ab ira, a pudore, a gaudio, a desiderio.

Interna cutis cum tenera epidermide (*i*), multo tenuior (*k*), simplicior cute externa, membranæque similior est. Ei cuti, uti alias repetitur, numerosissimæ glandulæ ovales incumbunt, quam late labia, genæque & mentum patent.

Inter has buccas & dentes maxillasque cavum est, exterius quasi oris atrium, quod sponte connivet, ut buccæ dentium sint vicinissimæ; sed varie aut recepto aere, aut musculis agentibus, buccæ possint, vel ab ossibus diduci, vel vicissim apprimi.

A vero ore hoc cavum dentium septo separatur; eo aperto, diducta maxilla inferiori, buccarum cavea cum ore vero conjungitur. Potest ex oris posteriori cavea (*l*) lingua exire, adque omne punctum internum buccæ adplicari.

§. XXII.

(*g*) MORGAGNUS *Advers.* I. p. 3.

(*h*) Duplex in superiori labio RUYSCII *Thef.* II. *aff.* 2. n. 5.

(*i*) MONRO *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. III. p. 118. CASSEBOHM in *posthumis*.

(*k*) Tunica exsanguis oris interni, linguæ, faucium, laryngis, gulæ ORIBASIUS p. 46.

(*l*) L. IX. p. 430.

§. XXII. *Buccarum musculi. Labii superioris levatores.*

Eorum primus fuerit, quem descripsimus *nasalis labii superioris* (1), qui id labium totum sursum vertit, etiam extrorsum, & narium meatui adplicat, ut eum meatum claudat. Lacrimas exprimere alii addunt (m).

Sequitur is communis *labii superioris & alarum narium levator* (n), qui ab orbitæ margine inferiori, & interiori (o), aque osseo maxillæ superioris processu nasali (p), supra ligamentum musculi orbicularis palpebrarum & infra idem, duplici principio natus, paulum extrorsum descendit, emissa nasali portione, fibrisque extrorsum declinantibus, & dispersis extrorsum, in cutem labii superioris inseritur, inque orbicularem labiorum. Ea labium superius (q) elevat, os aperit.

Alter *Levator labii superioris proprius* (r) a margine inferiori, interiori, orbitæ secundum priorem natus, simplex aut duplex (s) descendit introrsum, inque decussim prioris musculi, cum quo tamen etiam confunditur, per labium superius se dispergit, latus & brevis. Id labium elevat, & simul os extrorsum ducit.

Non est valde rarum, secundum ejusmodi musculum propiorem (t) ossibus, ad interiora Levatoris communis, quem continuo dicemus, ab osse maxillæ peculiariter dicto, sub foramine infraorbitali nasci, inque orbicularem labiorum se inmittere.

(1) L. XIV. p. 128. 129. COURCELLES *tab. I. lit. I. II. lit. I. t. 3. l. 1.*

(m) BERGEN *pent. obs. n. 1.*

(n) ALBIN. p. 151. T. I. w. x. y. T. XI. f. 10. SANTORIN. *Tab. I. S. n. 4. Cl. LIEUTAUD. p. 164. EUSTACH. tab. 41. f. 1. Quintus VESALII, FALLOP. p. 67.*

(o) COURCELLES.

(p) ALBIN. *Tab. XI. a. b. Grande portion de l'incisif WINSLOW n. 563. n. 3. LIEUTAUD p. 164.*

(q) ALBINI p. 152. *Tab. XI. f. SANTORIN. s. g.*

(r) ALBIN. p. 153. T. I. XI. f. 10. c. f. COWPER *tab. 21. 22. n. 24. SANTORIN. tab. 1. R. COURCELLES F. exterius EUSTACH. ibid. Autre portion de l'incisif WINSLOW n. 563. N. 2. Cl. LIEUTAUD.*

(s) ALBIN.

(t) An musculus parvus rotundus ex cavitate ossis malæ HABICOT D. V. *Lect. 10.*

Fasciculum alias diximus (*u*), qui ab orbiculari palpebrarum musculo, ad pinguedinem, etiam duplex & triplex se dispergit.

§. XXIII. *Zygomatici.*

Zygomaticus major, ab omnibus receptus, oritur a facie anteriori offis malæ (*x*), pene ad radicem jugi, simplex (*y*), fissus etiam & duplex (*z*), atque triplex (*a*); descendit oblique, inque angulum oris venit, in quo labia committuntur, atque in labii superioris orbicularem labiorum (*b*), inque triangularem labii inferioris finitur, ut cum suis fibris descendat (*c*), nonnunquam & in quadratum (*d*), & in buccinatorum (*e*); aliqui etiam fasciculi per adipem ad oram triangularis evanescent, aut arcu facto in risorium reflectuntur (*f*). Oris angulum diducit, sursum & ad latera, os aperit, genam in tumorem congerit, ad risum confert.

Zygomaticus minor (*g*) oritur ab offis malæ facie anteriori, magis ad interiora, sive propius naso, supra priorem (*b*): descendit similis, & inmittit se (*i*) in labium superius, ejusque orbicularem, conjunctus cum ejus labii levatore (*k*).

Officium prioris fere idem repetit, tantum, ut labium superius solum regat.

(*u*) ALBIN. *tab.* 1. t. XI. g. SANTORIN. o. LIEUTAUD p. 164. Add. CHESELDEN *anat.* p. 76. CANT. T. 3. f. 1. PARSONS l. c. n.

(*x*) ALBIN. *tab.* XI. f. 10.

(*y*) Simplex EUSTACH. T. 41. f. 1. COWPER *tab.* 32. n. 20. COURCELLES *tab.* 1. G. SANTORIN. ALBIN. p. 157. *tab.* XI. f. 10. 11. 12. 13.

(*z*) Compositus WINSLOW n. 559. duobus fasciculis insertus BOEHMER *fascic. obs.* p. VIII.

(*a*) MORGAGN. *Adv.* II. p. 29.

(*b*) SANTORIN. ALBIN. l. c. f. 13.

(*c*) CANT. T. I. ALBIN. p. 157. EUSTACH. SANTORIN. ALBIN. f. 10. m.

(*d*) SANTORIN. m. ALBIN. f. 10. n.

(*e*) ALBIN. p. 157. f. 13. WINSLOW n. 559.

(*f*) COURCELLES *tab.* 1. G. y. L. SANTORIN. x.

(*g*) WINSLOW n. 560. ALBIN. p. 155. T. XI. f. 10. i. h. SANTORIN. t. 1. Q. PARSONS l. c. g. WALTHER p. 5. EUSTACH. t. 41. f. 1. an non fasciculus ad levatorem MORGAGNO dictus l. c.

(*h*) EUSTACH. ALBIN.

(*i*) Duos facit COURCELLES *tab.* 1. E. E.

(*k*) ALBIN. EUSTACH. WINSLOW.

§. XXIV. *Musculi labiorum communes aliqui.*

Levator labiorum communis (*l*) fatis late oritur sub foramine (*m*) nervi infraorbitalis, ex foveolis ossis maxillaris super alveolos dentis canini, primique incisoris, & inde introrsum, etiam diviso, ut sæpe vidi (*n*), vel triplici (*o*), nam & ita reperi, principio: descendit inde pene rectus; angustior fit, & partim in orbicularem labiorum continuatur (*p*), partim in triangularem (*q*). Zygomaticus etiam cum eo cohæret (*r*), eo tectus, tegenſque buccinatorem (*s*). Labium superius mentumque elevat, os quod apertum fuerat, claudit, genamque, quam mœror depressit, in lætitia elevat.

Risorius (*t*) musculus est, non ab offe ortus, sed a fibris latissimi colli aberrantibus, aut a celluloso firmoque involucro masseteris ad mediam fere auriculæ altitudinem, alias e lobuli regione (*u*). Introrsum tendit, arcu (*x*) facto, deorsum primum, deinde sursum, accipit non raro accessorium a Zygomatico fasciculum, inque angulum oris superius, & antèrius quam triangularis inferitur.

Oris angulum diducit, genam in breviorè latitudinem contrahit, inque colliculum.

Triangularis (*y*), *Depressor anguli oris* (*z*) latiori principio prodit a membranis maxillæ inferioris marginem obducentibus, & a colli latissimo, adscendit, una interioribus fibris curvatus (*a*), externis rectus, & extrorsum convexus redit ad angulum oris, cum risorio & platysmate

(*l*) Quartus FALLOPII. Habet EUSTACHIUS t. 41. f. 1. 3. Levator anguli oris ALBIN. p. 155. *Les canins* WINSLOW n. 561. Simplex COURCELLES t. 2. H. SANTORIN. t. 1.

(*m*) SANTORIN. t. 1. o.

(*n*) ALBIN. tab. XI. f. 12. 13.

(*o*) COURCELLES tab. 1. h. h. h.

(*p*) ALBIN. p. 156. & ic. cit.

(*q*) IDEM ibid. & ic. cit. WINSLOW ibid.

(*r*) COURCELLES.

(*s*) SANTORIN.

(*t*) IDEM t. 1. n. COURCELLES t. 1. L. WEITBRECHT *Comm. Acad. Petrop. Tom. 9.* PARSONS *of physiogn.* T. 1. r. GAUTIER Tab. 1. Habet, sed non pro musculo, ALBINUS p. 194.

(*u*) SANTORINUS. COURCELLES.

(*x*) IDEM.

(*y*) WINSLOW n. 566.

(*z*) ALBIN. p. 158. Parvum SANTORIN. Majorem COURCELLES tab. 1. m.

(*a*) SANTORIN. EUSTACH.

unitur, & in Zygomaticum (*b*), & Levatorem (*c*) modo dictum, inque orbicularem inprimis superiorem (*d*) continuatur.

Externæ fibræ introrsum tendunt, internæ extrorsum. Deprimit labia, os aperit, adfectus tristis facit hieroglyphum.

§. XXV. *Musculi labii inferioris.*

Transversus menti SANTORINI (*e*) plerumque mihi adfuit carneus, rubro ponte tegens platysmatis fibras intimas, ut transversis fibris angulum menti subtenderet, a dextro triangulari in sinistrum continuatus.

Possset pro triangularis parte haberi. Nonnunquam dexter sinistro supra mentum potius lunato ductu cohæret (*f*).

Quadratus (*g*), *Depressor labii inferioris proprius* partim inter triangulares nudus eminet, partim tegitur.

Oritur, uti diximus (*b*), ex latissimi colli continuatis fibris, & a margine maxillæ (*i*), tum intra eundem, tum eo tectus, ex periosteo. Fibræ inde introrsum adscendunt, & inferiores quidem transversim a dextro musculo in sinistrum continuantur. Superioribus se decussantibus (*k*) in orbicularem (*l*), & in labium inferius idem se inmittit, & adeo vehementer adhæret cellulosæ telæ subiectæ, ut nitide separari nequeat.

Levator menti (*m*): *elevator proprius labii inferioris* (*n*) unus utrinque, carneus firmiorque est musculus, quam priorum multi. Nascitur ex maxillæ inferioris fovea sub alveolis dentis incisivi (*o*) exterioris, & fibras etiam habet ab orbiculari; descendit, non quidem decussa.

(*b*) SANTORIN. ALBIN. T. XI. f. 10. EUSTACH. t. 41. f. 1.

(*c*) ALBIN. p. 159. T. XI. f. 12. Add. COWPER tab. 32. n. 22.

(*d*) COURCELLES. WINSLOW. ALBIN. f. 11. 13. p. 159.

(*e*) p. 27.

(*f*) Ita ALBINUS p. 159. EUSTACHIUS tab. 35.

(*g*) WINSLOW n. 567.

(*h*) ALBIN. p. 160. COURCELLES t. 2. E.

(*i*) ALBIN. tab. XI. f. 9. 10.

(*k*) SANTORIN. y. COURCELLES Tab. I. II. O. EUSTACHIUS tab. 35. t. 41. f. 1.

(*l*) COURCELLES t. 1. 2. WINSLOW n. 567.

(*m*) ALBIN. p. 168.

(*n*) COWPER *Myolog.* ed. 1724. t. 31. n. 26. DOUGLAS. SANTORIN. q. r. ut tamen valde superior sit. *Incisif inferieur* WINSLOW n. 568. *Syllab. part. corp. hum.* Petrop. edit. t. 10. f. 9. *Houpe du menton* LIEUTAUD p. 166. 167. t. 6. ut tamen jungat cum Quadrato. Recte separat PETIT ad PALFIN II. p. 397. cujus est *houpe du menton*.

(*o*) ALBIN. tab. 3. β. β. tab. XI. f. 15.

tus (o), sed fibripot accedat utrinque (p), inque scutem mentis (q) se inmittit, quae ea ad colliculi modum eminet, inque quadrati partem internam, transversam. Eam elevat, labium inferius, postquam deorsum tractum fuit, suum in locum restituit, & idem ultra labium superius seorsum tendit, inque contentu, & indignatione. Ut in corpore. Depressorem labii esse alii (r) monent, ut tamen mentum eleve.

§. XXVI. *Buccinator.*

Buccinator non quod inflat buccas, sed quod inflatas deprimat, aeremque per lituum expellat, magnus musculus est, eorumque qui genas & labia adeunt, vastissimus.

Ejus triplex origo est, a maxilla quidem superiori (s), supra ultimum dentem molarem, quae sinum HIGHMORI continet, tum a tabulae pterygoideae facie extrema (t); aue corniculo pterygoideo (u). Sequentes fibrae ab ipso pharynge (x), a regione pterygopharyngei prodeunt.

Ima a maxilla inferiori (y), ejusque sede sub coronoidae processu, quae nervum admittit, pone dentes molares supremos, e sede cavi ibi positi fulci.

Ita latus fit musculus, fibris in universum transversis, parallelis (z), ut tamen supremae aliquantum descendant, adscendant (a) vicissim infimae, totusque musculus angustior fiat. Buccam praeter tegumenta interna & externa idem constituit, & versus labia antrosum it, subiectus levatoribus, & depressoribus, quos dixi (b), ut & superior pars mu-

(o) Ut apud SANTORINUM.

(p) COURCELLES t. 3. m. M. tab. 4. C. C.

(q) LIEUTAUD p. 167.

(r) WEITBRECHT. *Comm. Acad. Petrop.* T. IX. p. 252. LIEUTAUD.

(s) MORGAGNI *Epist.* XI. n. 42. CASSEBOHM. DOUGLAS p. 23. ALBIN. p. 162. WINSLOW n. 723. COURCELLES tab. 3. ⊕. tab. 4. f. 1. I. I.

(t) MORGAGNI. p. 360. ALBIN. p. 162.

(u) ALBIN. p. 162. DUVERNEY *myotom.* p. 45. MORGAGNI. p. 360. SANTORIN. t. I. & n. 35. DOUGLAS p. 23.

(x) VALSALVA apud MORGAGNI. *Epist.* XI. p. 353. n. 41. DOUGLAS p. 23. ALBIN. p. 162. tab. 10. f. 2. 3. 8. 10. COURCELLES tab. 3. O. t. 42. DUVERNEY l. c. GARENGEOT *myotomie* p. 118. LIEUTAUD p. 175.

(y) ALBIN. p. 162. tab. XI. f. 14. MORGAGNI. l. c. p. 360. COURCELLES tab. 3. ⊕. tab. 3. 4.

(z) SANTORIN: Tab. I. N. N. EUSTACH. tab. 41. f. 1. 3.

(a) COURCELLES tab. 4. Fibrae adscendentes mediae ALBIN: ibid. T. II. f. 14. d.

(b) ALBIN. f. 13.

sculi ad utrumque labium detegit & inferioris (c) atque fibræ suis partim in superioris labii orbicularem (d), partim in inferiorem orbicularem se innittat (e) ut in ore clauso, arcus labiorum aereve distentos efficiunt, quos vi sua contractili in rectitudinem porrigit, ut pars media ad dentes accedat. Os ad latus ducit, & buccas in rugas contrahit (f), uti fit in risu effuso, & in cachinno (g). Pharyngem arctat ore clauso, etiam ob conjunctionem cum orbicularis labiorum musculi parte ossi innissa.

§. XXVII. Orbicularis labiorum.

Orbicularis labiorum musculus (h), compositæ fabricæ est & difficilis.

In uniuersum equidem fibræ sunt in superiori labio in arcum modice convexum flexæ (i), & in inferiori, quæ in utroque oris angulo partim circumductæ sibi continuantur (k), partim intertexuntur decussatæ (l).

In eas fibras zygomaticorum, levatorum, depressorum musculorum, quos hucusque diximus, pene omnium fibræ degenerant (m), & finiuntur. Profundius stratum buccinatores fere soli efficiunt.

Sunt autem ejus orbicularis musculi aliqua strata interiora etiam ossi adnexa. Et in superiori quidem labio (n), a dentium incisivorum alveolis extrorsum feruntur, adduntque se orbiculari, & buccinatori.

(c) ALBIN. p. 162. Decussari, ut imæ in labium superius eant, supremæ in inferius COURCELLES t. 4. i. 1. 2. 2.

(d) Superiorem ALBIN. f. 14.

(e) Ad inferiorem ibid.

(f) IDEM p. 163.

(g) PARSONS of *physiognomy* p. 30.

(h) Superiorem ab inferiori separat WINSLOW IV. n. 553. 554. 556, Add. FALLOPIUM p. 67. b. LIEUTAUD.

(i) ALBIN. Tab. XI. f. 10. 11. 12. 13. 14. & tab. 3.

(k) IDEM p. 163. 164.

(l) WINSLOW n. 553. COURCELLES tab. 3.

(m) ALBIN. p. 164. & *ie. cit.* COURCELLES t. 1. k. k.

(n) Secundus ordo SANTORIN. t. 1. h. *Sur demi-orbitaires* WINSLOW n. 555. *Origo buccinatoris ab alveolis dentium* VERDIER.

In inferiori pariter, a maxilla inferiori (a), infra alveolum dentis canini, aut incisoris proximi, fibræ proveniunt, quæ transversæ, sed in arcum sursum, versum extrorsum ductæ se orbiculari addunt, & eadem in buccinatorem (p) continuantur.

Claudit hic musculus os, fibris ultra omnes Mathematicorum calculos ad tertiam, quartamve partem suæ longitudinis contractis, & angulis ad se mutuo adcedentibus, ut transversum os in orbiculum perbreve fiat.

§. XXVIII. *Manducatio.*

His nunc viribus cibus & recipitur, & promovetur, & manducatur. Nam adsumitur vi aliqua musculari, labiis aut deductis, & revolutis, & maxilla inferiori modice depresso, infusoque potu; aut vicissim, labiis ad vas, ex quo bibitur, applicatis, lingua primum ad dentes admota, tunc vero retracta (q).

Retinetur idem, cibus aut potus, buccis ad ossa maxillæ superioris, inferiorisve adpressis, & ore simul per suas vires clauso. In fene, cum buccarum muscoli paralytici essent, cibus potusve elabebatur de ore (r).

Promovetur retrorsum potissimum labio superiori, inferiori, aut gena ad eum cibum, quem volumus promoveri, applicatis: deinde linguae ope, quæ mira volubilitate ad omnes oris utriusque angulos pervenit, cibumque aut potum in dorsum suum onerat, lateribus sursum ductis (s), in vasculi speciem facta; desertque eosdem, & circumgestat: aut apicem etiam crassiori de angulo, quem tenuerit per styloglossos depellit, & secum curvato mucrone, quo lubet, urget. Modo dentibus admota, deinde reducta, ex cavea buccali humorem; cibumve manducatum fugit, & in posterius cavum oris desert.

(o) ALBINUS p. 164. Tab. XI. f. 14. *Accessor buccinatoris* COURCELLES t. 3. 4. *Productor labii inferioris* SANTORIN tab. I. §. WEITBRECHT l. c. p. 253. *Accessoires du demi-orbiculaire inferieur* WINSLOW n. 569. *Origo buccinatoris, ab alveolis dentium inferiorum* VERDIER ibid.

(p) ALBIN. p. 165.

(q) De suctione L. VIII. p. 296. Ejus species est potus.

(r) HEYMANN. Comm. T. I. p. 483.

(s) L. IX. p. 429. &c.

Vicissim dentes vel recta adducti mordent, dividuntque: vel motu laterali acti inferiores molares duriora quæque contra superiores immotos adprimunt, & prætereundo simul, atque ascendendo molunt, ea magna vi, quam diximus (t),

Estque ea commolitio maximi ad subigendos cibos momenti. Neque enim aut in ventriculo, aut in volumine intestinorum ulla porro vis ad cibos adplicatur, quæ cum dentium momento ullo modo conferri mereatur. Ostendetur enim, ne membranas quidem uvarum in reliqua tota via cibaria frangi, cum dentes etiam perficorum pomorum lapillos diffringant.

Quare magna cum jactura in digestionem manducatio intermittitur, fenesque carnes, nisi minutatim consciderint ad aliquam manducationis similitudinem, male omnino coquunt (u). Ejus vitii sæpe se reos faciunt homines literati nimium diligentes. VOSSII uxor marito cibos in os suppeditabat (x). Senex edentulus cibos, quos non manducabat, altero die ruminatione aliqua reddere cogeatur (y).

Et contra sola manducatione diurnæ cardialgiæ superatæ fuerunt (z). Nuper nutricis manducationem infanti optimam esse, parvus recepti moris admirator fassus est (z*), facileque crederem, ex multo pariori cibi copia posse satis virium alentium extrahi, dum ii diligentius manducarentur. Quare cum ea actione natura miram voluptatem conjunxit. Siccissimum panem expertus sum grate dulcem reddi, quando accurate & diu dentibus subigitur.

S E C T I O II.

S A L I V A.

§. I. *Humor oris.*

NON tamen solius commolitionis hæc laus est. Magna enim pars ad humorem pertinet, cum quo cibus subigitur. Is saliva est, cum exhalante,

(t) p. 14. 15. 16.

(u) SCHOOK *de fermentat.* p. 332.

(x) KUNDMANN *Zustand* p. 112.

(y) Vide in Ventriculi historia.

(z) TISSOT *de l'onanisme* p. 144.

(z*) BUFFON *Histoire naturelle* T. II. p. 464. 465.

exhalante humore, & aliquo muco mista. Salivam enim peculiariter dicimus, quæ ex ductibus propriarum glandularum conglomeratarum in os defluit. Mucus ex glandulis minoribus per breviora ostia effunditur; humor exhalabilis de arteriarum productis finibus.

§. II. *Salivæ fontes, Parotis.*

Præcipua hæc secundum aures glandula (*a*) conglomerati generis, ex acinis fit, in racemos coalescentibus, quos cellulosa tela revincit: & demum universa glandula cellulosis pariter filis, sed textum firmiorem mentientibus, in parte anteriori & media, obducitur, tamquam aliqua membrana, pene tendinea.

Hæc glandula partim cavam sedem inter angulum maxillæ inferioris processum [*b*] mastoideum & auriculam occupat; partim nuda masseteri [*c*], & ejus maxillæ nudo ramo subcutanea imponitur. Hinc jugo [*d*] terminatur, inde biventre musculo.

Figura in universum est, quæ antè duo cornua introrsum protrudat *superius* [*e*] quidem sub jugo, e tragi regione, longius, aut connexum cum reliqua glandula Parotide, aut nonnunquam ita separatum, ut peculiarem glandulam [*f*], sodalem Parotidis referat. Vidi defuisse, vidi duplex fuisse. *Inferius* breviusque cornu paulum sub maxillæ inferiori margine trans musculum sternomastoideum, biventrem, jugularem venam & carotidem arteriam, ad glandulam maxillarem continuatur, solaque vena faciali separatur. Reliqua *posterior glandulæ pars*, retrorsum ad aurem convexa, qua cranium respicit, nullam certam figuram habet, & ad vicinas partes se undique accomodat. Superne angustior lunata facie meatui auditorio adplicatur, eique adhæret: alia plana pariter facie in depressam sedem supra processum styloformem recipitur, & sulco

(*a*) Vide COURCELLES, & *tab. art. labialis* in *Fascic. III. ic. anat.*

(*b*) IDEM. *Tab. I.*

(*c*) *Tab. art. lab. Tab. tot. corp. ant.* Pars ante masseterem alias latior est, alias minus lata.

(*d*) COURCELLES t. I. *tab. nostr. art. lab. & tab. anter. tot. corp.* Jugo fortiter adhæret LIEUTAUD. p. 170.

(*e*) Lacinia & MORGAGN. *Advers.* VI. p. 129. Paulum distinctam pingit SANTORIN *tab. I. i.*

(*f*) *Tab. art. lab.*

effoditur pro arteria temporali, eademque sub meatu auditorio inter aurem & condylum maxillæ cui incumbit, angulum circa processum styloformem, inter aurem & maxillam totum replet, tum superius spatium inane inter articulationem maxillæ & meatum auditorium. Posterius glandula processu styloformi finitur, Inferior finis in plures conicos processus discedit, alias tamen pone aurem aliquantum adscendit.

Magna est glandula, & salivalium maxima. In homine drachmas quatuor (*g*) cum dimidia pendere visa est, pondere specifico, quam reliquæ glandulæ minori, ut se ad renes habeat ut 1034 ad 1050. (*h*).

Aliquas a se ipsa diversas glandulas generis conglobati impositas habet, tres, quatuor ultra (*i*), tum circa jugum, tum secundum vasa magna.

Multa, neque grandia, vasa habet ab arteria temporali, quam transmittit, & velat (*k*), & a transversa faciei. Venas ad congenere truncos remittit.

Nervos transeuntes habet a duro (*l*) pare, atque quinti ramo tertio (*m*) numerosos, ut tamen non satis certus sim, in glandula manere aliquos.

In omnibus puto quadrupedibus reperitur: cane, fele, equo (*n*), bove, sue, ove, erinaceo (*o*), fimo (*p*).

§. III. *Ductus Stenonianus.*

Et si hujus canalis finis, qua buccinatorem musculum perforat, dudum in CASSERIANIS tabulis depictus exstat (*q*): et si G. NEEDHAM (*q*^{*}) anno 1658. a se visum esse, non humilis auctor adfirmat:

- (*g*) WHARTON p. 119.
- (*h*) SAUVAGES *Diff. sur les medic.* p. 28.
- (*i*) *Comm. Boerhaav.* T. I. p. 166. Habet aliquas COURCELLES tab. 2. SANTORIN. T. I. & VALSALVA t. 1. f. 1. k. et si conglomeratas pingit.
- (*k*) Eadem latior *Tab. art. lab.* p. 17.
- (*l*) L. X. p. 260.
- (*m*) L. X. p. 229. 230. 231.
- (*n*) MURALT. *Vademec.* p. 57. 221.
- (*o*) IDEM ibid. p. 218. PEYER *obs.* p. 68.
- (*p*) PYGMÆO TYSON p. 53.
- (*q*) Habet CASSERIUS *Pentasthes. org. aud.* t. 4. f. I. X. C. BARTHOLINUS pro ligamento recenset *Instit.* p. 302. & C. BAUHINUS. Negat RIOLANUS in C. B. p. 723.
- (*q*^{*}) *Pref. & c.* 4.

etſi denique etiam *Gerardus* BLASIIUS, LEON. f. (r), juvenis STENONII hospes, non expers alicujus ex anatomicæ animalium partæ laudis, eundem ductum ſibi vindicare eſt admiſus (s), neque eſt abſque teſtibus (t), habuitque non neminem conſentientem; vere tamen hæc totius laus detecti ductus ſalivalis debetur Nicolao STENONIS f. juniori (u) æ & medicorum honorum candidato, qui anno 1660. die 7. aprilis in, ove ſuum ductum detexit, & paulo poſt in diſſertatione anatomica deſcripſit (x), tot aliis inventis celebris, ut etiam hunc ductum inveniſſe facile credas (y); deinde meliori deſcriptione de nobis meritis, ut inventorem adgnoſcamus.

Albus canalis eſt, numeroſis pictus vaſculis, teres, compreſſus, cavea exigua, firmula (z) ex cellulosa tela compactus. Eum innumerabiles ramuli generant, qui ex ſingulis glandulæ ſecundum aures acinis prodeunt, & in majores ramos, & in ductum, ab ima glandula, per ejus interiorem oram, poſterius ſecundum glandulæ longitudinem decurrentem conveniunt, qui porro pene de ſumma glandula, ſed infra verticem, cum cornu ſuperiori exit, fociiſque nonnullis de duro pare nervis (a), ſub jugo per maſſeterem pene ſummum introrſum it (b), & poſterior, & inferior acceſſoria, quam diximus, glandula. Ab ea ductum novum (c) inſertum accipit, qui ad STENONIANUM fere ſe habet, ut ad maxillarem ductum BARTHOLINIANUS, minor, ad acutum angulum introrſum eundo inſertus, ad interiorem maſſeteris muſculi marginem. An iſte ductus is fuerit, quem ex medio STENONIANO exire, & ſeorſim in os inferi *Juſtus* VESTI (d) ſcribit.

(r) JOHANNEM neſcio quare vocat STENONIUS.

(s) Apud BARTHOLIN. *Epist. Cent.* III. n. 43.

(t) Teſtimonia tamen exiſtant trium diſcipulorum BLASII, qui ajunt, preſente STENONIO ante ejus deſcriptionem a BLASIO ductum oſtenſum fuiſſe HOBOKEN *duct. ſaliv. Blas.*

(u) n. 13. *Diff. inaug.*

(x) De glandulis oris & nuper obſervatis inde prodeuntibus vaſis Præſide J. v. HORNE deſenſa Leid. d. 6. Jul. 1665.

(y) Vindicat ſe de *muſc. & gland.* p. 30. 31.

(z) STENONIUS n. 17. HORNE de *duct. ſaliv.* I. 13.

(a) Filamentis nerveis irretiri STENONIUS n. 14.

(b) Nimis inferiori loco de glandula educit SANTORIN. T. I. Z. & COURCELLES *tab. 11* Conf. *tab. art. lab.* & PARSONS of *phryſiognomy* *tab.* 7.

(c) Ann. 1728. inventum & deſcriptum in *Comm. Boerh.* T. I. p. 165.

(d) *Obſ.* I.

Eo ductū recepto, & deserto, quo sustentabatur, masseterē, canalis TENONII ductum mutat (*e*), & qui transversim antrorsum ferebatur, nunc flexu factō circa tendineam masseteris oram subito ad buccinatoris pharyngeam partem (*f*) accedit; & retrorsum, & paulum deorsum (*g*) introrsum per multum adipem tendit, perque ejus musculi discedentes fibras penetrat, & aliquo itinere ante oris membranam transit, quam & ipsam perforat. Ob eam curvitatem laxus est, & extenditur discissus (*h*).

Denique resectus quasi, osculo minime eminente, neque in papilla (*i*) obliquo tractu aperitur patulus, tamen angustior paulo, quam prius, in buccarum caveam, super dentem molarem superiorem medium.

§. I V. *Glandula maxillaris, eademque sublingualis.*

Multo minor altera sedet in angulo inter maxillam inferiorem, pterygoideo interno tectam (*k*), inter ejus maxillæ angulum, & musculum biventrem, inque angulo biventris primi cum secundo, partim sub mylohyoideo (*l*), partim exterior (*m*), etiam sub ceratoglossō (*n*), cuti propior, præcipua certe parte; Subrotunda est, in lobulos divisa, involucro celluloso pariter connexis acinis, inque superficie. quasi tela aliqua obnupta.

Pondus inventum est drachmarum duarum cum dimidia (*o*). Comperitum est etiam siccatione a 10000. partibus ad 2668. (*p*), & a 64. ad 10. (*q*) reduci, & pondus habere ad aquam ut 1043. ad 1000 (*r*). Mollior omnino est, quam parotis, lobulosque in majores dividitur, &

(*e*) Curvitatem exprimunt CHESELDEN t. II. COURCELLES t. I. *Mém. de Chirurg.* T. III. p. 458.

(*f*) COURCELLES tab. II. 5.

(*g*) *Mém. de Chirurg.* T. III. p. 455.

(*h*) BORDEU p. II.

(*i*) Papillam STENONIUS *diff.* n. 14. Carunculam esse excavatam KAAUW n. 286. Id nunquam inveni.

(*k*) *Tab. art. pharing. & tab. duct. saliv.* BIDLOO tab. 15. f. 1.

(*l*) *Tab. tot. corp. Tab. duct. saliv.* 3.

(*m*) *Ibid. tab. art. phar. tab. duct. saliv.*

(*n*) *Tab. duct. saliv.*

(*o*) WHARTON p. 119. 133. in bove unciarum novem.

(*p*) HAMBERGER *physiol.* p. 185.

(*q*) IDEM *ibid.* p. 183.

(*r*) SAUVAGES.

non raro profundo fulco in partem anteriorem & posteriorem (*s*) separatur.

Eadem non dudum detectam *appendicem* emittit in aliud stratum de fine suo anteriori ; supra mylohyoideum musculum , ad latus geniohyoidei continuatam , & sibi continuam , & sublinguali glandulæ , quæ ipsa glandula certe in homine maxillaris glandulæ vera est , & continua particula (*t*). Est ubi hæc appendix nulla fuit , sed id rarum est.

In quadrupedibus pariter ut Parotis regnat , bove , ut vidi , ove , rupicapra (*u*) , cane , equo , erinaceo (*x*) , etiam simio (*y*) , leone (*y**).

Et ipsa circumposita habet sibi & margini , & versus parotidem & biventrem maxillæ glandulas conglobati generis (*z*). Non vere dictum est , ab ejusmodi glandulis natos ductus in salivalem WARTHONI confluere (*a*).

Sublingualis (*b*) demum glandula (*c*) super mylohyoideum musculum , inter effosam ad eum finem levi fulco maxillam , & linguam , extra genioglossum (*d*) , interior styloglossum , & parte sua super ceratoglossum (*e*) , longe antrorsum & introrsum (*f*) , sub oris finiente velamento procurrit , acinis fere minoribus , & antrorsum extenuata (*f**) definit , qua lingua ipsa de oris membrana liberum apicem effert. Ejus pondus specificum fuit ad aquam uti 1007. 1000. ut minima fere solidarum partium (*g*) in ea portio sit. Arterias pars maxillaris a labiali habet , qua per glandulæ fulcum transit (*h*). Pars sublingualis a submentali (*i*) , & a sublinguali (*k*) accipit.

(*s*) Conf. *tab. saliv. duct.* COURCELLES *tab.* 3.

(*t*) COSCHWITZ f. 1. 2. KUMUS p. 49. LIEUTAUD p. 174. WEITBRECHT l. c. p. 255. & olim WHARTON p. 129. HORNE *microcosm.* p. 23.

(*u*) DUVERNEY *anc. mém.* T. III. p. 210.

(*x*) PEYER *obs.* p. 80.

(*y*) TYSON p. 53.

(*y**) BARTHOLIN. de suo ductu.

(*z*) HALE *phil. transact.* n. 364. WARTHON p. 119.

(*a*) STENONIS *diff.* n. 16.

(*b*) Habet MASSA p. 68. RIOLAN. p. 290. &c.

(*c*) *Tab. anât. nostr.* f. 3.

(*d*) COURCELLES t. 5. g. g. COSCHWITZ f. x.

(*e*) *Tab. nostr.* f. 3.

(*f*) COURCELLES *ibid.*

(*f**) COWPER *append.* f. 19.

(*g*) SAUVAGES *sur les médic.*

(*h*) *Tab. art. phar. & expl. tab. art. lab.* p. 6. not. 10. COWPER *ibid.*

(*i*) *Tab. art. lab.* p. 7.

(*k*) p. 6.

Venas (1) has glandulæ ad truncos fodales mittunt, lingualem, labialem. Pro vena in Maxillari fulcus peculiaris effoditur.

Nervi, si omnino in glandulis manent, sunt in parte maxillari a Quinti ramo linguali (m) in sublinguali ab eodem ultra nunc progresso (n). Pro nervo nono interius etiam fulco effoditur.

§. V. *Ductus excretorius glandulæ maxillaris.*

Ipsium ostium ab omni tempore notum fuit, ejusque memoria existat apud GALENUM (o), & ex GALENO apud ORIBASIIUM (p), Arabes universos (q), GUIDONEM (r), *Jacobum* BERENGARIUM (s), ACHILLINUM (t), alios (u) ejus ævi, & CASSERIUM (x) Orificia ingentia viderunt, quæ ad carnem glandulosam ducerent, sub radice linguæ positam (y), & ea ostia salivam profundere (z) non ignorarunt, aut posse stylum in oscula introduci (a).

Tamen, cum intermortua esset rei memoria, debemus plurimum *Thomæ* WHARTON (b), cujus industria ductus eosdem ex brutis eundem animalibus restitutos habemus: ex homine (c) historia nuper satis emendata existat.

Prodit nempe ex glandulæ maxillaris lobo posteriori, una cum appendice, ductus, plurimis natus radiculis, quorum major est ex ea appendice, tenuis, mollis, & ejusdem cum STENONIANO luminis, etsi universa diametro minori est.

(1) TREW tab. i. Ep. ad HALLERUM m. o. Tab. nost. duct. saliv. 2. 3. P. COURCELLES t. 2. u.

(m) Et ex ejus ganglio MEKEL *Quint. part.* 75. 76.

(n) IDEM *ibid.* 77.

(o) *De Jemine* L. II. de usu part. L. XI. c. 10.

(p) p. 54.

(q) RHazes ad MANZOR. L. I. c. XI. AVICENNA L. III. *sen.* 6. c. 1. AVERRHoes L. II. c. 14.

(r) *De Cauliaco* p. 4.

(s) *Isagog.* p. 45. b.

(t) p. XI. fontes salivæ dicit.

(u) MELANCHTHON *de anima.* Glandulas raninas salivam elaborare C. STEPHANUS p. 232. 128.

(x) Venarum nomine describit CASSER *de laryng.* t. 3. c. 1.

(y) COLLIGET L. I. c. 20.

(z) GALENUS. RHazes.

(a) GALENUS.

(b) *Adenolog.* p. 139. seqq.

(c) Primus ex homine v. HORNE descripsit in *diff. de ductu salivali.*

Is porro ductus trans ceratoglossum, eum inter & glandulam sublingualem, hanc addit, & ejus comes superior (*d*), exterior genioglossa, super mylohyoideum & biventrem, in lingua extensa fatis rectus ad apicem linguæ tendit.

Offendit ibi papillam longam (*e*), quando seta extrorsum urgetur, inque caudam de membrana linguæ productam, retractilem tamen, ut retrorsum in oris membranam recepta evanescat.

In eam papillam receptus ductus, quem dicimus, osculo fatis angusto ex fine corniculi aperitur, ad latus freni (*f*) linguæ.

Vidi in medio fere ductu suo dilatatum, tripla fuisse diametro.

Hujusmodi sub lingua ductus & in quadrupedibus (*g*), etiam frigidis (*h*), & in avibus reperiuntur (*i*).

§. VI. Ductus excretorii glandulae sublingualis.

Serius aliquanto hi innotuerunt: neque nisi nuper fatis vere. Primus *Caspar* BARTHOLINUS (*k*) nepos, aut ex propria industria, aut ex *Josephi Guiscardi* DUVERNEY (*l*) ostensionibus, inventum anni 1682. d. 13. mart. (*m*) in vitulo ductum salivalem describit, qui in leone, inque aliis animalibus, similis & parallelus sit WHARTONIANO (*n*), ut tamen ad glandulam maxillarem non pertineat, cæterum secundum ejus ostium paulo exterior (*o*) aperiatur, deque tota longa glandula sublinguali liquorem salivalem in os revehat (*p*).

Rectius *Augustus Quirinus* RIVINUS, sed in obscuriori libello (*q*)¹, dixerat paulo ante ductus sublinguales, alium principem esse ductum,

(*d*) COWPER. TREW. tab. 1.

(*e*) COWPER l. c. Papilla protegi WHARTON.

(*f*) HORNE diff. 1. n. 4. &c.

(*g*) In ove, urso, leone, lepore BARTHOLIN. In tursione TYSON p. 37.

(*h*) Crocodilo, JESUIT. Siam. p. 27.

(*i*) STENON. musc. gland. p. 32. 33. Aquila BORRICH hermet. Ægypt. sapient. p. 261.

(*k*) De Ductu salivali hætenus non descripto. Hafniæ 1684. 4.

(*l*) Ex testimonio Joh. MURALTII Vademec. p. 74.

(*m*) p. 4.

(*n*) In icone f. 1.

(*o*) F. 2.

(*p*) Ita habet KEIL p. 206. In plerisque animalibus esse ejusmodi Cl. BARTHOLINUS.

(*q*) De dyspepsia ann. 1679. corell. 1. 2.

WHARTONIANO conjunctum, alios minores (*r*), qualia & B. ALBINUS habet (*s*), & ILL. MORGAGNUS (*t*), quam quidem descriptionem RIVINI in cathedra Lipsiensi successor *Augustinus Fridericus* WALTHER (*u*) in homine perfecit.

Mihi, cum numerosis in exemplis inquirerem, res fuit ejusmodi, in homine quidem.

Quoties glandula maxillaris cum sublinguali non cohæret, tunc quidem solet (*x*) ductus adesse, qualem dixit BARTHOLINUS (*y*), longus, similis WHARTONIANI, secundum eum apertus. Vidi non minorem fuisse WHARTONINO. Vidi etiam ejusmodi canalem, cum tamen cum WHARTONI glandula sublingualis continuaretur.

Frequentius tamen est, eum ductum paulo prius quam in papilla WHARTONIANUS ille se aperiat (*z*), in hunc ipsum se inmittere, uti in hepaticum cysticus solet, ad angulum antrorsum acutissimum.

Deinde plerumque non unicus ejusmodi ductus ex sublinguali glandula prodit, sed unus, duo, tres (*a*), qui ex ordine in WHARTONIANUM ductum se aperiunt.

Denique alii sunt ductus sublingualis glandulæ, minime in WHARTONIANUM aperti, sed in linea, quæ a frenulo linguæ retrorsum tendit, secundum latera linguæ, exiguis osculis in papillis suis aperiuntur, quales WALTHERUS dixit. Numerum varium, & ad vigena (*b*) usque ostiola reperi, secundum totum glandulæ sub lingua ductum posita. Obscuriores sunt omnino ductus, quando grandes in WHARTONIANUM aperiuntur.

(*r*) *Paulus* BARBETTE foraminula etiam dixit, per quæ glandulæ raninæ se exonerant.
(*s*) *De saliv. Mercur.* n. 2.

(*t*) Neque enim negari potest, ex sublinguali glandula ductus esse, vel ex viri Cl. verbis, vel ex SANTORINI testimonio *Act. Erud.* 1727. p. 327.

(*u*) *De lingua* Lips. 1724.

(*x*) Rarum esse LIEUTAUD p. 174.

(*y*) Similia habet J. M. HOFMANN *de gustu* p. 34. A. Mar. Balth. 1700. p. 119.

(*z*) Ita NUCKIUS *siologr. tab.* 1. f. 4. COWPER ad f. cit. RAVIUS apud ERNDE. *itin.* p. 110. pro perpetuo: WEITBRECHT &c. Plerumque conjungi SCHELHAMMER *progr.* n. 7. Sæpe ROEDERER n. 19. In cane ita se habet DUVERNOI *diff.* p. 15.

(*a*) LIEUTAUD. Multi CHESELDEN p. 144. in vitulo.

(*b*) Tres RUYSCH *Thef.* 1. *aff.* 2. n. 3. etiam unicus ibid. Quatuor WALTHER *tab.* 1. f. 2. *tab.* 2. p. 14. 19. 26 27. Plures TREW *tab.* 4. p. 12. WINSLOW n. 582. MORGAGN. l. c. BARBAUT *splanchn.* p. 361. Tria, quatuor oscula FABRICIUS *anat. pract.* p. 119. BONHOMME p. 138. Habet VERDIER. II. p. 45. &c. In aquila ita se habet BORRICH l. c. p. 32. 33. In testudine CALDESI p. 74.

Neque hic finis est. Cum enim glandulæ sublinguali, qualem descripsimus, alii minores acini adsideant, ita ambigui, ut vel a sublinguali separare possis (c), vel cum ea conjungere, etiam isti acini in alia linea suis ostioliis aperiuntur, qua primum de lingua membrana oris secedit. Inveni quinque fuisse; & alia quatuor ostiola utrinque ad latera frepuli. Breviores sunt, & parum ramosi, absque papillis, expressa lingua conspicui. Hos forte STENONIUS (d), & HEISTERUS (e) dixit

§. VII. Glandulæ salivales minores. Buccales Labiales.

Quas ultimo dixi glandulas, eæ ad simplices accedunt; tum genales, ad quas transeo. Duræ eæ ovatæ, solidæ, ductu excretorio brevi involucrum oris perforant, & ostio suo aperiuntur, in genis (f), labiisque (f*).

Earum aliquæ majores, compositæ magis, circumstant ostium STENONIANI ductus (g), & earum aliquæ, buccinatorem inter & masseterem positæ, & membranam oris, aliquando ita excelluerunt mole sua ut peculiare nomen, *molarium* (h) meruisse visæ sunt.

Et eæ ductibus communibus in os suum humorem effundunt. Mihi semel grandiusculæ visæ sunt, nunquam peculiari nomine dignæ.

(c) Monuit ad glandulas a sublingualibus diversas pertinere WEITERECHT l. c. p. 255. Singulares porulos vocat BARTHOLIN *spec.* p. 44.

(d) *De gland. oris.* n. 19.

(e) Valde posterius habet WALTHER p. 13.

(f) STENONIUS l. c. n. 18.

(f*) COWPER *append.* f. 8. HEISTER f. 36. SCHURIG p. 63.

(g) Fr. HOFMANN *de saliv. inspect.* an. 1698. Novem glandulæ buccales novæ J. W. PAULI ad J. v. HORNE *microcosm.* p. 35. *Gl. buccales* longioribus ductibus LIEUTAUD p. 175. An. idem corpus glandosum notabile in buccinatore TEICHMEYER *anthropol.* p. 26.

(h) HEISTER *not.* 57. * f. 36. VERDIER p. 11. BARBAUT p. 362 Habet inprimis BORDEU glandulas molares duplo HEISTERIANA icone majores p. 51. quæ profundius circa condylos maxillæ ponantur; quasi parotidum propagines ad condylos p. 50, quamlibet cum duobus ductibus p. 50. ad penultimum molarem apertis p. 51. An etiam glandula palati non longo a ductu STENONIANO aperta ALBINI *de poris* p. 27. nisi de palatinis fermo est. Glandulæ très quatuorve, pisi magnitudine, super orbitularem oris positæ, qua ad eum tygomaticus accedit, ductu non visibili, quas sibi tribuit non descriptas A. J. R. MIEG *thes. anat. bot.* ann. 1721. ad agmen, ut puto, pertinent, quod ductui Stenoniano circumponitur.

Sic Porro in palato innulheribiles pori (*i*) sunt, valde etiam in vivo homine manifesti, inque parte posteriori ossea, quæ jam membranaceæ vicina est, ad latius futuræ mediæ ubiores (*k*), sæpe ex communi centro radiati, numerosis & incurvis radiis (*l*), secundum quos pori disponuntur. Alii, pene ad eandem sedem, sinus communis mucosi reperiuntur, unus utrinque (*m*).

Ex his omnibus fontibus liquor paratur viscidulus, equidem involucri oris madefaciendo destinatus, qui tamen cum saliva (*n*) varie miscetur. Labiales glandulas maximas, limpidum liquorem per duos menses integros, ad duas pintas quotidie (*o*) fundentes vidit in melancholico homine J. D. SCHLICHTING.

§. VIII. An etiam alii dentur ductus salivales.

Summa quidem hujus humoris est dignitas, qui in omni animalium classe, etiam in serpentibus (*p*), piscibus, cochleis (*q*), in papilionibus (*r*), vermibus (*s*) testaceis (*t*) animalibus difformibus (*u*) eo copiosior paratur, uti ficciori & difficiliore cibo animalia utuntur (*x*). Valde magnæ in castore, ductu in os patente (*y*).

(*i*) STENON. n. 21. f. 4. v. HORNE *microsc.* p. 18. BARTHOLIN. *spec. anat.* p. 44. RUYSCH *Thef.* II. *aff.* 4. n. 13. HEISTER f. 36. FANTON, LORENZINI *cramp. fish.* p. 28. In bove foramina & glandulæ arenulæ mole LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 320. In elephante STUKELEY t. 6. inque piscibus COLLINS t. 40. f. 3. in avibus IDEM. p. 219. PARISINI in tarda.

(*k*) Conf. ALBIN. t. 3. f. 1. h.

(*l*) Conf. diversam quidem iconem COLLINS *tab.* 2. f. 1.

(*m*) MORGAGN. *Epist.* IX. n. 5. ALBIN. *Adnot.* L. 3. p. 30. t. 3. f. 1. k.

(*n*) Totum palatum glandulam salivalem dixit COLLINS p. 222. 223. Sic CAMERARIUS *de tonsillis* p. 5. unicam per palatum glandulam numerat. Sic Cl. LIEUTAUD p. 174. VERHEYEN L. II. p. 274. & ipse STENONIUS *diff.* n. 21. Conglomeratæ in palato catopardi glandulæ DUVERNOI l. c. & in numidica ardea una cum duobus ductibus PARISINI.

(*o*) *Mnemosyn. crit.* p. 238.

(*p*) His in cavos dentes venenata saliva effunditur, quam minimæ glandulæ suppeditant RANBY *Phil. transf.* n. 401. Alia innocua ex glandula nata saliva RANBY *ibid.* In crocodilo JESUIT. *Siam.* p. 27.

(*q*) Duos ductus salivales dixit, SWAMMERDAM p. 124. 163. 167. 184.

(*r*) IDEM *bibl.* p. 595. In erucca vasa dissolventia eo pertinent LYONNET p. 511.

(*s*) In verme asili duo vasa salivalia cæca in os aperta SWAMMERDAM *bibl.* p. 661.

(*t*) IDEM *ibid.* p. 167.

(*u*) In lingua sepia. IDEM. p. 883. in lepore marino BOHADSCH p. 13.

(*x*) Ut in castore, in eruca salicis, similem ob causam LYONNET p. 513. ad lignum nempe dissolvendum.

(*y*) *Act. Erud.* 1684. p. 364. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 61.

Non tamen plures salivæ fontes hactenus vera fide innotuerunt. De COSCHWIZIANIS (z) diximus, qui sint venæ: tum de VATERIANIS (a), qui sint agmina glandularum mucosarum: deque incisivo ductu (b). Præter eas vias, salivæ non destinatas, BELLINGERUS (c) a thymo ad glandulam maxillarem ductum in fetu duxit: Antonius vero NUCKIUS (d) in orbita detexit ductum majorem ex glandula inter os jugale & musculum abductorem oculi posita natum, qui prope dentem molarem superiorem secundum in os aperiatur, non sine aliis Cl. viris testibus, in variis animalibus cane (e), lupo (f), catopardo (g), simio (h) volante, quorum scriptorum aliqui etiam ante Cl. virum eundem ductum se vidisse auctores sunt (i).

Alios etiam ex posterioribus laboribus addidit IPSE ductus minores, ex alia glandula natos, perinde in orbita posita, priori parallelos; perinde in os apertos (k).

Verum in homine hic neque glandula reperta est, neque ductus (l), adeoque nota est orbita, ut nulla spes supersit, eo loco glandulam posse latere.

§. IX. *Liquor exhalans.*

Subtilior glanduloso humore alter est vasculosus, qui ex universo ore vaporis ad modum exhalat, ex lingua, buccis (m), gingivis (n), labiis, palato; & idem in aquulam cogitur. Eum humorem injecta manu incisoris aqua imitatur, quæ de arteriis oris undique exsudat,

(z) L. XIII. p. 111.

(a) Ibid p. 107.

(b) p. 4.

(c) *Of the nutrition of the fetus.*

(d) *De ductu salivali novo* f. 1. 2. 3. 4. p. 11. seqq.

(e) J. M. HOFMANN *de gustu* p. 35.

(f) HARDER *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. I. obs. 196. apiar. p. 194.*

(g) DUVERNOI *Comm. Acad. Petrop* 1726. p. 345.

(h) IDEM *in iisdem Comm. T. V. p. 231.*

(i) ALBINUS *in diff. de poris* ann. 1684.

(k) *Sialograph.* ed. alt. p. 150. t. 6. f. 2.

(l) Conf. SCHELHAMMER *progr. valed.* n. 8.

(m) Ex villis oris *Physiol. in Bel. edit.* p. 51. Ex vasculis cavi oris & linguae КААОВ m 107. 108.

(n) Sanguis inde sudans VALISNERI *oper. T. III. p. 305.*

& cera sua VIR. ILL. ALBINUS imitatus est (*m*); idemque videtur in febribus deficere; quando os cum ingratissimo sensu squalet, neque enim etiam eo in casu salivales glandulae in officio cessare videntur.

Sed etiam mucus linguae, ex folliculis simplicibus abunde natus (*n*), cum saliva se miscet; motu linguae, & buccarum intertritus, ut in saliva mucī naturā non obscurā adpareat.

§. X. Saliva.

Ex his diversis humoribus, sed potissimum ex glanduloso humore, quem diximus (*o*), tum ex vapore exhalante, componitur ea *Saliva*, quae ab ore sani hominis nunquam abest, & quam in linguae superficie superiori potissimum collectam, cogimur aut deglutire, aut expuere.

Is humor aquosus, in igne totus exhalat (*p*), ita fluidus, ut non-nihil subfit viscoris (*q*), sapore nullo, si quisque propriae linguae sensum secutus fuerit, nullo odore, vel colore: difficilius in frigore coagulabilis (*r*). Pondus est ad aquam uti 1960. ad 1875. (*s*), ut aliquantum superet. Vis cohaesionis ad eandem in aqua vim est ut 30. ad 10 (*t*). Globulos aliquos continet minutos (*u*).

Eadem saliva in animalibus carnivoris acrior, & manifesto falsa (*x*) in serpentibus nonnullis, ut in vipera vehementissime venenata (*y*) est, etsi dulcis videtur, & insipida (*z*). In homine similiter perinde ut fit ab

(*m*) *Comm. Boerhaav. T. I. p. 171.*

(*n*) *L. XIII. p. 107. 108.*

(*o*) *n. 2. ad 7.*

(*p*) *BOERHAAVE Prælect. T. I. p. 177. VERHEYEN II. p. 112.*

(*q*) *FORDYCK de catarrh. p. 17. Inde, quam dicemus, diuturna spuma. Ideo forte salivam gelatinosam fecit GEUDER ferment. p. 114. A sputo tamen differt BOERHAAVE l. c. SCHNEIDER T. III. p. 521. WHARTON p. 142. 143.*

(*r*) *F. HOFMANN de saliv. inspect. Ita neque mucus.*

(*s*) *A. F. HOFMANN nov. hypoth. physiol. p. 5. 6. Uti 85. ad 74. la MURE de secret. ad an. Ut 394 $\frac{1}{2}$. ad 388. HAMBERGER p. 190.*

(*t*) *La MURE ibid. Ut 8. ad. I. SAUVAG. ad hæmast. p. 43.*

(*u*) *Phil. transf. n. 116. ASCHE de globul. &c. p. 62. 68.*

(*x*) *In cane subsalsa Colleg. priv. Amstel. obs. p. 9.*

(*y*) *PLIN. L. XI. p. 621. SEVERIN. viper. pyth. p. 239. 240. 256. COITER p. 126. MEAD. of pois. p. 57. 58. RANBY l. c. KALM. Svenska Acad. Handling 1752. n. 4. 1753. n. 1.*

(*z*) *CHARAS Sect. 8. REDUS &c.*

usu argenti vivi , ita per solum jejunium acris (z) fit , ut totum os doleat , animaue fætoze (a) peculiari corrumpatur , quod sæpe vidi. Per morbos etiam , & acris (b) , & denique dulcis (c) fit , quod vitium in scorbuticis (d) , in phthificis (e) , in hypochondriacis (f) , & hysteris (g) , aliquando non sine acredine (h) , alias absque malo est. Putredinosi quid credas fuisse , quoties acidorum usu emendatur (i).

Sibi permiffa , fano in homine , neque vino multum utente , absque conspicuo acore est , neque succum heliotropii rubro colore (k) tingit , certe non mea. Qui acidam se vidisse (l) sibi visi sunt , iis vini usus , aut ventriculi vapor admistus , aut morbus (m) imposuisse potuit , centies enim experimentum repetii. Et , si fermenti loco potest esse , idem aqua potest (n) , aut ovi albumen (o). Occultum , parcumque acorem inesse , ut

(z) TSCHIRNHAUSEN *medic. corp.* p. 23: experimento in se ipso facto.

(a) BIRCH T. I. p. 318. *Bresl Saml.* 1723. M. Mart. DALECHAMP. ad PLIN. L. XI. c. 53. De ordinibus religiosis severioribus LIND. *of scurvy* p. 328.

(b) In scorbuto HOFMANN *diff.* cit. p. 26. ut lintea eroderet ETTMULLER *med. hipp. chym. Hist. Morb. Uratistav.* 1700. p. 206. Sapor falsus casei putrescentis Nov. *Eph. Nat. Cur.* Vol. I. *obs.* 31.

(c) SANCTOR. *meth. vit. err.* p. 383. BENNET *Theatr. tabid.* p. 67. HOFMANN. *Med. Consult.* T. II. Dec. IV. c. 1. *Comm. Nor.* 1741. *bébd.* 52. BOSCHETTI *de saliva.* Post tertianam febrem *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. ann. 3. *obs.* 172. In altero latere VIRIDET *du bon chyle* p. 293.

(d) *Aët. Hæst.* T. IV. n. 72. BOERHAAV. *de natur. dulced.* p. 82.

(e) HENNINGER *de saliv. diff.* II. p. 25.

(f) HOFMANN p. 26.

(g) VIRIDET *du bon chyle* p. 288. *Add. Eph. Nat. Cur.* Vol. V. *obs.* 71.

(h) HOFMANN l. c.

(i) SANCTOR. l. c. oleo vitrioli.

(k) Non est acida EDITOR *lib. DEMOCRIT. Krankh. und Arzen. des animal. Lebens.* p. 124. Negat in junioribus DUVERNEY l. c. Negat in universum LANG. *physiol.* p. 81. J. W. PAULI in J. v. HORNE *de microcosm.* p. 45. ASTRUC. *de digest.* p. 267. *segg.*

(l) *Zod. Med. Gall.* T. I. p. 160. SYLVIVS *diff.* 8. n. 50. *Prax. Tract.* 5. *app.* p. 713. qui dentes vult stupefacere. VIRIDET *du bon chyle* p. 284. GRANITI p. 4. WILLIS *morb. hypoch.* p. 60. La METTRIE *obs.* p. 102. *Aur. Caten. homer.* Lac cogere SCHAPER *corpusc.* p. 25. NUCK *fiatogr.* p. 48. Succum heliotropii rubore tingere VIRIDET *prim. cod.* l. c. 8. p. 70. ANDRY *alim. du carême* p. 51. & in senibus DUVERNEY apud du HAMEL *Hist. de l'Ac.* p. 249. Malvæ tincturam eodem colore vitiare VIEUSSENS l. c. p. 161. Mercurium figere DEMOCRIT. CHRISTIAN. *vit. anim. morb. & med.* p. 53. Ferrum rodere cum fervore la METTRIE. Cum cinnabari incalescere SCHULZE *on kopper.* p. 34.

(m) VIEUSSENS *Trait. des liqueurs* p. 160.

(n) IDEM *ibid.* p. 164. la CHARRIERE p. 18. Pastam saliva fermentat VERHEYEN II. p. 113. Sed etiam putrida cum panis fervet PRINGLE p. 401. Saliva fervet cum succo raparum viridi MACTRIDE p. 44. cum pane celeriter. p. 53. t. 2. cum bile ipsa , tardius , sed diutius. *ibid.* cum carne ovilla p. 54. Farinacea manducata , cum saliva intrita in vesicam inclusa acescunt ROUPPE *morb. navig.* p. 94.

(o) HENSHAW *acerochal.* p. 23.

in sanguine, non repugno (*o*^{*}), tantum ut neque dominetur, neque ex eo salivæ utilitas pendeat (*o*^{*}). Sed neque lixiviosam credam esse in sano homine (*p*), neque ejusmodi phænomena vidi, etsi non recuso, ab usu argenti vivi putrescere, & signa edere naturæ alcalinæ (*q*). Cito certo putrescit (*r*), & tamen addita carnis putrefactionem retardat (*s*), iterum forte ex mucosa sua indole.

In calido aere ficcatur, ut exiguum quid falsumque supersit (*t*). Majori tamen copia inspissata, & salem tessellatum diaphanum, & gelatinosum viscidum quid reliquit (*t*^{*}).

Cum aqua ob mucosam naturam admistam non recte miscetur (*u*); sed neque cum oleo (*x*).

Balsamum peruvianum tamen solvit (*y*). Cuprum etiam magis quam aqua nuda erodit (*y*^{*}).

Ab acidis aut alcalinis salibus adjectis non fervet (*z*).

Sed, ob mucosam denuo naturam, a mercurio sublimato corrosivo, & a vini stillatitio liquore, & à nitro ipso (*a*) cogitur (*b*) aut certe lentescit (*c*). A spiritibus acidis, aliis in flocculos addensatur (*d*), & cogitur (*e*), ab aliis minime (*f*), Sub antlia pneumatica (*g*) aut ab igne admoto (*h*), aut admisto alcoholei (*h*^{*}), plurimam spumam

(*o*^{*}) Inesse p. 31. 32. sed leviter admistum TEXTOR *Stalograph* p. 37.

(*p*) De jejuna saliva DEIDIER *hum* p. 44. quod non recuso.

(*q*) BARON *Comm.* ad *Chem.* LEMERY p. 190. OWEN *de mercur.* p. 20. Putrescit FORDYCE p. 17. Canis ex ejusmodi saliva, quam lambserat, perit GOODALL. *coll. vin. dic.* p. 125.

(*r*) *Comm.* Acad. Petrop. T. XIV. p. 210. Vorticofum motum concipere TEXTOR p. 28. quo sal fixus destruitur, ut nullus ab evaporatione supersit.

(*s*) PRINGLE *diseas. of the army* p. 399.

(*t*) Duodecimam partem FORDYCE p. 18.

(*t*^{*}) TEXTOR p. 18. Crystalli in saliva sunt, quæ acidum fundant POTT *miscell. Berol* T. VI. p. 68.

(*u*) FORDYCE p. 17.

(*x*) NARCISSUS *de chylo.* n. 3.

(*y*) BIRR *specim anat. botan.* II. n. 58.

(*y*^{*}) TEXTOR p. 41. 42. cæruleo colore p. 44.

(*z*) BIRCH T. IV. p. 430. VERHEYEN L. II. p. 113. Nuck p. 50. FORDYCE p. 17.

(*a*) LEWIS *mater. med.* p. 399.

(*b*) FORDYCE p. 17.

(*c*) Ibid.

(*d*) Adfirmat tamen de spiritu vitrioli RAULIN *Obff. de med.* p. 183.

(*e*) BLANCAARD *acad.* p. 82.

(*f*) FORDYCE p. 18.

(*g*) MUSSCHENBROECK *diff. inaug. de aere* p. 6. 7.

(*h*) NUCK p. 53. BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 182.

(*h*^{*}) TEXTOR p. 28.

agit, & aerem difficulter dimittit. (*i**) Etiam sponte servata spumam concipit (*i*), & sedimentum ponit.

Ignе subjecto, & ex artis legibus sensim aucto, maxima pars abit in aquam insipidam (*l*), ad $\frac{4}{5}$ totius.

Exiguum momentum sequitur spiritus, lixiviosæ indolis (*m*), qualis ex sanguine habetur: tum olei empyreumatici (*n*). Alio modo oleum ex soluto in vini spiritu sedimento salivæ se prodit, grato pomi odore (*n**), quale oleum etiam in saliva cum alcali fixo digesta nascitur (*n*†): & denique abacto, quem continet, humore sedimentum ad $\frac{1}{125}$. (*o*) falsum relinquitur. In eo sal fixus (*p*) aliquis (*q*) superest, vix ad $\frac{1}{28}$. totius salivæ (*r*). Is partim de lixiviosa natura est (*s*), partim tessellatus (*s**), marinæ puto, qualis etiam naturæ obtinetur absque igne digestionе.

Terræ (*t*) tantumdem fere, quantum fals, in cinere salivæ est: in nuperis exemplis duplicem, calcariam aliam, alteram lamellatam, legimus fuisse, splendentem, pene trapeziis lamellis foliatam, qualis felenitica dicitur (*t**). A terreo eo in saliva elemento tartarea crusta nascitur, quæ dentes.

(*i**) Aër fixus in saliva MACTRIDE. p. 42.

(*i*) NUCK *anat. saliv.* p. 48.

(*l*) IDEM ib. p. 54. Ad $\frac{1}{20}$. BOERHAAVE ad n. 66. Ad $\frac{5}{60}$. G. v. SWIETEN T. I. p. 679. Ad $\frac{478}{480}$. BARCHHUSEN *acroam Exp.* VIII. Absque mensura BAGLIV. VERHEYEN II. p. 112. GAUBIUS HEUERMANN T. III. p. 340 341.

(*m*) VERHEYEN. BIRCH. Cum oleo vitrioli fervet l. c. GAUBIUS apud HAYMANN T. III. p. 52. HEUERMANNUS cum spiritu sanguinem comparat.

(*n*) VERHEYEN p. 112. ad $\frac{3}{128}$. Ad $\frac{1}{720}$. BARCHUSEN. Parum ejus inesse HAYMANN.

(*n**) TEXTOR p. 19. 94. Add. p. 23. 30. Non tamen in omnibus hominibus p. 27. Multum inesse oleum p. 45.

(*n*†) IDEM p. 36. Oportet tamen in his omnibus memorem esse, etiam ex simplicissima aqua in ELLERI experimentis, oleum & salem abunde gigni, quando putredinem subiit.

(*o*) NUCK p. 55. Ad $\frac{1}{160}$. de HEYDE *obs. med.* 88. Causticum esse BLANCAARD,, valde falsum FORDYCE p. 18.

(*p*) Ad $\frac{7}{80}$. DRELINCOURT *lienof.* p. 806.

(*b*) Nullum HAYMANN.

(*r*) VERHEYEN p. 113. Ad $\frac{1}{720}$. BARCHUSEN. Tantum $\frac{1}{260}$. falsi BAIER apud HOFMANN l. c. Duplicato ad finem salem esse SCHAPER *corpusc.* p. 26. nitrosum BAGLIV. p. 427. acidum acrem BLANCAARD p. 84.

(*s*) VERHEYEN. BIRCH. Etiam in spiritu vini solvi TEXTOR p. 19. 22.

(*s**) TEXTOR p. 18. 19. 26. 30.

(*t*) Tantumdem BARCHHUSEN.

(*t**) TEXTOR p. 20. ex flocculis in spiritu vini depositis.

obducit (*u*), & in ductu WHARTONIANO adeo frequenter (*x*) in calculi naturam coit, ut vix alium lapillum in homine frequentiore reperias. Ranulam (*y*) inde natam vidi, & exciso lapillo fanatam (*z*), alii anginam (*a*). Sed etiam olim HIPPOCRATES sub lingua calculos parvos nasci scripserat (*b*) Quare in WHARTONI potissimum ductu lapillus nascatur, non satis notum est: celeriter (*c*) id fieri historię docent. In STENONIANO rarius gignitur, sunt tamen exempla (*d*).

§. X I. *Motus saliva.*

Causa motus in eo humore in universum quidem eadem est, quæ in omnibus corporis humani humoribus, quos vis perpetua succedentis de corde in minima vasa sanguinis ad destinatos fines urget. Est tamen etiam peculiaris potestas, quæ tunc potissimum salivæ fluentum accelerat, quando eo ad subigendos cibos, & ad manducandum utimur.

Parotis adeo a musculo massetere (*d**) succutitur, & à colli latissimo (*e*), à maxilla demum ipsa, quæ non potest vel seorsum, vel deorsum, vel ad latera moveri, quin parotis prematur.

(*u*) FAUCHARD *dentiste* ed. nov. I. p. 179.

(*x*) SEVERIN. *nov. obs.* c. 28. GRULICH *cholelog.* p. 78. PLOT *natur. hist. of Oxfordshire* p. 215. MEIBOM *jurisjur. Hipp.* p. 152. LOSS *obs.* L. I. p. 90. TIMÆI *casus* I. n. 35. HAGEDORN *Cent.* I. *obs.* 71. *Journal des Savans* 1678. n. 23. *Galer. di Minerv.* VI. p. 236. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 3. *obs.* 43. ann. 9. 10. *obs.* 44. Vol. VIII. n. 20. CONTULI p. 46. ELLER *Mém. de Berlin* T. XI. p. 26. *Breslauer Saml.* 1726. m. Aug. BLAS *obs.* L. VI. *obs.* 14. KRAMER *Comm. Lit.* 1732. *hebd.* 49. SLEVOGT *ibid.* 1733. *hebd.* XI. 1738. p. 163. t. 4. f. 10. 1745. *hebd.* II. *Phil. transf.* n. 491. WALTHER *thesaur.* 92. G. v. SWIETEN p. 854. 855. VOLPINI p. 180. TUE-
NER. WALLERIUS *Act. Soc. Ups.* 1736. p. 178. 179. BACIOCCHI *lettera.* SCHERER *de calculo in duct. saliv.* n. 41. *Recueil périod.* 1756. m. Jul. ACRELL *Chirurg. Handelser* p. 92. *Nordl. Beytrage* p. 168. &c.

(*y*) TURNER. VALISNER. T. III. p. 138. J. Iv. STAHL *de ranula.*

(*z*) PLOT. VIRSUNG apud SEVERINUM l. c. WALTHER VALISNERI *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. I. c. *Det.* I. ann. 3. *obs.* 1. BACIOCCHI *lettera*, FOGLIAT. *ibid.* MEIBOM, SCHERER. ACRELL. HAGEDORN. l. c. ZACUT. LUSIT.

(*a*) *Journ. des sav.* 1721. BIRCH II. p. 339.

(*b*) *Epidem.* II.

(*c*) VOLPINI l. c.

(*d*) MEIBOM *Comm. in jurisjur. Hipp.* p. 152. & BLANCAARD *Jaarreg. C. V.* n. 47. ut videtur.

(*d**) p. 41. 12. *segg.*

(*e*) p. 17.

Deinde maxillares glandulæ , dum os aperitur , fonticulum (*f*) salivæ per WHARTONI ductum projiciunt , vi non minima (*g*). Id fit a potestate biventris primo , deinde mylohyoidei musculi , & a lingua depresso.

Sublingualem glandulam mylohyoideus totam urget , & depresso lingua , interque eas potentias tanquam in prelo media urgetur.

Sunt , ex STAHLIANA (*h*) potissimum secta , Viri , qui malunt ab irritatione , pene ad modum testis (*i*) , glandulas salivales humorem suum uberius adfundere : negantque aut mechanica pressione excitari posse , aut absque cupidine , neque admittunt salivam adfluere , si quis lignum (*k*) manserit : neque spongiam (*l*) , aqua ebriam , quæ Parotidis locum teneat , aperta maxilla inaniri , neque ipsam glandulam per ductum suum repletam , dum maxilla agitatur (*m*) , excuti. Sublinguales vero glandulas pressionem etiam fugere (*n*).

Est in hac affirmatione omnino pars veri. Ad odorem , ad conspectum , denique ad vividam ideam grati ferculi , maxime quidem jejuno homini , & famelico , certum est , de WHARTONIANIS osculis duos insignes salivæ fonticulos projici , ut modo diximus , qui in homine saturo , pariter aperto ore , non perinde conspicui exsiliant. Neque credam unice a plenitudine vasorum fieri , quæ in jejunante homine sint sua saliva plenissima. Exemplum feminis manifesto docet , a cupidine , ab imaginatione , ab ostentata voluptate , semen majori copia ad vesiculas feminales confluere , ut multo majori pondere in proxima venere ejiciatur , quam ab alio homine projiceretur , qui frigidior , absque præmissis veneris incitamentis , ei litaret. Hæc ergo causa ad occultam illam glandularum omnium irritabilitatem pertinet , quam in experimentis non possumus imitari.

(*f*) Guttulas inde stillantes SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 557.

(*g*) Ad tres quatuorve pedes in jejunio , quotidie BLANCAARD *Jaarreg Cent.* V. n. 14. Longissime projiciebat ILL. TEICHMEYER MENZ *de Saliv. non temer. ex. spuend.* p. 3.

(*h*) STORCH *Kinderkrankheit* T. II. p. 391.

(*i*) BORDEU *recherches.* p. 277.

(*k*) STAHL *theor.* p. 466.

(*l*) DE BORDEU p. 28.

(*m*) p. 35. *De chylic.* p. 19.

(*n*) BORDEU p. 73.

Sunt tamen nimii in secta sua viri Cl. Nam experimento facto omnino constat (o), agitata maxilla, ad ficcissimum lignum, salivam exprimi, inque os confluere: parotidem (p) actione maxillæ ex inani; etiam de ea glandula exulcerata, dum edebat æger, multum salivæ profluxisse (q): a scintillis electricis salivæ adfluxum accelerari (r), & cum convulsione maxillæ inferioris perpetuam salivationem conjunctam fuisse (s). In vulnere ductus STENONIANI, quando claudebatur vulnus, intumescibat parotis, idemque tumor solvebatur manducando (t). In alio casu inter partum vulnus ad 5. & 6. uncias salivæ suppeditare visum est (u).

§. XII. Copia salivæ.

Accuratam mensuram dari non credo, cum ab infinitis causis ea copia aut augeatur, aut minuatur. Augetur a percussis aliis secretionibus: ut a pedum refrigerio (x): ab urina repulsa (y): ab argento vivo (z) utcunque intra corpus humanum recepto, dummodo confertim, & absque intervallo subiverit: ab hypocondriaco malo (a): in variolarum in ore tumentium certa periodo (b): in febribus nonnullis intermittentibus (c) in hectica febre (d); in scorbuto (e).

(o) Excitari concussis musculis dat BORDEU p. 278. 279.

(p) Patente BORDEU *recherches* p. 39.

(q) *Mém. de Chir.* T. III. p. 445. *Eff. of. a Societ. at Edimb.* T. II. n. 13. Adde exemplum BARTHOLINI, *Cent.* III. *hist.* 77. & *Diff. sur la malad. des os* II. p. 93.

(r) ZETZELL *consect. electr.* in motum actis, procul dubio, musculis maxillam regentibus.

(s) DANIEL *Beyträge* II. p. 65. Salivam præter animæ imperium projici. In spasmo cynico masseter musculi durissimi salivam ad duos pedes projecerunt. *Nova Acta nat. curios.* vol. 1. obs. 63.

(t) *Mém. de Chir.* T. III. p. 431.

(u) De FIEU *physiol.* p. 446.

(x) BINNINGER.

(y) Potis aquis Egranis Henr. v. HEER. Cum mictu copioso alterna salivatio CAMER. *mict. period.*

(z) Etiam in cane WEPFER *cicut.* p. 299. Ab unico grano mercurii sublimati intra sex horas libra OWEN *de mercur.* p. 12. manifesto a stimulo, non a pondere metalli.

(a) HOFMANN *diff. cit.* SCHLICHTING. p. 238. ZACCHIAS p. 33.

(b) Die undecimo SYDENHAM. BOERHAAVE *Aphor. pract.* n. 1398. 1400. Post. variolas BETTUS p. 272. In petechiis Eph. *Nat. Cur.* Dec. III. ann. 5. 6. p. 257. *app.* p. 132.

(c) *Comm. Nor.* 1740. *hebd.* 23. HOFMANN l. c. SCHNEIDER l. c. III. p. 527. *Bresl. Saml.* 1723. m. Decembr. Cortici Peruviano salivam motam tribuit HELBIG *quin. Europ.* p. 26 Mihi videtur certum convalescentis signum esse.

(d) BESSE *lettre critique &c.* p. 282.

(e) VIRIDET *du bon chyle* p. 279. Maximum exemplum, continuo quasi ebullientis de ore salivæ RONSSEUS habet p. 255.

Augetur vehementer ab acri quocunque corpore in os recepto & manducato, potissimum ab acidis salibus (*f*); a *dracone*, qui de Absinthii genere est; ab hyssopo; pyrethro, a staphisagriae, & fabadillae feminibus; a tabaci fumo; a medicamentis emeticis mitioribus (*g*); nauseam tamen moventibus; a cibo ipso adsumto.

Minuitur ab aucta quacunque alia secretionem (*h*); a febribus in universum, quæ os exsiccant (*h**)

His in mediocritatem compositis, experimento aliquo in homine suscepto adjutus, NUCKIUS copiam salivæ intra viginti & quatuor horas effusæ, ad duodecim (*i*) uncias æstimat, alii ad sesquilibram (*k*). Sed alias in vulneribus drachmas septemdecim intra quartam horæ partem, & 22. in octodecim minutis, & in 23. minutis drachmas 26. cum sem. & in 28. minutis drachmas 33. exstillasse certi sunt testes (*l*): & demum 15. uncias intra triginta minuta (*m*): & quinque vel sex uncias intra cœnæ tempus (*n*). Ex ipsis tantillis buccarum glandulis magnum; duarum pintarum in diem, ptyalismum excitatum fuisse diximus (*o*). Ductu STENONIANO, ut facile ob itineris injuriis obnoxii rationem fit, discisso (*p*), aut a glandula ulcerata (*q*) tantum salivæ profluvium sequitur, ut difficillime (*r*) cauterio aut caustico, vel compressione diu-

(*f*) A spiritu salis GLAUBERI injecto plurima profluxit du HAMEL *corp. anim.* L. II.

6. 2.

(*g*) Vitriolum album ad granum unum salivationem ciet.

(*h*) A diarrhœa TULP l. c. L. III. c. 22. A nimio lotio CAMERAR. *mißt. periodic.*

(*h**) p. 52.

(*i*) L c. p. 32. 33. Dimidiæ libræ in apoplectico DOLÆUS *Encycloped.*

(*k*) NICOLAI *mat. med.* p. 177. 179. Triginta uncia quotidie in hæmoptoico NUCK. Semipintam effluxisse, dum unica tabaci fistula consumitur CHESELD.

(*l*) *Mém. de Chir.* T. III. p. 434.

(*m*) HAMBERGER *physiol.* p. 234. 235.

(*n*) DE FIEU p. 446.

(*o*) SCHLICHTING *mnemosyn.* p. 238. Magna a vulnere labii salivatio BIDLOO *Exerc.* II. CHESELDEN p. 146.

(*p*) GOOCH *cases* p. 20. 21. LAMBRECHS *obf.* p. 47. HELVETIUS *Mém. de l'Acad.* 1719. De FIEU, BELLOSTE *obf.* 4. *Fabric.* ab AQUAPEND. *de oculo* p. 23. FAUCHART l. p. 411. la FOSSE *obf.* p. 114, in equo Ex eodem eroso JOURDAIN p. 113. BECKET *obf. Chir.* IX. Glandula intumuit, cum ductus coaluisset IDEM.

(*q*) *Mém. de Chir.* l. c.

(*r*) *Rapports de Chirurg.* P. 92. Fistula inde nata *Hist. Morb. Uratisl.* p. 700. p. 230. BELLOSTE *obf.* 4. SAVIARD *obf.* 121. *Diff. sur les maladies des os* II. p. 93. COL. de VILLARS *diæt.* T. III. p. 215. *Eff. of. a Societ. at. Edimb* II. n. 13. SNAPE p. 147. KUCHLER *de dent. fistul.* p. 11. NUCK c. 3. DIEMERBROECH p. 434. SCHELHAMMER *oncolog.* p. 73. ut puto.

turna (*s*) compescatur : a coalitu etiam ejusdem ductus novam viam in buccis saliva sibi aperuit (*t*). Etiam ex male secto frenulo, de WHARTONI adeo ductu, vis salivæ præter voluntatem effunditur (*t†*).

Abunde autem in morbis salivam fluere per experimenta constat (*t**). In mercuriali sputatione (*t***) per decem, aut duodecim primos dies duarum (*u*), trium (*x*), quatuor (*y*), quinque (*z*) in diem librarum, etiam multo major, & trium (*a*), & quinque pintarum (*b*), & octo (*c*), ad sedecim librarum pondus fuit salivæ (*d*), & in universa curatione ad 50. (*e*), & 120. (*f*) libras.

Etiam in homine, ex scirrhuso pancreate hæctico, libræ salivæ decem, & ultra in diem fluxerunt (*g*).

Hæc si cum alvo, aut urina, aut sudore, & transpiratione fani hominis comparaveris, insignia certe sunt humorum fluentia.

§. XIII. Salivæ utilitas.

Duplex ea est. Pars deglutitur, noctu quidem omnis, etsi eo tempore saliva parcius paratur; interdiu, extra tempus sumendi cibi, in sano & bene morato (*h*) homine pars maxima. Ea in ventriculum

(*s*) Conf. SAVIARD *obs.* 121. COL. de VILLARS BELLOSTE *obs.* 4. GOOCH *facts. Mém. de Chir.* T. III. p. 445. Ab artificiali fistula sanatio SHARPE *oper.* p. 132. MARTI *de loc. præter. nat. ductus Saliv.* STENON. CHESSELDEN *anat.* p. 143. *Act. Edimb.* T. II. n. 13.

(*t*) SPINGSFELD *coalit. Visc.* n. 21.

(*t†*) GALEN. *de util. part.* L. XI. c. 10. RIOLAN. C. IV. c. 16.

(*t**) In variolis intra 24 horas salivæ libra fluxit, & ultra PLENCIT *variol.*

(*t***) Unius libræ in sex horis OWEN. *de saliva* p. 12. ex uno grano mercurii sublimati. Tanta vis inde salivæ, ut quasi mingeretur BRUNNER *pancr.* p. 138.

(*u*) GRAINGRE *med. ptyal. excit.*

(*x*) PUIATI *obs.* p. 235 DESAULT p. 53.

(*y*) IDEM *ibid.* *Nouv. method. des malad. vener.* p. 317. *Lettera de Gensino Eulabeofilo* p. 25. per multos dies.

(*z*) *Eulabeofilo* ad 5½. & 6. in diem.

(*a*) TURNER *siphilis* p. 190.

(*b*) IDEM *ibid.*

(*c*) A galon. CHESSELDEN l. c.

(*d*) SCHLICHTING l. c. p. 539.

(*e*) IDEM p. 540.

(*f*) TURNER *Præf. ad siphilid.*

(*g*) BESSE l. c. p. 282.

(*h*) Spuere signum est detestationis PLINIUS L. XXVIII. c. 7.

venit, & alio loco melius tradetur. De ore vero effluit, quando buccarum muscoli resoluti salivam male continent, ut in apoplecticis (*i*),

In ipso ore saliva ventriculo cibum jam pene dissolutum tradit: potus vehementiores debilitat: cum cibo morso & manducato subigitur, eum mollit, in pastam ad deglutitionem, ad digestionem, aptam figurat: diuturno maxillarum & linguae motu diligenter intertrita fales solvit, & diluit: olea subacta ad aquae miscelam contemperat, cujus rei summa est necessitas (*k*); sapores in massam sui undique similem confundit; aerem, spuma sua tenaciter inviscatum, in minima alentium elementorum intervalla introducit. Saporem etiam ciborum sensui nostro accommodat, dum fales solvit, gratiamque patienter subacto cibo addit (*l*), eoque modo hominem ad necessarium & utile opus, manducationem, invitat. Lictu solo canes pene omnia sua vulnera sanant, & dudum saliva laudata est ad lichenes (*m*), lippitudinem (*n*), ulcera sordida (*o*), strumas, melicerides (*p*).

In ea J. F. HELVETIUS (*q*), adeptus eremita, lapidem philosophorum quaesivit.

Quare non absque detrimento universae coctionis ciborum exspuitur, quod est tabacini fumi vitium. Inde ex solo abusu spuendi (*r*), aut ex salivae per vulnus jactura (*s*), aut ex quocunque nimio ejus humoris fluxu macies (*t*), verusque marasmus, secutus est. Et etiam vulgo notum est, ipsis etiam indis, a tabaci fumo (*u*), aut a pastillis (*x*). Nicotianae cum ustis conchiliis subactae, famem interire, eaque causa fuit

(*i*) SCHWENKE *de saliva* n. 7.

(*k*) BOERHAAVE l. c. p. 185.

(*l*) Conf. EUMD. J. R. M.

(*m*) MARCION Smyrnaeus apud PLINIUM L. XXVIII. c. 7.

(*n*) ROPER *saliv. crit.* c. 1.

(*o*) NUCK p. 52. Ed. II.

(*p*) Conf. SCHURIG. *Sialogr.* p. 21. 28.

(*q*) RZASZYNSKI *Hist. Nat. Pol.* T. II. p. 503.

(*r*) BAGLIVI p. 427. HARDER *apiar.* NEUMANN *oper.* p. 947. de nicotiana. Siccat & debilitat perfas CHARDIN *Voy.* T. IV. p. 36. Similia habet G. v. SWIETEN *Comm.* I. p. 639.

(*s*) RUYSCH *Alberf.* II. n. 5. *Morb. Uratist. hist.* 1700. p. 210. ex evulso dente. Etiam equi ea ex causa languent, quando salivalis ductus dissectus perit La FOSSE *obss.* p. 114.

(*t*) HANNEMANN-RAYGER *Eph. Nat. Cur.*

(*u*) LERY *hist. de l'Amér.* p. 213. COLBATCH *doctr. of acids asserted.* p. 435.

(*x*) MONARDUS *de aromat.* p. 309. Add. BOERHAAVE l. c.

primaria, cur fætida hæc planta primum in America tantam indigenarum gratiam sit consecuta. In se ipso expertus est PRÆCEPTOR, famem sublatam fuisse, cum salivam omnem exspuisset (*y*).

Neque debet his opponi, quod salivæ uberior profluxus venereum morbum, febres intermittentes, scirrhus solvat; quod in variolis sputatio salutis sit, & cum periculo supprimatur.

Quod enim ab argenti vivi violentia per os expellitur, id omnino tota est pene humorum (*z*) massa, adeps omnis, mucusve morbosus, medullæve forte infectæ non exigua portio, quæ omnia in humorum massam reducta, & expulsa, sanum corpus relinquunt, ut novi ex cibo & potu salubri, mitesque humores regenerari possint. Quare & per alvum sudoremve eodem effectû venenum Venereum expurgatur, aut deum, ut nunc maxime fieri solet, solo usu hydrargyri, lente, & absque conspicua excretionem expellitur.

In scirrhis glandularum perinde materies impacta utiliter dissoluta, atque nunc fluida egeritur, eademque forte causa fuerit salutaris in febribus intermittentibus (*a*) sputationis. Nam etiam tunc in hepate sæpe materies compacta residet, quam pro sputo excernere utile sit. Fætebat ejusmodi in casu saliva (*b*). Potest etiam signum esse restitutæ in minimis vasculis libertatis.

In variolis, angina funesta, orisque occlusio eo salivæ effluxu cavetur, neque aut perpetua est, aut necessaria, ut absque ea æger servari nequeat (*c*).

§. XIV. *Resorbtio, quæ in ore fit.*

Uti arteriolæ in lingua, in buccis, & in palato, exhalant, ita venulæ præsto sunt, quæ humorem tenuem resorbent. Nam aqua quidem, aut gluten piscium colore aliquo tinctum, inque venas capitis impulsum, sudat de facie superiori linguæ, de buccis, de labiis, deque ore universo; etiam COSCHWIZII (*d*), in lingua, experimento.

(*y*) Praelect. T. I. ad 66.

(*z*) BOERHAAVE *Præl.* I. p. 190. Omnes humores in salivatione mercuriali putrescunt & fætent GRAINGER *ptyalism*.

(*a*) *Bresl. Saml.* 1723. m. Decembr. *Comm. Nor.* 1740. n. 23. SCHNEIDER *de catharrh.* III. p. 527. HOFMANN. l. c. Adde CHEYNE *sanit. tuend.* p. 161. seqq.

(*b*) SCHNEIDER.

(*c*) FREIND *Comm. ad Epid.* VII. *hist.* II. FREWIN *Epist.*

(*d*) *De duct. saliv.* p. 10. Aer impulsus erumpit ex minimis ramis ductus salivalis, (qui vena est).

Deinde notissimum auxilium est a pane cum vino manducato, cujus vis refocillans (*e*) etiam equos (*f*) restaurat, etiam dum in ore vinum est, & prius omnino quam per ventriculum, intestina, & lactea vasa vis medicamenti potuerit longum iter absolvere. Sophos sola manducatione nutriri PARACELsus scripserat (*g*). Sed etiam vinum vappescere atque inebriare certum est, dum ore continetur (*h*).

Ita oleum nicotianæ in os felis instillatum, animalculum necat, totumque corpus, etiam cor, odorem veneni retinet, argumento in venas fuisse resumtum (*i*).

S E C T I O I I I.

D E G L U T I T I O.

§. I. *Pharynx.*

Difficillima particula physiologiæ, plurimum quidem lucis accepit ab ILL. ALBINI laboribus. Ut tamen eam lectori facilem tradam, necesse erit in minutas particulas historiam nostram dividere. Pharyngem adeo primum describemus, iterque ciborum ab ore in pharyngem imum; deinde Oesophagum, & progressum cibi per gulam in ventriculum.

§. I I. *Velum palatinum. Uvula*

Ex cute palatum osseum obducente (*a*), tum a SCHNEIDERIANA narium postremarum membrana, similis lamina retrorsum educitur, ut inter duas membranas plurimæ glandulæ (*b*) simplices, ovales, foraminibus

(*e*) KAAUW *perspir.* n. 442.

(*f*) ENT *oper.* p. 446. BATHURST *prælect.* p. 207.

(*g*) Paramir. L. III. tr. 4. *De originib. morbor. arcan. tartar.*

(*h*) G. v. SWIETEN *Comm. T. III.* p. 213.

(*i*) BIRCH l. c. T. II. p. 42. 43.

(*a*) BIDLOO t. 14. f. 3. HEISTER *Eph. Nat. Cur. Cent. IV.* t. 11. f. 1. LITRE *Mém. de l'Acad.* 1718. f. 20. L. JENTY *tab.* 2. f. 3. 5.

(*b*) BONHOMME t. 23. WALTHER *ling.* p. 36. COWPER *append.* f. 8. COLLINS t. 2. WINSLOW IV. n. 487.

exiguïs patentes, fibræque musculosæ mediæ contineantur, quas dicemus. Latera firmantur ad eadem ossa & ad processus alares (c).

Hoc productum velum in universum quadrangulare, posteriorem lineam habet in duos semicirculas divisam (d) ultra quos media pendet (e) particula, ovata simul & conica (f), crassior aliquantum reliquo velo, magisque rotunda, fabrica simili, tota glandulosa (g). Ea *uvula* a similitudine dicitur, & a velo palatino debet (h) distingui. Distinxit FALLOPIUS (i), GLISSONIUS (k), PRÆCEPTOR (l), & LITTRIUS (m), & nunc error emendatus est.

Situs hujus (n) veli curvilineus (o) est, ut pars anterior rectior sit, posterior in veli speciem flexa, denique recta descendat, & uvula quidem potissimum. Ad linguam ita adaptari potest, ut ea convexa radice sui dorsi velum palatinum concavum repleat & contingat, etsi, depressa utique lingua; spatium medium nascitur.

Super velum palatinum aditus a naribus in pharyngem est, quem dicemus.

Infra idem aditus in os (p) aut apertus, aut clausus, ut lingua levata aut depressa fuerit, velumque ipsum depressum aut levatum.

Uvula longe ante (q) epiglottidem valliculæ imminet, quæ est inter eam particulam, & linguam, ut in morbo justo longior, possit denique non sine incommodo linguam attingere. In sano homine utique distat (r).

(c) LITTRE p. 301.

(d) ALBIN. t. 10. f. 12. LITTRE l. c. t. 15. f. 1. JENTY.

(e) LITTRE l. c. ALBIN. ibid & f. 17. COWPER *tab.* 28. f. 4. DUVERNEY. BIDLOO. JENTY *tab.* 2. f. 3. 5. DRYANDER *ad Mund.* p. 43.

(f) COWPER.

(g) SLEVOGT *gurgul.* n. 14. RUYSCH *Thef.* X. n. 37. LOSS. *de gland.* n. 30.

(h) AURELIAN. *acut.* L. III. c. 1. CELS. L. VII. c. 12. n. 2. Quod uvæ simile pendet PLIN. L. XI. p. 624. Uva pro morbo PLIN. L. XXII. c. 13. L. XXX. c. XI. Ita *εμυλη* sumitur apud POLLUC. p. 470 ARISTOTELEM *hist. anim.* L. I. c. XI. ARETÆUM L. I. c. 8. Est etiam *κίων* POLLUCI p. 204. ARETÆO *acut.* L. I. c. 7. 8. *κίων* RUFO L. II. p. 57. ARETÆO *cur.* *acut.* L. I. c. 8. *diutur.* L. I. c. 7. POLLUCI p. 204. *Γαργαρεων* ORIBAS. p. 66. &c.

(i) p. 211.

(k) *De ventric. & intest.* II. c. 16. COWPER *Phil. transf.* n. 220.

(l) *Prælect.* I. p. 200.

(m) L. c. p. 300.

(n) Excusat VALSALVAM, qui receptum morem secutus sit, *Ep.* IX. n. 9.

(o) Sectio apud BONHOMME t. 16. f. 1.

(p) LITTRE f. 1.

(q) Conf. LITTRE f. 2. ALBIN. f. 17. DUVERNEY *posth.* t. 18. f. 1. BONHOMME l. c.

(r) BIDLOO t. 13. & in iconibus ALBINI, DUVERNEYI.

Uvulam solus homo (*s*) habet, tum fimia (*t*): reliqua quadrupeda ea particula destituuntur. Non adeo rarum est, bifidam (*u*) fuisse, cuius vitii causa videtur esse in azygis musculis justo majis distinctis. Discitur etiam (*x*) defuisse.

§. III. Arcus Faucium.

A lateribus veli palatini utrinque descendunt, & pharyngem ea sede perficiunt duo arcus (*a*), intus musculosis fibris facti, quas membrana obducit. Eorum arcuum anterior, idem tenuis, & a sodali suo magno intervallo remotus (*b*), ad linguam abit: posterior arcus crassior est, & sodali suo proximus descendit in pharyngem. Inter posteriores arcus uvula propendet.

Inter eosdem arcus (*c*), sub velo, & ad latera faucium utrinque ab perpendiculum sedet, ut tamen inferiora divergant, glandula peculiaris ingenii, in universum ovalis, anteriùs plana, posterius convexa (*d*) sursum crassior (*e*), amygdalæ integræ similis, præter proprium firidum involucrum (*f*) membrana laxa pharyngis protecta (*g*): perfo-

(*s*) PLIN. l. c. MORGAGN. *Epist.* II. n. 6. Non habet equus BOURGELAT *hippiatr.* II. 2. p. 311. neque canis PARIS, *anc. mem.* II. p. 338. aut Lupus FABER ad HERNANDEZ p. 819. Ait equidem in cervo uvulam esse SCHELHAMMER *oncolog.* p. 74. Sed puto de palatino velo loqui.

(*t*) BLAS *misc.* p. 258. PARISINI, DRELINCOURT apud BLAS *anat. animal.* p. 105. COLLINS p. 222.

(*u*) CRANZ *obs. cum tr. de instrum. edit.* *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 249. ann. 3. p. 511. ann. 6. 7. *obs.* 229. Vol. VIII. n. 106. PLATER *Mantiss. obs.* 40. BUCHNER *miscell.* 1728. p. 1450. STORCH *Kinderkrank.* p. 157. 158. MORG. *Epist.* X. n. 21. Inter morbo habet ARETÆUS.

(*x*) WEDEL *morb. inf.* HAGEDORN *obs.* 68. STORCH *ibid.*

(*a*) Ligamenta lateralia gargarconis, inter quæ tonsillæ RIOLAN, *Enchirid.* p. 311. *Piliers* WINSL. n. 490. Habet etiam DUVERNEY l. c. LITTRE l. c. f. 1. p. 301 BON-HOMME *tab.* 15. & BIDLOO *tab.* 13.

(*b*) DUVERNEY,

(*c*) DUVERNEY. LITTRE p. 301. WINSLOW n. 586.

(*d*) WIDMAN *de tonsillis* p. 13.

(*e*) *Ibid.*

(*f*) WIDMAN p. 19

(*g*) MORGAGN. *Epist.* IX. n. 119. WIDMAN p. 11. 12. Crassulas membranas vocat SCHNEIDER l. c. III. p. 419.

rata multis, ad quindecim usque sinibus & aliis quidem grandibus, uno (*g*^{*}), duobus, tribus. In ejusmodi finum multa foramina minora patent (*h*). Alia ostia sunt exigua, sinuum minorum, qui inter se conveniunt, ad usque duodecim (*i*). In ejusmodi finum quemlibet etiam glandulæ (*k*) simplices se aperiunt, quæ mukum parant, inque eos sinus effundunt, perque eos in fauces amendant (*l*), ipsa fabrica particulæ cellulosa est (*m*). *Tonsillas* (*n*) veteres dixerunt, nuperi *amygdalas*.

Inferius eas late styloglossus præterit & succutit : latera urgent musculi, qui arcibus faucium continentur.

In animalibus quadrupedibus reperitur glandula satis humanæ similis, cum sinibus, ut in (*o*) cane (*p*), bove (*q*), porco (*q*^{*}), phoca (*q*^{**}).

Haud longe a tonsilla, tubam versus, aliud utrinque & simile corpus (*r*) cum quatuor foraminibus visum est, ut quatuor tonsillæ numerari possent (*s*). In animalibus etiam passim a tonsilla ad tonsillam situm glandulosum venit, & conjungit utramque (*t*).

§. IV. *Pharynx*.

Pharynx (*a*) inconstantius apud veteres sumitur : nobis perpetuo tu-

(*g*^{*}) DIEMERBROECK p. 323. WHARTON WIDMAN p. 14. 15. 16. COLLINS. WINSLOW 587. Non perpetuum esse puto : conf. MORGAGN. *Epist.* IX. n. 18. Sic WIDMAN p. 15.

(*h*) Unum finum habet, in quem majores duo & plures minores aperiuntur WHARTON c. 22. & SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 520. Decem, duodecim WIDMAN n. XI. WINSLOW n. 587. HEISTER f. I. F.

(*i*) HEISTER *ibid.* DUVERNEY *ibid.* MORGAGN. *Epist.* IX. n. 18. DIEMERBROECK WHARTON c. 22. RUYSCH *Thef.* II. *aff.* 6. n. 14. VERHEYEN p. 275. RIOL. p. 294. WIDMAN p. 14. 15. COWPER *myotom.* t. 28. f. 4.

(*k*) COLLINS p. 226. KAAUW n. 342. WIDMAN p. 10.

(*l*) HEISTER f. I. F.

(*m*) WIDMAN p. 9. qui cum glandulis mesenterii comparat.

(*n*) AURELIANUS *acut.* L. III c. 1. CELS. L. 7. c. 12. n. 2. *Ἀρειανὸς & Ἀρετῆου* POLLUX p. 204. 252. *Παρισθῆναι* ARETEUS *cur. acut.* L. I. c. 7.

(*o*) MORGAGN. l. c. p. 245.

(*p*) MORGAGN. *ibid.*

(*q*) IDEM *ibid.* Negat habere equum BOURGELAT l. c. p. 353.

(*q*^{*}) MORGAGNI l. c. n. 16. p. 245.

(*q*^{**}) VALENTINII *Amphytheatr. Zootom.* p. 89.

(*r*) VALSALV apud MORGAGN. l. c. n. 12. add. n. 17. p. 246. ad proprium MORGAGNI experimentum.

(*s*) *Ibid.* n. 16. 245. RUFUS p. 28. 57.

(*t*) WHARTON c. 21. WIDMAN p. 12.

(*a*) *Pharynx* modo pro larynge dicitur, ut apud TIMAEUM, HIPPOCRATES in *vet. med.* GALENUM *de usu part.* L. 8. modo pro *Pharynge* GALEN. *ad tert. prognost.* ORIBAS. p. 208. POLLUCEM p. 254. ubi pro broncho laryngem habet. *Φαρυγγίον* dixit ARETEUS *cur. acut.* L. I. c. 7. Et *τὸ φαρυγνέον* dicitur & *τὸ φαρυγνέον* HOFMAN *Instit. med.* p. 189.

bus est superne latus, dorsum angustus (*b*). Amplior est superne, versus hyoides contrahitur, iterum qua laryngem continet latior (*b**).

Membrana intus oblinitur, cuti continua, suaque tecta epidermide, quam & per nares & per os accipit. Extus velatur cellulosa tela, in tenuem membranam, qualis est in omnibus musculis, collecta: interque eas duas membranas, quarum posterior vix id nomen meretur, fibris carneis varii ductus fit. Eas inter fibras & membranam internam, glandulæ ovales sedent, foramine proprio in cavæam pharyngis patulæ.

Facies posterior (*c*) longissima, continuatur narium cavæ, atque ad cuneiformem processum multiformis ossis, tunc ad ossis occipitis cognominem apophysin firmatur. Inde secundum vertebrae colli descendit, & ad septimam vertebrae, sub imo larynge, in gulam sive in oesophagum arctatur. Ad ea ossa multa tela cellulosa (*c**) cum mobilitate firmatur maxima (*d*), & firmitus ad processum cuneiformem ossis occipitis.

Latera (*e*) huius sacci musculosa accedunt utrinque a maxilla inferiori (*f*); a gena (*g*); a velo palatino (*h*); a pterygoideo processu (*i*); a styloformi apophysi; a lingua (*k*); ab osse hyoide (*l*); a laryngis cartilaginibus, scutiformi, & anulari. Eorum laterum dextrum simile sinistro in ejus occursum venit, ut in linea quadam alba (*o*), adipe signata, utrumque latus conveniat.

(*b*) WINSLOW n. 469.

(*b**) CASSER L. IV. t. 4. f. 5. ALBIN. t. 12. f. 24.

(*c*) Conf. ALBIN. T. 10. f. 8. 9. 10. t. 12. f. 24. COWPER t. 28. f. 3. CEPHALOT. t. 22. COURCELLES tab. 6. CANT. tab. 3.

(*c**) MORGAGN. *Ep.* XI. n. 31. p. 348.

(*d*) Mediastinum vocat, retro pharyngem collum bipartiens, GUNZ *Mém. des Savans étrang.* T. I. p. 288.

(*e*) ALBIN. t. 10. f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. t. 12. f. 23.

(*f*) COURCELLES n. 3. CANT. ALBIN. t. 10. f. 8. q. t. 12. f. 23.

(*g*) ALBIN. f. 8. r. t. 12. f. 23.

(*h*) p. 74. ALBIN. f. 12. 13. 14. 15.

(*i*) *Cephalatom.* M. COURCELL. n. 4. CANT. ALBIN. t. 10. f. 8. y. y. t. 12. f. 23.

(*k*) CANT.

(*l*) *Cephalat.* O. COURCELLES m. CANT. ALBIN. f. 8. n. n. o. & c. f. 1. 2. 3.

(*m*) *Cephalat.* P. COURCELLES l. L. CANT. ALBIN. f. 8. COWPER.

(*n*) COURCELLES θ & f. 2. CANT. ALBIN. f. 1. 2. 3. COWPER.

(*o*) C. BAUHIN. *Theatr. Anat.* CANT. tab. 3. EUSTACH. COURCELLES t. 6. L. L. Subinde deest MORGAGN. *advers.* II. p. 36. *Epist.* XI. n. 28. Nempe negat VIR ILL. tendineam lineam; adiposam, ut puto, non rejicit.

Anterius positum habet idem pharynx primo iter ad nares, tum palatum mobile (*p*), denique sub utroque iter in os: porro membranam oris, & linguæ radicem, ex que ea subrectam epiglottidem, & ad latera os hyoides, totum demum laryngem, qui in cavum pharyngem prominens, eo continetur (*q*): eaque sede Glottis, sive iter in asperam arteriam ex pharynge patet. Inde glandulam thyreoideam anterius incumbentem accipit.

Paulo retro narium ossium tubæ tunidæ intra pharyngem aperiuntur (*r*).

§. V. *Musculi pharyngis constrictores superiores* ALBINI (*a*).
Pterygopharyngæi (*b*).

Hi ad constrictorem pharyngis supremum pertinent, suntque ex præcipuis faucium musculis.

Oritur unus utrinque a toto corniculo (*c*) pterygoideo, interius, atque lamina (*d*) interna pterygoidea, nonnunquam a margine ossis palati huic continuo: alias & ab ipso tendine circumflexi palati (*e*). Vidi accessisse a salpingopalatino (*f*) fibrarum fasciculum.

Trans levatorem palati molliis, quem tegit (*g*), migrat, & circumdat in universum transversus arcu facto (*h*) pharyngem, retrorsum ductus, facitque ejus sacci latus, ejusque lateris partem supremam (*i*) carneam, dexterque in sinistri occursum venit, cumque eo conjungitur.

(*p*) EUSTACH. t. 42. f. 6. Tendo brevis est, & vix infra terminos supremi constrictoris descendit. Conf. etiam GUNZ. *Mém. des Savans étrang.* p. 287.

(*q*) CASSER. L. IV. t. 2. f. 5.

(*r*) ALBIN.

(*a*) ALBIN. p. 232.

(*b*) COWPER *diff.* MOLINETT L. III. c. XI. DOUGLAS p. 42. SANTORIN. WALTHER BONHOMME t. 22. M. *Pterigoidiens* (extypographi errore) WINSLOW. Omisit VALSALVA, monente jam COWPERO *Phil. Transf.* n. 299. etsi non ignoravit, MORGAGNO teste *Epist.* XI. n. 35. p. 352.

(*c*) MORGAGN. *Epist.* XI. l. c. ALBIN. p. 232. t. 12. f. 23. l.

(*d*) WINSLOW n. 476. SANTORIN. p. 121. MORGAGN. *Ep.* VIII. n. 6. p. 227. *Ep.* XI. n. 38. p. 356. ALBIN. t. 10. f. 3. r. & p. 232. COWPER nimis anguste t. 28. f. 3. L.

(*e*) ALBIN. l. c. r. & t. 12. f. 23. k. COWPER in expl. tab.

(*f*) VALSALVA fibras ejus musculi in hamulum, pterygoideum vidit inferi.

(*g*) Compara utrumque latus COURCELLES *tab.* 6.

(*h*) Ita etiam MORGAGNUS *Ep.* XI. p. 356. BONHOMME ALBIN. p. 232. 233.

(*i*) Conf. COURCELLES *tab.* 6. n. 4. & icones BONHOMME l. c. ALBINI, COWPERI.

Pharyngis posteriora dum ad anteriora adducit, utique gulam constringit.

In os occipitis inferi (*k*) ita interpretor, ut de celluloso fibrarum ad id os nexu firmo fit, qui possit nonnunquam similior videri tendinis.

Fasciculum ab osse petroso accessorium frequenter vidit ALBINUS ego raro & semel aut bis. Effet *Petropharyngæus* Cl. Virorum (*l*). Sæpe abesse DUVERNEYUS junior (*l**).

Deinde veteres *sphenopharyngeum* (*m*) suum ab acuto processu ossis cuneiformis, prope styloformem processum deduxerunt, & inter nuperos aliqui Cl. Viri similem ab apice processus spinosi ossis multiformis musculum viderunt, mihi nunquam repertum, diversum a nostro musculo (*n*). Longe enim & processus styloformis, & apex processus spinosi ossis cuneiformis distat ab ala pterygoidea, a qua noster provenit.

§. VI. *Mylopharyngæi. Fibra a buccinatore in pharyngem.*

Huic sodales se addunt, proximæ pterygopharyngeo, aliæ fibræ, quæ a buccinatore (*a*) inter ejus musculi originem a superiori maxilla, alteramque a maxilla inferiori, natæ, transversæ retrorsum tendunt.

Proximus est, qui a maxilla inferiori ejusque aspera linea super dentes molares postremos eminente natus, alias a tubere sub dentibus molaribus postremis, non minimus retrorsum tendit, sub priori, & pariter pharyngem complexus, pene transversus, in se ipsum redit. Plerumque tenuis, tamen adest (*b*).

Et iste supremam gulam perinde constringit, & tonsillam exprimit.

(*k*) SANTORIN. p. 122. MORGAGN. p. 357.

(*l*) WINSLOW *expof.* T. IV. n. 476. COURCELLES t. 6. n. 3. BONHÔME.

(*l**) *Myotom.* p. 126. 129. 130.

(*m*) RIOLAN. p. 314.

(*n*) WEITBRECHT *Comm. Acad. Petrop.* T. IX. p. 264.

(*a*) ALBIN. p. 232. *tab.* 12. f. 23. m f. 24. *tab.* 10. f. 3. s. f. 8. e. f. g. 1. f. 10. c. COURCELLES *tab.* 6. n. 5. *tab.* 3. O. *tab.* 4. f. 1. 3. Huc referam fibras a superiori maxilla prope ultimum dentem molarem ortas MORGAGNI *Epist.* VIII. n. 6. *Epist.* XI. n. 38.

(*b*) *Mylopharyngæus* DOUGLAS p. 42. pro novo SANTORINI p. 123. WEITBRECHT l. c. p. 267. CANT. p. 12. *tab.* 3. 28. 35. qui magnum omnino fecit. COURCELLES ad n. 3. Habet MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 45. p. 364. Est pars Cephalopharyngæi COWPERI *tab.* 28. f. 3. *tab.* 29. f. 1. *Myloglossi* pars major. I. *Wilb.* PAULI *Præf. ad microc. Myloglossus* VERHEYEN *Pars confriktoris pharyngis superioris* ALBIN. p. 232. *tab.* 12. f. 23. n. f. 24. 2. *tab.* 10. f. 2. z. f. . t. f. 8. q. s. f. 9. f. f. 10. d.

(*c*) Negat se reperire HEUERMAN T. III. p. 873. WINSLOW n. 480.

(*d*) SANTORIN. MORG. *Ep.* XI. n. 45. ALBIN.

§. VII. *Glossopharyngæi* (e).

Potius obscuriores istæ sunt fibræ, quæ a fibris linguæ postremis (f); & a genioglossæ (g) musculo natæ, per oris membranam sparsæ, retrorsum eunt, sub prioribus, ductu consimili, & pariter pharyngem contra linguam adstringunt.

§. VIII. *Hyopharyngæi* (h). *Constrictor pharyngis medius* (i).

Oritur distinctis fasciculis carneis, evidentibus, omnino tribus, supremo a baseos ejus ossis (k) parte exigua, neque perpetuo: altero a dimidio cornu (l) etiam duplex (l*) tectus ceratoglossæ musculo: denique major a corniculo hyoideo (m), ejusque margine inferiori, sursum latefcens (n); etiam a ligamento inter os hyoidei & cartilaginem scutiformem medio, quæ fibræ descendunt (o). Universi musculi pars superior, ad angulam valde acutum (p) ascendit, & partim tegit priores musculos (q), mediæ fibræ transversæ sunt (r), descendunt infimæ (s) & teguntur a sequentibus (t).

(e) VALSALV. SANTORIN. cap. 7. n. 6. p. 124. CANT. DOUGLAS.

(f) COURCELLES t. 6. n. 2. tab. 8. I. i. ALBIN. p. 232. t. 12. f. 23. p. t. 10. f. 2. 13. COWPER t. 28. An hic musculus gulæ a mento veniens C. BARTHOLINI *infl.* p. 278. Habet MORGAGNUS *Ep.* XI. n. 1. p. 317. & n. 45.

(g) COURCELLES t. 8. *Geniopharyngæus* WINSLOW IV. n. 480. WEITBRECHT p. 269. SANTORIN. p. 126. 127. ALBIN. t. 12. f. 23. o. t. 10. f. 2. 3.

(h) VALSALV. SANTORIN. n. 8. *Septimus musculus Pharyngis* MOLINETTI p. 134.

(i) ALBIN.

(k) *Basipharyngiens* WINSLOW n. 479.

(l) Habet COWPER t. 28. O. COURCELLES t. 6. m. tab. 8. K. *Ceratopharyngiens* WINSLOW. ibid. ibid. *Exstat.* apud ALBIN. p. 230. tab. 12. f. 23. g. t. 10. f. 1. 2. 3. CANT. A toto cornu EUSTACH. t. 41. f. XI.

(l*) MORG. p. 335.

(m) VALSALV. MORG. *Ep.* XI. n. 14. 17. SANTORIN. ALBIN. p. 230. t. 12. f. 23. h. f. tab. 10. f. 1. 2. 3. COURCELLES tab. 8. K. *interius. Chondropharyngæus* DOUGL. *Petits ceratopharyngiens* WINSLOW ibid.

(n) MORG. p. 336.

(o) *Syndesmopharyngæus* DOUGL. WINSLOW n. 481. CANT. p. 13. tab. 3. 27. 47. Habet COURCELLES tab. 8. MORGAGNUS n. 16. p. 334.

(p) Ic. ALBIN.

(q) ALBIN. t. 10. f. 8. 9. t. 12. f. 23. seqq.

(r) IDEM ibid. EUSTACH. &c.

(s) COURCELLES t. 6. M m. tab. 8. WEITBRECHT l. c. p. 261. BONHOMME t. 22. EUSTACH. l. c. ALBIN. p. 230. t. 12. f. 23. 24. 25. tab. 10. f. 8. 9.

(t) MORGAGN. p. 334. EUSTACH. ALBIN. in ic. cit. COURCELLES t. 6.

Supremas fibras offi occipitis se infigere (*u*) lego, & de celluloso pariter nexu interpretor.

Pharyngem detrahit & arctat.

§. IX. *Tyreopharyngæi* (*a*), *Cricopharyngæi* (*b*). *Constrictores pharyngis infimi* (*c*).

Hi muscoli reliquis ampliores sunt, hinc vulgo noti, & dudum, etiam veteribus dicti (*d*). *Tyreopharyngæus* quidem multiplici origine nascitur, & a cornu superiori (*e*) cartilaginis scutiformis; & ab ora laterali superiori ejus cartilaginis (*f*): atque a latere ejusdem iterum cartilaginis, longe (*g*), ut mediæ fibræ breviores sint: denuum a processu ejusdem inferiori (*h*), exque inferiori margine (*i*).

Fibræ ejus sibi parallelæ sursum eunt (*k*), & in linea media pharyngis inter se intricantur (*l*), teguntque hyopharyngeos (*m*).

Accedunt fasciculi a sternothyreoideo (*n*) cricothyreoideo (*o*) & hyothyreoideo (*p*).

Cricopharyngæus musculo modo dicto continuus (*q*) oritur a parte laterali posteriori cartilaginis cognominis; e regione musculi cricothyreoidei, supra marginem inferiorem (*r*); crassus valensque: accedunt aliquæ a cricothyreoideo fibræ.

(*u*) ALBIN. f. 8. MORG. *Epist.* VIII. n. 5.

(*a*) VALSALV. CANT. WINSLOW. DOUGLAS. SANTORIN.

(*b*) IDEM. *ibid.*

(*c*) ALBIN. p. 226.

(*d*) Musculi a posterioribus cartilaginis scutiformis ad gulam ORIBAS. p. 202. add. GALEN. *us. part.* L. 7. c. 11. 12! & *de vocis instrum.* c. 5.

(*e*) MORG. *Epist.* XI. n. 25. p. 342.

(*f*) Conf. ALBIN.

(*g*) WINSLOW n. 482. EUSTACH. t. 41. f. 8. *Tab.* 42. f. 4. CANT. *tab.* 3. ALBIN. t. 12. f. 23. b. b. t. 10. f. 1. 2. 3. BONHOMME *tab.* 21.

(*h*) ALBIN. p. 227. COURCELLES t. 8.

(*i*) ALBIN. T. 12. f. 23.

(*k*) ALBIN. ubique COWPER t. 28. f. 3. BONHOMME COURCELLES t. 6. L.

(*l*) MORGAGN. *ibid.*

(*m*) ALBIN. *ibid.* f. 24.

(*n*) Habet & MORGAGNUS p. 342. & GUNZ.

(*o*) Habet etiam GUNZ.

(*p*) SANTORIN. p. 129. ALBIN. t. 12. f. 24.

(*q*) WINSLOW n. 483. MARCHETTI p. 92. cui est *sphincter*; & GENGA *anat. chir.* p. 225. cui *Oesophageus*. Diversos esse GUNZ. *Mém. des Savans étrang.* p. 287.

(*r*) ALBIN. p. 227. t. 12. f. 23. c. c. t. 10. f. 1. 2. 3. COURCELLES t. 8. CANT.

Fibræ superiores sursum oblique tendunt, & se addunt sodales thyropharyngæo, pariterque in media linea alba se decussant.

Fibræ inferiores transversæ fere, in anuli speciem, pharyngem ambiunt, nomenque gesserunt (*s*) *oesophagæi* (*t*), ut tamen aliquæ descendant (*u*). Hæ fibræ subinde a superioribus distinctæ sunt, atque iis teguntur.

Priores lacerti pharyngem & detrahant & arctant: imæ arctant unice.

In glandulam thyreoideam fibras dedisse (*x*) & in asperæ arteriæ proximum anulum (*y*), Clari auctores existant.

§. X. *Stylopharyngæi.*

Constrictores diximus; qui nunc sequuntur muscoli pharyngem elevant. Hic princeps, plerumque ab appendice cartilaginea processus styloformis (*a*), aliquando & ab ossea parte (*b*) aliis ibi nati musculis inferior, & ab initio ligamenti stylohyoidei provenit.

Descendit antrorsum (*c*), teres solus inter pharyngis musculos: adplicatur pharyngi, & fibris suis disiectis, sæpe in duos & tres fasciculos distinctos separatis (*d*), inferitur per Pharyngis stratum interius, sive membranæ villosæ propius, fibris radiatim discedentibus (*e*) ut earum summæ adscendant, mediæ transversæ sint, descendant imæ. Sed aliæ exteriores aliquæ, non obscuræ, longe in marginem cartilaginis scutiformis (*f*)

(*s*) ALBIN. p. 228. BONHOMME, WINSLOW n. 484.

(*t*) WINSLOW n. 484. SANTORIN.

(*u*) COURCELLES t. 8. paulum ALBIN. t. 12 f. 24. n. 10. f. 8. COWPER.

(*x*) WINSLOW.

(*y*) MORGAGN. *Epist.* XI. n. 34.

(*a*) Conf. ALBIN. t. 12. f. 27. COURCELLES tab. 6. & 5. CANT. tab. 3. EUSTACH. t. 41. f. 5. 8. 11.

(*b*) MORGAGN. *Epist.* XI. n. 8.

(*c*) ALBIN. t. 10. f. 89. 10. 11. COURCELLES t. 5. 6.

(*d*) ALBIN. *ibid.* f. 9. 10. 11.

(*e*) ALBIN. p. 215. & *ic. cit.* f. 9. 10. 11. & tab. 12. f. 27. EUSTACH. tab. 42. f. 4. 6. SANTORIN c. 7. n. 7.

(*f*) ALBIN. f. 9. 10. 11. tab. 12. f. 27. 28. 29. 30. LIEUTAUD. EUSTACH. tab. 41. f. XI. t. 42. f. 6. COURCELLES t. 6. 8. FALLOP. l. c. WINSLOW n. 477. HABICOT. *Journ.* 6. *lett.* XI. MORG. *Advers.* l. p. 4. II. p. 34. In oram supremam cartilaginis Thyreoideæ IDEM *Epist.* VIII. n. 5. p. 226. 227. *Epist.* XI. n. 7. p. 324. & n. 10. Negat eas fibras, forte quod tenues sint, CANTIUS p. 12.

se inmittunt; & interiores aliæ in membranam laryngis (g), pone ligamentum hyothyreoideum fibris suis disperguntur, circa epiglottidem. In linguæ (h), radicem etiam, sed raro, partem hujus musculi immissam alii viderunt: Alii Cl. viri & in os hyoideum (i) & in epiglottidem (k) deducunt, in quas quidem fibras non incidi.

Pharyngem elevat, contra cibum recipiendum adducit, etiam ad latera distrahit. Una laryngem sursum ducit, ut se inclinet, & epiglottidem glottidi obducatur.

Secundum stylopharyngæum (l), etiam a tuba ossea natum (m), ossive vicino Cl. Viri viderunt.

Alias pars styloglossi musculi non minima pharyngem adit (n).

§. XI. Alii pharyngis levatores.

Ob connatum cum larynge pharyngem huc etiam pertinent laryngis & linguæ levatores; stylohyoideus (a). Biventris venter primus (b); geniohyoideus (c): hyothyreoideus (d), styloglossus (e); genioglossus (f), hætenus etiam palatopharyngæus,

Numerantur etiam inter levatores pharyngis *cephalopharyngæus* & *salpingopharyngæus*; ille quidem fibrarum pharyngis adscendentium supremus vertex, tum constrictoris medii (g), tum inferioris (h), quæ fibræ

(g) ALBIN. t. 12. f. 29.

(h) *Observ.* p. 75. b. cui est *Quartum par linguæ*, & *Instit.* p. 33. Minus certas facit MORG. *Advers.* II. p. 34. Negat SANTORINUS p. 126.

(i) MORG. *Adv.* I. f. 4. II. p. 34. *Epist.* XI. n. 7. VIII. n. 5. FALLOP. I. c. Negat SANTORINUS.

(k) WALTHER *de glut.* n. 6.

(l) ALBIN. *adnot.* IV. c. 5. MORGAGN. *Ep.* XI. n. 9. SANTORIN.

(m) MORGAGNUS.

(n) BOEHMER *præf. ad fasc. obs.* 117. Styloglossus alter, de quo dubitabat, num ad linguam pertineat, num ad Pharyngem CHESELDEN *anat. of human. body* Ed. VI. p. 79.

(a) L. X. p. 415.

(b) p. 418.

(c) p. 420.

(d) p. 382.

(e) p. 424.

(f) p. 422.

(g) L. XVIII. p. 70.

(h) p. 71. conf. *icones CANTII tab.* 3. BONHOMME *tab.* 22.

denique antem agnum foramen in medium processum cuneiformam tænia (*i*) cellulosa firmantur, aut unica, aut nonnunquam (*k*) duplici. Nos certe præter cellulosam telam nihil reperimus, quæ posterius, quam origo recti antici musculi minoris proveniat, & in medium pharyngem desinat. Si ea tamen totela firma satis fuerit, ut resistat magis, quam pharynx cum larynge, poterit fieri, ut inverso officio illi constrictores omnes pharyngem levant. Neque tamen id mihi probabile videtur, cum in deprimendo pharynge manifestam actionem musculosam percipiamus, cujus nullum foret instrumentum, si musculi pharyngem deprimentes in levatotes converterentur (*l*).

Salpingopharyngæus (*m*), summis viris dictus, ab extrema ossea parte tubæ EUSTACHIANÆ, & ab initio cartilagineæ portionis prodire dicitur, carneusque descendere, firma tendinea membrana tectus, & introrsum, antrorsum tendere, & inferi pharyngi, cum (*n*) palatopharyngæo, eumque elevare. Sæpius cum inquirerem, fasciculum eo loco reperi, qui tamem magis glandulis (*o*), quam fibris intus esset fartus.

§. XII. *Pharyngopalatini vel palatopharyngæi* (*a*).

Multorum nominum grandis est, & compositæ fabricæ musculus, qui inter principes deglutitionis auctores merito locum præcipuum tenet.

(*i*) *Azygos* SANTORINI, c. 7. n. 2. p. 121.

(*k*) PARIS. III. FALLOPII pars a basi capitis nata, qua jungitur cervici *observ.* p. 77. Similia docet HABICOT D. VI l. XI. sed addit processum transversum atlantis ib. *Cephalopharyngeus* DOUGLAS p. 41. CANT. p. 12. tab. 3. WINSLOW n. 475. GARENGEOT.

(*l*) Non reperit VALSALVA, neque MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 42. p. 361. neque HEUERMAN *Physiolog. tom.* 3. p. 373. Tenuibus fieri fibris DUVERNEY *myotomolog.* p. 129. 130.

(*m*) SANTORINI c. 7. n. 4. p. 122. ALBIN. tab. 12. f. 27. 28. p. 235. tab. 10. f. 13. WALTHER de *deglut.* p. 10. *anat. musc. repetis.* p. m. 617. COURCELLES tab. 6. P. BONHOMME *Sphenosalpingopharyngiens* WINSLOW IV. n. 476. Exiguum musculum EUSTACHII t. 42. f. 6. huc revocat ILL. ALBINUS, qui se comitem addit palatopharyngæo.

(*n*) ALBIN. l. c. EUSTACH. l. c. COURCELLES l. c. Vidi inter processum styloformam & eminentem ultimam alam pterygoideam.

(*o*) Similia reperit MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 44. p. 363. Membranæ albæ meminit WALTHERUS. Negat reperiri WEITBRECHT *Comm. Petr.* t. IX. p. 264. VINK *van de Spieren.* p. 196. Pergracilem fecit ALBINUS.

(*a*) Musculi gulæ 2. 3. a palato orti C. BARTHOL. *Instit.* p. 238. *Pharyngostaphylinus* VALSALV. c. 2. n. 12. 20. *Pharyngostaphylinus* WINSLOW L. IV. n. 496. & *thyrostaphylinus* EJUSD. n. 457. *Pharyngostaphylinus* SANTORINI c. 7. n. 12. p. 131. & *thyropalatini* FJUSD. n. 12. p. 132. & *hyperoopharyngæus* EJ. p. 132. 133. *Thyrostaphylinus* DOUGLAS p. 45. Recte conjungit in unum diversa nomina MORGAGNUS *Epist.* XI. n. 18. p. 300. & ALBINUS p. 238. Neque valde dissentit. WINSLOW n. 497.

Musculus in universum, connumerata dextra & sinistra columna, bicruris est (*b*), cruribus per arcum modicè convexum conjunctis. Is arcus, retrorsum cavus, late palato mobili insternitur (*c*).

Crura inde secundum pharyngis latera constrictuntur (*d*), suntque in facie posteriori pharyngis, propius membranam intimam, ut omnibus fibris trium constictorum tegantur (*e*).

Origo superior est & a margine levi, posteriori, ossis utriusque palati, Cl. Viris auctoribus (*f*), neque enim eo unquam deduxi; & a membrana firma (*g*), quæ ex periosteo palati ossei in palatum mobile retrorsum producit, estque ei pro fundamento; atque instrato tendine circumflexi (*h*) musculi, & nonnunquam nonnullis fibris a musculo azygo (*i*): reliquæ fibræ a dextro musculo in sinistrum transversæ continuantur (*k*). Arcus iste carnosus, jacet inter tendinem circumflexi musculi & inter uvulam, suamque concavitatem ostendit uvulæ (*l*).

Fibræ palatopharyngei, ut ego quidem reperi, in duobus sunt stratis; aliæ super levatorem palati mollis positæ. ut in vulgatori harum partium situ a levatore tegantur (*m*): aliæ infra levatorem, quem ideo contingunt (*n*), hæ pauciores.

Inde utraque columna, dextra, & sinistra, ab extremo palato molli deorsum (*o*) conflexa, tecta levatore, constituit arcum faucium interiorum, qui interius, quam tonsilla, & posterius, in pharyngem descendit,

(*b*) SANTORIN. p. 131. 232.

(*c*) WINSLOW n. 491. COWPER *tab.* 28. f. 2. *tab.* 29. f. 1. ALBIN. t. 12. f. 27. 28. 29. t. 10. f. 13. 14.

(*d*) *Posterior* ALEXII LITRE *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 301 f. 2. S. DUVERNEY *tab.* 18. f. 2. g. g.

(*e*) COURCELLES *tab.* 6. Conf. ALBINUS t. 12. f. 27. 28. 29. & t. 12. f. 10. 11. 12. 13. &c.

(*f*) MORGAG. *Epist.* VIII. n. 4. *Epist.* XI. n. 17. p. 298. 299. VALSALV. *Ep.* XI. n. 16. ALBIN. p. 236. SANTORINUS p. 133. de suo hyperoopharyngo: LIEUTAUD p. 171.

(*g*) ALBIN. p. 237. t. 10. f. 15. t. 12. f. 28: 29.

(*h*) VALSALV. apud MORGAN. *Ep.* XI. n. 16. p. 298. ALBIN. p. 237. COURCELLES *tab.* 7.

(*i*) MORGAGN. *Ep.* VIII. n. 4.

(*k*) MORGAGN. *Epist.* XI. n. 17. p. 299. ALBIN. p. 236. t. 10. f. 14. t. 12. f. 27. 28. 29. WINSLOW n. 496.

(*l*) COURCELLES *tab.* 6. ALBIN. t. 10. f. 14. 15. 17. t. 12. f. 27. 28. 29.

(*m*) ALBIN. t. 10. f. 14. COWPER t. 28. f. 2. N.

(*n*) COURCELLES in ic. 7. D. 8. ALBIN. t. 10. f. 13.

(*o*) ALBIN. p. 237. t. 10. f. 4. 14. 15. t. 12. f. 27. COWPER t. 28. f. 2. t. 29. f. WINSLOW n. 499.

interque stylopharyngæum musculum utrumque se conjicit (*p*), lateque per membranam albam pharyngis ad imum usque laryngem se radiatim spargit (*q*).

Earum fibrarum aliquæ superiores, in cornu superius cartilaginis scutiformis & ad latus ejus externum (*r*). & in marginem lateralem (*s*) veniunt, & ei adhærent, sub stylopharyngæo (*t*).

Facile apparet, cum hic musculus utrumque finem habeat in parte mobili; cum superiorem præterea finem conjunctio cum membrana dura palati mollis confirmet, inferiorem adhæsiō ad cartilagine[m] scutiformem stabiliat, esse pene utrumque finem æque mobilem, tantum ut mobilissimus sit arcus, quo in palato molli dexter musculus cum sinistro convenit.

Quando ergo hic musculus ex sua propria natura agit, detrahit quidem palatum molle, aque naribus removet, adque linguam idem propius adducit, cibum ergo ea parte positum a naribus interposito velo arcet, deorsum urget in pharyngem, & ne in os redeat, cavet, deducto ad linguam velo palatino. Una pharyngem elevat, dilatat, contra detrufum cibum adducit, ad inversionem epiglottidis confert.

Si vero alter finium ejusdem musculi firmior fuerit, & larynx suas per vires detractus sit, tunc unice poterit velum palatinum deducere, & adplicare linguæ.

Si contra per levatorem palati mollis velum palati sursum ductum fuerit, latusque pharynx, & larynx, poterit tunc pharyngem, & una laryngem elevare, tamquam ad palatum osseum (*u*).

Tonsillam quam prætervehitur, concutit & evacuat. Hinc a tumida tonsilla dolor in deglutiendo & incommodum, potissimum ab hoc musculo compresso.

(*p*) EUSTACH. ALBIN. p. 237. tab. 12. f. 27. 28. 29. 30.

(*q*) ALBIN. t. 10. f. 10. 11. t. 2. f. 27. EUSTACHIUS.

(*r*) EUSTACHIUS t. 42. f. 6. MORGAGN. *adv. anat.* I. n. 8. *Epist.* VIII. n. 4. *Epist.* XI. n. 14. VALSALVA *ibid.* COWPER edit. 1724. ALBIN. p. 237. t. 10. f. 10. 11. tab. 12. f. 27. 30. LIEUTAUD p. 171. SANTORIN. p. 131. 132. WINSLOW n. 497. DOUGLAS. p. 45.

(*s*) ALBIN.

(*t*) COURCELLES. EUSTACHIUS.

(*u*) Similia habet ALBINUS. COURCELLES.

(*x*) Glossostaphylinus VALS. WINSLOW. SLEVOGT.

§. XIII. *Glossopalatini. Constrictor isthmi faucium* (a).

In velo palatino arcum similem, ut is, quem nuper diximus, hic musculus efficit, quem perinde possis pro uno & azygo numerare, & pariter duos arcus ad latera veli mollis descendentes facit, sed interiores, minores, & minus descendentes. Sæpe obscurior est (b), ut tamen carneum esse agnoscas.

Finis ergo hujus musculi alter, & superior, est arcus in mobilis veli palatini parte posteriori (c) qua palatopharyngæo incumbit (d), multo angustior (e). Aliqua parte cum membrana firma veli cohæret. Subcutaneus est, sive musculorum ejus regionis infimus, & qui primus remoto velamento, glandulisque detractis, conspicitur. Fibræ posteriores in uvulam usque dorsum sparsæ desinunt (f). A latere utroque veli fere recta antrorsum & paulum deorsum fertur, & ad linguam accedit (g), in que ejus basim supra styloglossi musculi insertionem se inmittit. Cum palatopharyngæo (h) nonnihil confunditur, & cum levatore veli palatini. Vires habet similes, magni momenti ut in tantilla carne. In deglutitione veli palatini faciem inferiorem ad linguam deducit, unit utramque, aditum ad os perfecte intercipit, cibumque in pharyngem præcipitat (i).

Tonsillam, dum tumet, cum musculo proxime dicto comprimit, ut inter utrumque muscolum emulgeatur.

§. XIV. *Levatores palati mollis* (a). *Salpingostaphylini* (b).

Tertius in palato molli arcus (c) magna parte inter duas quasi laminas

(a) ALBIN. p. 241. COURCELL. *L'anterieur* LIEUTAUD p. 170.

(b) SANTORIN. c. 7. n. 14.

(c) COURCELLES, VALSALVA : ALBIN. tab. 10. f. 17. tab. 12. f. 11.

(d) ALBIN. l. c. COWPER p. 29. f. 1.

(e) COURCELLES tab. 7. B. β. ALBIN. l. c.

(f) ALBIN. l. c.

(g) LITRE l. c. f. 1. D. D. DUVERNEY tab. 18. f. 1. d. d. ALBIN. l. c.

(h) LIEUTAUD, ALBIN.

(i) ALBIN.

(a) ALBIN. p. 242.

(b) VALSALV. SANTORIN. c. 7. n. 15. p. 134. *Le droit.* LIEUT. p. 170.

(c) SANTORIN. l. c. MORGAGN. *Epist.* VIII. n. 3. X. n. 2. EUSTACH. tab. 42. COWPER t. 28. f. 2. ALBIN. p. 243. tab. 10. f. 13. 14. Tendinem interjectum habet. MORGAGNUS *Epist.* X. n. 7. LIEUTAUD.

thyreopalatini interceptus est (*d*) idem antè nudus (*d**), retrorsum convexus (*e*), carneus & robustus; tenetque veli palatini partem inter musculi circumflexi tendinem & oram liberam (*f*). Fibras ad uvulam, & palatum osseum mittit, & cum pharyngo palatinis passim se commiscet (*g*), & cum tendine circumflexi.

Inde antrorsum adscendit, (*h*) & extrorsum, ut tegatur pterygopharyngæo, & inferitur alio fine in ossis petrosi (*i*) partem, quæ tubam emittit, ad radicem processus acuti ejus ossis, pone tubæ partem mollem, alio fine in foveolam glabram ossis petrosi, inter iter carotidis, & processum acutum extremæ alæ pterygoideæ: alio denique in tubæ cartilaginem (*k*)

Nares quidem in cadavere sponte clausas vidi, potest tamen utique hic musculus, quoties palatum mobile ab eo diductum fuit, sursum ducto (*m*) velo, & retrorsum, nares claudere (*n*). Probabile est, agere in iis hominibus, qui odores (*o*) infestis solo nixu edito norunt excludere, & vidit Cl. LITRE, cum per alteram narem liquorem infundisset, rediisse per utramque, manifesto a velo palatino prohibitum, ne in fauces descenderet (*p*). Denique sunt qui continuo & absque intervallo flare norint, aere per nares admissò, in os descendente, & per idem efflato, dum nares clauduntur, ne per eas is aer exeat (*q*). In respirando agere etiam ALBINUS (*r*) auctor est.

(*d*) Pars tecta palatopharyngæo ALBIN. *tab.* 10. f. 13. Pars quæ eum musculum tegit f. 14.

(*d**) Pars nuda anterior COURCELLES t. 7.

(*e*) ALBIN. *ic. tab.* 12.

(*f*) COURCELLES.

(*g*) ALBIN.

(*h*) ALBIN. t. 12. f. 9.

(*h**) ALBIN. COWPER t. 28. f. 4.

(*i*) Similia fere habet LIEUTAUD n. 170. Paulo aliter ALBINUS conf. t. 12. f. 9. t. 10. f. 13. 14. Ex ossè petroso COURCELLES t. 6.

(*k*) RAU *myolog.* p. 52. LIEUTAUD WINSLOW n. 501.

(*m*) MORGAGN. *Epist.* X. n. 7. VIII. n. 3. ALBIN. p. 243. LIEUTAUD.

(*n*) SANTORIN. p. 135. ALBIN. p. 243. 244. COWPER *Phil. trans.* n. 220. A velo palatino in sugendo nares claudi GLISSON *ventric. & intest.* p. 296.

(*o*) La HIRE *Hist. de l'Acad.* 1712. p. 38.

(*p*) *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 304.

(*q*) *Mém. de l'Acad.* 1717. p. 70. 71. 72.

(*r*) L. c.

§. XV. *Circumflexi palati.*

Multo grandior musculus est , quam continuo credas , & tunc demum totus apparet , quando follicite alam externam pterygoideam demolitus fueris : arcum autem facit eorum , qui sunt in velo mobili , quartum , maxime anteriorem , & vicinissimum fini palati.

Oritur ab extremo osse petroso (*b*) qua cum extrema ala pterygoidea committitur ; & , continua eminentia acuta (*c*) ejus alæ , quæ est ossis cuneiformis , posterius quam foramen rami tertii nervi Quinti paris ; & ab eodem osse antrorsum , in alarum usque intervallum , interius quam arteria meningea (*d*) , & late ab alarum intervallo (*e*) ; alaque interna ; & a tubæ parte cartilaginea (*f*) , late , alias paucis fibris , alias uberioribus (*g*).

Descendit antrorsum cum levatore (*b*) , sed exterior quam tuba , ut ille interior est , per cavum alis internis & externis interpositum , proxime alam internam , latus ad unciam , & tendine mistus & carne.

In tendinem conversus transit per suum fulcum (*k*) ad hamuli pterygoidei basin , & reflectitur introrsum , paulum sursum , abique in latum expansumque tendinem (*l*) , per membranam veli mollis sparsum , superiori loco quam glandularum ægmen , radiatum (*m*) , ut fibræ anteriores antrorsum , mediæ recta introrsum , posteriores retrorsum eant (*n*) . Anteriorum fibrarum non paucae

(*a*) ALBIN. p. 245. *Musculus novus tabæ* VALSALV. Primum par FALLOP. p. 76. b. *Contourné*. LIEUTAUD p. 171. Habet etiam Pygmæus TYSON.

(*b*) SANTORIN. ALBIN. p. 246. t. 12. f. 9. COURCELLES p. 76.

(*c*) De ea FALLOPIUS p. 76. b.

(*d*) ALBIN. t. 12. f. 10. MORGAGNUS p. 214. COURCELLES , WALTHER , WEITBRECHT.

(*e*) Ab alâ interna WALTHER , SANTORIN. a radice alæ ALBIN. COURCELLES ; ab alis MOLINETT. RAU *myolog.* p. 52.

(*f*) ALBIN. p. 246. conf. *tab.* 10. f. 15. 16 VALSALV. MORGAGN. *Ep.* VII. n. 26. p. 212. 213. n. 28. p. 214. COURCELLES , LIEUTAUD , WEITBRECHT *Comm. Petrop.* T. IX. p. 257. add. COWPER t. 28. f. 2. Negat SANTORINUS c. 2. n. 11. p. 46.

(*g*) MORGAGNUS.

(*h*) VALSALVA , COURCELLES , t. 7. ALBIN. t. 12. f. 9. 10. t. 10. f. 15. 16. COWPER l. c. f. 4.

(*i*) VALSALVA , COURCELLES , CANT. *tab.* 3. f. 2. EUSTACH. t. 41. f. 13. t. 42. f. 4. 6. ALBIN. t. 12. f. 9. 10. t. 10. f. 15. 16.

(*k*) VALSALVA.

(*l*) Nimis angustum VALSALVA & EUSTACHIUS : melius COURCELEES.

(*m*) IDEM.

(*n*) IDEM.

in lunatam posteriorem aciem ossis (o) palati innascuntur, in ipsam usque mediam spinam. Interiores & posteriores fibræ cum comparibus in arcum coeunt (p), & passim cum palatopharyngæi (q) arcu miscentur. Fasciculus etiam per pterygopharyngæum, ejusque internam laminam, versus linguam abit (r).

Viderunt aliqui clari Viri, partem, ab osse petroso & ab ala majori natam, in hamuli radicem defuisse (s); ab ea radice vero aut alium musculum porro in velum palatinum se demisisse (t), aut partem ejusdem musculi circumflexi alteram (u). Alii summi viri eam fabricam non viderunt (x), neque ego in eam incidi.

Officium idem habet, quod haberet, si ab hamulo pterygoideo nasceretur. Nempe velum palatinum deprimit, a naribus abducit, has claudas aperit. Simul idem velum ad latera expandit.

Tubam paulum dilatat (y) trahendo, nam tumendo potius arcuat (z).

§. XVI. *Azygos. Palatostaphylinus.*

Satis similis in eo geniohyoidei, fibras habet rectas, ita sibi accumbentes & parallelas, ut vel unicum musculum (a) sine pari facere pos-

(o) SANTORIN. p. 47. ALBIN. p. 247. f. 9. 10. t. 10. f. 16. MORGAGN. *Epist.* VII. n. 23. p. 208. *advers. anat.* II. p. 35. WALTHER p. 8. DOUGLAS.

(p) COURCELLES. ALBIN. t. 12. f. 9. 10. t. 10. f. 16.

(q) ALBIN. p. 247.

(r) An de ea, sed carnem vocat WALTHER *de musc.* ed. nostr. p. 584 *de deglut.* p. 19.

(s) ALBIN. WINSLOW n. 458.

(t) ALBIN. WEITBRECHT p. 258. *Ceratostaphylinus* HEISTER *Compend. anat.* n. 72. f. 38. WEITBRECHT. *Ceratostaphylin.* VERDIER. GARENGEOT p. 131. *Pterygopalatinus* CROONII apud GIBSON *anat.* p. 476.

(u) WINSLOW.

(x) Negat se vidisse MORGAGN. *Epist.* X. n. 19.

(y) MORGAGN. p. 212. Experimento facto.

(z) Arctare ALBINUS.

(a) *Azygos* MORGAGNI *Epist.* VIII. n. 2. *Adv.* I. n. 8. p. 4. *Advers.* II. p. 35. *Comm. Acad. Bonon.* T. I. 311. VALSALV. apud MORGAGN. *Epist.* X. n. 19. SANTORIN, c. 7. n. 16. p. 135. HEISTER f. 38. K. *Musculus sine pari* CANT. p. 15. *Azygos uvulae* ALBIN. p. 248. COURCELLES. *Musculus uvulae* LITTRE p. 302. In cervo media in uvula musculosum quid invenit SCHELLHAMMER *Oncol.* p. 74.

fis, aut duos (*b*) : non habet tamen satis evidentem cellulofam telam, ut duos musculos vere distinctos videas (*c*).

Origo anterior est aut a palati offei spina media (*d*) ut Cl. Viri scribunt, neque enim eo deduxi (*e*) aut a tendine circumflexorum muscutorum, nam ita omnino vidi (*f*) & a membrana firma, ex periosteo producta (*g*).

Ponitur in strato fibrarum supremo (*h*) five proximo cælo narium. Tendit retrorsum, rectus primo (*i*) & eundo arctior fit (*k*), deinde cum velo palatino flexus, & denique descendens (*l*) in uvulam continuatur, cui fundamentum præstat, & quam, multis cum glandulis efficit (*n*). Cum palatopharyngæo nonnihil miscetur (*o*) & cum levatore, plerumque pallidus.

Uvulam antrorsum curvat, versus linguam, elevatque (*p*) quando descendit.

Videtur, si quid ferii est in populari modo confirmandæ ejus parti-

(*b*) Duos olim & suspensorios dixit I. v. HORNE p. 20. Duos fecit DIONIS *cours d'Anat.* p. 592. *Palatostaphylinos* vocat. DOUGLAS. p. 144. *Epistaphylinos* WINSLOW p. 502. Duo SANTORINUS p. 136.

(*c*) Conjungit VALSALVA, & ex maturioribus cogitationibus MORGAGNUS p. 303. 304. & WALTHER *de deglutit.* p. 17. ut rarissime duo sint MORG. p. 306. 314. cum in animalibus potius duos reperiatur p. 312. Non vult. musculum dici LIEUTAUD p. 172.

(*d*) ALBIN. *tab.* 10. f. 13. VALSALVA apud MORGAGN. l. c. p. 301. DOUGLAS. WINSLOW LITTRE t. 15. f. 2. CANT. *Syllab. part. corp. hum.* in Russ. edit. 88.

(*e*) VALSALVA *ibid.*

(*f*) Non omnino ab offe MORGAGN. p. 308.

(*g*) ALBIN. & levatoribus *ibid.*

(*h*) COURCELLES in *tab.* 7.

(*i*) Fibras longitudinales vocat RUYSCH. *Thef.* II. *aff.* 5. n. 6.

(*k*) COURCELLES.

(*l*) In fig. LITTRII.

(*m*) ALBIN. p. 248. MORGAGN. *Epist.* X. n. 24. p. 307. COURCELLES t. 7. DOUGLAS. WINSLOW. CANT. 3. f. 2. Alias ad initium, in finem alias MORGAGN. *ibid.*

(*n*) LITTRE; SCHELHAMMER.

(*o*) MORGAGN. p. 306. 309.

(*p*) MORG. *Epist.* X. n. 27. LITTRE. Errorem, qui ILL. DOUGLASSIO excidit, tum PRÆCEPTORI, correxi in *Prel.* BOERH. T. I. p. 213. 214. tum ALBINUS *de deglut.* p. 72.

culæ quando per morbum longior, abiit in *uvam*, in hoc isto musculo admotis acribus aromatibus, irritabilem naturam a medicis augeri.

Uvula motu voluntario regitur (*q*).

§. XVII. *Glandula pharyngis.*

Humorem pharyngi natura, & per exhalationem arteriosam suppeditat, & mucii copiam, quem folliculi simplices linguæ (*a*), palati (*b*), veli palatini (*c*), dorso epiglottidis (*d*) tubæ EUSTACHIANÆ (*e*) denique pharyngis, & convexi laryngis undique fundunt. Totus nempe pharynx obducitur in fede convexa membranæ albæ, quæ ex cute continuatur, glandulis duriusculis, ovatis (*g*), per exiguum ductum porumque mucum fundentibus; tunc potissimum, quando deglutimus, tunc enim muscoli pharyngis agunt, eumque saccum dum constringunt varie, mucum de glandulis expriment.

Nusquam eæ defunt, adsunt tamen uberiores, qua pharynx ex naribus continuatus (*h*) os occipitis subtendit. Ea in fede vidi in lineas rectas radiatas (*i*) disponi. Ductum (*k*) communem aliquando ibi repertum fuisse lego. Lacunas & circa tubam EUSTACHIANAM longas vidi, & magnam aliam medio inter tubas loco. Ante tonsillas etiam linguam versus, agmen ejusmodi glandularum est, rectum, quod anterius & superius, quam tonsilla, incipit, & in pharyngem definit (*l*). Aliæ deni-

(*q*) RIEDLIN. *cur. med. obs.* 46.

(*a*) L. XIII. p. 107.

(*b*) L. XVIII. p. 50.

(*c*) p. 63.

(*d*) L. IX. p. 392.

(*e*) L. XV. p. 223. 224.

(*g*) MORGAGN. *Epist.* IX. n. 21. p. 250. de plerisque, tum COURCELLES t. 6. Habet etiam VALSALVA. t. 5. f. 2. & COWPER *tab.* 29. f. 2. Glandulas ad fauces etiam GALENUS dixit, *de util. part.* L. XVI. c. 11.

(*h*) Vide descriptionem ejus partis suæ membranæ SCHNEIDER *de catarrah.* L. III. c. 3. p. 503. 504.

(*i*) Habet fere similia MORGAGNUS *Epist.* IX. n. 13. p. 242. 243. & SANTORINUS p. 37.

(*k*) HEISTER *not.* 58. f. 38. f. Non perpetuum esse MORGAGN. p. 242.

(*l*) An tonsilla anterior p. 66.

que glandulæ in teretem fasciculum membranæ ope colliguntur, quem salpingopharyngæum (*m*) musculum vocant.

Superius in universum majores, deorsum sensim rariores sunt.

§. XVIII. *Arteriæ pharyngis, palatique.*

Arterias numerosas natura his partibus dedit; neque exiguas velo palatino.

Pharynx arteriam propriam (*a*) habet, etiam duplicem (*b*). Quando unica, tunc est ex carotide fere externa (*c*), & posteriori loco nascitur, quo ex eo trunco arteria occipitalis exit. Adscendit, testâ vasis & musculis ejus sedis omnibus, & ramos ubique musculis colli (*d*) anterioribus impertit.

Sed tamen alios furculos præcipuis musculis a styloide processu descendentibus (*e*) & levatoribus, & tubæ (*f*) largitur: truncoque suo, quo carotidis foramen videbatur subire, reflexa (*g*) posteriorem partem adit pharyngis, in eum saccum late impenfa. Dat tamen, uti diximus, etiam pharyngis lacunari supremo, & narium parti postremæ & superiori [*h*].

Arteria *palati mobilis* plerumque est ex labiali, alias tamen a pharyngea (*i*). Adscendit cum musculis a styloide processu natis, tum cum levatore, & quidem trunco profundo adit velum palatinum, & in eo loco supremo posita, sodalis azygi musculi in ultimam usque uvulam (*k*) venit. Alter ramus superficialis cum circumflexo palati musculo venit in velum mobile, ejusque glandulas & musculos. Hæc palatina satis grandis est, ut resecta uvula subinde plurimum sanguinem (*l*) funderet etiam erosa (*m*), & funestus nonnunquam eventus fuerit ejus jacturæ (*n*).

(*m*) p. 74.

(*a*) *Fascic. II. T. L. X. p. 110. Fascic. III. p. 4. Comm. ad Boerhaav. prælect. T. I. p. 202.*

(*b*) p. 4. *Fascic. VIII. p. 10. Fascic. II. not. c c.*

(*c*) *Fascic. III. tab. art. phar.*

(*d*) *Ibid. i. p. 4. His dicari PETIT ad PALFYN p. 346.*

(*e*) *Tab. 3. s ad x.*

(*f*) p. 4.

(*g*) p. 4. *Add MEXEI. tab. nervi Quinti.*

(*h*) *L. X. p. 110.*

(*i*) *Fasc. III. p. 7. Fasc. II. M.*

(*k*) *Fasc. II. ad c c.*

(*l*) *Fascic. II. N.*

(*m*) *Alex. BENEDICT. L. IX. c. 44.*

(*n*) *IDEM. ibid. & VALSCUS de TARANTA. cum gurgulio refecaretur.*

Tonsillaris arteria ex labiali prodit, dum ea per fulcum glandulæ sub maxillaris transit; adscendit secundum sedem pharyngis lateralem, in tonsillæ partem convexam. Altera etiam solet ad tonsillas accedere, palatina propago (o).

Palati durioris arteriæ sunt a *palatina* quam diximus, & a ramis palatinis (p) descendentes arteriæ maxillaris internæ, qui antrorsum secundum dentium radices procurrunt, & arcum faciunt in fede futuræ incisivæ, ex quo ipso furculus per incisivum ductum in nares adscendit (q), inque ossa spongiosa.

Buccarum arteriæ sunt ex *labiali*, ejusque ramis labiali (r) inferiori, coronaria inferiori (s), & superiori (t), & labiali superiori (u); tum ex transversa faciei (x).

Accedunt rami buccinatorii (y) a maxillari interna adrepentes, cum prioribus conjuncti: & rami infraorbitalis trunci (z), perinde irretiti cum labialibus; & rami de foramine mentali (z*) prodeuntes: & alii rami temporalis arteriæ profundioris (z†). Longa hæc omnia, neque hujus sunt sermonis.

§. XIX. *Venæ earum partium.*

Pharyngis venæ sunt, minores aliquæ a ramo aliquo venæ jugularis internæ circa os hyoides nato, infra divisionem, aut superius in parotide, aut a vena thyreoidea superiori, aut a labiali. Ejus trunculi furculi sunt, qui in facie posteriori pharyngis descendentes arcum faciunt cum sodalibus: plexumque (a),

(o) Fasc. III. p. 7. Fasc. VIII. p. 12.

(p) Fasc. VIII. p. 18. Fasc. III. p. 10. Fasc. II. μ . & not. y. MEKEL *de nervo quint.* 46.

(q) L. XIV. p. 149.

(r) Fascic. III. tab. art. labial. O. Y. Fasc. VIII. t. y. MEKEL *Mémoire de Berlin*. T. VII. JENNY f. tab. 1. f. 1.

(s) Fasc. III. YY. Fasc. VIII. P. MEKEL.

(t) K. K. Fasc. VIII. ξ . MEKEL.

(u) Fasc. VIII. η .

(x) d. d. Fasc. VIII. ad L.

(y) Fasc. VIII. α .

(z) Fasc. VIII. γ .

(z*) Fasc. II. R.

(z†) Fasc. III. p. 19. 20.

(a) WEITBRECHT *Syndesm. ic.* n. 37.

Major vena pharyngis a trunco imprimis magno (*b*) interno, jugularis venæ est, ad glandulam maxillarem nato, qui lingualem venam profundam, inferiorem, ramum dorsalem linguæ, ramum maxillarem internum, ramum nasalem, ramum maxillarem inferiorem, ramum tonsillarem, ramum palatinum, & pharyngæum edit.

Ad tonsillas, dorsum linguæ, velum palatinum, pharyngem, maxillam inferiorem, laryngem, alius sæpe truncus venit, aut a vena thyreoidea superna, aut a linguali, aut a vena labiali.

Alias ex trunco venæ jugularis, cum venis pharyngeis, primo loco dictis, nascitur truncus, qui ad posteriora linguæ, velum palatinum, tonsillam, supremum pharyngem accedit.

Venæ buccales sunt a labiali (*d*) propagine jugularis internæ, simplicioribus quam arteriæ truncis, anulo per supremas nares maximo unitæ, tum cum vena ophtalmica de orbita emergente (*e*) inosculatæ.

Profundæ aliquæ a temporali accedunt, ut profundæ arteriæ (*f*).

§. XX. *Nervi earum partium*

Nervi pharyngis præcipui prodeunt ex trunco glossopharyngæo, qui ab Octavo est (*g*): tum ab alio nervo pharyngis pariter ad Octavum par pertinente, inferius nato (*h*), & a nervo laryngæo & ipso Octavi furculo (*i*). Adeunt porro eundem saccum nervi aliqui molles, & a ganglio producti intercostali (*k*), & ab eodem laryngeo nervo.

Nervi palati mollis & uvulæ sunt a palatinis descendentibus (*l*) ex Quinto pare natis, ramoque ejus secundo.

Tonsillæ (*m*), & proximus pharynx, a linguali tertii rami Quinti furculo propagines habent.

(*b*) L. X. p. 262.

(*c*) TREW *Epist.* ad HALLER t. 2.

(*d*) Conf. *ic. arter.* in *fasc.* III. & L. X. p. 262. JENTY *tab.* I. f. I.

(*e*) L. XVI. p. 440.

(*f*) Dicta L. X. p. 233.

(*g*) p. 232. add. Cl. ROEDERER *Thef.* n. 17.

(*h*) p. 233.

(*i*) p. 233.

(*k*) p. 256. 257.

(*l*) p. 212.

(*m*) p. 218.

Buccarum innumerabiles nervi , a duro [n] trunco ; & ab infra orbitali secundi quinti [o] ramō ; aque mentali [p] ; & a buccinatorio [q] , & a masseterico [r] ramis tertii trunci quinti paris nascuntur. Eos in MEKELLII incomparabili [s] tabula videas.

Acris pharyngis , & veli palatini sensus est , cum a levi harum partium irritatione ventriculus subvertatur , & sequatur vomitus. Igneus salivæ sensus erat , dum deglutiebat hydrophobus [t].

§. XXI. *Deglutitionis historia, Iter cibi per os.*

Prima hæc pars narratu difficilis est. Nempe cibum ponimus in linguam receptum esse [a] , explicatam per suos musculos , deinde ora utraque sursum per styloglossos ducta [b] , ut media quasi cymba tutius receptam bucceam contineat [c]. Una buccarum musculi & labiorum [d] os undique claudunt , ne quidquam elabatur.

His ita præparatis , lingua per styloglossos elevata ad palatum adprimi-
tur [e] , apice primum , deinde ex ordine etiam posteriori sua parte. Ita
cibus , cui non alia via patet , ad posteriora migrat , sedemque faucium ,
pergit. Potest etiam linguæ apicem suum retrorsum curvare , & cibi iter
juvare , & retrorsum sensim duci [f].

Accedit , certe sæpe , vis suctionis , imprimis dum bibimus. Nempe
linguam ex ordine retrorsum ducimus , ut spatium retrocedendo paremus , in
quod anteriora quæque succedant [g] , denique ipsa inspiratione adhi-

(n) p. 227. seqq.

(o) p. 211.

(p) p. 217.

(q) p. 221.

(r) p. 220.

(s) *Mém. de Berlin*. T. VII.

(t) DESAULT *de la rage*.

(a) L. IX. p. 429.

(b) p. 425.

(c) *Prælect. Boerh.* T. I. p. 212. ALBINUS *de deglut.* p. 10. 11. REVERHORST *de usu ling.* p. 55. PETIT *Mém. de 1716.* p. 15.

(d) S. I. n. 22.

(e) ALBIN. p. 21. PETIT *Mém. de 1716.* p. 15. 16. & *Mém. de 1715.* p. 145. SENAC *Ess. de phys.* p. 494. HAMBERGER p. 356. n. 9. & p. 358.

(f) HEUCHER *oper. omn.* p. 551. HAMBERGER p. 359.

(g) PETIT 1715. p. 143. HAMBERGER p. 358. 361. not. 12. add. ALBIN. p. 11. In hiru-
dine lingua sola totum hoc officium absolvit MORAND. *Mém. de l'Acad.* 1739. p. 263.

bita [*b*], ut aer externus per os torrentis in modum fubeuns cibum, potumve detrudat. Creditum est, non alio modo, neque absque inspiratione, deglutiri posse [*i*] & ob hanc potissimam causam negant Cl. Viri, fetum per os ali, ut qui respiratione careat. Sed quisque facile percipiet, quiescente pectore, neque inspirante, & clauso ore naribusque adstrictis, bene nos deglutire & rarissime una inspirare.

§. XXII. *Ut claudatur larynx.*

Sed exstat ad posteriora & inferiora linguæ [*a*] erecta epiglottis [*b*], & pone eam ad laryngem nunquam non apertus aditus.

Adest pariter supra linguam, & supra epiglottidem aditus in nares, inter cuneiformem processum, & inter velum palatinum [*c*].

Eorum itinerum primum continuo funestum vitæ finem imponit [*d*], si eo cibus descenderit.

Alterum incommodum est, & dolens, ut quisque expertus fuerit, si casu per nares cibus redierit, & præterea naturæ fini repugnat, quæ cibum in gulam vult deduci.

Magna primum sapientia naturæ factum est, ut vires pharyngem levantes & dilatantes, una laryngem elevant [*e*], atque viam ad asperam arteriam claudant.

Eæ vires sunt [*f*] styloglossi [*g*], stylohyoidei uterque [*h*], stylopharyngæi [*i*], biventrium [*k*] primus venter, hyothyreoidei [*l*].

Sed elevato larynge fit, ex ejus fabrica, ut invertatur & antrorsum inclinetur [*m*], utque una & vera glottis constringatur [*n*], & totus la-

(*h*) PETIT 1715. p. 144. 1716. p. 20. 21. GLISSON *ventr. & intest.* p. 296. HAMBERGER *Elem.* p. 356.

(*i*) Nullum animal absque suffocatione sub aqua deglutit BIRCH T. I. p. 117.

(*a*) COWPER ad t. 13. BIDL. f. 1.

(*b*) L. IX. p. 373.

(*c*) p. 64.

(*d*) L. VIII. p. 267.

(*e*) CASSERIUS p. 193. MORGAGN. *Epist.* XI. n. 33.

(*f*) L. IX. p. 240.

(*g*) Ibid. p. 424. COWPER *Phil. transf.* n. 220.

(*h*) L. IX. p. 415. 416. 417.

(*i*) L. XVIII. p. 72.

(*k*) L. IX. p. 418.

(*l*) Ibid. p. 383.

(*m*) ORIBAS. p. 64. RUFUS p. 27. C. STEPMANUS l. c. p. 25. ALBIN. *deglut.* p. 1.

(*n*) L. IX. p. 447.

ryn̄ sub epiglottidem se recipiat , a qua ampliter tegitur [*o*] & abunde. Ergo in animalibus sub aqua respirantibus merito maxima est , ut in phoca [*p*] & in lutra [*q*].

Id ut fiat perfectius , & larynx [*r*] firmitus elevetur , una os plerumque clauditur & maxillæ adducuntur [*s*], plerumque nempe , & in commodiori deglutitione : nam possumus [*t*] & humores imprimis , aperto ore etiam deglutire , sed magis incommode , & cum periculo : & etiam tunc necesse est firmari maxillam , ut punctum immotum levatoribus laryngis præbeat. Hinc a luxatione maxillæ deglutitio aboletur , & fitis incurabilis supervenit [*u*]. Et in senibus , quibus articulatio maxillæ minus firma est , deglutitio paritur [*x*].

Firmatis vero maxillis biventres , geniohyoidei [*y*] & genioglossi [*z*], laryngem sursum ducunt & invertunt [*z**]. De biventre video negari [*a*] : sed duritatem ejus in deglutiendo nascentem Cl. Viri experti sunt [*b*].

Confert ad invertendam epiglottidem lingua [*c*], quam diximus eo tempore elevari. Sed potest etiam immota lingua , inque cadavere ostendi , ut laryngis aditus , dum idem sursum ducitur , arctetur , seque inclinet ; neque aliter ob vires geniohyoideorum , genioglossorum fieri potest. Et credam linguam potius resistere , non adeo retrorsum ductam epiglottidem impellere. Penitus enim firmata lingua , & contra palatum stabili , bene deglutio. Bolum [*d*] aliqui epiglottidem inclinare scripse-

(*o*) L. IX. p. 474. ARIST. *hist. anim.* L. I. c. 16.

(*p*) PARISINI.

(*q*) *Mém. des Savans étrang.* T. II. p. 205.

(*r*) Elevari in deglutiendo ALBIN. p. 21. &c. ORIBAS. p. 94. CARP. *Isagog.* p. 50. b. CASSER p. 181. MONRO *Eff.* &c. T. I. p. 145. WALTHER *de deglut.* p. 10. GLISSON *ventr. intr.* p. 299. MORGAGN. *Epist.* XI. n. 33. &c.

(*s*) MONRO *Eff.* T. I. p. 137. 145. COWPERT. 15. f. 1.

(*t*) FERREIN *Mém. de 1744.* p. 552.

(*u*) La MOTTE. T. IV. p. 337.

(*x*) FISCHER *morb. senil.* p. 181.

(*y*) L. IX. p. 420.

(*z*) p. 422. seqq.

(*z**) In vivo cane SCHELHAMMER *de voce* p. 10.

(*a*) FERREIN *Mém. de 1744.* p. 552.

(*b*) MONRO *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. III. ed. 4. p. 424. 229. T. I. ed. 4. p. 113. 114.

(*c*) B. S. ALBIN. *hist. musc.* COWPER *Phil. transf.* n. 220. PERRAULT *Eff.* III. p. 194.

(*d*) GALENUS *util. part.* L. VII. c. 16. ORIBAS. p. 64. CASSER. p. 187. HILDAN, *Cent.* V. obs. 94.

runt. Sed exiguus humor, epiglottidi invertendæ ineptus, tamen deglutitur.

Ostendi tamen necessario fieri, dum levatur pharynx, ut una glottis claudatur (*e*), ne guttulæ forte aliquæ, fulcum (*f*), qui est ad utrumque latus aditus laryngis, perlabentes in fistulam spiritalem destillent, faciantque tussim (*g*). Et intelligitur, cur adeo facile tussis superveniat iis, qui dum deglutiunt, rident, aut alioquin animo aliis curis occupato, celerius bibunt. Nam in risu erigunt epiglottidem ut efflent, & laryngem detrahunt, quando eum maxime oportebat levare, quo epiglottis invertetur. Et adparet impossibile esse, una nos inspirare & deglutire. Nam inspiranti larynx apertus ponitur.

Hinc ab epiglottide erosa (*h*), aut rigida (*i*), aut resoluta (*k*) ut inverti nequiret, ex illapso in laryngem potu, funesti eventus sequuntur.

Majores guttulæ tussim cient, minimæ non adeo nocent. Perantiqua de potu in asperam arteriam illabente lis fuit, & auctor I. HIPPOCRATICI (*l*) aliquid tamen de humore epoto in laryngem (*m*) subrepere, experimento cum odorato liquore capto confirmavit; PLATO (*n*) eam sententiam repetiit, refutavit ERASISTRATUS (*o*), & ante eum alius HIPPOCRATICUS auctor I. *περι νοστων* (*p*), tum ARISTOTELES (*q*).

In GALENUS (*r*) exiguum tamen aliquid in spiritalem fistulam

(*e*) L. IX. p. 447.

(*f*) PETIT. *Mém. de* 1716. p. 13.

(*g*) Ibid. p. 14. LITRE *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 304.

(*h*) Ex lue venerea, erosa epiglottide, suffocatio, MERGLIN ad PANDOLPHIN. *de vouta* sit spin. p. 273.

(*i*) BONNET *sepulchr.* II. p. 31.

(*k*) HELMONT *catarrh. deliram* n. 54.

(*l*) *De corde*, & alius auctor I. *περι του εντος παθων*.

(*m*) Ea enim est sententia, licet pharyngem nominet.

(*n*) In TIMÆO.

(*o*) GALEN. *hipp. & Plat. decret.* L. VIII. c. 9.

(*p*) L. IV. fin.

(*q*) *Part. anim.* L. 3. c. 3.

(*r*) *De usu part.* L. VII. c. 17. *Meth. med.* L. IV. Ita ORIBASIIUS p. 64.

advenire secundum parietes , etiam per experimentum putavit ostendi , ulcerum ejus fistulæ a siccantibus lente deglutitis sanatorum (*s*).

Multi ex ea schola , ut ubique , Cl. Viri in eam iverunt sententiam (*t*).

Contra VINCENTIUS BARONIUS (*u*), vir eximius , negavit in vivo animale coloratos liquores in eam arteriam , inque bronchia , descendisse , ut nuper Cl. ALBINUS (*x*). Inde CÆSO GRAM peculiari libello ostendere conatus est , vera docuisse PLATONEM , & H. FABRICIUS experimentum HIPPOCRATICI auctoris repetiit (*y*). In nostris denique & Cl. EVERS experimentis (*z*) adparuit , & vulgarem , & tinctam aliquo colore aquam , omnino in pulmone fuisse , cum viva animalia in ejusmodi aqua suffocassemus (*z**).

Ut omnino lis tota videatur ab aquæ ubertate pendere , quæ tussim moveat si major fuerit ; nihil noceat eadem , quando perexigua est.

§. XXIII. *Cibus in pharyngem recipitur.*

Eædem causæ , quæ laryngem elevat , eædem non possunt non una pharyngem (*a*) sursum ducere ; sursum vero ductus dilatatur : eo magis , quod abductus a vertebis larynx , & antrorsum prolatus (*b*), spatium auget , cujus mensura est distantia vertebrarum colli a fine anteriori pharyngis. Sed etiam lingua una radice sua paulum antrorsum ducta pharyngis , caveam auget (*c*).

In hunc dilatatum pharyngem cibus premitur a lingua , cujus pars major palato osseo adpressa est ; pars denique postrema elevata (*d*) cibum ab anterioribus sibi transmissum , in proximum spatium impellit , quod ei recipiendo patet.

(*s*) *Method Med.* L. V.

(*t*) NARDI *noët. genial.* L. X. p. 700. TANCREDUS LATINIUS *de fame & siti* p. 103. HEUCHER *oper.* p. 563. GURDOT *prolegom.* p. 22. Humor thoracici partem inde deducit JASOLINUS *de aqua pericard.* c. 4.

(*u*) *Pleuropneumon.* p. 131.

(*x*) L. c. p. 68.

(*y*) *De gula* p. 37.

(*z*) *Exp. de respiratione Sect.* 4.

(*z**) *Hist. de l'Acad.* 1719. p. 29. EVERS *disp.* p. 6. 7. BRUNIER *additam.* p. 190.

(*a*) p. 73. &c. ALBIN. *de deglut.* p. 23.

(*b*) ORIBAS. p. 94. FABRICIUS *de gula* p. 33.

(*c*) ALBIN.

(*d*) CICERO *de natura deor.* L. II. p. 602 PETIT *Mém de* 1715. p. 145. 1716. p. 8. p. 494. ALBIN. p. 13.

Has ob causas adparet, magnas esse in deglutiendo partes linguæ (*e*), ut omnino gravius vulnerata (*f*) difficilem reddat deglutitionem. Femina, cui de lingua nihil supererat, nisi tuberculum (*g*), sicca quæque non deglutiebat, nisi digitis intrusa.

Potus facilius & ab incumbente palato molli, & ab uvula (*g**) & a linguæ fulca, qui est ante epiglottidem (*g***), ducitur secundum utrumque ejus lingulæ latus, per sulcos, utrinque aditum spiritalis fistulæ amplexos. Necesse autem est, parce bibere & lente, ne in laryngem copiosior humor aberet.

§. XXIV. *Cibus in gulam pellitur.*

Sed cum ea linguæ elevatione, ita concurrit ad depulsionem cibi veli palatini descensus, ut utraque actio linguam palato molli adprimat (*a*): sic omnem in os reditum intercipiat, & una potenter a naribus cibum removeat potumque, & in pharyngem demum urgeat.

Ea actio est thyreopalatini (*b*) qui, dum pharynx adfurgit, una velum mobile deorsum ducit, & glossopharyngæi (*c*). Ideo quando amygdalæ tumefactæ sunt, laborat hæc actio; neque enim velum palatinum satis nunc ad linguam accedit (*d*).

Et una, quamprimum cibus in pharyngem (*e*) est receptus, irritatus pharynx & ipse contrahitur, omneque linguam inter & vertebrae spatium abolet. Videtur hæc actio ad irritationem pertinere; neque enim in arbitrio nostro est, non deglutire, quæ pone linguam in summas fauces illapsa sunt (*f*).

Primi ergo pterygopharyngæi (*g*), & cum iis conjuncti buccinatores, & (*h*) mylopharyngæi (*i*), & glossopharyngæi (*k*), pharyngem ad re-

(*e*) GREW *Cosmolog. sacr.* p. 26.

(*f*) A plumbea glande BAUSCH *prooem. hamatol.* p. 52.

(*g*) JUSSIEU *Mém. de l'Acad.* 1718. p. 8. Conf. ALBIN. *de deglutit.* p. 12.

(*g**) PETIT *Mém. de 1716.* p. 13. LITRE *Mém. de 1718.* p. 302.

(*g***) PETIT p. 13.

(*a*) ALBIN. *de deglut.* p. 15. conf. COLLINS p. 222. COWPER *append.* p. 23. PETIT *Mém. de 1714.* p. 145. *Mém. de 1716.* p. 21. Sed iste de unico casu.

(*b*) ALBIN. p. 13. 14. 23. *hist. musc.* p. 238.

(*c*) Ibid. p. 241.

(*d*) SENAC *Ess. de Phys.* p. 591.

(*e*) ALBIN. *de deglut.* p. 15. 16. *Hist. musc.* p. 238. 239.

(*f*) HARVEI p. 197.

(*g*) p. 68.

(*h*) p. 69.

(*i*) Ibid.

(*k*) p. 70.

fistentem linguam adprimunt [l], quo tempore faccus ad laryngem amplior cibos recipiendos expectat.

Deinde ex ordine [m], ut irritatæ fuerunt, carnes pharyngis inferiores, hyopharyngæorum [n], thyreopharyngæorum [o], cricopharyngæorum [p], porro cibum deorsum promovent, ut denique in gulam recipiatur. Arytænoidei, dum secundum glottidis veræ appendicem cibus atque potus descendit, eam rimam claudunt [q].

Una larynx laxatus descendit, & retrorsum per suas vires reducitur, & pharyngem etiam ipse arctat. Id fit ab agentibus sternohyoideis [r], sternothyreoideis [s], coracohyoideis [t].

Absoluta ea actione suo se elatere epiglottis nunc erigit, & uvula a levatore palati mollis & azygo suo restituitur.

Eadem veli palatini, linguæ, & pharyngis contractio intercipit iter ad nares [u], neque eo cibi redeant, cavet.

Merito igitur quoties vel ex connato vitio columella deest [x], aut palati fornix [y], palatumve [z], aut velum fissum est, aut nimis parvum [a], aut ab ulcere erosum palatum [b], aut consumtum velum palatinum; toties male utique deglutitur [c], & cibus in nares turpi spectaculo redit [d].

(l) ALBIN. p. 27. *Hist. musc.* p. 238.

(m) CICERO l. c.

(n) p. 70.

(o) p. 71.

(p) Ibid.

(q) L. IX. p. 472.

(r) Ibid p. 413.

(s) p. 381.

(t) p. 414.

(u) C. ALBIN. *de deglut.* p. 15. & p. nostr. 78.

(x) BAUHIN. *Theatr.* p. 507. RIOLAN. p. 254. WEDEL *morb. inf.* p. 12. STORCH *Kinderkr.* p. 157. 158. SALMUTH L. III. n. 6. CRANZ *obs. cum. tr. de instrum.* ed.

(y) ZIMMERMANN *Eph. nat. cur. Dec. I. ann.* ad p. 512.

(z) *Fränk. Anmerk.* IV. p. 241. PETIT *Mém. de 1735.* p. 52.

(a) La METTRIE *obs.* 110. etiam p. 316.

(b) TURNER *Syphyllis* p. 263. HAYMAN *Comm. ad Boerh.* III. p. 249.

(b*) MORGAGN. *sed. & caus. morb.* II. p. 9.

(c) ZIMMERMANN *var. natur. luf.* p. 14. WEDEL. *Fränk. Anmerk. Eph. Nat. Cur.* l. c. RIOLAN. CRANZ. STORCH. In altero latere ALBIN. *de deglut.* p. 16. Inde mors per famem ARETÆUS *cur. acut.* L. l. c. 9.

(d) SALMUTH. WEDEL *de lacte* La METTRIE. TURNER. c. BAUHIN. HAYMAN, PETIT. RIOLAN. &c.

Si vero reperiuntur aliqui, quibus uvula aut resecta (*f*) aut a morbo deleta (*g*), aut a primo ortu deficiente (*h*), etiam eroso palato (*i*), tamen deglutitio integra superfuit (*k*), iis probabile fit, aut solam laxiorem columellam decurtatam fuisse, ut ejus fatis ad necessarios usus relinqueretur; aut certe palati, quantum natura desiderabat, superfuisse integrum; aut naturam peculiari aliqua fabrica malos effectus vitiosæ fabricæ reparavisse, ut margine processus palatini ossis maxillæ superioris eminente (*l*) scimus factum esse. De sola certe uvula possis excusare, si quis negaverit ad claudendas nares facere (*m*). Quibus animalibus nulla uvula, iis majus est velum (*n*).

Magis mireris, etiam in asperam arteriam vitio veli palatini cibos potusque illapsos fuisse (*o*), natamque phthisin (*p*), & suffocationem denique (*q*) supervenisse. Etsi enim antiqua res est, cavere id velum, ne quid in fistulam spiritalem illabatur (*r*), certum est tamen, & multo; quam glottis anteriorem uvulam esse (*s*), & ad eam rimam claudendam minime idoneam. Videtur liquor ex veli vitio minus bene in pharyngem depelli, hinc hæere circa glottidem, & paulo post illabi (*t*).

In angina pars mali solet in velo palatino esse (*u*).

§. XXV. *Finis hujus actionis.*

Adparet multa & composita vi (*a*) muscutorum cibum potumve descendere; neque simplici ponderis potentia ad ventriculum duci, cum alio-

(*f*) HAGEDORN *obs.* 69. RAV. apud BÖTTICHER *de loquela*. EYSEL *de pracip. uvulæ morb.* n. 3. RUFUS II. p. 57.

(*g*) *Phil. transf.* n. 464. ASTRUC. L. IV. c. 11. p. 523.

(*h*) HAGEDORN n. 69. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3.* p. 490.

(*i*) FOREST. *obs.* L. 32. c. 22. add. HILD. *obs. chir. Cent. II. obs.* 22.

(*k*) HAGEDORN. qui non est ad manus; EYSEL. *Phil. transf.* l. c. RUFUS. ASTRUC. HILDAN. FOREST.

(*l*) *Eph. Nat. Cur. Nov. vol. I. obs.* 103.

(*m*) SLEVOGT *de gurgul.* p. 189. 190. nob.

(*n*) Cani *compar. anat.* p. 50.

(*o*) PETIT *Mém. de 1716.* p. 14.

(*p*) PARE. *admin. anat.* p. 47. MORGAGN. *Epist.* p. 239. C. BAUHIN. p. 502.

(*q*) MORGAGN. ex velo palatino consumto l. c. WALTHER *hist. suffoc. ex velo palatino male formato.*

(*r*) ORIBAS. p. 66. conf. SENAC. p. 497.

(*s*) p. 63. & LITTRE *Mém. de 1718. tab. 15. f. 2.*

(*t*) Conf. ALBIN. p. 16.

(*u*) STÖEK *ann. med.* II. p. 144.

(*a*) BOERH. *Prælect.* T. I. p. 242.

quin & pleraque quadrupeda contra ejus ponderis vim in deglutiendo cibum urgeant, & homo inverso (*b*) corpore, & pedibus supra caput eminentibus, bibere queat. Quare intelligitur, cur a morte (*c*) aqua in ventriculum animalium submersorum non facile descendat, etsi a vivis utique sub aquam datis bestiis deglutitur (*d*), plerumque certe (*e*) in experimentis nostris (*f*): ob quam ipsam irritationem in ventriculo natam eadem vomere conantur (*g*).

Quare etiam in mente conscia doloris, quem inter deglutiendum pateretur, aquæ timor nascitur, quoties organa deglutitionis inflammata sunt, etiam quando nullus canis morsus accessit (*h*). Adparet etiam, cur in summa debilitate (*i*) & in apoplexia (*k*) nonnunquam, inque paralyfi gulæ (*l*), & in stupore a frigore nato (*m*), nulla deglutitio superfit, quæ funesta est in morbis malignis anginae species (*n*). Frequens satis est malum, in quo sola solida descendunt, fluidi nihil deglutiri potest (*o*). Vidi & sanavi paralyfin dilatati pharyngis, & in sacco cibi aliquamdiu (*p*) circa thyreoideam cartilaginem retinerentur, & demum crudi rejicerentur.

(*b*) Add. SENAC p. 493. KRUGER *physiol.* p. 84.

(*c*) EVERS *experiment. in submersis* p. 6. 7.

(*d*) J. HORNE 2. *bref om drifwande and. sjunkande long.* p. 13. *Art. de faire les rapports* p. 516.

(*e*) *Exp. nostr.* 135. 136. 138. 139. & in experimentis EVERS p. 613. & nonnullis *Hist. de l'Acad.* 1719. p. 26. & de se ipso BRUHIER *addit.* p. 190.

(*f*) Nullam reperit LOUIS *signes de la mort* p. 267. nec in aliis experimentis *Hist. de l'Ac.* 1719. p. 29. Nulla erat *Exp.* 137.

(*g*) EVERS p. 18. sub ipsam mortem.

(*h*) LIEUTAUD *précis* p. 475. DARLUE *Jour. de med.* vol. III. n. 3. Hydrophobiæ in febribus absque morfu canis rabidi ortæ numerosissima exempla collegi. Addam unice de sede ejus mali aliqua. Plerumque adest faucium inflammatio MORGAGN. *sed. caus. morb.* I. p. 64. Ante hydrophobiam angina, & in aspera arteria, prope glottidem, rubor SAUVAGES *nosol.* II. p. 2. p. 202. Hydrophobia a rima glottidis inflammata & irritabili GILBERT WATTS *de epilepsia* Leid. ann. 1753. Musculi laryngis & pharyngis inflammati, cartilagine aryaenoideæ tumidæ, ut guttur comprimeretur. In larynge & pharynge gangraena, & ex illo ichor faeditissimus. Vicinae glandulae inflammatae *Act. Acad. Mogunt.* I. p. 343. seqq.

(*i*) In sene HAYMANN *Comm.* T. III. ex BOERHAAVII ore. Add. MORGAGN. *sed & caus.* II. p. 10. de ultimo bolo. Ab evacuationibus nimis le DRAN. *oper.* p. 278. A diabete HEYDE *obs.* 28.

(*k*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 6. 7. *obs.* 40.

(*l*) TULP. L. I. c. 42. *Hist. Morb. Uratist.* 1702. p. 96. 97. STALPART *Cent.* II. *obs.* 27. FABRIC. *de gula* p. 16. In altero latere ALBIN. p. 16.

(*m*) SCHURIG *chylolog.* p. 270.

(*n*) FELICE *diff.* p. 161. HYSEL. *K. Svensk. Soc. Handl.* 1746. p. 193. In febre carcera-ria PRINGLE p. 307. in ardente ZACUT *hist. med. mirab. obs.* 100. [in isto casu vinum datum saluti fuit.]

(*o*) G. v. SWIETEN *Comm.* T. II. p. 702.

(*p*) Sacci œsophagi non infrequentes DUYERNEY *posth.* II. p. 173.

Et vicissim ex spasmo hysterico constricto pharynge deglutitio abolita fuit. Ejusmodi mala sunt, quæ opio levantur (*q*).

Multum autem hic juvat mucī, ex fontibus jam excitatis copia: neque enim sine eo gula quidquam absque summo dolore dimitteret; neque aspera, & arida, aut acria absque irritatione sentientis membranæ pharyngis transeunt.

Multum etiam facit epidermidis tutela. Ea enim per inflammationem (*s*) & excoriationem amissa, deglutitio fit difficillima. Etiam hic blandi liquores & mucī analogi salutares fuerunt.

In solidorum deglutitione superstitē, quando fluida non descendunt, credas obstaculum aliquod in gula esse, quod cedat buccæ solidæ, fluido non cedat.

S E C T I O I V.

O. E S O P H A G U S (*a*).

§. I.

Oesophagus vel gula similis undique fui, carnosus, cylindricus, tubus, antè tamen & posterius compressus est, qui sub cartilagine cricoide (*a**) ex pharynge continuatur, inque ventriculum ducit. Nullo animali negatus est (*b*), brevior tamen (*c*), & amplior (*d*) in

(*q*) COLLINS p. 263.

(*r*) De HAEN *de deglut. vit.* p. 59.

(*s*) BIUMI *canalett.* p. 90. *Hist. de l'Acad.* 1712. n. 5. A lixivio poto SEVERIN. *nov. abscess.* c. XI. a spiritu nitri *Journ. de méd.* 1757. Ne aquam quidem ferebat miser. Secessit involucrum linguæ, sive epidermis, a veneno *Hamburg. Magat.* T. XV. p. 538. tum oris & faucium cuticula, funesto eventu SAUVAGES nosol. T. III. P. I. p. 24.

(*t*) La METTRIE *obs. de med. prat.* p. 10. *Journ. de Méd.* 1757. m. April.

(*a*) Στομαχός POLLUX p. 252. PLIN. L. XI. p. 625.

(*a**) COWPER *myotom.* 1724. tab. 28. f. 3.

(*b*) Habet apīs SWAMMERDAM *bibl.* p. 454. hemerobium p. 248. eruca p. 477. de GEER p. 8. LYONNET. Cochlea GAUTIER *obs.* p. 199. LISTER *cochl.* t. 1. f. 1. Purpura *Phil. transf.* T. L. p. 2. p. 587. Ostreum, cancer, locusta, CHALETON *enquiries on nutrition* p. 23. Mentula marina VANDELLI *diff.* Animalculum valde simplex microscopicum HILL. *Essays* p. 161.

(*c*) Multis piscibus ARISTOTELES *hist. anim.* L. II. c. 17. PLIN. l. c. SEVERIN. *antiperipatias* p. 105. RONDELET *de piscib.* p. 96. puto quod brevis sit.

(*d*) Doro COLLINS tab. 26. Acipenser GRONOV. *mus. ichthyol.* II. p. 43. Rhombo turbot COLLINS tab. t. 37. Siluro HELWIG ex MONAVIO Plicæ COLLINS ibid. f. 4. Lucio perca SCHONEVELD p. 114. Lamia RONDELET p. 392.

piscibus , in quadrupedibus frigidis (*e*) , & in nonnullis avibus (*f*). Latum multivoris esse , & iis quæ ossibus vivunt (*g*) dudum dictum est. Divisus , inque insulam rediens , raro fuit spectaculo (*h*).

Ejus iter in universum est secundum corporum vertebrarum anteriorem sinistramque faciem , ad sinistrum fistulæ spiritalis latus , ut cartilaginea dextra pars ejus fistulæ , ultra oesophagum , nuda emineat , molle vero deliquium , & anulorum ejus fistulæ cartilagineorum pars sinistra , gulæ (*i*) incumbat.

Per collum multa cellulosa tela ad eam , quam modo dixi , fistulam , adque membranas vertebrarum corpora velantes revinctus , descendit oesophagus. Neque aliam tunicam externam (*k*) habet , ea enim , quam a mediastino addunt (*l*) & parvæ longitudinis est , & , unice anterior gulæ incumbit.

In pectore medius inter pleuræ dextrum sinistrumque saccum intercipitur , in spatio mediastini posteriori (*m*) dexter adjacens arteriæ aortæ , cui cedit , & dextrorsum deflectit (*n*) , fere a quinta (*o*) vertebra dorso ad nonam. Ita descendit pone cor , secundum medium sinum pulmonalem : sensim tamen deflectit iterum paulum sinistrorsum (*p*) & antrorsum , ut vertebrae deferat anterior , & in ostium septi transversii , sibi destinatum (*q*) , inter musculosas carnes lumbales medias interceptum , reci-

(*e*) Amplus in vipera BLAS *anat. anim.* p. 332. serpente p. 353. rana JACOBÆUS c. 3. p. 50. Salamandram p. 117. testudine WELSCH *hecatost. obs.* 47.

(*f*) Corvo marino PARIS. Ciconiæ *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs.* 97. Plateæ ALBIN. *de avib.* Tom. II. n. 66. Aquilæ T. II. n. 5. Ardeæ SCHRADER *diss. anat. carniv.* p. 29. Buitauro ALDROVAND L. XX. p. 406. Laro COITER p. 133. Anatæ SEVERIN *Zootom democr.* p. 337. Gregi COITER p. 122. Corvo SCHRADER p. 24.

(*g*) GREW *anat. of the guts* p. 20.

(*h*) BLAS. p. IV. *obs.* 7.

(*i*) WINSLOW *Mém. de 1715. Expos. anat.* T. IV. Plerumque FANTON. p. 75. MORGAGN. *Epist.* XI. n. 48. Accurate pone asperam arteriam poni BEHRENS *Bresl. Saml.* 1723. m. Jan & situ ludere HEISTERUS *Compend. not.* 48. Neque aliter tamen vidi quam dixi.

(*k*) WILLIS *Pharm. rat.* L. I. tab. 4. A. A. VERHEYEN p. 201. tab. 23. f. 4. HEISTER p. 127. WALTHER *de deglut.* n. 29. FANTON. *diff. anat.* p. 75.

(*l*) FANTON.

(*m*) L. IV. p. 265.

(*n*) EUSTACH. tab. 10. f. 1. 3. VESAL. L. 5. c. 3. p. 594. COLUMB. p. 226.

(*o*) COLUMB. PETSCHÉ *diff. sepe laud.* n. 97.

(*p*) Conf. EUSTACH. l. c. COLUMB.

(*q*) L. VIII. p. 79. 82.

piatur, oblique inmissus. Infra gulam carnæi diaphragmatis fasciculi a dextris in sinistra decussantur (*r*). Denique in abdomine oesophagus dilatatus (*s*) in ventriculi faciem superiorem, posteriorem, ad originem sacci cæci sinistri se immittit.

§. II. Oesophagi fabrica.

Carnea hujus tubi fabrica est, ut robore & ventriculum & intestina, in homine immensum superet, in herbivoris (*a*) etiam robustior (*b*), quibus lento opere cibum de terra sursum in ventriculum promoveat, in ruminando in os reddat.

Fibrarum duo sunt plana. Exteriores (*b**) sub cricopharyngæo musculo primum natæ; a cartilaginis anularis (*c*) facie posteriori, ex ejus dorso, æque obliquæ (*d*) primo, inde rectæ, secundum omnem gulæ ambitum in ventriculum descendunt.

Interiores (*e*) ab eadem cricoide cartilagine (*f*) nascuntur, sub musculo cricopharyngæo, obliquæ primo (*g*), deinde transversæ (*h*), & in circulum gulam ambiunt.

In nonnullis animalibus, ut in cane (*i*), & fele (*k*), tigride (*l*), phoca (*m*), bove (*n*), ove (*o*), ove guanaco (*p*), hæ fibræ in spiræ

(*r*) Ibid. p. 79.

(*s*) RUYSCH thes. II. tab. 5. f. 1. COWPER l. c. tab. 29. f. 4. EUSTACH. ibid.

(*a*) Ruminantibus GREW l. c. equo p. 12.

§ *b*) Musculus perforatus FALLOP. p. 158. b. Adde in cane SCHRADER p. 18.

(*b**) FALLOP. p. 159. COWPER tab. 28. f. 3. tab. 29. f. 3. 4. MORGAGN. Epist. XI. n. 51. p. 375. & n. 52. p. 376. RUYSCH. Thes. II. tab. 5. WEPFER de cicut. p. 120.

(*c*) FALLOP. p. 158. b. SANTORIN. c. 7. n. 20. p. 140.

(*d*) Helices vocat WALTHER l. c. p. 30. 33. & MORGENBESSER de vomit. p. 6. Habet etiam COWPER *ic. cit.*

(*e*) FALLOP. p. 159. MORGAGN. p. 376. WEPFER. WALTHER *deglut.* p. 29. COWPER t. 29. f. 3.

(*f*) WALTHER. SANTORIN.

(*g*) MORGAGN. Epist. XI. p. 376. WALTHER p. 29. SANTORIN. p. 139. n. 19 WINSLOW n. 159.

(*h*) In Lupo BESLER.

(*i*) Observ. colleg. priv. Amstelod. p. 32. MORGAGN. Adv. I. p. 19.

(*k*) GREW p. 22.

§ *l*) PARISINI De omnibus animalibus LORENZIN. p. 27.

(*m*) SANTORIN. p. 138.

(*n*) MORGAGN. PEYER *Merycol.* p. 162. GREW *anat. of the guts* tab. 26.]

(*o*) GREW p. 17.

(*p*) FEUILLE *Journal* T. 2.

speciem oesophagum ambeunt, contrario utrinque ductu : & se decussant (*q*) : non perinde in homine (*r*).

Mire dilatabiles factæ sunt, & fibræ istæ, & reliquæ tunicæ oesophagi. Neque enim solæ viperæ (*s*) magna animalia deglutiunt, qualia vidi in eorum gula hære in SEBÆ & VINCENTII thesauris, quæ nunquam credidisses eo potuisse urgeri (*t*). Sed etiam in lupo (*u*) similis est facilitas. inque aliis bestiis. Lamina hominem obesum gula excepit (*x*). Etiam in homine per morbos mire distenditur (*y*) : transmisit nonnumquam nummum duarum fere unciarum diametro (*z*).

Etiam plicæ in nonnullis bestiis extensionem adjuvant, ut in hufone (*a*) ave Peruviana (*b*) tarda (*c*).

§. III. Cellulosa tela (*a*) Tunica nervea.

Laxior (*b*), quam usquam in systemate cibario, hæc tela est, adeo longa, & rara, ut olim dictum sit, duos tubos esse in oesophago, carneum exteriorem, ac huic inclusum membranaceum, quos facile separet (*c*).

Succedit continuata tunica nervea (*d*) gulæ, firma (*e*) alba, laxa, distensibilis, exque cellulosis laminis, stipata ipsa nempe & oris (*f*) &

(*q*) STENON. *musc. & gland.* p. 13. WINSLOW n. 159.

(*r*) MORGAGN. p. 375. 376. *Adv.* II. p. 35. VERHEYEN p. 201. 202. WINSLOW n. 159. Vidit tamen in homine SANTORIN c. 7. n. 18. p. 138.

(*s*) CHARAS p. 44. SEVERIN. p. 233. BARTHOLIN. *Cent.* IV. *Hist.* 15. Tres aviculæ in anguis ventriculo SEVERIN. *Zootom.* p. 364.

(*t*) Serpens hinnulum 40. l. deglutivit SAAR *Ostind. Reis.* p. 70.

(*u*) BESLER. *Gazophylac.*

(*x*) RONDELET p. 392. Fuisse Jonæ balænam jam est suspicatus.

(*y*) BLAS p. IV. *obs.* 9. Ventriculo æqualis G v. SWIETEN T. II. p. 647. add. BARRERE *obs. anat. obs. ed. nov.* p. 147. de HAEN *de deglut. cas.* I.

(*z*) *Hist. de l'Acad.* 1752. n. 1. Florenum WERDEN *Nachricht von im Magen gefundenen Höhlern* p. 16.

(*a*) MARSIGLI *Danub. Panon. Mys.* T. VI. tab. 4.

(*b*) FEUILLE *Journal.*

(*c*) HARDER *apiar. obs.* 19.

(*d*) WINSLOW n. 160. WALTHER l. c. n. 14. Conf. VERCELLON *Glaad. Oesoph.* p. 41

(*b*) WALTHER l. c. p. 31.

(*c*) FALLOP. p. 158. b. HABICOT *Journ.* VI. *leg.* II. VERHEYEN p. 202. WINSLOW IV. n. 161. Laxe pendet a fibris musculosis PEYER *merycol.* p. 165.

(*d*) Nervosa GEEW p. 16. WALTHER n. 14. WINSLOW IV. *Poitr.* n. 160. &c. Duas fecit siphone WOLFIANO J. W. PAULI *progr.* 1721.

(*e*) WEPFER *cicut.* p. 221. GREW p. 16.

(*f*) CHARLETON *Enquiries on nutrit.* p. 28.

faucium alba cutis (*g*). Aere impulso, ut in ventriculo, in spumam & in bombycinas abit cellulas.

Sensum, ut vera cutis, retinet. Ustionis sensus manfit, cum membrana interna vomitu rejecta fuisset (*h*). Periit convulsus, cui vitrum iu oesophago hæserat (*i*).

Interior facies oesophagi in plicas (*k*) amat collabi, quæ longitudinem sequuntur, porosque habet, de quibus continuo dicetur.

Obducitur denique vera & insensili epidermide (*l*) quæ & nervæ membranæ sensum minuit, & eadem post ambustiones (*m*) absque magno malo, & decessit & recrevit. Vidi feminam, quæ plumbo fuso deglutito supervixit. In exuviis insectorum & ipsa deponitur (*n*). Tenera cum sit, non sufficit retinendæ & in vesiculam colligendæ materiæ variolosæ. Hinc ultra fauces nunquam pustulas variolosas vidi (*o*).

Villi (*p*) in animalium variorum cavo oesophago dependent, etiam prælongi; in homine, etsi Cl. Viris dicti sunt, mihi tamen nondum innotuerunt (*q*). In testudine (*r*) manifestissima dura corpuscula in cavum gulæ producuntur. Sed ea pertinent forte ad auxilia retinendæ prædæ (*s*).

(*g*) WILLIS l. c. §. II. n. 2.

(*h*) *Hist. de l'Acad.* 1712. p. 39.

(*i*) BARTHOL. *Cent. V. hist.* 66.

(*k*) WEPFER p. 120. COWPER *tab.* 29. f. 2. FANTON. p. 55. WINSLOW.

(*l*) Cuticularis NICHOLLS.

(*m*) Add. BOERHAAV. *prælect.* T. I. p. 239. Canes ab infuso plumbo non perierunt *phil. transf.* 1749. P. 2. n. 54. In morbo ejecta est *hist. de l'Acad.* 1752. n. 5. Thermas illæsa potabat femina apud SALMUTH c. 2, *obs.* 5. Voratum vitrum BARTH. l. c. SALMUTH L. III. *obs.* 3. Epidermi gulæ & ventriculi debetur, quod varii hominis acerrima venena. fusaque metalla, absque præse interitu deglutiri potuerint. Sanatus est; qui aquam fortem biberat RONSSEUS *Epist.* 9. A spiritu vitrioli de lutito ardor faucium, ventriculi, intestinorum, brevi sublatus TIMÆUS L. VII. c. 12. Satis facile sanari, qui aquam fortem bibunt STAHL *mat. med.* p. 251. Canis a fuso plumbo non periit, neque in alio casu homo *Phil. transf.* ann. 1749. P. II. n. 54.

(*n*) SWAMMERDAM p. 670. 1686.

(*o*) Ita neque in gula, ventriculo, intestinis, larynge, aspera arteria vir Cl. P. C. FABRICIUS *Progr.* ann. 1760. edit. Variolas in ventriculum & intestina non descendere multa confirmant. In variolis ulcera quidem & maculæ *Phil. transf.* ann. 1755. p. 56. & aphthæ STUBBE *phlebot.* p. 252. non vero variolæ. Intestina inflammata & gangrenosa, tum diaphragma, pustulæ in ventriculo & intestinis inullæ BEUSSEK *hist. cadav. variol.* & similia La METTRIE *obs. de Médecine pratique* p. 35.

(*p*) Papillas vocat RUYSCH *Advers.* II. n. 9. Habet etiam in *Thef.* VII. n. 40. villosæ nomine. Valde parvas esse WINSLOW n. 161. Veram villosam dixit VERHEYEN p. 202. *tab.* 23. f. 5.

(*q*) Neque Cl. HAASE *de renovat. tunic. villos.* n. 13. tum PAULI l. c.

(*r*) COLLINS p. 286. RUYSCH *cur. renov.* n. 85. *Thef.* VIII. *tab.* 2. f. 4. BELLIN. *discors.* IV. p. 83. Dentium speciem vocat STUBAS *Phil. transf.* n. 27. Habet etiam CALDESI p. 23. & JACOBÆUS p. 104. Habet jam PLINIUS L. XI. p. 625. stomachum callo denticulatum. In acipensere etiam reperiuntur RICHTER *Ichthyol. Theol.* p. 203. In xiphia SCHELHAMMER p. 12.

(*s*) Vocat aculeos CALDESI p. 22. Add. VALISNER *T.* III. p. 448. SCHELHAMMER. JACOB.

§. IV. *Liquor oesophagi.*

Arteriolæ omnino, ut in reliquo tubo cibario, ita in gula humorem tenuem exhalant, quem ars imitatur, quæ aquam per arterias injectam in cavum idipsum perpluere (a) cogit.

Earum glandularum aliæ externæ (b) sunt, quæ secundum gulam universam, & in pectore etiam uberiores sequuntur. Eæ non raro ulcerosæ, inque canibus verminosæ (c), habitæ sunt pro fonte liquoris, pleni vivis animalculis, quæ in gulam & ventriculum effusa sint præcipuum coctionis ciborum instrumentum (d), & vitalem characterem massæ chylosæ impertiant. Verissimæ tamen conglobati, & lymphatici generis glandulæ sunt (e).

Quare etiam, uti mesenterii & inguinum glandulæ frequentissime humore viscido & concreto replentur, intumescunt (f), ita & istæ glandulæ simili malo gulam comprimunt, cogunt super compressam sedem dilatari, & iter ad ventriculum ita arctant, ut malignus ciborum

(a) KAAUW *perspir.* n. 178. 179. etiam de cera.

(b) Conf. L. II. p. 189. 190. Habet duas ejusmodi glandulas testudo CALDESI p. 28.

(c) MORGAGN. *Epist.* IX. n. 44. Bresl. *Samlung.* 1716. M. nov. FANTON *anat.* p. 55. CORNEL. *Consent. progymn.* p. 241. KÖNIG. *regn. anim.* p. 88. PEYER *obs.* 13. *Phil. transf.* n. 335.

(d) Toto libello a Jacobo VERCELLONI, imprimis *Secl.* II. n. 18. p. 129. seqq.

(e) L. II. p. 190.

(f) BARTHOLIN. *inst. anat.* p. 237. RUISCH *Advers.* I. Dec. I. n. 20. p. 24. *Eff. of a Societ at Edimb.* II. n. 24. 25. RONCALL. *PAROD. hist.* p. 171. BONNET *sepulchr.* III. p. 263. II. p. 31. 33. 34. 35. *Eph. Nat. Cur. vol. VI. obs.* 140. VERHEYEN p. 201. SCHURIG *Chylogog* p. 249. WESZPREM. *obs.* HILDAN. *de angina* p. 402. EYSSON. *de fund microc. diff.* 5. *Gal. di minerv.* T. VI. p. 66. T. VII. p. 12. *Act. Budissin.* p. 171. SCHEUCHZER ad DEIDIER p. 538. 539. in *Tr. de la peste.* TULP. L. I. c. 44. G. v. SWIETEN *Comun.* T. I. p. 647. BORDEU *sur les glandes* p. 192. BLANCAARD *chirurg.* p. 470. COCCHI *bagni di Pisa* p. 238. *Journ. de medec.* 1759. nov. VALISN. *Oper.* III. p. 208. 209. de HAEN *Histor. morb. deglutit. propr.* MANGET *Theatr.* p. 298. KRAMER *med. milit.* T. II. p. 172. MORGAGN. *Sed. & caus. morb.* p. 9. ob glandulam maxillarem duram, aliosque tumores canérosos.

Ventriculi ostium superius connatum tumore inaequali scirrroso, ostium angustante, ut sola liquida descenderent PONTICELLI *conf.* 14. Ex nivis abusu oesophagus cartilagineus & osseus, ostio pene clauso, inde ciborum omnium vomitus tabesque funesta TRILLER *de callosa oris ventriculi angustia* Ex membranaceo corpore & mucco compositum in oesophago impedimentum BEVERWYCK *Schat. der ongezondd.* p. 201. Ex tuberculo, ut videtur, prope septum transversum FERDINANDUS EPIPHANIUS. Ex scirrho ad orificium ventriculi COÏTER p. 121. SCHEUCHZER l. c. Oesophagus scirrho circumdatus MAUCHAET *struma oesophi.* p. 13. Caro excrescens de gula & aditum in ventriculum claudens IDEM. Ex acino mucoso oesophagi scirrholi idem malum SCHMIEDER *Eph. Nat.*

in eum ventriculum commeatus, & denique nullus fit, lentaque tabe æger (*g*) intereat, nisi efficax manus Medici accefferit (*h*). Valde frequens malum est, ut præter infinitas per Medicos fastos sparsas historias, mihi pene invito & per alia officia distracto medico, & subinde consilia, inter diversissima civilis munia danti, tres eodem tempore casus ejusdem mali curandi occurrerint. Curavi autem eos ægros, ut breviter aliquid de arte medica adspargam, argento vivo cum camphora (*i*) & aloë composito, ut per alvum pituita sanguine tincta decederet; alium etiam nuper oleo tartari per deliquium in multa aqua dato.

Aliæ glandulæ (*k*) pharyngis veriores, exiguæ, subrotundæ & ovatæ, depressæ, in cellulosa tela sedent, inque convexitate membranæ nervæ (*l*) eademque per ductus exiguos (*m*), & poros (*n*), humorem viscidum (*o*)

Cur. Vol. VI. obs. 73. Add RHOD C. II. obs. 48. HAYMAN Comm. T. III. p. 160. VERHEL de alim. chylopoj. p. 23. A spongiola oesophago adnata HORNUNG cista p. 255. A tumore fungoso nata angustia, lente aucta UYLHOORN in HEISTER p. 824. 825. Ab atramenti potu ad orificium oesophagi duo tumores adfidentes BECK palp. cord. tuberculis duobus id ambeuntibus FERNEL pathol. L. VI. c. 1. Ex steatmate pectoris JAMIESON Edimb. III. n. 28. A steatmate superiori orificio adnato RHOD II. 3. Ex scirrho amplexo ostium ventriculi Hamb. Magaz. T. XV. Est ubi absque glandulæ aliquo discrimine gula tota in scirrhum versa fuit RHOD Cent. II. obs. 47. G. v. SWIETEN T. 1. p. 37. II. p. 648. de HAEN de deglut. cas. 3. aut demum cartilaginea WARNER cas. 9 COLLINS p. 262. VALISNER. l. c. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. p. 173. TRILLER diss. propr. BECK tal. p. 11. & etiam ossæ MORG. sed. morb. Gula pene coaluit ex abusu spiritus vini WILLIS Pharm. l. 1. p. 22. Comm. Nor. 1741. hebdom. 25.

(*g*) TRILLER. DIEMERBROEK p. 326. UYLHOORN ad HEISTER p. 824. 825. VEREYEN, HILDANUS. HAYMAN. EYSSON. SCHNEIDER. COCCHI. Aët. Budiss. TULP. JAMIESON. Hamb. Magaz. Anton. de HAEN. SWIETEN. BLANCAARD. WARNER. VALISNER. BECK. Aët. Edimb. l. c. EPIPHANIUS hist. 63 SCHEUCHZER ad DEIDIER p. 538. COCCHI apud TARCIONI pref. hist. p. LIII. FERNEL l. c.

(*h*) RUYSCH. WESZPREMI. BLANCAARD Juarregist. C. V. n. 31. SCARELLA in gal. di Minerv.

(*i*) Conf. L. II. p. 189.

(*k*) STEN. gland. musc. p. 34. DUVERNEY apud du HAMEL Phil. vet. & nov. Physf. c. 3. p. 316. Journ. des Sav. 1678. Ann. Mém. de l'Acad. T. X. p. 610. I. G. PAULI. v. HORNE microc. p. 37. MORGAGNI Adversf. III. p. 6. Epist. IX. n. 24. p. 252. BOERHAAVE Epist. de fabr. gland. ad p. 22. HEISTER n. 386. KAAUW perspir. n. 251.

(*l*) MORGAGN. Epist. IX. l. c.

(*m*) FANTON, CALDESI.

(*n*) WEPFER, HEISTER, KAAUW n. 177. 178. BOERHAAVE l. c. p. 10.

(*o*) In cane FANTON p. 55. 57. WEPFER cicut. p. 149. 252. Colleg. priv. Amstel. obsf. p. 32. In lupo WEPFER cicut. p. 163. In animale Zibethi FANTON. In tigride PARIS. In vitulo MORGAGNI Adv. III. p. 5. In castore Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obsf. 251.

in oesophagum deponunt, qui acriter sentientem tubum, & a frictione, acrimonia, aut calore cibi deglutiti dolentem, consoletur.

Pene omnia animalia ejusmodi glandulas in oesophago habent, quadrupeda (*p*), pisces (*q*) aves etiam manifestissimas.

§. V. *Arteriæ oesophagi.*

Multæ, sunt exque diversis natæ trunculis, arteriæ oesophagi, quarum quæque non longam sedem ejus tubi suis ramis percurrit. Primæ sunt a thyreoidea inferiori (*a*) ejusque ramo laryngeo.

Quæ sequuntur, jam in pectore, ex eodem trunco sed ex ejus ramo thoracico (*b*) nascuntur. Sub iis sunt parvi trunculi cum glandulis lymphaticis, etiam pericardium, vasa magna cordis (*c*) adeuntes. Eorum *dexter* ex arteria subclavia dextra (*d*), aut ex mammaria (*e*), aut ex trunco subclavio ante ortum carotidis (*f*), aut ab intercostali superiori (*g**) aut a thyreoidea inferiori (*g*) venit. Duo etiam trunci fuerunt, ex aorta alter, & alter ex intercostali superiori (*h*). *Sinister* (*i*) venit a subclavia ejus lateris (*h*), aut a mammaria sinistra (*l*), aut a trunco aortæ (*m*), aut ab intercostali superiori (*n*).

(*p*) Inter pisces squatina COLLINS p. 256. Etiam testudo MORGAGN. CALDESI p. 28. FANTON. *diff.* p. 81.

(*q*) COLLINS p. 255. GREW. p. 9. 31. 40. Peculiariter aquila HARDER *apiar.* p. 61. MARSIGLI *danub.* T. VI. p. 9. *tab.* 6. Noctua *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4. obs.* 34. scops demoiselle PARIS. Platea ALBIN. T. II. n. 66. Casuarius GREW l. c. Gallina MORGAGN. *Adv.* III. p. 5. Anser *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 85. Hirundo GREW. p. 8. 9.

(*a*) *Fascic.* II. *tab. art. thy. inf. not. g. k. & in icone.* SYLVA de la Saignée p. 95.

(*b*) *Fascic.* II. l. c. *not. l. & Fascic.* VIII.

(*c*) *Fascic.* II. *ic. art. thy. inf. l. not. m. Comment. ad BOERH. T. III, n. 308. not. a Fascic.* III. *tab. art. thorac. II. h. i. & not. 6.*

(*d*) *Fascic.* III. l. c. *Conf.* SYLVA p. 95. WALTHER *vas vertebr. ad verba rami tertiæ* GUNZ ni fallor l. c.

(*e*) *Fascic.* III. l. c. & *tab. thor. I.*

(*f*) *Ibid.*

(*g*) *Ibid.*

(*g**) *Ibid* & RUYSCH *Epist.* VI. *tab.* 7. f. 3. *Conf.* SYLVA.

(*h*) *Ibid.*

(*i*) *Fascic.* VIII. p. 21.

(*k*) *Ibid.*

(*l*) *Ibid.*

(*m*) *Ibid.*

(*n*) *Ibid.* WALTHER in fallor.

Sequuntur rami cum bronchiis communes, lateris dextri, duobus sæpe trunculis, ramis numerosis ex bronchiali dextra (o).

Sic a sinistra bronchiali, sæpe duplici (p) trunculo ad gulam arteriæ veniunt.

Infra eas, aut etiam commistæ, ex aorta ipsa arteriæ duæ (q) tres (r), quator; quinque (s), sex, septem (t) oesophageæ veniunt; superiores minores, inferiores majores (u), & ad pleuram, pericardium, pulmonem etiam extensæ, denique in ventriculum cum oesophago propagatæ, ut cum coronariis & phrenicis inferioribus ramis communibus uniantur.

Inter eas una alterave est ab intercostali aortica (v).

In brevi spatio gulæ, quod est sub transverso septo, a phrenica (x) aque coronaria dextra (y), hi principes rami, ad gulam veniunt, quorum ista in thoracem etiam redit, inosculata pectoralibus.

Ita natæ hæ arteriæ, numerosæ, exiguos quidem ramulos dant carneo gulæ involucro, rete vero faciunt ramorum majorum in parte convexa nerveæ tunicæ, quod nomini membranæ *vasculosæ* (z) occasionem dedit, quæ eadem etiam a glandulis glandulosa dicta est (a).

Surculi per nerveam convexam plurimi sparguntur, eaque perforata minuti ramuli denique in convexitate epidermidis finiuntur, minimis, quas jam diximus, fistulis exhalantibus emissis.

§. VI. *Venæ oesophageæ.*

Exigua earum, ut fere undique venarum, memoria est. Numerosis etiam ex trunculis nascuntur.

(o) *Fascic. III. tab. post. thor. k. ①. & not. 10. Fasc. VIII. p. 21.* Unicam habet RUYSCH *obs. anat. post. tr. de valo Lymph. & WALTHER de nerv. intercost. diff. 2.* Habet WINSLOW III. n. 109. LIEUTAUD p. 221. SYLVA &c.

(p) *Fascic. III. not. 9. Fascic. VIII. p. 21. 22.*

(q) *Fascic. VIII. p. 22.* HEISTER n. 67. LIEUTAUD p. 489. Tres oesophageas habet P. C. FABRICIUS in *progr.*

(r) *Ibid.* HEISTER. LIEUT. 112.

(s) *Fascic. VIII. l. c.* Quinque vel sex GUNZ *Mém des savans étrangers* I. p. 291.

(t) *Fascic. III. not. 10. 11. ic. cit. q. r. u. y. z. tum 7. 8. 13. 14. 15. 16.* Aliquot KULMUS numerat *anat. p. 82.* & HEBENSTREIT. Unam I. DRAKE t. sæpe cit. XX. n. 30. WALTHER.

(u) *Fascic. III. p. 38. y. l. c.*

(v) *Fascic. III.*

(x) *Sinistra tab. art. renal. & ibid p. 54.*

(y) *Fascic. II. tab. art. coeliac. not. g. Fasc. VIII. p. 92.*

(z) VERHEYEN p. 202. WILLIS in *tab. 6.*

(a) VERHEYEN l. c. WILLISII glandulæ videntur in concava parte nervea poni l. 8.

Supremæ oesophagearum sunt a thyreoideis (*a*) inferioribus, adeuntibus laryngem.

Proximæ in dextro latere ex trunco venæ cavæ (*b*) veniunt, qua dividitur, vel ex mammaria dextra, & ex azygo (*c*); in sinistro ex subclavia sinistra (*d*) aut ex bronchiali sinistra, aut ex vertebrali ejus lateris. Eæ venulæ vasa cordis magna, fistulam spiritalē, glandulas ei adfidentes, & oesophagum adeunt. Etiam bronchialis dextra ramos eo dat (*e*).

Proximæ sunt ex vena sine pari (*f*) in dextro latere, & ex hemiazyga in sinistro: adeunt eæ mediastinum, pericardium, pulmonis superficiem, oesophagum, valde numerosæ. Imæ earum, & majores eadem, ad diaphragma descendunt, cumque coronariis ad pectus redeuntibus, cumque phrenicis communicant.

In abdomine ex phrenica (*g*) & ex coronaria natæ gulam adeunt.

Rete faciunt ut arteriæ, etiam magis manifestum sed exterius, cetera similes.

Lymphaticæ venæ oesophagum numerosæ perambulant, qui totus conglobatis glandulis tegatur. Num tamen ex gula quidquam sugant, num potius ad telam cellulosam pertineant, quæ pleuræ exterior circumponitur, nunc quidem non possum definire.

§. VII. *Nervi.*

Numerosi ii multique, quantum novi, omnes sunt ex pare octavo: superiores quidem ex recurrente (*a*) trunco, grandes ii, & multo, quam ad intestina, potiores. Inferiores sunt ex ipso nervo octavi paris (*b*), cujus uterque truncus, dexter & sinister, per oesophagum multis magnisque ramis ad ventriculum descendit.

(*a*) *Fascic.* III. p. 29. T. I. II. & p. 38. Venæ ad jugularem WELSCH tab. 31.

(*b*) *Fasc.* III. p. 35.

(*c*) p. 38. Habet WELSCH l. c.

(*d*) p. 35.

(*e*) Ω. T. II. *Fasc.* III.

(*f*) *Fasc.* III. p. 38. tab. 11. t. 2. 3. 4.

(*g*) *Fasc.* III. p. 56.

(*a*) L. IX. p. 407.

(*b*) L. X. p. 235. 236.

§. VIII.

§. VIII. *Actio oesophagi.*

Eadem, quæ pharyngis est, sed simplicior. Cibus ex pharynge in oesophagum demissus eum dilatat, fibras extendit, irritat. Eadem per leges naturæ irritabilis paulo post contractæ, se liberant stimulo, cibum in partem proximam laxam, non irritatam, neque contractam, promovent: quæ & ipsa, ab ea ipsa causa irritata, paulo post deorsum cibum urget, donec in ventriculum depulsus gulam finat quiescere.

Motus naturalis oesophagi in animalibus (*a*) est evidentissimus, etiam in ranis (*b*), potissimum tamen in ruminantibus & vomentibus (*d*).

Idem ab irritatione adeo arcte contrahitur (*e*), dum cibum promovet (*f*), ut nullus tubus superfit (*g*), isque motus etiam a morte (*h*) major (*i*) est. A morte oesophagus convulsus (*k*). Robore constrictionis suæ, ut fibrarum vi, ventriculum utique superat (*l*).

A nervis octavi paris irritatis idem motus nascitur (*m*).

In homine etiam adparuit (*n*), non bene negatus oesophagi motus (*o*). A convulsionibus hystericis arcte constrictus fuit, ut unica in diem hora misera posset deglutire (*p*).

Quare & paralytis (*q*), ex debilitate nata, omnem deglutitionis usum abstulit, ut tamen cum viribus, etiam gulæ naturalis usus rediret (*r*).

(*a*) Motum peristalticum gulæ habet FABRICIUS *de gula* p. 22. & in equi bibentis oesophago GREW p. 229. In aculeo pediculi motus peristalticus SWAMMERDAM *bibl.* p. 78. 79. In proboscide GEOFFROI *insect.* II. p. 6.

(*b*) CALDAN *Letter.* in *collect.* Bonon. p. 329.

(*d*) Conf. p. 154.

(*e*) CALDAN p. 329. *Experim. nostr.* de irritab. 340. 341. 342. SPRÖGEL *de venon.* p. 51.

(*f*) *Exp.* 340. 331. SPRÖGEL PEYER *merycolog.* p. 164. WEPFER *cicut.* p. 353.

(*g*) *Exper. nostr.* n. 334. SPRÖGEL p. 44.

(*h*) De HEYDE *obs.* 91.

(*i*) CALDAN. *ibid.* p. 335.

(*k*) De HEYDE *obs.* 92.

(*l*) *Exper.* 342.

(*m*) CALDAN. *Lett.* II. p. 420.

(*n*) De HEYDE.

(*o*) LANGGUTH in *diff. de motu perist.*

(*p*) BESSE *analys.* I. p. 470.

(*q*) COLLINS p. 263.

(*r*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. 8 *obs.* 21.

Etiam manifesto a cerebri vitio feroque in ventriculis effuso destructa (s) deglutitio.

In obstructo oesophago cibus & peristaltico naturali motu deorsum actus est, & antiperistaltico (t) sursum rediit.

Fibræ, quæ longitudinem sequuntur, in ruminantibus visæ sunt gulam elevare, cibumque quasi adtrahere (u).

§. IX. *Motus gulæ a diaphragmate.*

Diximus (a) oesophagum inter musculos inferiores & intimos diaphragmatis ad abdomen descendere. Ab iis nunc omnino constringitur, dum homo inspirat (b), ut per experimenta manifesta apparet (c). Et si enim in animale inciso molliter (d) gula comprimitur, facile tamen intelligitur, vivo in homine, quando omnia plena sunt, multo arctius omnia adstringi. Ut eo minus sit mirum, succum heliotropii, adeo impatientem acoris, tamen in oesophago vivi animalis colorem cyaneum servasse, quem etiam vapor acidus vitiaffet, si potuisset de ventriculo effugere (e): cum ipse etiam vapor fermentationis lac cogat (f): Ita in alio exemplo, oesophagus plenus fuit, inanis vero ventriculus (g), ut viam a gula clausam fuisse certum esset. Quare etiam in sano homine, de ventriculo non nimis onerato, neque aer, neque aqua, neque odor adscendit, eaque omnia, quoties adscendunt, id vitio fit.

In ruminantibus (h) animalibus majori cum robore oesophagum stringi adparet.

(s) COLLINS p. 260.

(t) MAUCHART *de struma*. Talem in vomitu agnovit FABRICIUS l. c.

(u) PEYER l. c. Habebat ORIBASIIUS p. 94.

(a) p. 96.

(b) L. VIII. p. 87. Ventriculum plenum 'ab eo claudi THEOPHILUS L. II. c. 3. Nobiscum VIEUSSENS *traité des Liqueurs* p. 263. SCHWARTZ *diff. de vomitu* &c. Inspiranti animali stringitur SPRÖGEL p. 26. 28.

(c) *Exp. nostr.* 335. 336. 337. 338. 339.

(d) L. VIII. p. 87.

(e) VIRIDET *de ferment.* p. 223. conf. L. VIII. l. c.

(f) SCHVYL. *Vet. med.* p. 183.

(g) SENAC p. 127

(h) PEYER p. 178.

Aliis in animalibus valvulam (*i*), aut sphincterem (*k*), in oesophagi aditu esse legas. Sed & illam nuperiora (*l*) experimenta infirmant, & de isto alias dicemus, quid verum sit. In cadavere certe humano oesophagi in ventriculum patentis ostium amplius est ductu reliquo (*m*) accurate tamen constringi posse non recuso (*n*).

Sed vel ob membranulas, quibus cum septo transverso gula cohaeret, vel ob carneos (*o*) a Cl. viris dictos fasciculos, vel ob nervorum forte communem naturam, qui est ganglio semilunari & diaphragma adeunt & ventriculum, consensus certe aliquis est in utroque organo, ut in vulnere diaphragmatis deglutitio sit impedita (*p*) & contractis carnibus diaphragmatis vomitus secutus sit (*q*). Singultus etiam utriusque consensus manifestum reddit.

(*i*) In equo LAMORIER *Mém. de Montpel.* 1733. p. 511. asino & mulo p. 514. porco BUFFON T. V. t. 18. f. 2. porcello guineensi BUFFON T. VIII. p. 9. lepore T. VI. t. 40. f. 2.

(*k*) In vulpe PEYER *obs.* 20. in cane IDEM *obs.* 29. in equo BERTIN. l. c. in raja STEN. *musc. & gland.* p. 45. in homine LAURENTIUS p. 304.

(*l*) *Mém. des Savans étrang.* T. III. p. 416. BERTIN. *Mém. de* 1746. p. 44. seqq.

(*m*) RUFUS p. 60. VESAL. L. V. c. 3.

(*n*) Angustissimum in equo est BERTIN. *Mém. de* 1746. p. 48. BUFFON T. IV. T. 5.

(*o*) L. VIII. p. 82.

(*p*) ZITTMAN *Méd. leg. Cent. II. Caf.* 31.

(*q*) SCHULZE *de Emesi exp.* 3.

LIBER XIX:

V E N T R I C U L U S.

S E C T. I.

F A B R I C A.

§. I. *Numerus.*

Ventriculus, & etiam *Stomachus* latinis, pars est cibarii organi amplior, quæ gulæ succedit, & ante angustiora intestina sequitur.

Animalia quidem omnia canalem cibarium habent, estque is ipse primarius character (*a*), quo a vegetabilibus distinguntur: cibum enim per aliquod sensibus obvium ostium recipere, & in proprio canali interno conficere, omnibus est commune (*b*).

Dilatatio vero ejus canalıs, quæ post gulam succedit, & ad intestinum pertinet, est quidem in plerisque animalibus, non tamen in omnibus. Quadrupeda calida avesque omnes manifestam habent, piscesque calidi,

Quadrupeda frigida (*c*), longum ventriculum habent, ut tamen in plerumque oesophago amplior sit & intestino, ut in rana (*d*) testudine (*e*), serpente (*f*), lacerta (*g*), & perinde in piscibus (*h*) ut in xi-

(*a*) TYSON *Phil. transf.* n. 269.

(*b*) Reperitur cibarius canalis in animalculo valde simplici HILL. *Essays* p. 261. & in alio JOBLLOT *tab.* 6. f. 10. p. 54. 55. In Hydra. cui nullum cor neque cerebrum BOHADSCH *anim. mar.* p. 92. Et in pectine HASSELQUIST p. 447.

(*c*) Sanguine carentibus nullus ventriculus, & intestinum ab ore incipit PLINIUS L. XI. p. 629.

(*d*) JACOBÆUS *de ranis* p. 104.

(*e*) IDEM *ibid.*

(*f*) Vipera COITEL p. 126. COLLINS *tab.* 41. f. 1. Serpenti colubri f. 2. SEBA *Thef.* T. I. *tab.* 109. f. 1. BLAS. p. 233. Illi vix a gula differt, nisi quod minus carnosus sit, BLAS *anim.* p. 372.

(*g*) Etiam Americanæ GAUTTIER *obs. period.* 1756. Nov. In Salamandra JACOBÆUS p. 109. nullum facit discrimen.

(*h*) RONDELET p. 70.

phia (*i*), trigla (*k*), afello (*l*), lucio (*m*), efoce (*n*), lucio perca (*o*), acipensere (*p*), galeo (*p*^{*}), salmone (*p*^{**}), tinca (*p*^{***}), barbione (*p*^{****}), acu marina (*p*[†]), cyprino lato (*p*^{††}), mullo rubro (*p*^{†††}), phoca (*p*^{††††}), qui quidem potius est quadrupes; & inter vermes in lumbrico terrestri (*q*), hirudine (*r*), tereidine (*s*). Inter insecta in eruca (*t*), ape (*u*), musca (*w*), scarabæo (*x*), hemerobio (*y*), hydrocantharo (*z*), monoculo (*a*), pediculo (*b*). Denique in testaceis, ut in buccino (*c*), cochlea (*d*) purpura (*e*); & in zoophytis, ut in lepore marino (*f*) mentula marina (*g*). Lumbrico tamen intestinali, nulla a gula aut ab intestino est diversitas, tum humano (*h*)

(*i*) SCHELHAMMER disp. de eo pisce.

(*k*) GRONOV. *Act. Soc. Lit. Upsal.* 1742.

(*l*) SCHOENEVELD *ichthyolog.* p. 20.

(*m*) BLAS *anat. anim.* p. 481.

(*n*) Non distinctus GRONOV. p. 10.

(*o*) SCHOENEVELD p. 44.

(*p*) GRONOV. II. p. 43.

(*p*^{*}) PARIS. Distinguit tamen in cane DAMPIER T. III. p. 87.

(*p*^{**}) GREW p. 42. *Gronov. Upsal.* 1741.

(*p*^{***}) GREW. COLLINS t. 40. f. 1.

(*p*^{****}) IDEM ibid etiam JAC. BRIME.

(*p*[†]) *Phil. Transf.* n. 144.

(*p*^{††}) COLLINS t. 36. GREW.

(*p*^{†††}) COLLINS t. 36. f. 2.

(*p*^{††††}) HARTMANN *Anat. phoc.* p. 8.

(*q*) WILLIS *anim. brut.* p. 24. 25. VANDELLI p. 125.

(*r*) TYSON *Phil. transf.* n. 144. COLLINS tab. 40.

(*s*) ADANSON p. 266.

(*t*) DE GEER p. 20. SWAMMERDAM *biol.* p. 477.

(*u*) SWAMMERDAM p. 454.

(*w*) Afili vermi SWAMMERDAM p. 678.

(*x*) MALPIG. *posth.* p. 59. SWAMMERDAM p. 313. Cossi vermi SWAMMERDAM t. 27. f.

II. 12.

(*y*) *Journ. des Sav.* 1696. p. 477. 478. VALISNER. intorno alle brume.

(*z*) SWAMMERDAM p. 248. t. 15. f. 5.

(*a*) SCHÆFFER p. 37. huic latior.

(*b*) SWAMMERDAM t. 2. f. 3.

(*c*) LISTER *Exerc. Anat.* II. p. 55.

(*d*) LISTER ibid. p. 9. 26. de cochl. p. 73. SWAMMERDAM p. 124. 166.

(*e*) *Phil. transf.* vol. L. P. 2. p. 587.

(*f*) SCHOENEVELD p. 42. BOHADSCH p. 7.

(*g*) VANDELLI *differt.* p. 93.

(*h*) TYSON *Phil. transf.* n. 147. REDI tab. 10.

tum lupino (*i*) neque inter zoophyta hydrae (*k*), neque animalculis quibusdam microscopis, quibus certum tamen intestinum est (*l*).

Contra possis ventriculum polypo tribuere, absque intestino, si quidem ex ventriculo toti corpori æquali, per os fæces suas reddit (*m*), neque aliud inferius ostium nactus est, per quod cibum deponat. Plus enim hic inventori credo, etsi alii Cl. Viri (*n*), cum id animal plerumque cibum vomitu reddere fateantur, tamen ano non carere defendant. Sed etiam hirudini (*n**), & formicaleoni (*n***), negant idonei viri anum esse.

§. II. Simplex. Multiplex.

Multi ventriculi esse dicuntur iis animalibus, quibus receptaculum ciborum amplius, in partes fabrica sua diversas distinguitur; neque enim multiplicem dixerim, si absque ea fabricæ diversitate aliqua in sede, pluribusve locis strictior fuerit, quod in homine (*a*) frequens etiam ipse (*b*) sæpe reperi: tum in variis bestiis castore (*c*), sue (*d*), aliis.

Avibus plerisque pene tres (*e*) sunt ventriculi.

Et primum oesophagus supra pectus (*f*), sub ipsa cute, intumescit in ovalem & insigniter dilatabilem faccum (*g*), membranaceum, valde glan-

(*i*) KLEIN *herpetol. tab.* 2.

(*k*) Apud BOHADSCH l. c.

(*l*) HILL. l. c.

(*m*) TREMBLEY p. 117. *Phil. transf.* n. 469.

(*n*) BAKER *du polype* p. 42.

(*n**) *Phil. transf.* n. 469. *Mém. de* 1739. p. 264.

(*n***) REAUMUR *Mém. pour servir à l'hist. des insect.* T. IV.

(*a*) SCHRADER *Dec. I. obs.* 8. WEPFER *cicut.* p. 117. RIOLAN. p. 117. DIONIS p. 284. C. BAUH. *theatr.* p. 161. SPERLING *anthrop.* p. 732. *Eph. Nat. Cur. Vol.* 10. *obs.* 16. BLAS *obs.* 9. p. 4. PETSCHÉ *Disp.* sæpe cit. n. 84. HAEN *rat. med.* VI. p. 16. 17. FANTON. *anat.* p. 162. ut etiam valvula subesset. LUDWIG *de viis bilis cysticæ* FABRIC. *progr. ann.* 1759. MORG. *Ep.* 30. V. II. Tribuitur trabeculæ la planchette *Nov. Eph. Nat. Cur. Vol.* I. *obs.* 76. spiritui vini DAUBENTON *hist. naturell.* T. III. p. 163. 264.

(*b*) Ic. *Oment.* II.

(*c*) BUFFON. T. VIII. t. 39. f. 1. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 32. *Act. Erud.* 1684. p. 361.

(*d*) GREW p. 14. *Armadillo des NOUËS* p. 250. urso PARIS. hystrici PARIS. equo non valde pasto SEVERIN. p. 290.

(*e*) FABRIC. *de ventric.* p. 48. *de variet. ventr.* p. 110. PEYER *merocol.* c. 4. GREW *Cosmolog. Sac.* REAUMUR *Mém. de l'Acad. de* 1752. p. 304.

(*f*) Onocrotali capiti faccus adnascitur, qui & dilatari se patitur, & vi musculosa stringitur J. B. CORTES apud ALDROV p. 51.

(*g*) Conf. HARV. *de gener. anim. Exerc.* 8.

dulosum, fuscique plenum. In eo sacco aliquamdiu, & eo diutius (*h*) quo difficilior cibus est, congeritur idem, & maceratur, adque tritum præparatur, quem in ventriculo musculofo expectat. Fibras etiam ingluvies habet, quibus se inaniat.

Eam ingluviem habent aves (*i*): primo perfecte granivoræ & fructivoræ, columba (*k*), turtur (*l*), perdix (*m*), urogallus (*n*), lagopus (*o*), galli sylvestres (*o**), psittacus (*p*), graculus bohemius (*q*), coturnix (*r*), fringilla (*t*), rubicella (*u*), chloris (*w*); passer (*x*), emberiza (*z*).

Deinde, quæ præter grana quidem insecta etiam vorant, ut tamen præcipuum alimentum sit ex granis, ut gallus (*a*) meleagris (*b*), picus (*c*), anas (*d*), colymbus (*e*), si de his credi potest ALBINO.

Porro aves aliquæ, quæ etiam multum animalis cibi absumunt, ardea (*f*) phoenicopterus (*g*), ardea (*h*), casuarius (*i*).

Denique aves aliquæ rapaces non sunt penitus absque ingluvie (*k*),

(*h*) GREW p. 40. major tunc, ut magis ad latera emineat.

(*i*) Pene omnes habere PERRAULT *Eff. de physique* T. III. p. 179. DUVERNEY *posth.* II. p. 446.

(*k*) GREW *anat. of the guts* p. 35. tab. 28. ARIST. *hist. anim.* L. II. c. 17.

(*l*) ALBIN. II. n. 47.

(*m*) WILLOUGHBY *ornith.* p. 119. 120.

(*n*) IDEM p. 122.

(*o*) IDEM p. 127.

(*o**) DERHAM *Physicotheol.* p. 4. c. 23.

(*p*) COLLINS *tab.* 23. *Phil. transf.* n. 211. ALDROV. I. p. 146. II. 33.

(*q*) ALDROV T. I. L. 12. p. 799.

(*r*) ALBIN. I. n. 70.

(*t*) GREW p. 37.

(*u*) IDEM p. 38.

(*w*) WILLOUGHBY p. 179.

(*x*) p. 185.

(*z*) p. 196.

(*a*) ARIST. l. c. SUIDAS III. p. 88. GREW p. 37. 38. FANTON. *diff. anat.* p. 118.

(*b*) PARIS. T. III. P. 2. p. 85.

(*c*) WILLOUGHBY p. 93.

(*d*) SEVERIN. II. p. 337.

(*e*) ALBIN. T. I. n. 82.

(*f*) BLAS p. 146.

(*g*) PARIS. T. III. p. 3. t. 10. p. 42.

(*h*) WILLOUGHBY p. 204.

(*i*) PARIS. T. III. p. 2. t. 67. F. Non bene adeo negat GREW p. 31.

(*k*) MONRO *compar. anat.* p. 119. COLLINS p. 255. DUVERNEY *posth.* T. II. p. 447.

etsi ea minus manifesta est, nam etiam in vulture (*l*) nudi colli, qui grifo gallis (*m*), & in pica (*n*), lego ingluviem esse.

Multæ tamen adeo aves eo præsidio destituuntur, aliquæ granivoræ, ut otis (*o*); struthio (*o**), passeris nonnulli (*p*): tum pleræque carnivoræ, aquila (*q*), ossifraga (*r*), ulula (*s*), corvus (*t*), cornix (*u*), monedula (*x*), turdus (*y*), hirundo (*z*), cuculus (*a*), torquilla (*a**), platea (*b*), pelicanus (*c*), ardea stellaris (*d*), ciconia (*e*), ibis (*f*), avis regia (*g*), anser, anas sylvestris (*i*), mergus (*k*), colymbus maximus (*k**), aves aquaticæ in universum (*l*) eæ puto, quæ piscibus vivunt aut infectis.

Alter *bulbus* (*n*) est *oesophagi*, pars ventriculo musculofo aut proxima, aut continua, & ipsa carnea, etsi minus valens eo ventriculo, & in ovi speciem dilatata, inque omnibus, ni fallor, avibus (*o*) plurimis glandulis ornata, quæ succum videntur suppeditare, cum quo cibus durior in vero ventriculo teratur; cujus callosæ tunicæ, & vehementes motus, non poterant glandulosum systema admittere.

(*l*) IDEM p. 545.

(*m*) PARIS. P. III.

(*n*) ALBIN. T. I. n. 15.

(*o* Comm. Lit. Nor. 1731. Spec. 14. PARIS.

(*p*) GREW p. 39.

(*q*) Not. æ. p. 113.

(*r*) COITER apud ALDROVAND. I. p. 126.

(*t*) Not. d. p. 114.

(*t*) ARIST. hist. II. c. 17.

(*u*) ARIST.

(*x*) ARIST. T. I. n. 14.

(*y*) WILLOUGHBY p. 137.

(*z*) GREW p. 39.

(*a*) GREW p. 33.

(*a**) GREW p. 38.

(*b*) PARIS.

(*c*) GREW.

(*d*) ALDROVAND L. 20. p. 406.

(*e*) PARIS.

(*f*) Paris.

(*g*) PARIS.

(*i*) GREW p. 33.

(*k*) COITER obs. p. 132.

(*k**) ALBIN. I. n. 82.

(*l*) REDI anim. viv. p. 88.

(*n*) FABRIC. l. c. PEYER. *Merycol.* p. 22. 23. REAUMURIO secundus ventriculus.

(*o*) Omnibus GREW p. 32. 40.

Reperitur primum in granivoris , ut in genere pavonum , in gallinis [*p*], ut in gallo indico [*q*], ægyptio [*r*], meleagride [*s*], otide [*t*], psittaco (*u*), graculo (*w*); in columba (*x*), turture (*y*), fringillis (*z*) coturnice (*a*), torquilla (*b*) : in aquaticis carnivoris , ut in ardea (*c*), scope numidica (*d*), ciconia (*e*), platea (*f*), pelicano (*g*), phoenicoptero (*h*), ave regia (*i*), corvo marino (*k*), anser (*l*), cygno (*m*), mergo (*n*), arquata (*o*), colymbo majori (*p*), sterna (*q*); denique in omnivoris in casuario (*r*), struthione (*s*), sturno (*t*), pico , (*u*), corvo (*w*), In veris porro carnivoris , ut in aquila (*x*), haliæto (*y*).

- (*p*) GREW p. 33. PEYER *de ventric. gallin.* p. 62.
 (*q*) PARIS. T. III. P. 1. p. 126.
 (*r*) PARIS T. III. P. 3. p. 56.
 (*s*) PARIS T. III. P. 2. p. 85.
 (*t*) PARIS. T. III. P. 2. p. 106. Add. ALDROVAND l. p. 146. *Commun. lit. Noric.* 1731. p. 107. GREW p. 37. 38.
 (*u*) *Phil. transf.* n. 211. COLLINS *tab.* 23.
 (*w*) ALDROW l. c.
 (*x*) GREW t. 28. p. 35.
 (*y*) WILL. p. 134.
 (*z*) GREW.
 (*a*) WILLOUGHBY p. 121. SEVERIN. p. 339.
 (*b*) GREW p. 38.
 (*c*) SCHRADER *digest. anim. carniv.* p. 29. 30.
 (*d*) PARIS T. III. P. II. p. 9.
 (*e*) PEYER l. c. p. p. 26. WEPFER *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 251. PARIS. T. III. P. 2. p. 68.
 (*f*) PARIS III. P. 3. t. 6. ALBIN. III. n. 66.
 (*g*) PARIS III. P. 3. p. 197. huc ALDROV. & ATKINS *voy to Guinea* p. 256.
 (*h*) PARIS H. P. 3. 1.
 (*i*) PARIS III. P. 3. p. 205. M.
 (*k*) PARIS III. P. 1. p. 216. 217.
 (*l*) COLLINS *tab.* 19. PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 85.
 (*m*) BARTHOL. *Cent.* II. n. 79.
 (*n*) L. c. not *k* p. 112.
 (*o*) WILLOUGHBY p. 217. ALBIN. I. n. 179.
 (*p*) Id. WILLOUGH. p. 259.
 (*q*) p. 269.
 (*r*) PARIS III. P. 2. ic. G I. p. 57. GREW p. 31.
 (*s*) PARIS III. P. 2. p. 127. Huc descriptiones *Phil. transf.* n. 386. 394. VALISN. T. I. p. 271.
 (*t*) GREW p. 37.
 (*u*) *Phil. transf.* n. 350.
 (*w*) SCHRADER *digest. carniv.* p. 25.
 (*x*) PARIS. III. P. 2. p. 94. Pro ingluvie HARDER *apiar.* n. 61. ALDROV. I. p. 116.
 (*y*) Huc refero infundibulum BORRICHII *bermet. sapient.* p. 263.

vulture [z], vulture nudicolli five grifone [a], ossifraga [b], pygar-go [c], ulula [d], cuculo [e].

Tertius *ventriculus* [f] in omnibus quidem avibus reperitur, diversa tamen cum fabrica, ita ut ubique tendines & musculos, eosdem habeat, quas aves granivoræ, sed omnia debiliora [g].

Nempe bene multæ aves ex genere carnivoro [b] & insectivoro, tenuem habent & membranaceum ventriculum, qualis est in quadrupedibus carnivoris, inque piscibus. Ejusmodi ventriculus est in aquila [i], accipitre [k], vulture [l], ossifraga [m], onocrotalo [n], pica [o], cuculo (p), pico (q), nycticorace (r), merope (s), pica marina (t), scolo-pace (u), sturno (w), vanello (x), alcyone (y), ardea (z), bu-tauro (a), mergo albello (b), merganfere (c), colymbo minori (d), & majori (e)

- (z) SCHEUCHZER *Presl. Saml.* 1726. I. p. 87.
 (a) PARIS. III. P. 3.
 (b) BLAS *anat.* p. 263. CORTESIUS apud ALDROVAND I. p. 226.
 (c) Ingluviem vocat WILLOUGHBY p. 31.
 (d) GREW p. 32.
 (e) GREW p. 33. HERISSANT *Mem. de* 1752. p. 421.
 (f) FABRIC. I. c. REAUMUR I. c.
 (g) DUVERNEY *post.* T. II. p. 447.
 (h) GREW p. 40. COLLINS p. 255. MARSIGLI *Danub.* T. VI. *misc. obs.* p. 11.
 SWEKIN. p. 338.
 (i) PERR. *Eff.* T. III. p. 204. PARIS. III. P. 2. p. 94.
 (k) SEVERIN. *Zoot. democr.* p. 338.
 (l) PARIS. *anc. men.* T. I. p. 430. DUVERNEY II p. 545.
 (m) CORTES. apud ALDROV. T. I. p. 226.
 (n) ALDROVAND III. p. 50. PARIS. III. P. 3. p. 197. WHEHLER *voyage de Grece &c.* T. II. p. 29.
 (o) ALBIN. I.
 (p) *Mém de* 1752. p. 306. Huic est inter debilissimos.
 (q) ALBIN.
 (r) ALBIN. T. I. n. 40. his quatuor glandivoris una & insectivoris.
 (s) ALBIN. T. II. n. 44. WILLOUGH. p. 102.
 (t) ALBIN. T. I. n. 70. SEVERIN. p. 337. WILL. p. 220.
 (u) ALBIN.
 (w) ALBIN.
 (x) ALBIN. T. I. n. 74.
 (y) ALBIN. T. I. n. 54. WILLOUGHBY p. 101.
 (z) WILLOUGHBY p. 204.
 (a) ALDROV. L. 20. p. 406.
 (b) ALBIN. T. I. n. 89.
 (c) WILLOUGH. p. 253.
 (d) IDEM. p. 258.
 (e) ALBIN. I. n. 82. Potest hic error tot sub titulis irreplisse, quem cum nihil valde sit nociturus, lectorem ut excuset rogo.

Robustiores, non tamen ut attingat robur avium granivorarum, habent aves aliquæ omnivoræ, ut casuarius [f], struthio [g], monedula cornubica [h], graculus [i], turdus [k], merula torquata [l]: aut insectivoræ ut merula [m], sturnus [n], hirundo apus [o], curruca [p], oenanthe [q], gallinago [r], pluvialis major [s], tringa minor [t], armeria [u], vanellus [u*], & in universum aves longicrures ripariæ [u**]: porro aquaticæ (w), ut grex (x), albellus mergus (x*), larus (y), corvus marinus (z); denique carnivoræ aliquæ, ut grifo (a), falco (b), ulula (c).

Denique carnosus miri roboris ventriculus est in genere gallinaceo (f), meleagride (g), gallo calecutico, indico (h), tarda (i), columba (k),

- (f) GREW p. 32. PARIS. III. P. 2. t. 1.
 (g) WAREN *Phil. transf.* n. 394. Robustissimum tamen vocat VALISNERI p. 241.
 (h) ALBIN. T. II. n. 24.
 (i) ALBIN. T. I. n. 16.
 (k) IDEM T. I. n. 34. 36.
 (l) IDEM T. I. n. 39.
 (m) WILLOUGHBY p. 140.
 (n) IDEM p. 145. GREW p. 37. ALBIN. I. n. 40.
 (o) WILLOUGHBY p. 156.
 (p) p. 158.
 (q) p. 168.
 (r) p. 214.
 (s) IDEM p. 221.
 (t) p. 223. ALBIN. T. I. not. 50.
 (u) p. 225.
 (u*) p. 228. ALBINUS T. II. n. 74. carnosum esse negat.
 (u**) MARSIGLI p. 13.
 (w) WILLOUGHBY p. 254. Add. ALBIN. T. II. n. 89. COITER p. 132.
 (x) COITER p. 132.
 (x*) ALBIN. I. n. 89.
 (y) WILLOUGHBY p. 263. VALENTIN. *amphith. zootom.* T. II. p. 231.
 (z) PARIS. III. T. I. p. 217. & in ic. WILLOUGHBY p. 28. Membraneum vocat ALBIN. T. II. n. 281.
 (a) PARIS. III. P. III. p. 214. 215.
 (b) MURALT *vadem. anat.* p. 337.
 (c) GREW p. 32. WILL. p. 66. ALBIN. T. I. n. 9.
 (f) GREW p. 34. PEYER l. c. p. 59. 60. 61. PERRAULT T. III. t. 13.
 (g) PARIS. III. P. I. p. 85.
 (h) IBID. p. 227.
 (i) PARIS. III. P. 2. p. 107. *Commun. lit. Nov.* 1731. l. c. Minus tamen robustus.
 (k) GREW p. 35.

turture (*l*), graculo (*m*), corvo (*n*), coturnice (*o*), chloride (*p*), tum inter aquaticas in anfore, anate, laro (*t*), cygno (*u*), ciconia (*w*), ardea numidica (*x*), platea (*y*), phœnicoptero (*z*), ave regia (*a*), avibus etiam nonnullis una & insectivoris, & granivoris, ut in alauda (*b*), passere (*c*), caryocatacta (*d*), arquata (*e*).

Duros etiam ventriculos habent buccina (*f*), murices (*g*).

Inter quadrupeda, carnivora omnia habent ventriculum simplicem (*h*), humano similem, unice paulo robustiorem: habent etiam herbivora aliqua, ut equus, elephas (*i*), manati (*k*), balæna, lepus, & omnivora, ut mus, porcus, simia.

Excipiuntur unice ruminantia (*l*) animalia, quibus iisdem cornua plerumque de fronte surgunt, & quæ eadem plerumque pedis ungula sunt bipartita, aut tripartita: his enim ventriculi quidem aliter, ac in avibus quidem, continuus est, cæterum per strictos aliquos quasi isthmos dividitur, in partes, quæ tota sua fabrica dissentiunt. Duo, tres, quatuor sunt ejusmodi ventriculi. Quatuor in camelo [*m*], bove [*n*],

(*l*) ALBIN. T. II. n. 47.

(*m*) ALDROW. T. I. p. 799.

(*n*) SCHRADER p. 25.

(*o*) ALBIN. T. I. n. 30.

(*p*) GREW p. 37.

(*t*) ALBIN. T. II. tab. 87. (a Gull.)

(*u*) BARTH. anat. cygn. p. 35.

(*w*) PARIS. III. P. 3. p. 67. Eph. Nat. Cur. Dec. II ann. 2. obs. 97.

(*x*) PARIS. III. P. 2. p. 9.

(*y*) IDEM p. 27. cum icone.

(*z*) PARIS. III. P. 3. p. 10.

(*a*) IBIDEM p. 205.

(*b*) ALBIN. T. I. n. 42.

(*c*) Ibid. n. 62.

(*d*) ID. T. II. n. 28.

(*e*) Limaces edente ALBIN. T. I. n. 79.

(*f*) Exerc. anat. II. p. 55. 61.

(*g*) Phil. transf. Vol. 50. P. II. p. 582.

(*h*) ARIST. part. anim. L. III. c. 14.

(*i*) STUKELEY. MOULINS.

(*k*) Nov. comm. Acad. petrop. T. II. p. 310.

(*l*) FABRIC. var. ventric. p. 48. ARIST. part. anim. L. III. c. 14. conf. hist. L. II. c. 17. PERRAULT Essais. de phys. T. III. tab. 13.

(*m*) ARIST. l. c. PERRAULT Ess. T. III. tab. 10. PARIS. III. P. I. p. 75. Conum. petrop. T. X. p. 241.

(*n*) BLAS anat. vituli p. 207. BUFFON T. IV. p. 460. seq. VIEUSSSENS tr. des Liqueurs p. 273. seq. PEYER merycol. GREW. p. 19.

etiam afro (*o*), ove (*p*), capra (*q*), cervo (*r*), caprea (*s*), rupicapra (*t*), alce (*u*), animale moschifero (*u*^{*}), & caprea stepnoi farai (*u*^{**}).

Tres dicuntur in animale esse ovibus affini peruviano huanaco (*w*); tres animali de suis genere Tayacu (*x*).

Duo dicuntur in gazella esse (*y*). Leporum unicus (*z*), est ventriculus, etsi levi plica distinctus (*a*).

In quadrupedibus marinis tursioni tres dantur ventriculi, neque dissimiles (*b*) fabricæ ruminantium. Est tamen ex carnivoris, ut admireris hanc quasi ex lege exceptionem.

Sic in lumpo pisce duos ventriculos esse legimus (*c*). Ingluviam & ventriculum ostrea, & cochleæ habent (*d*), & murices (*e*).

Inter insecta gryllotalpa quatuor ventriculos (*f*) habet: quinque sunt in echino marino (*g*), sed totum id animal in quinque partes dividitur.

§. II. Situs.

Homini unicus est ventriculus & situm tenet perpetuum: neque enim morbosas aliquas varietates hic numerasse fas est, in quibus utique ad per-

(*o*) PARIS. P. III. p. 2. p. 27.

(*p*) GREW p. 16. seqq. ALDROW *paralip.* p. 125. & in *Quadruped. bisulc.* p. 398. BUFFON p. 40.

(*q*) BUFFON T. V. p. 81. PEYER *Exerc.* p. 82. *merycol. ic.* I. seqq. VIEUSSENS *des liq.* p. 274. tres facit iste.

(*r*) BUFFON T. VI. t. 15. f. 3.

(*s*) HARDER *apiar.* p. 51.

(*t*) WELSCH *agagropil.* p. 10. PEYER *App. Eph. Nat. Cur. Dec.* II. ann. 1. PARIS. III. P. I. p. 206.

(*u*) PARIS. III. P. I. p. 184.

(*u*^{*}) *Nov. Comm. Acad. Petrop.* IV. p. 402.

(*u*^{**}) *Ibid* p. 391.

(*w*) FEUILLÉE *Journ. d'un voyage au Pérou* T. 2.

(*x*) COWPER *Phil. transf.* n. 153. add. BARTH. *Cent.* II. *Hist.* 96.

(*y*) PARIS. III. p. 101. seq. MURALT p. 107.

(*z*) BUFFON T. VI.

(*a*) Valvulam vocat PEYER p. 83. de cuniculo, & *merycolog. ic.* n. XI.

(*b*) TYSON p. 21. tab. 1. f. 6. BARTHOL. *Cent.* II. *Hist.* 25. Duos vocat LE MAYRE *voyag.* p. 117.

(*c*) SCHELFHAMMER *de xiphia.*

(*d*) LISTER *de cochl.* T. I. f. 1. 2.

(*e*) *Phil. transf.* T. L. p. 587.

(*f*) PEYER *merycolog.* c. 7.

(*g*) CESTONI apud VALISNERI *Oper.* T. I. p. 467. KLEIN *dispos. natur. echinoderm.* Ged. an. 1734. t. 30.

pendiculum (a) positus, denique ad umbilici sedem (b), aut ad ossa ilium & pubis (c), detractus fuit: aut arcu suo majori sinistrorsum (d); minori dextrorsum respexit.

Sed neque eos casus oportet numerasse, in quibus totus per aliquod diaphragmatis foramen in pectoris cavum migravit (e): aut in quibus transpositis visceribus dextra tenuerunt ea viscera, quibus NATURA sinistram abdominis & pectoris sedem destinaverat (f).

Hypochondrium ergo sinistrum ita occupat, ut anterius partem hepatis sinistri sibi impositam patiatur (g); cum id viscus inter ventriculum sit & inter diaphragma (h): plerumque nudus sit tum inferius, tum sinisterius, qua parte etiam diaphragma ipsum sinistra amplitudine contingit [i]. Alias hepar totum ventriculum protegit.

Ad latus sinistrum & posterius cum mobilitate adnexum patitur lienem [k], quem omentum ad ventriculum adligat. Pone se & pancreatis [l] partem habet; & capsularum renalium, & hepatis [m]. Oesophagus vertebrae mediis incumbit [n].

(a) Ita etiam BOERNER *de tabe sicca lethal.* de HAEN *hist. morb. Sing.* MANGET *biblioth.* p. 77. ETTMULLER ad *Disp.* G. FRIDERICI *Comm. Petrop.* T. VII. p. 233. RICHERTI *obsf. quadr.* n. 1. *Comm. Acad. Petrop.* T. VII. p. 233. De fetu *Mém. de l'Acad.* 1749. p. 385. 386.

(b) *Obsf. of a Societ. at Lond.* T. II. p. 111. RIOL. p. 118. Infra umbilicam LAMBRECHT *obsf. t.* 14. p. 28. Ad pelvimusque VELSE *ingress. intest. obsf.* 6. LUDWIG *sit viscer. abdom.* p. 11. P. V. in hypogastrio ACRELL *chirurg. händelsf.* p. 157. Ex hernia ad vesicam usque PARE *administ.* p. 14. b. In hypogastrium delapsus ventriculus. MORGAGN. *sed. causf.* II. p. 224. In ilia *Act. Budissin.* p. 80. 81. Ab omento in herniis de situ detractus. *Verandl.* v. T. VIII. P. 1. p. 120. 121.

(c) G. v. SWIETEN T. III. p. 107.

(d) Etiam LUDWIG p. VII.

(e) SENNERT. *Prax.* L. III. part. 2. c. 15. PLATER *mantiss. obsf.* 13. BARTH. *Cent.* VI. *hist.* 55. PARE *operum.* L. IX. c. 31. p. 313. HOLT. *Phil. transf.* n. 275. *Bresl. Saml.* 1723. Maj. CHAUVET *Hist. de l'Acad.* 1729. n. 2. inque fetu STAEHELIN *tent. anat. bot.* 1724. Porro BAUSCH *Procem. ad tr. de hamatit.* p. 9. BEKER *mort. submersf. sine aqua obsf.* 1. CLAUDER. *obsf. mirab. Journ. de med.* 1758. m. Dec. In carne LITTRÉ *Hist. de l'Acad.* 1706. *obsf.* 13 in ova PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec.* 2. ann. 4. p. 195. Coli pars cum omento & pancreate per viam nervi intercostalis in thoracem pulsa *Phil. transf.* n. 351. Numerosa exempla reperio viscerum abdominis, quae per vulnera, vel per congenitos aliquos hiatus, transversa septi in thoracem migrarunt. Sollicite nuper descriptum habetur id mali genus in *verhandel der hollandt maatschapp.* T. VIII. P. 1. p. 171 seqq.

(f) L. IV. p. 303. In ventriculo HEUERMANN *physiol.* T. III. p. 455, 590.

(g) CELSUS L. IV. c. 1. WAINWRIGHT *de hepate.* BIDLOO *tab.* 41. EUSTACH. *tab.* 9. *Iconstr. Omenti* l. SPIGEL p. 244. JENTY T. I. f. 3. CHESELDEN *tab.* 21. VESAL. L. V. f. 2. 12. Sed ventriculus valde nudus est in iconibus: add. p. 596. In fetu *Mém. de* 1749. p. 385, 386.

(h) CHESELDEN, JENTY & VESAL. 595.

(i) WINSLOW n. 48. CHESELDEN, JENTY r. 1. f. 3.

(k) JENTY T. 3. f. 4.

(l) EUSTACH. T. X. f. 3. VESAL. f. 15.

(m) Conf. JENTY r. 3. f. 4.

(n) WINSLOW n. 45. & *ic. nostr. diaphr.*

Sterni appendicula [o] alias respondet fere medio ventriculo plerumque adhuc hepate tecto : alias dexteriori parti, & pene pyloricæ [o*], ut tamen hepar medium se interponat. Fissura umbilicalis hepatis principio [p] pylori opponitur. Arteria aorta inter duo orificia pone ventriculum descendit [q], cui quasi, finum imprimit [r].

Inter eadem orificia hepatis lobulus se immittit [s]. Arcus uterque utrimque fere æque altus est in ventriculo inflato : sibi relictus, ad dextra humilior est.

Utrumque orificium posteriori loco est, quam reliquus ventriculus, magis tamen oesophagus. Subjectam habet intestini coli transversam partem [t] & a mesocolo transverso sustinetur, quando plenus [u] est. Costis ita continetur, ut & partem nudam inter costas dextras & sinistras occupet [w], & infra marginem costarum aut omnino non, aut aliquantum descendat [x] magis quando plenus, inanis minus.

Omentum majus ex pene tota linea ventriculi maxima prodit, ut tamen dextro fine cis pylorum finiatur [y]; sinistro in ligamentum abeat, quod a liene ad ventriculum tendit. Minus omentum ex curvatura minori in hepar exit.

Oesophagus aliquanto posteriori loco est & superiori, & oblique per hepatis finum in ventriculum [z] cis ejus cæcum saccum se immittit. Pylorus anterior [a] & insigniter inferior [b] de fine graciliori ventriculi adscendit. Non valde se invicem remota sunt [b*] hæc duo ostia.

Partium demum ventriculi situs totus mutabilis est, ut ventriculus magis fuerit potu ciboque plenus, aut vicissim inanis.

(o) A depressa ea appendice cardialgia. GENGÆ *anat. Chir.* p. 116. Recte ergo negat pylorum subesse SANCTORIUS *meth. vitend. error.* p. 174.

(o*) POLLUX p. 254.

(p) Ita fere EUSTACH. l. c. CHESELDEN. Sinisterius VESAL. f. 26.

(q) L. XVII. p. 600.

(r) VESALIUS.

(s) *Tab. Oment.* f. 2.

(t) EUSTACH. *tab.* 9.

(u) DUVERNEY *posth.* T. II. p. 178.

(w) JENTY t. 1. f. 3. Compara etiam EUSTACH. *tab.* 9. cum 45.

(x) In cholera BARTHOL. *Cent. II. Hist.* 81.

(y) EUSTACH. l. c. VESAL. l. c. &c.

(z) WINSLOW n. 53.

(a) IDEM n. 49.

(b) IDEM *ibid. Mém. de l'Acad.* 1715. p. 233. Modice FABRIC. *de ventric.* p. 53. Multo SANTORINUS p. 164. uterque puto vere. Aequè altus SMETIUS *miscell.* L. X. Id vero nimium est.

(b*) LUDWIG l. c. n. XI.

Verius in cadavere ita ponitur ad perpendicularum, ut & oesophagus in eum descendat [c], & vicissim ab eo adscendat pylorus [d], ita arcus maximus inferior sit [e], curvatura minor superior [f] & intercepta his arcibus planities ventriculi anterior [g] peritonæum contingat: ut demum cum ventriculo & lien se ad perpendicularum componat, & finem alium superiorem habeat, inferiorem alterum.

In vivo homine hæc omnia paulum aliter se habent [h], & intestinorum resistentia ventriculum ita repellit, ut planum anterius una paulum superius, posterius una paulum inferius, arcus major paulum anterior, arcus minor posterior sit, oesophagus retrorsum inclinetur [i].

Omnia ea majora sunt, quando ventriculus aut impulsio flatu bene turgit [k], aut aere sponte recepto, nam & ita vidi habuisse: tunc enim surgit antrorsum pars inferior, quoad arcus [l] major peritonæum contingat, arcus minor sua cornua retrorsum ostendat [m]; planum interceptum quod posterius fuit [n], nunc sit inferius; superius vero sit, quod erat anterius (o).

Inflatus magis sursum versus diaphragma mihi visus est turgere, quam deorsum.

Una oesophagus ad horizontem parallelus ex ventriculo retrorsum inclinatur (p). Sic etiam pylorus, qui adscendebat, nunc retrorsum migrat transversus (q), atque adeo in homine supino descendit. Etiam alioquin potest ita repleri, ut potius deorsum vergat (r). Inflatus, vel alio-

(c) EUSTACH. tab. 10. f. 1. 3. VESAL. L. V. fig. 2. 6. n. 14. 15.

(d) EUSTACH. tab. 10. f. 1. 3. VESAL. f. 14.

(e) EUSTACH. VESAL. f. 14 & 15. JENTY tab. 1.

(f) EUSTACH. VESAL. f. 14. 15.

(g) EUSTACH. f. 1. VESAL. f. 14. JENTY tab. 1.

(h) Conf. LUDWIG l. c. p. VI. WINSLOW n. 48. seqq. 50. 51. DUVERN. posth. T. II. p. 178. Plenum ventriculum orificium suum ad duodenum ita vidit adplicare, ut clauderetur LEVELING pylor p. 22.

(i) WINSLOW IV. n. 53. VESAL. f. 12.

(k) CANT. p. 18. Ita describit RUFUS p. 61. Non penitus satis ventriculum antrorsum vertit EUSTACHIUS t. 10. f. 2. Laudat quidem MARTINE p. 53. Add. JENTY t. 3 f. 4. JACOBUS B. WINSLOW *Mém. de* 1715. p. 233 qui hunc ventriculi situm proposuit.

(l) RUFUS, WINSLOW. *ibid* *ic. nostr.* Oment. I. LIEUTAUD p. 266. CLAUSSEN *de duodeno* t. 1.

(m) RUFUS, WINSLOW add. CANT. l. c. LIEUTAUD p. 266. JENTY. GARENGEOT *splanchnol.* T. 1. p. 232. tab. 7.

(n) WINSLOW n. 51.

(o) IDEM *ibid*.

(p) CANT. p. 18.

(q) EUSTACH. t. 10. f. 2. ut certe videas, parum adsurgere: add. *ic. Oment. I.*

(r) CANT. p. 18. t. 5. f. 1. JENTY t. 3. f. 4. CLAUSSEN. GARENGEOT.

quin amplius', vesiculam fellis a dextra parte arcus majoris (*s*) pyloro suo contingit: vidi etiam eam vesiculam cis pylorum in cruvatura minori fuisse (*t*).

Arteria gastropiploica (*u*) cum ventriculo, arcum magnum antrorsum vertente, ad peritonæum nunc pervenit, & in macilentis tangitur.

Una lien (*w*) situm mutat, & ita transversus fit, ut fines habeat, anteriorem (*x*) & posteriorem. Pancreas, utique a ventriculo nunc potius minus comprimitur (*y*); hepar (*z*) magis. Vicissim a pancreate tumido comprimitur (*z*†) ventriculus.

§. III. *Ventriculi figura.*

Figura non facilis est dictu, in universum tamen conica, cujus omnes sectiones sint circuli: basis cono adaptatum hæmisphærium (*a*) in sinistro fine clausum. Circulus maximus ad insertionem oesophagi ponitur (*b*), inde ventriculi lumina uniformiter decrescunt (*c*), donec in duodenum se immittat, fine angustissimo.

Is conus cæterum in fetu brevis est (*d*), ut totus ventriculus pene rotundus sit. In adulto homine longior (*e*) est stomachus, & magis dextrorsum protenditur; diversa tamen amplitudine, modo amplius, modo

(*s*) EUSTACH. t. 10. f. 2. *tab. nostr. oment. 2.* vesicula in situm reposita. DUVERNEY T. II. p. 83.

(*t*) Ita se habent in f. 2. VESALII, ubi ventriculus præmagnus pingitur.

(*u*) WINSLOW l. c. PECHLINI *obs.* 6. *Cent.* II. Add. DUVERNEY *posth.* T. II. p. 178.

(*w*) *Comment. Boerh.* T. III. p. 29. LA SONE. *Mém. de l'Acad.* 1754. p. 139. BORDEU *recherch.* p. 432. add. FIZES de *Liene* p. 131. PETIT ad PALF. II. p. 125.

(*x*) *Tab. nostr. Oment. 2.*

(*y*) DUVERNEY *posth.* T. II. p. 183.

(*z*) CHESELDEN p. 164 RUFUS p. 31. KOEHLER de *cardialg.*

(*z*†) MORG. *Sed. & caus.* II. *Ep.* 30.

(*a*) Conf. EUSTACH. t. 10. f. 1. 2, 3. VESAL. f. 13. 14. CANT. t. 5. f. 1. HELVET. *Mém. de* 1719. *tab.* 22. f. 1. RUYSCH *Thef.* II. *tab.* 5. f. 5.

(*b*) EUSTACH. l. c. HELVETIUS, RUYSCH.

(*c*) EUSTACH. *ibid.* VESAL. p. 596. f. 13. 14. CANT. RUYSCH. Sensim in ventriculo longo HELVETIUS.

(*d*) Et parvus. In maturo fetu ad hominem adultum se habet ut $1\frac{1}{2}$. ad 43. Est autem in eodem reliquum corpus ad corpus adulti ut 1. ad 20. cum ventriculi sint ut 1. ad 28. SAUVAGES *Embryolog.* p. 11.

(*e*) Conf. icones VESALII f. 2. 6. HELVETII.

angustus, & intestini similior; non raro aliqua strictura quasi divisus (*f*), maxime posterius (*g*), tum paulo cis pylorum (*h*), unde tunc antri (*i*) aliqua imago (*k*) nascitur, quam aliqui Clar. Viri nimii fecerunt.

Deinde conus iste non rectus est, & ventriculi inanis finis dexter contra sinistram sursum peracuto angulo redit (*l*), ut ostia superne vel posterius sibi valde vicina, anterius aut inferius remotissima sint (*m*). Porro cæcus sacculus superior est, indeque ventriculus dum contrahitur, una descendit (*n*).

Cæterum cardiam (*o*) veteres dixerunt, qua subit oesophagus, & scrobiculus cordis etiam nunc vocatur, qua ventriculo appendicula ensiformis imminet. Pylorus est ostium dextrum, arcus minor est (*p*), qui posterius duo ostia conjungit, major qui anterius (*q*).

Credas in universum amplitudinem multum pendere a copia distendentis cibi. Hinc longior ventriculus, cum callosus pylorus male pateret (*r*), hinc in helluonibus peramplus (*s*). Hinc perangustus in cosso, quando nunc in nympham abit (*t*), & magna ratione arctior in musca asili, quam in edace vermie fuit (*u*). Angustus, neque tenui intestino crassior (*u*^{*}) a scirrho oesophagi. Agno herbis pasto, quarum id animal magnam molem devorat, amplius, angustus idem cum panè aleretur (*x*).

(*f*) p. 110.

(*g*) VESAL. p. 596.

(*h*) Tab. Oment. II.

(*i*) WILLIS l. c. p. 21. WEPFER *cicut.* p. 121. 122. In cane PEYER *obs.* 31. in crocodilo Jesuit. Siam p. 20. A morbo MORG. *Sed. caus. morb.* II. *Epist.* 30.

(*k*) WINSLOW n. 49. Nulla, quæ nunc succurat memoriæ meæ, hujus antri icon exstat, ne WILLISII quidem. Non habet EUSTACHIUS.

(*l*) Oment. t. 2. WINSLOW n. 49. VESAL. p. 597. L. V. f. 12. 13. 14. Add. ic. CANT. HELVET.

(*m*) CANT. HELVET.

(*n*) EUSTACH. t. 10. f. 1. 2. 3. &c.

(*o*) RUFUS p. 31. conf. KOEHLER p. 4. seqq.

(*p*) *Petite arcade* WINSLOW *Expōs.* IV. n. 45. 50.

(*q*) *Grande arcade* IDEM *ibid.*

(*r*) PLANC. *Acad. conjectur.* p. Cl. Amplissimûs a glanduloso concremento in principio duodeni Bonom. *Comm.* T. II. P. I. p. 457. Cum omnia revomerentur, ventriculus valde contractus BADER *obs.* 47. ROEDERER in progr. & exemplum transmisit in literis ILL. PRINGLE, in quo minor potius, quam intestinum, ventriculus fuit.

(*s*) p. seqq.

(*t*) SWAMMERDAM *tab.* 28. f. 5.

(*u*) IDEM p. 678.

(*u*^{*}) G. v. SWIETEN *Comm.* T. I. p. 37.

(*x*) BUFFON T. IV. p. 464.

Cæterum amplitudo perinde incerta est: angustus (*y*) est ea in robustissimis hominibus, & subito enectis (*z*) ventriculus, & in aliis longo morbo (*a*) maceratis, aut ab inedia extenuatis (*b*), aut vini spiritu (*c*) abutentibus. Vidi in vetula intestino non latiore (*d*), vidi duodeno angustiore (*e*).

Peramplus autem est (*f*) in edacibus (*g*): in iis quibus pylorus obstructus cibum maligne dimisit (*h*). Mensuras aliquas addo, & ex fanis, quas ex variis auctoribus repeto (*i*); & ex morbosis cadaveribus alias (*k*). Etiam a venenis, distentus (*l*) reperitur, & a nephritide (*l**).

§. IV. *Fabrica ventriculi. Tunica extima.*

Eadem in universum ventriculi, quæ gulæ, quæ intestinorum, & quæ

(*y*) BARTHOLIN. *Cent. I. Hist.* 50. Anserino non major G. v. SWIETEN *Comm. T. III.* p. 151. Minimus GALEN. *art. med.* Minimus WINTER. *mot. musc.* FANTON. p. 162. Libræ capax STÖRK. *ann. II.* p. 250. Coli similis IDEM p. 115.

(*z*) SANTORIN. c. 9. n. 6. ETTMULLER *progr. ad Disp.* Cl. FRIDERICI ubi sex tantum uncias recepit: Ab emetico HILDAN. *Cent. IV. obs.* 51. Ad ovi volumen contractus ibid. *obs.* 79. A colica PAW-*obs.* 4. VATER *de chordaps.* a veneno MANGET *bibl. T. I.* p. 80. HILLET p. 13.

(*a*) Duorum digitorum capax SCHURIG *chylolog.* p. 377. Minimus WOLF *obs.* p. 119. HEUERMANN *physiol. T. IV.* p. 35. SCHMIEDEL *de peric. &c.* p. 27. 28. Spissus & contractus a longa ægitudine CHIFFLET *obs.* 27.

(*b*) RUYSCH *obs.* 68. LITTER *Mém. de 1716.* p. 187.

(*c*) LOESECKE *obs.* p. 36. *Hist. de l'Acad.* 1706. n. 5. LAMBRECHTS *obs.* p. 28. In PECQUETO, celebri anatomico, avellana nuce non major BOERHAAV. *Prax. T. I.* p. 54. Add. BEHRENS *diætet.* p. 294.

(*d*) In polyphago BOEHMERI p. 7.

(*e*) HEUERMANN. *T. III.*

(*f*) Duos pedes longus WALRAVEN *tympan.* p. 42. & in universum in tympanicis LITTRE *Mém. de l'Acad.* 1713. Magnum facit ubique VESALIUS Add. *Phil. transf.* n. 207. BEMRENS. *Bresl. Saml.* 1723. M. Mart. Ab emetico ALBERTI *M. Leg. T. I. P. 2.* p. 441.

(*g*) DILTHEY *obs.* 10. SCHURIG. STENZEL. ALBIN. *fam cania n. XI. Fränk. Anmerk.* T. VI. p. 397. LOTICH L. IV. c. 2. *obs.* 2. ad 5. Sex mensurarum capax HAEN *Rat. med. L. VI.* p. 23. una tenuissimus.

(*h*) HASENOEHL p. 60. LIEUTAUD *Mém. de 1752.* LANGGUTH *progr. de tabe- ficca. Comm. Bonon T. II. P. I.* p. 157. SCHLICHTING in *Verbrugge* p. 47. 48.

(*i*) Decem librarum MAJOR *Anat. Prior.* p. 17. Sex libras parisiinas & uncias 2. solidi cibi distentus capit RIOLAN. p. 117

(*k*) Quatuor stopharum LOESEL *ren.* p. 60. Sedecim librarum STÖRK p. 123. Trium pintarum aquæ & septem librarum carnis DIONIS p. 181. Novem pintarum PLEMP. *fund. med.* p. 129. Novem quartarum ROSEN p. 308. Novem cantharorum SCHURIG. p. 361. 175. Tredecim librarum RHOD *mantiss.* n. 18. Quatuordecim librarum SPIGEL p. 225. Sedecim COLLINS p. 323. Duodecim mensurarum STENZEL. *scatom. aqrt.* Viginti mensurarum HASENOEHL p. 60. Librarum nonaginta SMETIUS *miscell. L. X.* p. 380.

(*l*) A veneno MORG. *sed. caus.* II. p. 14. HILLEFELD p. 4. 21. 43. 44. A tartaro emetico *Lettr.* al S. CURZIO p. 23. 24. Post omnis cibi vomitum MORG. *sed. caus.* II. p. 425. A febre maligna *Journ. med.* 1762. M. Avril.

(*l**) *Phil. Transf.* n. 207.

vesicæ urinariæ fabrica est : membranæ veræ quatuor, extima; musculosa: nervea: villosa: cellulosa: telæ tres, quæ earum tunicarum intervalla replent, extima, media, intima. In eo hæc receptacula differunt, quod ob variam eorum figuram simplicior in intestinis, in ventriculo magis composita fibrarum carnearum natura fit.

Ergo primum peritonæum (*a*), ad utrumque oesophagi latus, se super omentum eo modo conjiciens, quo alias opportunius dicetur, generat membranam ventriculi primam, & extimam. Ea firma, simplex, extus glabra, minutis undique vasculis abunde picta, membrana est (*b*), quæ maximam partem ventriculi contegit, fibrasque musculares firmat; eæ fibræ hac membrana violata neque aerem nunc continent, neque figuram ullo modo suam valent sustinere. Fibrarum in prima tunica nullus est certus ductus (*c*).

Duæ sunt ventriculi sedes (*d*), a quibus hæc membrana abest, ad originem utriusque omenti. Id enim huic ipsi tunicæ continuatur, cumque duplex sit; duasque paginas habeat, hætenus remotas, ut & glandulæ intercedant, & vasa non minima, spatium id totum inter duas omenti paginas absque membrana extima est. Latius est in arcu minori, qua sede plurima sunt vasa, nervique, pluresque glandulæ, Minus, sed longum, est per totum arcum majorem.

§. V. *Cellulosa prima.*

Qua nuda sedes est ventriculi (*a*), ea laxus fatis, neque absque adipe cellulosus (*b*) & laminosus textus est, in arcu minori etiam evidentior, qualem etiam ubique convexum peritonæi dorsum circompositum gerit: dorsum enim est, quod tunicæ carneæ ventriculi, & omnibus equidem visceribus obvertitur.

In ea cellulosa tela, arcus semper minoris, nervorum octavi paris (*c*) præcipui rami sunt, & arteriæ coronariæ majoris, venæque.

(*a*) WINSLOW n. 55.

(*b*) *Première tunique* WINSLOW n. 55. Extima WILLIS p. 16. GLISSON *ventr.* 3^a int. p. 135. Ob cellulosa naturam in plures laminas resolvere potuit PEYERUS *Merycolog.* p. 116.

(*c*) Fecit fibras longitudinem ventriculi sequentes, WILLIS *tab.* 2.

(*d*) BARTHOL. *analect.* p. 183. 184. *Method. demonstr.* p. 183. 184. *specim. anat.* 140.

(*a*) Paulo prius.

(*b*) DUVERNEY *posthum.* T. II. p. 179.

(*c*) L. X. p. 236.

Sed etiam perpetuæ ea fede glandulæ (*d*) reperiuntur, conglobati generis, nihil ab iis diversæ, quæ sunt in mesenterio, numerosæ, ovales, compressæ, pene agminatæ, minime ignoratæ antiquis, neque a nuperis (*d**) detectæ. Lymphaticæ sunt indolis, & vasa lymphatica (*e*) maxima ea fede reperiuntur, alibi repetenda. In aliis animalibus oportet conglomerati esse generis, cum ostia (*f*) in ventriculum aperta habeant.

Secundum arcum majorem cum pariter tela cellulosa sit, recipit ea arteriam venamque gastroepiploicam dextram (*g*) & sinistram, & nervulos nonnullos minime grandes (*h*); denique glandulas etiam conglobatas (*i*), quæ longa serie, non valde confertæ, in principio sedent omenti.

Non rarum est eas glandulas, maxime supernas, viscida (*k*) materia, etiam scirrhusa repleri (*l*), ut etiam ventriculum arctent (*m*), & ad pylorum (*m**), & ad oesophagum (*m***).

Verum in reliquo toto ventriculo, inque utraque planitie illa, anteriori & posteriori, cellulosa tela brevis est, fibrosa, reticulata, absque adipe, ita stricta, ut aegre, neque unquam satis perfecte, a fibris carneis membranam extimam separe. Sensim autem ex laxitate illa degenerat, & ut recedit ab utrovis arcu, ita brevior fit, & strictior. Quæ brevissimæ cellulosi textus laminæ sunt, ea fede fibræ exteriores, longæque ventriculi ita manifestæ pellucet, ut aliquid tendini simile nascatur, aut ligamento. Ita ad utrumque latus pylori descripsit WINSLOW

(*d*) Superiores ventriculi NUCK *aden.* p. 6. NICHOLLS p. 20. Gastricæ VERCELLONI p. 50. seq. Conf. L. II. p. 190.

(*d**) Sibi tribuit BIANCHI *prolus.* p. 19. Negat in cardia, nec bene HEISTER T. II. p. 30.

(*e*) PETSCHÉ n. 38. & c.

(*f*) Quindecim in castore BUFFON T. VIII. p. 314. In lutra marina *Nov. Comm. Acad. Petrop.* T. II. p. 376. in phoca IB. inque manati p. 310.

(*g*) *Fascic.* II. tab. art. coeliac. II. RUYSCH l. c.

(*h*) Vide n. 22.

(*i*) Et has BIANCHUS sibi tribuit: sunt autem inferiores ventriculi NUCK p. 6. & Omentales ejus p. 7. ante eum Cl. virum jam dictæ PEYERO *merycolog.* p. 105. & J. Wilhelmo PAULI apud RIVINUM, & prius RUDBECKIO.

(*k*) HEUERMANN T. III. p. 437. tumores ovi mole.

(*l*) BESSE *append. Thes.* p. 278. 279.

(*m*) BESSE *ibid.*

(*m**) RONCALL PAROLIN. *hist. morb.* p. 171. *Comm. Acad. Bonon.* T. II. P. I. p. 157.

(*m***) BESSE *ibid.* Prope antrum pylori plexus glandularum post vomitum conspicuus MORG. *sed. caus. morb. Ep.* 30.

[*n*], Huc etiam Cl. virorum intersectiones tendineas refero, quæ sint in ventriculi fibris carneis [*o*].

Hic accuratus nexus fecit, ut fibras carneas aliquas in externam tunicam inferi dictum sit [*p*].

In hac cæterum cellulosa prima rete est truncorum [*q*] vasorum, arteriosorum, & imprimis venosorum majorum. Earum trunci majores sunt in arcu minori, & majori; rami sensim minores in utrumque planum ventriculi mutuos in occurfus tendunt [*r*].

§. VI. *Fibræ musculosæ ventriculi.*

Difficilis certe harum fibrarum est administratio, hinc parca, & sui dissimilis, in diversis scriptoribus [*a*] historia. Difficulus a membrana externa expediuntur: difficulus stratum fibrarum primum [*b*] ita tollitur, ut alterum integrum maneat. Ita vero in robustis corporibus mihi visæ sunt habere.

Fibræ validæ, quæ longitudinem oesophagi sequuntur, primum *stratum exterius* constituunt. Eæ, quando ad ventriculum pervenerunt, fere ad stellæ [*c*] modum undique in ventriculum se disjiciunt.

Aliquæ sinisteriores, alias valentes, uti nobis visæ & WEPFERO [*d*], alias tenuiores [*e*], carneæ primum, inde sensim pallidiores, per ar-

(*n*) N. 61. & HELVETIUS *Mém. de l'Acad.* 1719. p. 337. t. 22. f. 1. FF. In equo BERTIN. *Mém. de* 1746. p. 30. 31. 32. t. 1. f. 2. qui duo alia addit ligamenta.

(*o*) DISDIER *Splanchnol.* T. I. p. 136. WINSLOW n. 57. LIEUTAUD p. 267.

(*p*) PEYER *mercol.* p. 114. BERTIN. l. c. p. 36.

(*q*) FANTON. *diff. anat.* p. 87. DUVERNOI *Comm. Acad. Petrop.* T. VII.

(*r*) Conf. DUVERNOY l. c. p. 313. subobscuræ: conf. etiam RUYSCH. l. c. EUSTACH. tab. 10. f. 2.

(*a*) WILLISSIANA descriptio tota a nostris differt; accedit maxime WINSLOWIANA. Duæ descriptiones fibrarum ventriculi humani nuper prodierunt, Cl. Viri *Josephi Exup. BERTINI*, in *Mém. de l'Acad.* ann. 1761. & Cl. LEVELING in *disp. de pyloro*, Argentinae defensa. Prior ille vir Cl. a me dissentit, quod circulos sacci caeci primo strato fibrarum a longitudine Oesophagi descendendum tribuat, caetera & ipse & Cl. LEVELING fere similia nostrorum habent, & tria strata BERTINUS.

Ligamenta pylori distinguit tamen Cl. LEVELING, quod fibræ sint tendineæ, commistæ ex filamentis tunicae externae adnatis ad tunicam muscularem, & adcretæ lineæ albæ, quæ est pylori vestigium, indeque super duodenum continuatæ p. 7. 6. Res ipsa eadem est.

(*b*) Rectis externas ab his nostris diversas habent Cl. viri WILLIS tab. 2. WEPFER *cicut.* p. 121. FALLOP. p. 162. b.

(*c*) Recte BERTIN. p. 32. & tab. 4. a. b. c. d. breviores tamen: Habet & GALEACIUS *Comm. Bonom.* l. c. DUVERNEY *posthum.* T. II. p. 180.

(*d*) L. c.

(*e*) Tenues HELVET. t. 22. f. 1. ab E ad F. Tenuis MORGENBESSER *vomit.* p. 10.

cum minorem (*f*) versus pylorum tendunt, proprio ibi sed ludicro nomine nuper adpellatæ (*g*). Inter eas, quæ mediæ sunt, eæ in pylorum excurrunt (*h*), inque ipsum duodenum, & paulatim in eo intestino evanescent, Numerus earum minor est. Hæ imprimis pylorum ad oesophagum adducere aptæ natæ sunt, ut ventriculus replicetur magis, & pylorus adscendat, cibique exitus hactenus fit difficilior.

Pleræque intermedio loco inter oesophagum & pylorum usque descendunt (*i*) de arcu minori, seque inter transversas adscendunt & evanescent, & ipsæ in longas illas degenerant.

Aliæ demum fibræ inter oesophageas sinistrorsum (*k*) incedunt, inque saccum ventriculi cæcum, & longitudinem ventriculi relegunt.

Sequitur stratum *transversum* ventriculi, fibræ nempe, quæ ambitum ejus sacci ita ambeunt, ut circulos absolvant, quales quidem fibræ carneæ circulos faciunt, plures nempe in lineam anularem conjunctæ, ut tamen subinde divergant, interque sodales suis finibus (*l*) se abscondant.

Harum fibrarum primæ ambeunt saccum cæcum (*m*) ventriculi sinistrum, circulis semper majoribus, ut sunt dexteriores, & porro universum ventriculum (*n*), inque ipsum duodenum continuantur, strictiores in arcu minori, inde versus majorem laxatæ. Anuli etiam plerique obliqui (*o*) sunt, & se leniter interfecant. Subjacent prioribus interiores, & utique ventriculum arctant. Eadem in pyloro ventriculum adstrictæ claudunt; & eadem, ut repetere erit necesse, robustum anulum in sede valvulæ pylori efficiunt (*p*).

Denique intimæ fibræ ventriculi (*q*) sunt ex fibris oesophagi circularibus. Circulum integrum absolvunt, ad sinistra oesophagi, arcu versus

(*f*) Habet GALEACIUS *Comm. Bonom.* T. II. P. 2. p. 240. WEPFER *cicut. aquor.* p. 121. *Planæ externe* WINSLOW n. 25. DUVERNEY T. II. p. 181. Aliquot fibræ FALLOP. p. 162.

(*g*) *Cravate de Suisse.*

(*h*) Valde breves b. c. BERTIN. T. 4.

(*i*) BERTIN. p. 34. GALEAC. p. 240. 241. Obliquæ FALLOP. p. 162. WEPFER p. 121. GARENGEOTI icon est ex HELVETIO, *splanchnolog.* Tom. 1. tab. 8. p. 243.

(*k*) BERTIN. p. 34.

(*l*) L. XI p. 410. 411.

(*m*) HELVET. f. 1. 2. C. C. C. p. 338. WINSLOW n. 59. BERTIN. p. 34. 35. 36 (sed a numerat primis & tertiis), DUVERNEY *posth* T. II. p. 181.

(*n*) HELVET. f. 1. G. G. p. 338. WEPFER p. 121. BERTIN. p. 36. t. 4. i. t. 5. c. d. GALEAC. p. 241.

(*o*) HELVET. l. c. & p. 338. BERTIN. *Spirales facit* SANTORINUS n. 166. & olim FALLOPIUS p. 162.

(*p*) GALEACIUS p. 241. Conf. WEPFER p. 122.

(*q*) HELVET. D. f. 2. B. B. *Troisième* BERTIN. p. 37. DUVERNEY T. II. p. 181. Interior series longitudinalium GALEAC. p. 240.

lienem converſo (*r*), dextrorſum aliqua pars obſoleſcit. Poſſis etiam pro duobus faſciculis habere (*s*).

Inde dextrorſum, ſed ad utrumque latus oſophagi, ſe conjiciunt (*t*) inque planitiem utramque ventriculi, ſecundum ejus longitudinem, productæ, cis pylorum demum deſinunt. Hæ tertium ſtratum ventriculi conſtituunt, & videntur & claudere poſſe oſophagum, maxime quando pylorus per ſuas vires circulares clauſus eſt, & morari cibos, dum eas ſiniſtrorſum reducant iis adjuvantibus, quas modo diximus (*u*).

Ligamenta pylori ſunt duæ lineæ albæ (*w*) inter utrumque arcum, per media duo plana decurrentes, in quibus fibræ, longitudinem ventriculi ſequentes, cum tunica extima coaleſcunt.

Et ventriculi, & urinariæ veſicæ, & felleæ demum, fibræ ſunt ex genere ramoſo, reticulato, quæ variis & obliquis ſub angulis ſe ſecant; & in ſe mutuo inhærent, atque inoſculantur (*x*),

Quare intermediæ inter eos faſciculos areolæ ſola a nervea membrana robur ſuum habent & ab extima; & in ſaccos cæcos non difficillime deprimuntur, etiam in ventriculo (*y*). Ob eam etiam rem aerem in flatum muſculoſa tunica non retinet, quando extimæ præſidium ablatum eſt.

§. VII. *Ventriculi animalium fibræ.*

Quadrupedibus carnivoris fibræ earum ſunt analogæ, quas ex homine deſcripſimus, in equo valde ſimiles (*a*) plerumque robuſtiores (*b*), in nonnullis animalibus tamen debiles, ut in marte, & in muſtela (*c*), in animale boreali *Vielfras*, & in ſciuro (*d*).

(*r*) Carnoſæ fibræ FALLOP. p. 162. b. Sphincter Oſophagi LIEUTAUD p. 267. DUVERNEY. l. c. p. 184.

(*s*) *Deux plans* WINSLOW n. 60.

(*t*) Unum faſciculum habet HELVETIUS ſub D. f. 1. add. p. 337. BERTIN. f. c. t. 6. Habet WINSLOW n. 60.

(*u*) p. 127.

(*w*) HELVETIUS p. 337. t. 22. f. 1. inter E. & F. BERTIN. p. 31. 32. WINSLOW n. 61.

(*x*) HELVET. p. 338. WINSLOW n. 58. BERTIN. p. 36.

(*y*) Videtur FANTON. *Epiſt.* II. ad MANGET.

(*a*) BERTIN p. 24. SCHURIC *chylolog.* p. 29.

(*b*) In cane WEPFER p. 207. in porco IDEM : & des NOUES. p. 110.

(*c*) GREW p. 1.

(*d*) IDEM. p. 24.

Ruminantibus validæ sunt, quæ perpetuum & naturalem vomitum solæ, absque auxilio muscutorum abdominis, nimis debiliū, exercent (e).

Avium granivorarum musculos describere visum est, quod earum exemplum in physiologiam humanam sit introductum.

Duo sunt musculi, etsi possunt videri quatuor esse (f): radiatus uterque & connexus in utroque centro tendineo (g) ventriculi, quæ centra utrique musculo communes sunt. Eorum alterum est in superficie anteriori (h), in posteriori alterum (i).

Uterque musculus durus est & pene absque cellulositate, neque ullus ejus roboris musculus, ideo strictis stratis compactus, in homine invenitur. Superior alter sphincter est (k) oesophagi, quem amplectitur (l).

Alter musculus *duodenalis* (m), hinc sulco a majori distinguitur, inde cum eo confunditur: duodeno propior idem, superne brevior altero, inferne longior.

Uterque ventriculi cavum comprimit, quod exiguum est, ovatum, diametro vix æquante musculi crassitiem.

Interna crusta ventriculi, quæ in homine villosa, hic cartilaginea (n) est, & maxima ejus pars plicata (o).

Cæterum etiam in minutis animalibus, inque insectis, fibræ ventriculi transversæ robore superant: in ephemero (p), eruca, (q) bombyce (r), ape (s), scarabæo nasicorni (t), cochlea (u).

(e) Conf. PEYER *Merycol.* ic. 2. 3. 5. 7. &c.

(f) Pro quatuor musculis numerant PEYER *de ventric. gallin.* p. 68. DUVERNEY *posthum.* II. p. 446. PERRAULT *Eff.* T. III. p. 201. t. 2. f. 1. Sed musculi ab eo viro A. & D. dicti continuantur cum B. & C. Sex facit GREW in *Gallo* p. 34. 40. Sed ejus viri musculi laterales sunt cellulosæ telæ cum vasculis mixtæ.

(g) COLLINS *tab.* 19. PERRAULT t. 12. f. 1 GREW p. 34. *Obs. sur le poulet* n. 270.

(h) Ibid. *obs.* 267. 268. 269.

(i) Ibid.

(k) Ibid. n. 269. 270. Est A. D. PEYERI.

(l) Etiam PEYER p. 70.

(m) *Obs. sur le poulet* n. 269 PERRAULT B. C.

(n) PEYER p. 72. REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 296. 297. 298. *Compar. anatom.* p. 95. In grege COITER p. 132. In aquila ALDROVANDUS T. I. L. 12. p. 799. In loligine LISTER *Conchyl. bivalv.* p. XXXV.

(o) GREW *tab.* 29. PERRAULT f. 2.

(p) SWAMMERDAM t. 15. f. 5.

(q) p. 275.

(r) MALPIGH. p. 17. *tab.* 5. f. 1.

(s) REAUMUR *Mém. pour servir à l'hist. des Insect.* T. V. p. 445.

(t) SWAMMERDAM *bibl.* p. 313.

(u) HARDER *exam. cochl.*

Aliquæ rectæ intercedunt (*w*), quæ in eruca ligamentum referunt (*x*).
Robusti vero, & fere ex avium similitudine, sunt ventriculi cochleæ (*y*),
& buccini (*z*), & locustæ (*z**).

§. VIII *Cellulosa secunda* (*a*).

Multo hæc priori laxior, per universum ventriculum facile continuanda, flatu per vulnuscum carneæ tunicæ inflictum optime ostenditur, bombycniæ, albissima, laminis facta & fibris. Ampliores sunt areolæ, & cellulosa tela crassior, quam in intestinis.

Per eam tunicam pleraque vasa (*b*) ventriculi sparguntur. Truncos solos prior cellulosa habet, carneæ minutissimos furculos excipit; in ista vero numerosissimi, & inter maximos & minimos medii, rami arteriarum & venarum suum faciunt rete.

In eandem & in intimam exhalat vapor, qui in morbis frequenter cum cellulosis laminis confervet, & viscidam primo, deinde duram in naturam, callosam (*c*) & cartilagineam abit, quæ universum ventriculum crassum (*d*), pylorum sæpe perangustum (*e*) facit. Etiam

(*w*) In bombyce MALPIGH. l. c.

(*x*) SWAMMERDAM p. 575.

(*y*) LISTER buccin. Exerc. II. p. 9.

(*z*) Ibid p. 55.

(*z**) RÖSEL von Heuschrecken p. 59.

(*a*) Habet WINSLOW n. 62. DUVERNOI l. c. n. 7. FANTON. p. 84. HEISTER not. 9* NICHOLLS p. 20. & olim BLASIIUS in porco. Nervea alia, ope siphonis ostensa J. WILH. PAULI progr. ann. 1721.

(*b*) FANTON. diff. anat. ed. II. p. 87. WILLIS pharmac. rat. tab. 4. f. 2. p. 23. DUVERNEY l. c. n. 8. WEPFER cicut. p. 124. Rami nerveæ RUYSCH Thef. II. n. 3. n. 14. Thef. VIII. n. 33.

(*c*) BOSCUS facult. anat. p. 21. CHIFFLET obs. 27. ROEDER in progr. HASENOEHL p. 60. LANGGUTH de tabe sicca lethali SCHMIEDEL in diff. de pericard. Commun. Boron. T. II. P. I. p. 157. Phil. transf. n. 351. LEMERY Hist. 1702. n. 1.

(*d*) Conf. BARTHOLIN. Cent. III. Hist. 6. BLAS obs. 9. P. IV. Journ. de Méd. 1759 nov. CHIFFLET obs. p. 27. SCHMIEDEL de pericard. p. 27. 28. BARRERE obs. p. 153. seq. p. 213. 214. LOESEKE obs. p. 36. & STORCK ann. med. I. p. 250. A spiritu vini vir. ILL. JANUS PLANCUS Acad. conject. p. CI. Tunicarum ventriculi incrassatarum exempla, etiam habent BADER obs. 23. SINOPUS parerg. p. 262 &c.

(*e*) BARRERE nouv. obs. anat. p. 153. 157. FANTON. p. 14. PETIT apud LATHERMANN Sebacea materie infarctus SCHNEIDERUS p. 321. Callosus BARTHOLIN Cent. IV. Hist. 47. PLANCUS conject. p. 21. Prædurus MOBG. Sect. II. p. 426. Induratus membranis crassioribus confusis, exiguum iter relinquentibus Journ. med. 1757. M. Mart. Impedimentum scirrhum. pylorum ambeuns HAEN rat. medend. VI. p. 13. 14. 272. Pylorus & media pars pylori cartilaginea fere ossea Phil. transf. n. 353. Durus & angustus pylorus DIONIS. p. 185.

osseæ (f) duritas in ventriculo viva est. In eadem cellulosa ventriculi tela adipis glebularum vidi (g).

§. IX. *Nervea tunica* (a).

Hæc vera ventriculi, ut intestinorum basis est, cuti faciei, oris, faucium & oesophagi continua, alba pariter, firma, crassior, quam in intestinis. Ejus superficies externa æquabilis, cellulosa, quam modo diximus, sibi adnatam recipit. Interna in exigua juga producitur, quæ sunt nuclei & quasi fundamenta plicarum (b), in quas villosa tunica repetitur.

Vasa propria exigua habet, si recesseris a vasis cellulosa tunica, quam diximus.

Impulso per vulnusculum aere dissolvitur, inque spongiosum, bombicinumque, albissimum textum abit, qualis est in reliquis intestinis. In gelatinam per morbum conversam vidit Cl. RICHERTS (c).

§. X. *Cellulosa tertia* (a).

Hæc inter nerveam & villosam sequitur ultima cellulosa tela, lata & manifesta, ut non difficulter præpares, adacto per vulnusculum tunica villosa flatu, a quo artificio in spumæ speciem intumescit: Pinguedinem aliquando recipit (b). Eadem magnam partem plicarum efficit, nerveam inter & villosam sumta.

Per eam cellulosa telam ultimum vasculosum rete dividitur, & minutiorum ramorum, & una numerosiorum a quibus porro brevissimi ramuli per villosam penetrant. Idem a rete secundo per nerveam perforatam trunculis suis advenerunt.

Et hæc potissimum cellulosa tertia sedes est præcipua inflammationis,

mort subit. p. 125. Scirrhusus PERRAULT *de la seve* p. 227. Pene clausus tuberculis scirrholis WILLIS *pharm. ration.* S. II. c. 1. DUVERN. II. p. 573 & gypso ZOD GALL. ann. 1. Febr. In febre scirrhus, & glandulosa caro adnata *Eff. of a Societ. at Edimb.* I. n. 14.

(f) PETIT apud LATHERMANN, etiam a spiritus vini abusu.

(g) Ita DUVERNOI l. c. p. 214. *Phil. transf.* l. c.

(a) WINSLOW n. 63. PAULI l. c.

(b) WINSLOW n. 66.

(c) *Obs.* 3.

(a) *Tissu fort lache* WINSLOW n. 64. Filamenta, quæ fibrosam nerveæ connectunt. WEPFER *cicut* p. 122.

(b) Conf. OELHAFEN *part. abdom. content.* de corpusculis pinguibus internæ superficiei ventriculi adnatæ.

quæ in ventriculo, per venena (*c*), etiam per emetica pharmaca (*d*), morbosque inflammatorios (*e*) frequens reperitur. In eo casu fere sanguis in cellulosa spatiosa effusus reperitur, ut in canibus a venenis variis enectis (*f*), inque homine post repetita medicamenta emetica (*g*) pereunte vidi. In cane veros grandes que grumos cruoris ab usu coboldi in cellulosa sparsa effusos reperi, tum in fele ab arsenico, in tertia semper cellulosa, & in homine Cl. CURZII (*g*^{*}) amicus.

Ventriculum in hac lue inflammatum reperis. & nuper tristes nuntii ad Senatum curandæ valetudini præpositum venerunt, in morbo boum, qui universam Europam fere armentis nudavit, nobis minus contagiosus est, ut fere unum stabulum, evacuet, ventriculum tertium inflammatum fuisse. Ita in plurimis scriptis confirmatur, etiam in *Verhandel der Holland. maatschapp* T. VI & VII.

Sed etiam in peste (*a*), in morbis malignis (*b*), dysenteria (*c*), in colica (*d*) in cholera (*e*), in podagra retroversa (*f*): denique a venenis acribus, mercurio sublimato (*g*) arsenico (*h*), coboldo (*i*), auripigmento (*k*), cupro male stannato (*l*) nuce vomica (*m*), cicuta (*n*),

(*c*) HASENEST *Richter* T. IV. p. 47. 48. VALCARENGHI *ad* EBEN. BITAR. p. 104. 105. A vomitu in cane *Phil. transf.* n. 335. In cane etiam SPROEGEL n. 44 46. A mercurio præcipitato HILLEFELD p. 43. 44. A semine staphilagriæ p. 21. A scylla p. 15. 17. a nuce vomica p. 45. 46. maculis rubris variis. A coboldo IDEM p. 63. Ab oleo anisi p. 38. 39. A cocculis indis p. 34. 37. A viridi æris atroruber p. 48. A saccharo saturni p. 52.

(*d*) Ipse vidi, & habet *Hist. de l'Acad.* 1713. p. 130. & Cl. HILLEFELD p. 51. a Gummi gutta p. 28.

(*e*) In cholera HEINRICI *de cholera*, in dysenteria *Phil. transf.* Vol. II. P. I. n. 12. In febre maligna ibid. *Journ. med.* 1762. M. April. HOFMANN *de remed. benign. nox.* Post febrem intermittendem MORGAGN. *sed. & caus.* II. *Epist.* 30. Al funesta siti POZZI *Commerc. Epist.* p. 77. In variolis STUBBE *phlebot.* p. 252. KÆMPF *infaert ventric.* *Phil. transf.* 1755. p. 56. in morbo bubulo SALCHOW: in epilepsia VALENTIN. *Epist.* IX. n. 216.

(*f*) *Opusc. anat.* T. I. *de part. sent.* & irrit. *Exp.* 328.

(*g*) *Opusc. pathol. obs.* 14.

(*g*^{*}) *Littera* al S. CURZIO. p. 24.

(*a*) *Traité de la peste* p. 400.

(*b*) *Act. Budissin.* p. 412. 413. *Journ. med.* ann. 1762. m. Avril & olim C. GEMMA.

(*c*) MONRO *diseat of hospit.* p. 64.

(*d*) CECCHI *pref.* p. LVI ad opuscula *Phil. Transf.* VII. P. I. n. 12.

(*e*) HEINRICI *de cholera*.

(*f*) HOFMANN *med. imprud. multorum morborum causa.*

(*g*) WEPFER *cicut.* p. 301. 302. 375. MEAD *pois.* p. 95.

(*h*) Nimis frequentia exempla nolo citare. Nullum, puto, ab arsenico adsumto hominem periisse, quin ventriculus inflammatus fuerit.

(*i*) ALBERTI *med. leg.* I. app. cas. 28.

(*k*) VALENTIN. *Pandect.* P. I. Sec. 3. c. 26.

(*l*) Ignatius VARI in proprio lib.

(*m*) Canes HILLEFELD 4. 5.

(*n*) WEPFER p. 312.

colchico (o), scilla (p), femine laureolæ (q), drastice medicamentis (r), aut emeticis (s) ventriculus inflammatur.

§. XI. *Tunica villosa* (a)

Epidermidi etiam manifesto continua (b) & ipsa decessit & (c) reparata est, & in animalibus variis, avibus (d), ratto moschato (e), cancris (f), infectis (g); etiam in homine, siquidem post eam ejectam multi convalescerunt (h).

Alba est, flava (h*), rubra simplex, mollis, quando sola habetur. Perinde ut cutem vulgaris epidermis, ita hæc villosa nerveam oblini, ne perpetuo doleat. Hinc ventriculus etiam pulverem adamantum absque malo tulit (i). Hinc ab ea detrita dysenterici dolores (k) & cardialgici (l); & appetitus prostratus [m]; & diarrhoea [n]; & ciborum intolerantia [o], & vomitus perpetuus (p), & cruentus ventriculus (q) & sanguinis per inferiora secessus (r). Visus est in ventriculum sanguis effundi ab inflammatione ex

(o) STÖRCK de colchico p. 21.

(p) HILLEFELD p. 15.

(q) LANG *remed. Brunsvic.* p. 173.

(r) *Poudre d'Ailhaud scamoneatum pharmacum. Journ. med. ann. 1763. m. Decemb. SCHAFONSKY convuls. puerp.*

(s) TESPANEGGER p. 280. A gilla HEERS *Spadaupn.*

(a) *Crustra villosa WILLIS p. 12. 13. Veloutee WINSLOW n. 65. Panniculus nervos operiens MASSA p. 25.*

(b) NICHOLLS p. 20. Cl. C. a BERGEN *pent. obs. MONRO Edimb. Eff. III. p. 118. Epithelium vocat RUYSCHUS Thef. VII. n. 40.*

(c) In hectico *Journ. de medec. 1761. M. Mars. Ab emetico VIRIDET du bon chile p. 87. 88. 89. ALBERTI med. leg. T. I. P. 2. 441. Ex dysenteria ARET diut. II. p. 61. PICCOLI. pralect. p. 105. vesicatorio devorato BARTHOL. Cent. III Hist. 16. ut videtur.*

(d) Suspiciatur REAUMUR *Mém. de 1752. p. 297. Cuticularem esse MONRO compar. anat. p. 95. Tota ingluvies renata in gallina HARDER opiar. p. 70.*

(e) Renovatur *Mém. de 1725. p. 332. 333.*

(f) Totum ventriculorum novari ROLFINK *de calcul. p. 31. &c.*

(g) SWAMMERDAM p. 686. in nympha asili.

(h) VIRIDET & RETARUS BARTHOL. &c.

(h*) Ad pylorum DUVERNEY p. 535. caeterum rubella.

(i) KRUGER *Pathol. p. 202.*

(k) ARETÆUS PICCOLHOMIN.

(l) BLAS *obs. 6. P. V. BARTHOL. l. c.*

(m) VIRIDET p. 365.

(n) *Journ. de medec. l. c.*

(o) VATER *deglut. imped. caus. abdit.*

(p) MANGET *bibl. T. I. p. 8. a veneno.*

(q) VATER.

(r) HOFMANN *remed. benign. nov.*

frigido potu nata (*s*) ; & a tartaro emetico (*t*) : cum ea crusta villosa ab emeticis (*u*) destruat.

In nonnullis animalibus crassa est; dura, pene cartilaginea, ut in avibus granivoris (*w*), ingluvie aquilæ (*x*), etiam in loligine (*y*).

§. XII. *Plicæ valvula.*

Ut minutius hanc membranam prosequamur, primo tenere oportet, eam, & in homine, & in plerisque animalibus, amplam esse, & natali ratione ampliorem (*a*), quam eæ membranæ, quibus extus circumpositis interior coercetur.

Hæc autem amplitudo infumitur in plicas & juga eminentia, quæ in cavum ventriculi eminent, & quorum præcipua pars villosa est membrana, quæ cellulosa tertiam, & nerveæ quasi radicem continet.

Eæ plicæ in variis animalibus varie se habent (*b*). Et primum in homine plicæ oesophagi, quæ ejus longitudinem sequuntur, in ventriculum aliquousque producuntur, in omnem ambitum, ad stellæ aliquam similitudinem (*c*). Valvula in ea sede nulla est, neque in homine, neque in equo (*d*), neque in bove (*e*), etsi nonnulla animalia plicam ibi habent (*f*): sed plicæ, ut in ano, tamen id ostium arctant.

(*s*) *Lett. la S.* CURZIO p. 23. 24.

(*t*) ALBERTI *Med. leg.* T. I. P. 2. p. 2. 546.

(*u*) p. 132.

(*w*) ALDROV. *ornitholog.* p. 116.

(*x*) LISTER *conchyl. bivalv. audar.* p. XXXV.

(*a*) Longitudinem tunicæ villosæ superiorem uncis 13. inferiorem uncis 39 æstimavit WEPFER *cicut.* p. 121. 122. Longitudinem membranæ carneæ superiorem unciarum 12. inferiorem 24 IDEM.

(*b*) Fere in omnibus animalibus ejusmodi plicæ reperiuntur, ut in Elephanto PARIS. cuniculo GREW p. 10. mure SCHRADER p. 22. Sue GREW p. 9 14. Apro mexicano COWPER *Phil. transact.* n. 153. In leone BARTHOLIN *Cent. IV. Hist.* 100. in tigre *Couguar Hist. natur. Tom. IX.* in urso *hist. natur. T. VIII. t. 34. f. 1.* PARIS. in cane MONRO *comp. anat.* p. 14. In tursione TYSON p. 21 COLL. p. 276. in phoca PARIS. In serpentibus CHARAS *vip.* p. 44. in crocodilo BORR *herm.* p. 276. in piscibus ut xiphia HARTMANN add GREW p. 32. &c. REDI *anim.* p. 116. In rana JACOBÆUS p. 83. in testudine PARIS. etiam in gryllotalpa PEYER *merycol.* p. 8. & locusta ROESEL *von Heuschrecken* p. 59. In ruminantibus tamen profundissimæ sunt plicæ & folia, ut in ventriculo PERRAULT *hist. T. III. f. 4.* PEYER *meryc. ic.* 8. 9. 10. BUFFON *Tom. V. tab.* 18. p. 490. VIEUSSENS *liq.* p. 273. & in camelo *Com. Pet. cit. inque buanaco* FEUILLEE. Etiam in quarto ventriculo PEYER. PERRAULT f. 5. VIEUSSENS *liq.* p. 279.

(*c*) VESAL. T. V. f. 16. h. WINSLOW n. 67. BERTIN. l. c. *tab.* 17. RUYSCH *Thef.* VIII. n. 62. BOEHMER *de polyphago* p. 9.

(*d*) BERTIN. l. c. p. 44.

(*e*) SAUVAGES *Mém. sur le mal des bœufs* p. 20.

(*f*) Leporis BUFFON l. c. porci BUFFON T. V. *tab.* 18. f. 2. Angustissimus in equo BERTIN. p. 48.

Deinde per universum ventriculum amplæ rugæ plicæque secundum fere longitudinem (*g*), tamen varie inplexæ, a cæco facco versus pylorum producuntur, ea sede magis conspicuæ.

Denique ventriculi membranæ interiores omnes, carneæ interior & circulare stratum, cellulosa secunda, nervea, & cellulosa tertia, & villosa (*h*) in duodenum ita producuntur, ut nascatur anuli tumidi, molles, lubrici, crassique, & plicati effigies (*i*), quam laxius intestinum duodenum circumpositum amplectitur.

Is annulus (*k*) utique etiam in vivo homine ostium primi intestini artius reddit, & aliquantum resistit iis, quæ imprimis duriora & crassiora ex intestino in ventriculum repellerentur, nisi is obex impediret. Hinc calculi vesiculæ felleæ vomitu non frequenter rejiciuntur, nisi minimi, per secessum vero etiam vegrandes.

In sicco ventriculo hic annulus in speciem valvulæ, aut diaphragmatis abit, qualia sunt in tubis telescopicis (*m*). Dimidiatus visus est (*m*^{*}).

In plerisque certe animalibus pylorus angustus est, angustissimus in ruminantibus (*n*), & in tursione (*o*), in porco (*p*), in urso (*q*), ut neque aerem transmittat, etiam in rana piscatrice (*r*), in hydrocantharo (*s*).

(*g*) WILLIS *tab.* 4. f. 1. RUYSCH *Thef. H. tab.* 5. f. 2. BOEHMER p. 9. de FIEU p. 435. Plicæ ventriculi, secundum longitudinem versus pylorum extensæ, LEVELING f. 1.

(*h*) WINSLOW n. 66.

(*i*) Conf. AMSTELODAMENSES in porco add. WINSLOW n. 70.

(*k*) *Comm. Bonon.* VESAL. WINSLOW n. 71.

(*l*) Vulgo *valvula pylori*. Habet jam VESALIUS *rad. chin.* p. 192 193. & in *Exam. Fallop.* p. 116 & in *ic. cit. k & fabr. corp. hum.* p. 607. PARRUS II. c. 14. VID. t. 63. f. 3. ROUSSET *hysterot.* p. 238. COITER p. 132. RIOLAN. *Enchirid.* p. 118. SMETIUS *miscell.* L. X. WEPFER *cicut.* p. 122. FANTON. *Diff. anat.* p. 85. 86. WINSL. n. 69. 70. 71. DUVERNEY II. p. 182. RUYSCH *musf. rar.* p. 152. *Comm. Bonon.* T. II. f. 2. p. 241. Exstat etiam in vitulo apud *Amstelod.* p. 13. in rupicapra HARDER *apiar.* p. 51. PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. append.* In porco apud BLAS *anat. porc.* p. 65. & paulo aliter apud amicos *Amstelod.* p. 13. In sciuro FANTON. p. 162. In talpa lineam separatoriam habet RICHIA *Constit. Epid.* n. III. p. 96. In lepore valvula est *hist. natur.* T. VI. t. 40. f. 2. PEYER *obsf.* 18. in hystrice SEVERIN. *Zootom.* p. 320. in cuniculo brasiliiano MURALT p. 64. in urso *hist. natur.* T. VIII. *tab.* 34. f. 1. TREW. *Comm.* 1734. n. 38. in fele PEYER *obsf.* p. 57. in cane BLAS *anat. can.* c. 18. Sed negat SCHRADERUS *digest. anim. carniv.* p. 16. eam plicam in cane valvulæ nomen mereri.

(*m*) HEISTER *fig.* 6. & fere BOURDON t. 2. f. Bonam iconem IDEM dedit valvulæ pylori, tunicæ nerveæ laxatæ, quæ torum orditur p. 13. f. 1. & fibrarum carnearum in torum collectarum f. 1 2.

(*m*^{*}) MORGAGN. *sed. & caus. morb.* p. 208.

(*n*) VIEUSSSENS *tr. des Liq.* p. 274. PEYER *meryc.* p. 145.

(*o*) TYSON in ejus animalis anatome p. 21.

(*p*) BLAS l. c.

(*q*) SCHRADER. *de anim. carniv.* p. 16.

(*r*) CHARLETON *mantiss.* p. 19.

(*s*) *Journ. des Sav.* 1696. p. 478.

Neque rarum est, proprium quasi sphincterem pylorum ambire in porco (*t*), vitulo (*u*), cuniculo brasiliano (*w*), fele (*x*), demum in homine (*y*).

Si nunc requiras, num ideo pylorus in naturali fabrica conniveat, sitque clausus, non facillimum est respondere. De convulsiva occlusionem non quæro, cuius certa sint exempla (*z*). In homine vero sano citum iter lactis in nutricibus, tum aquarum mineralium; phænomena velociter de vulnere intestini exeuntis (*a*) cibi, aut argenti vivi (*b*), bilis regurgitatio (*c*), ipsa naturalis extra irritationem remissio sphincterum, quos voluntas non regit, faciunt ut credam, sola dura, integra, & solida, ab angustiiis pylori repudiari, uti vidi in fele massam lacteam coactam a pyloro refutatam fuisse; fluidis vero id iter semper patere. Video equidem contra nos produci posse, aliquando, etiam aliquot a pastu horis, lac in ventriculo solo fuisse, quod ipse vidi: & in submersis animalibus aquam in intestina non transiisse (*d*). Verum in istis quidem brevissima, post submersionem, vita fuit (*e*); in illis lac crudum in ventriculo erat, cum per intestina cum materia reliqua commistum [*f*] esset.

Rugæ omnes cæterum inflando (*g*) evanescunt, dum membrana musculosa & extima ab impulso aere in eandem amplitudinem distenduntur, quæ est villosæ nunc explicatæ. Etiam in vivo homine per morbos delentur eadem, quando ventriculus super modum distenditur (*h*).

(*t*) AMSTELOD. colleg. priv. observ. p. 13. 27

(*u*) p. 17.

(*w*) MURALT p. 122.

(*x*) PEYER *obs.* p. 57.

(*y*) MORGAGN. *Abv.* III. p. 6.

(*z*) *Seç.* IV. Pylorus etiam a morte calamo non amplior de HAEN *rat. med.* VI. p. 272.

Ventriculus humanus studiis pulte repletus, clausam habuit valvulam pylori, ut, ob eminentem torum, nihil in duodenum transiret, & stricturam inmissus digitus perciperet. Deinde cum vir. Cl. ventriculum undique premeret, & una pylorum versus cardiam adtraheret, aeremque inflaret, erant duæ quasi valvulæ, nempe latera pylori: hiantia tamen, ut aer viam inveniret LEVELING.

(*a*) Ibid.

(*b*) *Seç.* IH.

(*c*) *Seç.* IV.

(*d*) EVERTSE *Disp. de submers.*

(*e*) L. VIII. p. 267. 268. &c.

(*f*) Vide suo loco.

(*g*) GLISSON p. 137.

(*h*) *Lett. al* CURZIO l. c. BONNET *Sepulchr.* L. 3. *Seç.* 6. *obs.* 8.

§. XIII. *Rugæ minores, villi, papillæ.*

In his rugis, multo minores aliæ vermiculares rugæ (*a*), reticulatæ quasi, utcunque subrotundæ tetragonæ, accurate conspiciendo adparent (*b*); leves eadem & facile evanescentes, & obscuriores quam in ductibus biliaris. Minimum & subtile rudimentum esse videtur reticulatæ fabricæ, quæ pulcherrima est in ruminantium (*c*) secundo ventriculo.

Denique & in homine, & potius evidentius in aliis animalibus, fila, five villi (*d*) adparent, in ventriculi caveam producti, breviores tamen quam in intestinis (*e*). In avibus totus bulbus, ipsaque glandularum convexa superficies, conspicuis villis obsitæ sunt.

Eadem ubique villorum natura videtur, ut nempe per eos & arteriæ & venæ in caveam ventriculi patulis ostioliis apèriantur.

Nam aqua (*f*), gluten piscium, argentum vivum (*g*), denique fenum (*h*), aut ceracea materies, in arterias impulsæ, hos villos, rubore suo implet, & in caveam ventriculi exsudat (*i*), ut in concava villosæ tunicæ sede cylindri ceracæ in cavum ventriculi prominentes distinguantur (*k*). Similia fiunt, si per venas eos humores impuleris (*l*), utrumque enim experimentum sæpe feci. Et vicissim aqua in vivis animalibus invasa omenti ventriculi adtensa (*m*) venit.

(*a*) A maceratione villosam rugosam fieri, ut in lotricibus digitorum cutis C. A. v. BERSÉN l. c.

(*b*) Rate minimum in cane & bove MALPIGHIIUS dixit, in ove RUYSCH *Thef. anat.* II. p. 15. *Adv.* III. t. 2. f. 7. B. in urso PARIS in Elephanto DUVERNEY Habet in homine RUYSCH *Thef. II. Aff. III.* n. 14. t. 5. f. 3. 4. *Thef. X.* n. 142. 143. Habet DUVERNOY *Comm. Acad. petrop.* T. IV. p. 215.

(*c*) PEYER *ic.* 6. p. 125. BUFFON T. IV. t. 17. VIEUSSENS *liqueurs* p. 272. In galeario pisce rhombos sensim minores sustinentes. villos descripsit DUVERNEY l. p. 535.

(*d*) Fibras, ut in lingua, dixit FALLOPIUS *obs.* p. 161, & WEPFER *cicut.* p. 124. In sue vidit SWAMMERDAM apud PECHLIN *purg.* t. 2. f. 3. In sue, asino, & cane MALPIGH. *gland. conglob.* p. 9. In asino DUVERN. *posth.* p. 536. add. n. 525. ID. in porcello castoreo zibetho T. II. p. 489. In cervo VIRIDET *bon chyle* p. 459. In bulbo avium, inque ipsis glandulis villi sunt evidentissimi. Evidentes in Lagopode ROBERG. in *diff. de ea ave.* KLEIN *de avib.* p. 116. cum *ic* videntur de genere composito esse. In avibus etiam Cl. REAUMUR descripsit *Mém.* 1752. p. 307. tum in echino ruminantium PEYER l. c. BUFFON l. c.

(*e*) Pars in equo absque villis BERTIN p. 40.

(*f*) KAAUW *perspir.* n. 185. 562. HALES *hamastat.* p. 118. PAULI *præfat.* ad v. HORNE.

(*g*) VIEUSSENS *obs. d'anat. & de med. prat.* p. 12. 13.

(*h*) KAAUW p. 185. 562. HALES VIEUSSENS *conf.* p. 257. 258.

(*i*) RUYSCH *Thef.* VI. n. 33. KAUW.

(*k*) KAAUW n. 186. 187.

(*l*) IDEM n. 446. 617.

(*m*) KLAUNIG *nosodoch obs.* 15. KAAUW n. 489. de venis potissimum VIEUSSENS *Vasor. system.* p. 31.

Papillæ subrotundæ, nerveæ (*n*) nondum certa fide innotuerunt; in ruminantibus utique reperiuntur (*o*) ejusmodi tubercula, sed grandia & composita, ut nullo modo cum humana fabrica compares. Quas RUYSCHIVS vidit, eas credunt Cl. Viri villos venosos inanes fuisse (*o*).

§. XIV. *Glandula ventriculi.*

Avium (*a*) quidem ventriculi, & bulbus inprimis, quem diximus, evidentissimas habent glandulas ovatas, ductu suo patentes, in cavum bulbum, septemplici in gallina (*b*) ordine. Reperiuntur in gallo indico (*c*), columba (*d*), turture (*e*), otide (*f*), psittaco (*g*), struthione (*h*), casuario (*i*), cygno (*k*), mergo (*l*), fulica (*m*), corvo (*n*), scope (*o*), ave regia (*p*), ciconia (*q*), ibide (*r*), ardea (*s*), onocrotalo (*t*), corvo aquatico (*u*), falcone (*w*), vulture (*x*), aquila (*y*),

(*n*) Papillas dixit RUYSCH *Thef.* VII. n. 40. *Advers.* II. p. 26. *Advers.* III. n. 10 p. 33. seqq. &c. tum HAASE *renov. tunic. vil.* & totam tunicam papillofam IDEM RUYSCHIVS *Thef.* VIII. n. 71. Fateatur obscuriorem esse in homine, quam in ove, fabricam *Adv.* III. p. 34.

(*o*) DUVERNEY T. II. p. 436. VIEUSSENS *liq.* p. 273. In vacca barbarica PARIS III. P. II. p. 227. in tertio vitulorum ventriculo. GREW p. 27. RUYSCH *Adv.* III. t. 2. f. 7. *cur. post.* n. 37. 171. In ventriculo primo VIEUSSENS p. 272. GREW p. 17. In tertii lamini VIEUSSENS n. 273. BUFFON T. IV. t. 18. p. 490. GREW p. 18. PERRAULT *Eff.* t. 14. f. 2. 3. FEUILLEE PEYER *ic.* 8. p. 118.

(*a*) WEPFER *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. obs.* 251. DUVERNEY *posthum.* T. II. p. 446. Addit succum mucosum album fundere. Porro MALPIGH. l. c. p. 10. FANTON *diff.* p. 39. CORNEL. CONSENTIN. p. 215. PEYER p. 68. WILLOUGHBY p. 7. GREW p. 40. REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 304. Folliculos in ventriculo habet Cl. LEVELING : vesiculas sebaceas Cl. LOBSTEIN *nerv. access.* p. 41.

(*b*) FANTON. *diff. anat.* p. 108.

(*c*) PARISINI.

(*d*) *Amst. coll. priv. obs.* p. 38. COLLINS p. 256 GREW p. 35. BLAS p. 285.

(*e*) ALBIN. *de avib.* ed Gall. T. II. n. 47.

(*f*) ALDROV. II. p. 92. PARIS. *Mém.* &c. HARDER *apiar.* p. 78. *exerc.* p. 254.

(*g*) *Phil. Transf.* n. 211.

(*h*) VALISNER. I. p. 240.

(*i*) GREW p. 32.

(*k*) BORRICH *hermet. sap.* p. 251.

(*l*) COITER p. 132.

(*m*) PEYER *obs.* 46.

(*n*) PEYER *obs.* 50.

(*o*) PARIS.

(*p*) IDEM. T. III. P. 3. p. 29.

(*q*) HARDER *obs.* I. WEPFER l. c.

(*r*) PARIS.

(*s*) BLAS p. 146.

(*t*) MARSIGLI in *oper. Danub.* T. VI. p. 10. & PARIS.

(*u*) PARIS. ALDROV. L. XIX. p. 265. ALBIN. T. II. n. 81.

(*w*) MURALT *vadēm.* p. 337.

(*x*) SCHEUCHZER *Bresl. Saml.* 1726. p. 87.

(*y*) BORRICH l. c. p. 260. PARIS, MALPIGH. *gland. congl.* p. 10. ALDROV. I. p. 116. MARSIGLI. T. VI. p. 9.

ossifraga (z), noctua (a), hirundine (b), aliis aviculis (c). Sic manifestissimæ glandulæ sunt in castore (d), elephanto (e), rupicapra (f), cuniculo (g), hystrice (h), erinaceo (i), talpa (k), marsupiali (l), lutra (m), sue (n), civetta (o), cane (p), lupo (q), panthera (r), tigride (s), catopardo (t).

Etiam in serpentibus (u) reperiuntur, & in piscibus, aurata (x), xiphia (y), asello (z), lucio (a), torpedine (b): & in insectis, ut in sphondylia (c), locusta (d).

Homini (e) non perinde (f) sunt evidentes: poros (g), equidem

- (z) LEIGH. *natur. histor of Lancash.* p. 159.
 (a) MALPIGH. I. c.
 (b) GREW n. 39.
 (c) IDEM ib.
 (d) BERGER *natur. human.* p. 135. WEPFER l. c. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 52.
 (e) BILFINGER *var.* T. II. p. 194. PARIS.
 (f) HARDER p. 51.
 (g) GREW.
 (h) PARIS.
 (i) MURALT p. 265. FANTON. p. 57. In siamenfi echino TACHARD *voyag.* T. II. p. 252.
 (k) MURALT p. 538.
 (l) COWPER p. 28.
 (m) *Mém. présent.* T. II. p. 200.
 (n) BRUNNER *duoden.* p. 70. VERCELLON. PEYER *obs.* 34. MALPIGH. *Colleg. Amst.* p. 26. GREW p. 14. ASTRUC *digest.* p. 161. 162.
 (o) DU HAMEL p. 228.
 (p) GREW p. 56. BRUNNER p. 49.
 (q) PAULIN *lycolog.* p. 4. DOLARI *Epist.* IV.
 (r) PARIS. BUFFON T. IX. p. 180.
 (s) PARIS.
 (t) DUVERNOI.
 (u) BRUNNER p. 84.
 (x) PEYER *merycol.* p. 17.
 (y) SCHELHAMMER. Negat HARTMANN.
 (z) COLLINS p. 276.
 (a) *Phil. transf.* n. 162.
 (b) STENON. *Act. Hafn.* T. II. p. 224.
 (c) PEYER *merycol.* p. 6.
 (d) ROESEL *Heuschreck* p. 9.
 (e) Habet WILLIS p. 13. t. 4. f. 3. & villosam tunicam glandulosam dicit, tum in homine WEPFER p. 121. 123. RIDLEY *obs. pract.* p. 199. HARDER *obs.* XI. p. 204. 251. ASTRUC *de la digest.* p. 161. 162. HEISTER II. p. 29. KAAUW n. 120. HEUERMANN T. III. p. 467. JUSTI VESTI *Dec. obs.* I. HELVETIUS l. c. ex WINSLOW DUVERNEY II. p. 480. 481. MORGAGN. *Sed & caus. morb.* II. p. 18.
 (f) Etiam MORGAGN. *Adv.* III. p. 6. FANTON. p. 59. VERDIER. Parvas esse VIRIDET l. c. 43. Microscopio visas RIDLEY HEUERMANN.
 (g) Poros habet VIDUS *tab.* 63. f. 3. RUYSCH *Thef.* II. *tab.* 5. f. 2. *Thef.* VII. n. 10. *Thef.* X. n. 141. FANTON *diff.* p. 89. 90. VIEUSSSENS l. c. p. 82. In catopardo DUVERNEY I. Conf. VALISNER. p. 241. in struthione.

plerumque reperi, passim in ventriculo obvios, circa pylorum etiam frequentiores (*b*), per quos mucosi aliquid in ventriculum potest exprimi (*i*). Ductus excretorios, & ostia, & succum expressum alii viderunt (*k*). Semel tantum aut bis glandulas ipsas vidi, de cryptarum genere, simplices (*l*) rotundas, lenticulares, membranaceas, cavas, brevi ductu per villosam productas, sedentes in cellulosa tertia (*m*). Non sunt vasorum penicilli (*n*) neque rugæ (*o*), neque rejici debent (*p*), etsi non semper possunt ostendi (*q*).

Has glandulas in ingentes glandium quernarum quasi calyces, tres lineas latos, hemisphæricos (*r*) duros, grandi foramine in ventriculo cavo patulos, vidi degenerasse (*s*).

§. X V. *Ventriculi succus.*

In hujus succi historia accurate versandum est, cum in eo ipso causa coctionis ciborum primaria, seculo potissimum præterito, vulgo quæsitæ fuerit (*a*).

Difficilis res est, cum ventriculus raro purus sit, & etiam tunc spontanea degeneratio hujus succi ejus naturam corrumpere possit.

Et primum acida corruptio ventriculo valde familiaris est, quam lac (*b*),

(*b*) MORGAGN. SANTORIN. p. 165. WINSLOW n. 63. VERDIER p. 60. HARDER, BEHRENS *Bresl. Saml.* 1723. m. Jun. Paucas ibi WEPFERUS, alieno a nostris modo.

(*i*) WEPFER p. 123. VESTI.

(*k*) DUVERNEY T. II. p. 182. Negat quidem BARBIELLINI proprio lib.

(*l*) Compositæ in struthione VALISNERI p. 240. in castore WEPFER, cui etiam aliæ sunt conglomerati generis BUFFON T. VIII. p. 314.

(*m*) WILLIS p. 13. WINSLOW n. 63. WEPFER p. 123. 124. 129.

(*n*) *Thef.* II *Eff.* 3. n. 14. *Thef.* IV. n. 92. *Thef.* VI. n. 33. BOERHAAV. p. 57. VIEUSSSENS *obsf. d'anat. & de prat.* p. 80. *tr. des liqueurs* p. 261.

(*o*) *Thef.* X. n. 142.

(*p*) BRUNNER *de duoden.* p. 51. 52. 70. LIEUTAUD p. 68. BARBIELLINI in *proprio lib.*

(*q*) Vindicat eas BOERHAAV. *Epist.* p. 11.

(*r*) *Opusc. pathol. obsf.* 22.

(*s*) Conf. tumefactarum glandularum exempla MANGET *bibl.* p. 174. Ab attramento deglutito scirrhasas dixit VERDRIES *de pica* p. 26. An huc locus DUVERNEY. II. p. 573.

(*a*) HELMONT *Sextupl. digest.* PASCAL. *fermens* p. 285. WILLIS *ferment.* c. 5. HIPPOCRATES. ETMULLER. BAYLE *corp. anim.* p. 342. VIRIDET *prim. coct.* c. 11. 12. FLOYER *præternat. stat.* p. 67. SYLVIVS de le BOE ubique: etiam NICOLAI von Fiebern. n. 102. qui famem ab iis deducit. Eo videtur, certe in avibus, inclinare REAUMUR. I. c. p. 307.

(*b*) A cibis esse in cane GEUDER *ferment.* p. 78. A vino Rhenano vomitus, acetosus. PEGHLIN. L. I. *obsf.* 19. A pane acor. passerum. HELMONTIANUS SCHOCK *ferment.* p. 297.

& panis, & pleræque plantæ, & demum carnes (c) ante putredinem sponte concipiunt, ut etiam putredinem nonnunquam superet. Inde factum esse potuit, ut homines nonnunquam acidissimos humores vomitu rejiciant (d), aut in ventriculo acidi signa evidentia ostenderint (e), & in animalibus ruminantibus (f), & in omnivoris (g), inque avibus (h), denique etiam in carnivoris (i), & in homine (i*) acida massa, & acidus succus repertus fuerit; & aviculæ acidum vaporem exhalent (k).

Contra carnes, post initia quædam acoris, sponte in putredinem degenerant, cujus cum certo gradu alcalina natura conjungitur (l). Sed etiam nostri humores, & cum iis ventriculi succus, ad eam degenerationem sponte vergunt (m).

Ita fieri potuit, ut contenta ventriculo, fætida, putrida, denique mani-

(c) PRINGLE p. 396. 398. 402. 406. Acidum est principium putredinis in hypochondriacis HIGHMOR. *affect. hypochondr.* p. 40. 105.

(d) H. de HERES *obs.* p. 251. ALBIN. *de atherapeus.* p. 13. BOYLE *util. Phil. exp.* p. 135. TRALLES *Hist. Choler.* p. 150. ILSIMANN *colic. Saturn.* HELMONT l. c. n. 41. p. 173. CELSUS L. I c. 3. p. 27. *Obs. of a Soc. at London* T. I. n. 46. Argentum tingentes WOODWARD *cases* p. 17 Ructus acidi VERHEYEN p. 255.

(e) In ventriculo humano gas acidum STORCK *Ann.* l. p. 126. BLAS *obs.* 6. L. V. *obs.* 3. L. VI. Odor acidus in homine SAND *rarus ventr. abscess.* Acidissimus odor in ligno devorato Bresl. *Saml.* 1723. m. Sept. & WERDEN *Nachricht wegen im Magen gefundener Hölzer* p. 8.

(f) Agno FLOYER, ove REAUMUR, cuniculo FLOYER *prat. nat. state of hum.* p. 66. vitulo du HAMEL p. 249. Capella VIEUSSSENS *liq.* p. 280. Adde manati *Comm. Petr. Nov.* II. p. 310. erucam *Phil. transf.* n. 470.

(g) Sue PEYER *obs.* 34. mure VALISNER *gener.* L. II. n. 5 6. (lac coactum) glire BARTHOL *anat.* p. 78.

(h) Columba succum heliotropii rubro colore tinxit *Mém. avant.* 1699. T. II p. 8. du HAMEL *hist.* p. 256. add. FLOYER *pharmacobösan.* p. 53.

(i) In avibus carnivoris acidus FLOYER. In onocrotalo MARSIGLI *danub.* T. VI. *obs. misc* p. 10. In aquila p. 9. an cane KNIGHT *vindic.* p. 34. (Nempe primo adscendens in destillando liquor.) In cane subito enecto, lac coactum LITRE *Hist. de l'Acad.* 1711. n. 7. In piscibus carnivoris VIRIDET *prim. coct.* c. 10. 11. 12. & *du bon chyle* p. 64. in torpedine LORENZINI p. 28. in lucio coagulum lac cogens. ANDRY *des alim.* p. 362.

(i*) Lac omnino cogitur LEWIS *mater. med.* p. 528.

(k) HELMONT *calor efficace diger.* n. 27. p. 164. *imago ferment* p. 93. n. 23. 24. 25. 26. 27. *Conf. sextupl. digest.* n. 12. p. 168. Add. DUVERNEY *post.* p. 272.

(l) Fasc. *Seç.* III.

(m) L. V.

fecto alcalina fuerint, in homine (*n*) in animalibus carnivoris (*o*) & denique herbivoris (*p*) potest.

Est ubi bilis de intestino regurgitans (*q*) amarorem & flavum colorem ei succo impertit (*r*). Amari vomitus a navigatione (*s*). Et a multo usu salis marini ejus generis acrimonia subesse (*t*) potest.

Ut ergo is succus verus & purus habeatur, cavendum est, ne ciborum reliquiae, neve aliqua fermentatio, aut putredo, eum corrumpat. Sumendus est ergo ex puro animalis aliquamdiu, neque tamen nimis diu cibis abstinentis, ventriculo: aut recipiendus, qualem homo sanus, jejunus, cum aliquo levi deliquio animi saepe regurgitantem remittit. Spongiis etiam in animalium ventriculis datis vir ILL. eum succum suscepit (*u*).

Repertus est autem his artificiis succus ventriculi pene salivalis (*w*) omnino in igne exhalabilis (*x*), mucosus (*y*) in ipso ventriculo, & minus mucosus quando de ore exstillat, aut insipidus (*z*), aut leviter

(*n*) In ventriculo fani hominis succus malvæ virefcit VIEUSSENS *liq.* p. 270. Per destillationem stomachus dat elementa alcalina, phlegma, spiritum alcalinum, substantiam oleosam, salem fixum PINELLI *de podagr.* p. 313. Etiam caninus ventriculus dedit alcali KNIGHT *vindicat.* p. 34.

(*o*) In cane *vas brev.* TILING p. 362. In erinaceo MUSGRAVE *Phil. transf.* n. 192. In ossifraga anima olidissima CORTES apud ALBOV. l. p. 226. In serpente faetidissimus ventriculi liquor GEUDER *serment.* p. 71. cx R. I. CAMERARIO. In pisce *Phil transf.* n. 102. DAMPIER III. p. 87.

(*p*) In vitulo malvæ tinctura viridis facta est VIEUSSENS *liq.* p. 276.

(*q*) WALÆUS p. 763. VALISNERI l. p. 241. PANAROL. *pentec.* l. n. 39. WENKER *ulc. ventr. obs.* l. HILDAN. *Cent.* IV. n. 40. (in marasmo). Amarum in cancro molli BROWNE *jamaic.* p. 425. In animalibus nonnullis constanter amarum est ut in struthione VALISNER. In pullo ovo contento nunquam non bilem in ventriculo reperi *du poulit* II. p. 128.

(*r*) A fenna sumta flavus liquor in ventriculo MATTEI *anim.* p. 44. & bilis ipsa p. 53.

(*s*) CELS. l. c. 3. p. 23. A morfu viperæ POUTEAU *obs.* p. 155.

(*t*) PINELLI l. c. d. 290.

(*u*) REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 482.

(*w*) DEIDIER *physiol.* p. 80. LIEUTAUD *Eff.* p. 270.

(*x*) WEPFER *cicut.* p. PEYER *merycol.* p. 182.

(*y*) WEPFER p. 123. Parum acris in lucio & cyprino VIRIDET *bon chyle.* l. c. In pisce BOYLE *util. phil. exp.* p. 117. in xiphia HARTMANN in cane B LANGRISH *Exp. en brutes* l. BRUNNER *pancr.* p. 88. 119. ASTRUC. p. 78. In castore WEPFER l. c. in glire MOEBIUS *de usu ventr. & int.*

(*z*) Limpida abunde de ore reddita *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4. obs.* 108 Phlegma FLOYER l. c. p. 59. Pituita vomitu rejecta TULP. p. II. p. 29. TILING p. 120. MARC. DON. *Hist. med.* p. 8. non acida WEDEL *phys.* p. 119. In porco phlegma plurimum

falsus (a), in quadrupedibus herbivoris (b), & carnivoris (c), in avibus (d), & piscibus (e), etiam in homine (f).

Neque aut acida (g) aut alcalina natura in eo succo puro conspicua fuit.

Deinde cum meo rogatu Cl. Lugdunensis medicus RASTIUS, & in mulo, & in ove, per abstinentioniam a pastu, purum succum ventriculi obtinisset, in utroque animale succus gastricus mucosus & viscidus repertus est, in omafo tamen ovis, quam in mulo minus. Cum acido vitriolico & nitroso idem in ove paulum efferbuit, cum odore putrido: syrupum violarum viridi tinxit. Ab acido non coactus est, ab oleo tartari admisto filamenta depofuit. Sapore fuit falso subacri, absque sale muriatico. Adversatus etiam magis glutinosus evasit.

In mulo albuminosus visus est & glutinosus (b), & spumam egit virgis percussus ut albumen, tamen ut igne subposito totus aufugeret. Ab alcohole vini non mutatus est. Cum spiritu vitrioli paulum efferbuit, flocculos posuit; sic cum aliis acidis liquoribus chemicis: magis tamen cum nitri spiritu confligit. Cum oleo tartari fluidior factus est & floccos dejecit. Videtur adeo hic succus ex muco & aqua componi, & ad naturam alcalinam vergere.

FLOYER. Insuper succus ventriculi in ossifraga LEIGH. *Natur. hist. of. Lancasb.* p. 159. In struthione VALISNER. p. 240. contra PECHLINUM qui acidum fecerat *purgant* p. 74. In buteone REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 305. In glire TILING l. c. p. 371. In gallina GALATHEAU & HARDER *apiar. obs.* 16. In tarda HARDER *apiar.* p. 78. In cervo VIRIDET *bon chyl.* p. 459. Blandus & iners HECQUET. *dispens. du Carême.*

(a) BRUNNER *pancreat.* p. 91. *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. I.* p. 127. In buteone falsus REAUMUR p. 305. BOHN p. 131 in ossifraga.

(b) In vitulo KERGER *ferment.* p. 201. 202. in ove MATTEI *anim.* p. 15. REAUMUR p. 495. Subfalsus in agno COLLINS p. 308. MOEBIUS TILING p. 362. MURALT p. 495. In glire acris TILING p. 361. MOEBIUS. In cuniculo MATTEI p. 5. & in lepore IB. in cuniculo piperatus BRUNNER *duoden. c. 5.* p. 92. & in homine VIRIDET p. 475. In castore falsus BERGER l. c. & in lepore MATTEI in fele IDEM.

(c) In cane STRAUS TILING MOEBIUS *de usu ventr.* in fele MATTEI.

(d) TILING *vasf. breve* p. 361. MOEBIUS p. 188. In gallina SCHOCK *de ferment.* p. 304. In ciconia STRAUS apud VALENTIN. II. p. 54 in falcone (dulcis) BORELL. apud MALPIGH. *posth.* p. 23. Salsus in aliis avibus COLLINS p. 308.

(e) In squatina COLLINS p. 277. in lupo p. 308. in lucio Jack *Phil. transf.* n. 162. ammoniacalis in harengo Oecon. *Abhandl.* IX. p. 17. Dulcis in piscibus BORELL. l. c. In cancro nitrosus TILING.

(f) Vomitu redditus submuriaticus *Eph. nat. Cur. III. ann. I.* p. 127. gelatinosus ANEL. *lib. propr.* p. 45.

(g) LIEUTAUD p. 271. GALATHEAU BOYLE. *Phil. Exp. util.* p. 117. BOHN. p. 131 & *de ferment. sang.* BERGER. ASTRUC. *trit.* p. 78. in cane. LISTER *de hum.* p. 157. VALISNERI *Vol. III. obs.* III. p. 139. seq. PINELLI p. 345. GEUDER DUVERNEY *Mém. avant.* 1699. l. c. CAPOA *dell incertezza de medic.* p. 52. seqq. &c.

(h) Mucus ventriculi perinde, ut intestinalis, in coagula polyposa abid TACUT *prax. admir.* L. II. *obs.* 119. PUJATI *obs.* I. & crustas limosas *Journ. med.* ann. 1764. m. Sept. quæ per vomitum rejiciuntur.

Compositæ autem naturæ est, ex saliva, alibi descripta : ex liquido exhalante ventriculi, quod credas, ex analogia, & ex certis in pullo-
rum avium ventriculo factis experimentis de lymphæ genere esse : ex
succo œsophagi : & pancreatis : & ex muco demum glanduloso.

§. XVI. *Arteria ventriculi. I. Coronaria sinistra.*

Eum nunc succum, ut omnes, arteriæ generant. Earum plurimæ in
ventriculo ex *Coeliaca* arteria nascuntur, quam, etsi etiam alios ramos
edit melius hoc loco conjunctam describemus.

Rarissime (a) ex communi cum mesentericæ superiori trunco, sæpi-
sime ex aorta, dum inter cruram septi transversæ descendit, in duode-
cima vertebra dorso (b) nascitur, magna, sed minor tamen quam mesen-
terica (c), ex aortæ anteriori, & sinisteriori paulum sede, ut dextror-
sum & antrorsum se efferat, & deorsum (d).

Ex trunco suo, qui semper brevis est, amat edere phrenicam fini-
stram (e), etiam phrenicam dextram (f) & capsulares (g), aliquando
pancreaticam (h) ad sedem pancreatis reni sinistro proximam, inosculatam
ramo phrenicæ sinistrae.

Deinde vel ex uno loco in tres ramos finditur, facto quasi tripode (i) :
vel primam producit coronariam majorem (k) & paulo post, non re-
moto loco, in duos truncos discedit, hepaticam, splenicamque, nisi
quod aliquando dextra hepatica ad mesentericam pertinet. Est ubi prior
splenica, deinde ex hepatica coronaria nascitur (l).

(a) Semel vidi *Fascic.* VIII. p. 35. Habet PARE L. II. c. 22. VESLING *Epist. posth.*
8. RIOLAN *anacephal.* p. 153.

(b) *Tab. art. tot. corp. ant.* EUSTACH t. 26. in cartilagine inter ultimam dorso & pri-
mam lumborum vertebra WINSLOW n. 176.

(c) Lumina sunt uti 900 & 289. *Comm. in Præl. Boerh.* T. I. p. 39. & alias dia-
metri ut 17 & 19. Ut 14400. & 16900. SENAC *du cœur* p. 247. Diametros facit ut 13.
ad 4. HELVETIUS *Lettre au sujet de la critiq. &c.* p. 181. seq.

(d) *Tab. coeliac not. e. tab. corp. ant.* HEUERMANN T. III. tab. 3.

(e) *Conf. not. f.* WINSLOW n. 176. WALTHER *coeliac* S.

(f) *Tab. art. corp. tot. ant. &* WINSLOW T. III. n. 172. 176. *Fasc.* II.

(g) *Ibid not. f. &* PETSCH n. 49.

(h) *Fascic.* III. p. 32.

(i) *Tab. corp. anat.* C. D. E. EUSTACH. t. 27. f. 4. LOWER *de corde* p. 214. WINS-
LOW n. 178. LIEUTAUD p. 485. WALTHER *ven port.* HEUERMANN l. c.

(k) *Tab. coeliac. l. R. & not. nostr. f.* WALTHER *obs.* 3. STULELEY *of the spleen*
G. WINSLOW n. 177.

(l) *Not. f.*

Est etiam uti prior prodiit coronaria, & tamen tripus adest coeliacæ in hepaticam dextram, sinistram, & splenicam divisæ (*m*). Vidi coronariam ex aorta prodiisse (*n*). Ex splenica etiam, sed rarius nascitur (*o*).

Prima ergo, minor tamen (*p*) coeliacæ propago *coronaria superior* (*q*), *sinistra*, vel *major*, addit se principio sinistro arcus ventriculi (*r*) minoris, exeuns antrorsum & sinistrorsum.

Dat nonnunquam phrenicam sinistram, aut utramque (*s*), aut pancreaticam peculiarem, quæ cum vena portarum descendit, & cum pancreaticis a mesenterica natis se conjunxit (*t*).

Peculiarem solet ibi edere oesophageam (*u*), quæ in thoracem veniens cum furculis ibi natis inosculatur.

Edit eodem loco *coronarium* (*w*) ramum, peculiariter eo nomine digum, qui ad coronæ modum, non tamen ut circulum manifestum efficiat oesophagi ad ventriculum limitem ambit. Edit is unum alterumve ramum sursum in oesophagum (*x*); & plerisque aliis deorsum in ventriculi cæcum saccum absumitur (*y*), cum splenicis conjunctus.

Sequuntur ad utramque planam faciem ventriculi rami aliquot (*z*).

(*m*) *Tab. Coel. II. S.*

(*n*) *Ibid. Fascic. II. not. f.*

(*o*) Habet GUNZ *obs.* n. 10.

(*p*) Habet tamen STUKELEY venam imitatus tum EUSTACH. t. 27. f. 4. VESALIUS VERHEYEN t. 38. c. KULMUS t. 16. CASSER. L. VI. tab. I.

(*q*) Valde parva EUSTACH.

(*r*) COWPER t. 3. n. 39. *Gastrica major* C. BAUHINO *Gastrica* GLISSON *ventric. & int.* p. 116. *Gastrica sinistra* KEILIO *abrigd.* p. 342. *Epigastrica* LOWERO *Stomachique corônaire* WINSLOW n. 177.

(*s*) *Tab. coeliac. I.* WINSLOW n. 179.

(*t*) *Tab. coel. I. Y.*

(*u*) *Fasc. II. not. g.*

(*w*) *Tab. coeliac. I. Z. & not. g.* EUSTACH. tab. 27. f. 2. 4. STUKELEY VESAL. p. 454. &c. WINSLOW n. 179.

(*x*) *Fascic. VIII. l. c.*

(*y*) *Not. g.*

(*z*) *Tab. coeliac. I*

Præcipuus demum truncus coronariæ (a) in duos ramos dividitur, anteriorem (b), & posteriorem (c), etiam tres sibi similes (d).

Eorum vel uterque, vel posterior, secundum arcum ventriculi minoris dextrorsum excurrit, & cum coronaria parva, hepaticæ propagine (e), insignem anastomosin facit, ut non minimi trunci contrario ductu in unum coalescant.

Sed ab eadem coronaria & in antèrius planum ventriculi, & in posterius, maximi rami eunt, & versus arcum majorem protensi (f), cum furculis gastropiploicarum & brevium in rete consentiunt.

Reliquus truncus ejusdem coronariæ circa lobulum spigelii inflexus per sulcum ductus venosi hepar adit, plerumque exiguus (g), aliquando tamen ita insignis, ut alterius sinistrae arteriæ hepatis nomen mereatur. Dat etiam diaphragmati (h).

§. XVII. II. Splenica.

Hic ramus, etsi ab alio viscere nomen habet, tamen magna parte sui ad ventriculum pertinet.

Splenica arteria rarissime ex aorta (a), neque enim unquam vidi, longe plerumque ex coeliaca nascitur, paulo postquam prodiit coronaria (b). Inde incurvo quidem, sed acuto fatis angulo (c), sinistrorsum & potius retrorsum se confert, secundum oram superiorem (d) pancreatis, & posteriorem (e), in universum in arcum flexa, sursum

(a) *Tab. coel. I. b. not. h.* EUSTACH. I. c. VESAL. l. c. STURGELEY I. c. WINSLOW n. 180. LIEUTAUD p. 488. CASSERIUS l. c.

(b) *Fascic. VIII. l. c.*

(c) *Ibid.*

(d) *Ibid. Fascic. II. l. c.*

(e) *Ibid.* EUSTACH. f. 4. LEONCENA in *Phil. transf.* n. 280. WINSLOW ib. Hepaticæ inferi PETIT ad PALFYN. p. 353.

(f) *Conf. tab. I. coel.*

(g) *Tab. coel. I. & not. g. h. add.* WINSLOW n. 181. PETSCHKE n. 50. HEUERMANNT. III. p. 714. GUNZ l. c. & olim RHOD. *mantiss.* n. 48. Hepatica prima WALTHER l. c. b.

(h) *Not. h.* WINSLOW n. 181.

(a) Ita RIOLAN. in LAURENT. p. 641. *Enchirid.* p. 244. DRELINCOURT de liene t. I. n. 8. LINDEN *physiolog. reform.* p. 817.

(b) *Tab. coel. I. g.*

(c) *Tab. coel. I.* HEUERMANNT. l. c.

(d) *Tab. coel. II. ic. & not. e.*

(e) WINSLOW n. 190.

cavum (*f*), sed serpentinis (*g*) alternis flexibus, eo evidentius, quo magis cera repleta fuerit.

Finem utique facit sui in lienem, secundum cujus finem, ventriculo obversum, in omento gastrocólico conflexa adscendit, quando inanis est ventriculus, aut antrorsum emergit, quando plenus (*h*). Inde plures, ad decem (*i*), ramos in id viscus infigit, quasi in foramina (*k*) mersos. Aliqua (*l*) lienalium aliquando ex medio pancreate ad suum viscus accedit.

Verum eadem ventriculi curvaturæ majori plurimos ramos impertit, quorum primus (*m*) aut ex lienalium maxime postica arteria, aut paulo prius natus, ad duas tertias finemve pancreatis (*n*), aliquando etiam ex medio pancreate prodit. Is secundum ventriculi magnum arcum antrorsum, dextrorsum, cum arcu migrat, in omento: ad aliquam a ventriculo distantiam (*o*). Est *gastroepiploica sinistra* (*p*) quæ non raro aut splenicæ arteriæ verus truncus est (*q*), aut certe alter ramus princeps, ut splenicæ propagines alterum ramum efficiant.

Ejus rami gastrici ad utrumque planum ventriculi adscendunt, & cum furculis coronariæ (*r*) utriusque in retia coeunt. Abeunt autem ad ventriculum per omentum (*s*).

Rami epiploici in omentum gastrocolicum, ejusque utramque paginam abeunt, pariter reticulati (*t*).

Eorum aliquis, ex primis, per medium omentum productus, apud

(*f*) *Fascic. VIII. p. 34.*

(*g*) ARANT. *obs. anat. c. 35.* CASSER. L. VIII. t. 9. f. 1. RUYSCH *Epist. VII. tab. 4.* DRAKE l. c. 41. BIDLOO t. 36. f. 1. WALTHER *ven. port.* WINSLOW n. 194.

(*h*) p. 120.

(*i*) *Tab. coeliac. II. not. e. & ic. conf. Fascic. VIII. ad quinque WINSLOW n. 195.*

(*k*) CASSER L. VI. T. 1. L. VIII. t. 9. f. 1.

(*l*) *Fascic. VIII. l. c.*

(*m*) EUSTACH. f. 2. 4. STUKELEY t. 1.

(*n*) *Not. g.*

(*o*) *Icon. coel. II.*

(*p*) De MARCHETT & c. Habet VESALIUS p. 491. ic. p. 484 E. *Gastrica sinistra* WINSLOW n. 191. LIEUTAUD p. 461.

(*q*) *Tab. coel. II.*

(*r*) WINSLOW n. 191.

(*s*) *Tab. coel. II. & not. c.*

(*t*) WINSLOW n. 192.

veteres *epiploica sinistra* (u) nomen gessit, & anastomofin cum dextris omentalibus fecit.

Ipsæ truncus vel majori anastomofi (w), vel minori aliqua (x), cum gastroepiploica dextra in continuum arcum abit, postquam tertiam, & ultra, longitudinis ventriculi partem emensus est, semper tamen dimidia minorem.

Sunt etiam ex primis ejus ramis aliqui pancreatici (y), & aliquando lienales aliqui (z), tum rami perpetui ad mesocolon & ad ligamentum lienem sustinens (a).

Porro & ex finu lienis, aque ramis ipsis lienalibus (b), & ex trunco, inter nascentes ex ordine splenis trunculos (c), numerosæ arteriæ, ad quinque (d), cum omento gastrocólico ad ventriculi tuber veniunt; ex inofculatæ (e) coronariis a gastroepiploica sinistra, natis, & ad usque ipsum infertum oesophagum, & ad ligamentum in quod omentum desinit, ramulis suis excurrunt. Sunt venarum *brevium* comites arteriæ.

Surculi ex ea fede aliqui ad diaphragma per ligamentum oesophageum veniunt, alii redeunt ad pancreas & ad mesocolon (f).

Sed neque valde rarum est, a splenica, dum secundum pancreas migrat, jam vicina lieni, unam alteramve arteriam (g) in planum posterius ventriculi, sub oesophago, prope arcum minorem (h), venire. non in eodem cum brevibus arteriis ordine, & quam ex posterius.

(u) Ibid. Fascic. VIII. C. BAUHIN D. d. MARCHETT. LIEUTAUD. p. 490. VESALIUS p. 484. ad γ. & ε. & c.

(w) EUSTACH. tab. 27. f. 4. tab. nostr. II & I. & not. e. STUKELEY WINSLOW n. 192.

(x) Hinc inconspicua EUSTACH. f. 2.

(y) WINSLOW n. 192. Not. e.

(z) Not. c. LOWER p. 214.

(a) Not. e. & Fasc. VIII.

(b) Not. e. tab. post. O. O. Fascic. VIII Unum STUKELEY. Habet VESAL. p. 454. 3. WINSLOW n. 194.

(c) Fasc. VIII.

(d) Unicam veteres RHOD. mantiff. obs. n. 29. Plures esse RIOLAN. in Laurent. p. 660. Tres. quatuor, TILING vass. brev. p. 105.

(e) EUSTACH. f. 4.

(f) Not. e.

(g) Tab. coel. II. k. not. f. & Fascic. VIII. EUSTACH. t. 27. f. 2. 4. CASSER L. V. 1. WALTHER ven. port. p. XI.

(h) Fasc. VIII.

Rarius est, ex splenicæ origine peculiarem *pyloricam* ad partem pylori posteriorem, & ad fasciculum vasorum biliariorum ivisse (i). Ejus locum alias pancreatica peculiaris tenet, suprema fodalium: & dextrorsum trans pancreatis caput, retro pylorum, ad duodenum missa & ad pancreas (k), cum pylorica & pancreaticoduodenali inosculata. A coeliaca, etiam (l) a coronariæ trunco, & ab aorta vidi (m) hanc arteriam prodiisse.

Denique fere ex origine splenicæ ramum ad mesocolon transversum ramum vidi ivisse omentalibus & colicis ramis inosculatum (n).

Reliqui rami splenicæ, dum pancreas sequitur, id viscus numerosi adeunt (o), cum pancreatis a mesenterico trunco natis varie inosculati.

Omnino quam hepatica minor est. In junioribus reperi, splenicam o. 000144. & o. 00081- hepaticam o. 000149- & o. 000336. (p). In adultis hominibus hepatica, ut totum hepar, minor est, atque adeo ratio splenicæ crescit.

Vidi secundam arteriam splenicam (q), prius ex coelicæ trunco ortam, quæ per pancreatis apicem lienem adiit, inque ejus visceris sinu inosculata fuit cum lienali vulgari.

§. XVIII. III. *Hepatica* (a).

Maximus ramorum coeliacæ, & verus ejus plerumque continuus truncus est.

Pergit dextrorsum, antrorsum, sub papilla lobuli spigeli per proprium ejus lobuli sulcum, tunc secundum arcum minorem ventriculi, ad pylori sedem, & vesiculæ felleæ. Ibi in duos ramos plerumque finditur (b), hepaticum, & gastricoduodenalem, hunc minorem, Ille edit (c) *coro-*

(i) *Tab. 1.*

(k) *Tab. coel. II. not. c.*

(l) *p. 144.*

(m) *Tab. II. 1. c.*

(n) *Fascic. VIII. 1. c.*

(o) *Tab. coel. II. i EUSTACH. I. c. f. 2. 4. WINSLOW n. 190. WALTHER.*

(p) *Prælect. in Boerh. T. III. p. 45.*

(q) *Tab. coel. I. f. not. h.*

(a) *Tab. coel. I. Conf. WINSLOW n. 182.*

(b) *EUSTACH. tab. 27. f. 2. 4.*

(c) *Conf. not. m. ad Fasc. II. tab. art. coel. Puto pingi apud EUSTACHIUM t. 27. f. 2.*

nariam dextram minorem [d] ; nisi ea , ut non raro fit , ex trunco hepatico ante divisionem prodiit.

Ea per arcum minorem ventriculi , sinistrorsum redit , atque majori coronariæ [e] occurrit , & inosculatur , similesque ramos in ventriculum inque gastroepiploicarum dextrarum occursum edit ut dextra : Surculos etiam dat omento hepaticogastrico , & ductibus bilariis , cum cysticis inosculatos [f]. Minimam vidi fuisse , ut totus arcus minor a coronaria dextra ramos suos haberet.

Truncus *gastricoduodenalis* [g] minor plerumque , aliquando tamen trunci nomine dignus [h] , pone pylorum se recipit [i]. Edit , primam *pyloricam superiorem vel dextram* [k] : quales etiam coronaria parva alias dat , aut hepatica [l]. Ea per anteriora pylori facit circellos , & cum pylorica inferiori , & cum gastroepiploicis dextris ventriculi arteriis , cumque duodenæ ramis connexos [m].

Dat porro truncus aliquando hepaticam parvam in fossam umbilicalem (n) , & minores aliquas pyloricas , & *pyloricam (o) inferiorem* dextrorsum & sinistrorsum divaricatam , in ventriculum & in duodenum , & ventricularibus , atque duodenæ primæ inosculatam.

Inde truncus emergit sub duodeno , & denuo dividitur. Ramus *pancreatico duodenalis* (p) , circumlegit arcum cavum duodeni sinistrorsum versum , & ei intestino , & pancreati prospicit ; cui ramum aliquem majorem , longe *transversum* (q) , sinistrorsum euntem impertit , cum aliis pancreaticis a splenica ; aq̃e coronaria (r) , & a mesenterica ; & a ga-

(d) *Pylorica GLISSONII COWPERI WALTHER Ven. port. WINSLOW n. 183. Gastrica dextra C. BAUHINI D. MARCHETTIS p. 37. VERHEYENII. Habet CASSER. L. V. tab. i. G.*

(e) p. 146. EUSTACH. f. 2. WINSLOW ibid.

(f) Not. m. l. c.

(g) *Gastrica dextra WINSLOW n. 184.*

(h) *Fasc. VIII. p. 38.*

(i) Not. p ic. I. & ic. II.

(k) Conf. *Fasc. II. not. n ic. I. Est gastrica dextra minor WALTERIS.*

(l) *NICOLAI direct. vas. p. 64.*

(m) Not. cit. n.

(n) *Fascic. II. n. p.*

(o) *Fasc. II. t. 2. a a. Fascic. VIII. p. 44.*

(p) *Fascic. II. T. I. T. II. b Duodena WINSLOW n. 184. 186. HEISTERI. WALTHER. Intestinalis C. BAUHINI, DIEMERBROEKII.*

(q) *Fascic. II. T. I. q. T. II. d.*

(r) *Fascic. VIII. p. 33.*

stroepiploica (s) natis inosculatum. Is ramus & mento furculum dat (t), etiam mesocolo transverso, colicis mediis irretitos (u).

Duodenalis vero ramus cum duodena superiori (w) convenit, cumque mesentericis, & ex eodem ramo duos manifestos arcu habet (x), estque is ramus, quem dixi cum duodena dextra coire (y), & cum pancreatica ex splenica nata (z), & cum pancreatica transversa (a) communicare. Aliqui ejus furculi in peritonæum renale abeunt. Ex mesenterico ramo hepatico nata visa est (b).

Eo ramo edita reliquus truncus, nunc *gastroepiploica dextra* (c) dicitur, eaque trunco suo per omentum colicogastricum incedit, ad aliquam a ventriculo distantiam (d), & hinc omentales edit numerosissimas, primas ad colicum omentum (e), alias ad colicogastricum, ejusque antèrius folium. Harum aliqua dexterior, & major, olim *epiploica dextra*, dicta est. Ejus rami in laminam posteriorem omenti circumducti denique ultimis furculis ad colon veniunt, inosculatæ colicis. Anteriores demum in omento colicogastrico pulcherrima retia (f) faciunt. Dedit etiam vesiculæ fellis furculos, cum omenti minoris parte membranacea advenientes, aliqui etiam ex primis ramis pancreas adeunt, cum *transversali* inosculatæ.

Inde e regione in ventriculum, ejusque planum antèrius & posterius furculos dat (g) ex ordine, cum coronariis superioribus in rete intricatos, & cum pyloricis, & reliquis gastricis.

(s) Ibid. p. 34.

(t) Fasc. II. l. c.

(u) Fascic. II. t. 2. b. Fasc. VIII. p. 34.

(w) p. 152.

(x) Fascic. II. T. I s. T. II b. f. not. d. Fasc. III. p. 44. WALTHER EUSTACH. l. c.

(y) Fascic. VIII. p. 33. 34.

(z) p. 149. Fascic. II. t. II. Fasc. VIII. p. 32.

(a) Fasc. II. t. 2. d.

(b) WINSLOW n. 186.

(c) Fascic. II. tab. 1. 2. not. r. EUSTACH. l. c. CASSER. L. V. tab. 1. ad G. C. BAUHIN. GLISSON. *Gastrica major*. SPIGEL L. IV. tab. 8. f. 1. 2. *Gastrica dextra* WINSLOW n. 184. *Coronaria inferior* COWPER 35.

(d) Fasc. II. t. I. II.

(e) Fasc. VIII. p. 34.

(f) DIEMERBROECK. VERHEYEN. KULMUS. LIEUTAUD p. 489. Plures WINSLOW. n.

185.

(g) RUYSCH *Thef.* II. tab. 5. f. 2. CASSER. L. VII. tab. 3. L. VIII. tab. 4. f. 2.

Denique vel majori, ut frequentius est (*h*), vel obscuriori aliqua anastomosi, in arcum cum gastroepiploica sinistra coit (*i*).

Reliquus truncus, *hepatica*, continuo dividi, solet, plerumque in duos (*l*) ramos, nonnunquam in tres (*m*), & tunc medius coronariam parvam, ramulos biliarum ductuum, & duodeni, inque anonyum & finistrum lobulum versus dat arterias. In solita magis fabrica ramus *sinister* (*n*), etiam prius quam duodena natus (*o*), tenet locum in fasciculo vasorum hepaticorum finistrum, & anteriorem, ante venam putarum (*p*).

Edit saepe coronariam minorem, furculum ad omentum gastrohepaticum, & per fossam venosam peculiarem hepaticam (*q*). Edit inde *duodenam superiorem*, alias a duodenali natam, aut a dextra hepatica, quæ circa convexum arcum duodeni, per posteriora capitis pancreatis circumflexa, decussans ductum choledochum, duodeno, & pancreati, ramos exhibet, cum aliis pancreaticis vasis biliaris insertis (*r*) mistos; & in ima parte descendens duodeni finistrorsum recurva, deum duplici anastomosi in duodenalem finistram, modo dictam, & in mesentericam (*s*) se immittit.

Reliqua dicentur, quando de hepate sermo erit.

§. XIX. *Arteriarum ventriculi communia.*

Multis ex locis & truncis hæ arteriæ adveniunt, ob multiformem puto ventriculi figuram, in quam unicus truncus minus æqualiter se distribuisset, aut nimis, qua adiret, robustus, aut non par transmittendo ad remotos ramulos sanguini, si tenuis foret.

(*h*) EUSTACH. l. c. *Fascic. II. t. 1. 2.*

(*i*) LEONCENA.

(*k*) HEBENSTREIT.

(*l*) EUSTACH. f. 1. 2. 4. STUKELEY, PECHLIN. *obs.* 58. *Cent. I.*

(*m*) *Fascic. VIII. p. 33.*

(*n*) *Tab. coel. I.*

(*o*) WALTHER *nerv. intercost. c. II.*

(*p*) *Fasc. II. not. o. ic. I.*

(*q*) *Fascic. VIII. p. 33.*

(*r*) *Fascic. II. not. p.*

(*s*) *Fascic. II. not. p. WALTHER l. c. EUSTACH. t. 27. f. 2. 4.*

Omnes autem ii diversi trunci (a) inter se consentiunt, ut compressis omnibus, unicus, qui liber fuerit, provideat universo visceri: in unum etiam injecta materia repletum, turgeant omnes.

Omnes in trunco suo, coeliaca, innumerabilibus nervis (b), obnubuntur, quodcumque demum in ejusmodi plexu naturæ fuerit consilium. Serpantum (c) in modum flectuntur omnes, ut possint obsequi extensioni ventriculi, neque disrumpi, quando a flatu mire turget, aut a nimio cibo.

Omnium ea est distributio, ut truncis suis rete majus faciant in cellulosa prima (d): perforent fere absque ramis musculosam (e); secundum tenuius rete faciant (f) in cellulosa altera: perforent nerveam, faciantque rete (g), minimorum ramorum, in cellulosa tertia, quos villosa tunica sola tegat, facillime rumpenda, si eo præsidio caruerint (h).

In exhalantes villos sanguis post mucum non difficulter subit, ut vomitus cruenti absque magno periculo fiant, potissimum a suppressis menibus (i). Hinc neque vas ruptum eo in casu non invenitur, neque erosio (k).

Sic injectus in arterias hydrargyrus facile in venas transit (l), etiam in cellulofam tunicam (m).

§. XX. *Venæ ventriculi.*

Rectius eæ conjunctæ tradentur, quando cum hepate vena portarum describetur (a). Nunc sufficiat dixisse, venarum truncos in universum

(a) PETSCHÉ n. 52. add. VIEUSSENS *obs. d'anat. & de méd. prat.* p. 67.

(b) L. X. p. 263.

(c) PETSCHÉ n. 37.

(d) p. 124. 125.

(e) p. 128. &c.

(f) p. 130.

(g) p. 132.

(h) Sanguis effluxit, cum in cadavere mucus (villosa tunica) detergeretur GLISSON *ventr. int.* p. 382.

(i) Conf. C. STALPAART *von der WIEL obs.* 17. *Cent. post. & L. XXVIII. Sect. IIR*

(k) G. v. SWIETEN T. III. p. 126. 127. GLISSON *ventr. & intest. l. c.*

(l) VIEUSSENS *traité des Liq.* p. 255. 256. *obs. d'anat. & de méd. prat.* p. 64.

(m) IDEM *ibid.*

(a) L. XXIII

arterioforum focios esse : tantum ut ex splenica quidem vena , brevia vasa (*b*) , & posteriores (*c*) venæ gastricæ , & gastroepiploica sinistra (*d*) & coronaria major (*e*) trunco ; vena vero coronaria minor ex trunco venæ portarum (*f*) , aut ex ramo a vena portarum nato ; aut ex gastroepiploica proveniant. Porro vena *duodena superior* (*g*) & *inferior* (*h*) , & vena *dextra gastroepiploica* (*i*) & *pylorica* (*k*) & proprio trunco gastrocolico (*l*) ad mesentericam venam spectante nascuntur , aut ex eadem seorsim (*m*) prodeunte , aut a vena portarum (*n*) , aut a splenica.

Deinde venarum rete primum potius arterioso uberius est , veriusque reticulatum , & anastomoses , quas arteriæ , venæ etiam majores habent.

Omnes etiam ventriculi venæ (*o*) , & quidem omnes venæ ex trunco portarum natæ , absque valvulis sunt , ut in universo eo systemate ad portas pertinente valvulæ desiderentur.

Venam aliquam a cava venire ignoro , nisi huc aliquas anastomoses referas , qualem inter venam renalem sinistram & gastricam sinistram. ILL. SCHMIEDEL vidit (*p*) ; aut venam , qualem ipse vidi , ab azyga in coronariam dextram communicantem ; aut vasis brevis cum sinistra phrenica (*q*) conjunctionem.

Non potest autem præteriti error , apud veteres equidem potentior , nostro seculo obsoletus , quo vena brevis , aut vas breve , (nam multas venas in unam contrahunt) dictum est , in ventriculum aperiri , eo-

(*b*) EUSTACH. l. c. FONTAN. ad VESAL. *Epit.* p. 22. Dixit & plurima , GUNTHER p. 26. Ex trunco splenicæ raro venire BERTRANDI *hist.* p. 12.

(*c*) VESAL. L. III. l. c. O. O. ex coronaria. Ex splenica Id. U. L. V. f. 3.

(*d*) EUSTACH. *ibid.* VESAL. *ibid.* WINSLOW n. 257.

(*e*) EUSTACH. l. c. f. 24. VESAL. III. c. 5. p. 444. ROLFINK p. 1150. WINSLOW n. 254. Ex trunco venæ Portarum SALZMAN *Ep. ad HORST* p. 448. WINSLOW n. 255. WENKER *vuln. vent.* p. 15.

(*f*) EUSTACH. f. 2. VESAL. l. c. WINSLOW n. 238. & similiter vidi se habuisse.

(*g*) WINSLOW n. 239.

(*h*) Conf. interim *comment. in Boerh.* T. III. p. 82.

(*i*) EUSTACH. f. 4. WINSLOW n. 239. 243. 244. 245. LEONCENA E. conf. *Comment.* T. III. p. 83. *Fascic. III.* l. c. *Art. mes.* p. 44. *h.* Ex trunco venæ portarum WALTHER p. x.

(*k*) *Comm.* T. III. p. 89.

(*l*) WINSLOW n. 244.

(*m*) EUSTACH. f. 2. VESAL. L. III. l. c. L. V. f. 3. 4.

(*n*) CASSER *tab.* I. L. V.

(*o*) STAHL. SALZMAN *ven. port.* WINTRINGHAM. *enquir.* p. 292.

(*p*) *Variet. vasor.* p. 26. n. 19.

(*q*) HABICOT. D. I. *Lect.* II. p. 39.

que acidum succum atramve bilem (r) destillare, quæ a liene adveniat, & ad ciborum coctionem utiliter serviat, & appetitum faciat (s), & ventriculum stimulet, & ad excretionem fæcum (t) sollicitet.

Paulum aliter ARETÆUS, lienem purgamenta sanguinis recipere (u): quæ ita ornat ORIBASIIUS (w), ut lien eos humores ex hepate adtractos commutet, inque ventriculum per vas breve effundat.

Eam opinionem J. BAPTISTA ab HELMONT ita auxit, ut acorpeculia ris ingenii (x), diversus a chemico acore, fermenti nomine dignus, ex liene per vas breve ventriculo adspiret (y), qualia etiam alii sunt imitati (z).

Adduxerunt etiam testimonium sanguinis succive atræ & sanguinolenti, qui frequentissime vomitu (a) redditur, & quem per vas breve in ventriculum venisse persuadebantur (b); & quem ipsum ex liene venire sanguinis in eo viscere conditio suaderet, tum ejusdem visceris, quando sanguinem ejusmodi ægri reddebant, tumor immensus (c); & experimentum, cum pressio liene ea materiis in ventriculum effunderetur (d).

Etiam notas in membrana ventriculi iis vasis respondere addiderunt, tanquam poros (e); & venas breves in splenetico homine sanguinem revolvamente cruore plenas fuisse (f).

(r) GALEN. *de usu part.* L. IV. c. 8. L. V. c. 5. NEMES 28. ORIBAS. p. 118. LAURENT. p. 325.

(s) GALENUS *ibid.* RIOLAN. p. 118. NEMESIUS. AVICENNA L. I. *fen. I. doctr.* 5. *summ.* 5. c. 2. RHASES ad MANSOR. L. I. c. 22. C. STEPHANUS p. 179. BARTHOLINUS p. 170. TANCREDUS p. 31. Arabibus tribuit HOFMAN de Liene. Acido salsum facit TILING *vas. breve* p. 106.

(t) AVICENNA.

(u) *Diut.* I. c. 15. ORIBAS. p. 118.

(w) *Ibid.*

(x) *Sextuplex digest.* n. 2. 3. 4. 11. 12. 13. 14. &c.

(y) *Ibid.* n. 11. p. 168. *Pylor. rect.* n. 26. p. 185. WILLIS *de ferment.* c. 5.

(z) Halitus in avibus acidum CORNELIUS *Consent.* p. 227.

(a) *Journ. de med.* 1758 m. Mart. SCHURIG *chylol.* p. 474. 475. Per vomitum liquor niger *lettera al* S. CURZIO p. 23. 24. etiam felici eventu CARDAN. ad *aphor hipp.* p. 253 Conf. MORG. *sed. & caus. morb.* II. p. 23. 130. SCHENK *de trib. coction.* HOECHSTETTER *Decur.* II. *Cas.* 5. Nihil aliud est morbus siamensis TITSING *genees konst.* p. 131. Vomitus cruentus 23. libr. cum cancroso steatomate ROTARI *oper.* p. 313. In morbo siamensi ventriculum & intestina plena materie fætidissima describit CL. TITSINGH *genees konst.* p. 376. Tumorem lienis evanescentem per sanguinis secessum BIUMI *scrutin.* p. 218.

(b) Ostium in ventriculo apertum fuisse VALVERD L. VI. c. 5. p. 267. WEDEL *physiol. reform.* p. 120. calamo æquale BARTHOL. *hist.* 61. *Cent.* III.

(c) In sanguinis vomitu lien triplo major TILING. *digress.* p. 182. A sanguinis vomitu tertia pars lienis consumpta SCHURIG *chylolog.* p. 460.

(d) VALVERD l. c. Meatum dicit C. STEPHANUS p. 179.

(e) RIOLAN. in LAURENT. p. 660.

(f) BARTHOL. *hist.* 80. *Cent.* I. Vasa coronaria turgida HORST. Venæ breves non raro varicibus obsidentur, etiam apud CL. BERTRANDUM p. 12.

In cane, cui lien erat excisus, ventriculus cibo putrido plenus (*g*) & cum liene crusta lapidosa obstructo morbus niger (*h*) conjunctus fuit.

Et credam equidem, materiam eam, cujus effusionem renovato nomine morbum nigrum in Gallia vocare solent, utique per vomitum, & per concussiones abdominis vehementissimas, quæ vomitum faciunt, de liene forte & de hepate, contra circulationis leges retroagi, ventriculi vasa tumefacere (*i*), demumque ruptis iis in ventriculum effundi, cum præterea venæ breves valvulis destituantur (*k*). Manifesto lienem durum, callosum, majorem, in ventriculum, cum premeretur, materiam dare vidit Cl. MUZELIUS, qualem æger vomendo reddebat (*l*). Et lien obstructus sæpe expeditur, sanguine per vas breve exeunte, ut ægri morbo liberentur. Denique cum hepatis scirrhus, qui reducis a ventriculo ad portarum venas sanguinis iter impedit, vomitus sanguineus & vasa coronaria turgida (*l**) fuerunt.

Non ideo tamen hæc naturalis sanguinis per venas breves fluentis via (*l***) est: quam utique sanguis a ventriculo ad lienem relegit, non contra; ut etiam vinculis injectis (*m*), tumor ostendit ventriculo propior, dum sedes venæ lieni vicinior inanitur. Neque ea vena unquam in ventriculum pertunditur (*n*), & si fuisset pertusa, nihil esset hic brevis vasis peculiare. Nam & venæ gastricæ in morbo nigro ruptæ fuerunt (*o*), & cum morbo nigro splen parvus est repertus, bonumque hepar (*p*).

Longe minus in sano homine acidum quid (*q*) in eo sanguine est, sive sanguinem, sive bilem, sive vaporem dixeris. Acor enim in sano

(*g*) MEAD. apud STUKELEY p. 46.

(*h*) HOFMAN *morb. lien.* n. 6.

(*i*) FUSE ad demonstrat STUKELEY p. 21.

(*k*) BARTHOL. *hist.* 60. Cent. IV.

(*l*) *Obs.* p. 28.

(*l**) HORST. A scirrhus hepatis vomitus cruentus BOHN. p. 251.

(*l***) Cl. MACOPPE & alii id senserunt apud ROTARI *oper.* p. 142. seq.

(*m*) DRELINCOURT *canicid.* 8. add. MALPIGHI *de liene* p. 115. WALÆRUM ad BARTHOL. p. 775. nempe sanguinem a liene ad hepår ferri. Vide *huius operis* L. II. p. 213.

(*n*) VESAL. *de rad. chin.* p. 196. *de fabr. corp. hum.* p. 630. Cl. HOFMAN *de liene* c. 19. P. A. MOLINETTI in peculiari folio. Negat pertusam fuisse in morbo nigro CLAUDER *obs. pract.*

(*o*) PALFYN. ex Cl. LARBERI editione T. II. p. 118.

(*p*) GUARINONI *cas.* 388.

(*q*) Ex primis acorem ex Liene refutavit SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. p. 43.

fanguine obscurus, per multa demum experimenta, separatis principiis, manifestus constitui potest (*r*).

In liene, etiam cocto, nullum acorem (*s*) reperiri constat: Neque infusum lac aut succum violarum mutat (*t*), neque austeritas in liene est, nisi tota massa fanguinea aceat (*u*); id is ipse discipulus SYLVII confirmat, qui vasis brevis usum fictitium se evertisse gloriatur (*w*).

§. XXI. *Nervi ventriculi.*

Numerosi sunt, ex pare vago potissimum nati, ventriculo destinati nervi. Adveniunt cum oesophago, duplici, uti descripsimus, plexu (*a*) anteriori minori, posteriori majori.

Eæ utroque fasciculo plexus circa dextra sedem ingredientis oesophagi permagnus nascitur (*b*), qua sede etiam sensus acris est, & in deliquium animi facile transit, vel ex oscillatione, vel ex vomitus primis conatibus, vel ex veneno maligno miliari ad ventriculum percussio, vel simpliciter ex titillatione cutis, quæ ei sedi respondet.

Accedunt ad faccum sinistrum nervi ab intercostali plexu coeliacam amplexo (*c*); tum ad pylorum (*d*); alique ab hepaticis (*e*).

Sensus interni ventriculi (*f*) acris (*g*) est, potius vehementior quam intestinorum (*b*). Aliquoties colicas ventriculares expertus, a flatu natus, levabar, quamprimum causa mali in intestina transierat. Dolor intolerabilis a calculis (*i*) subnascitur. Multo acrius quam cutis etiam nuda ventriculus sen-

(*r*) L. V. p. 94.

(*s*) GEUDER *ferment.* p. 182. de la FONT *de tympanite* p. 144. CHARLETON *Exerc. pathol.* p. 131. BOHN *duumvir. hypoch.* n. 28. seq. VIRIDET in *nesfrende prim. coct.* p. 656.

(*t*) BOHN *ibid. circul. anat.* p. 258 Sal marinus in eo infuso fuit IDEM *duum. vir. n.* 30.

(*u*) SCHVYL *de natura & usu lienis* Leid. 1664.

(*w*) *Diff.* V. n. 15.

(*a*) L. X. p. 236. 237.

(*b*) WILLIS *fig.* XI.

(*c*) L. X p. 262.

(*d*) *Ibid.*

(*e*) p. 263.

(*f*) Vidit Cl. v. BOS *viv. corp. hum. solid.*

(*g*) Dolor ab ulcere ventriculi HILDAN. L. III. *obs.* 20. a scirrho BOSCUS *facult.* p. 21. G. v. SWIETEN III. p. 151. BARRERE *nouv. obs.* 20. p. 213. 214. In vomitu *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 230. ab omento elapso POTT. *rupt.* p. 64.

(*h*) Fatetur WHYTT *physiol. eff.* p. 155. Tactus, ut recedit a lingua, ita debiliior fit HARTLEY p. 151.

(*i*) CARDAN. *contrad.* L. II. tr. 5. p. 175.

tit, aut quam lingua; Aqua laurocerasi instillata oculum non adficit, & tamen pota canem inter horam enecat (*k*). Antimonialia medicamenta vulnera cutis exsiccant, & tamen vomitum movent (*l*). Arsenicum, quod linguæ nihil quidquam sensus imprimit, ventriculum in horridas convulsiones ciet, lateque inflamat (*m*). Vitrum antimonii gustu non acre est, & tamen ad mortem (*n*) usque vomitum movet. Insipida infusio antimonii ventriculum tamen subvertit (*o*). Ricini tertia species semen habet dulce, ut amygdalæ, & tamen vehementer purgans (*o**).

Et si præterea ad vomitum movendum acrius, quam ad alvum ducendum pharmacum requiritur, intelligitur majorem violentiam posci, ut motus ventriculi invertatur, minorem, ut intestinorum contenta naturalem viam sequantur. Mire cæterum vires tollunt, quæ ventriculum adficiunt. Cholera subito robustissimum hominem frangit. Ex dolore ventriculi deliquium funestum animi (*p*), & ex sola fame (*q*), vel (*r*) foda.

Neque alia via ad mortem brevior est, venenis vehementer acribus in ventriculum receptis, ut sublimato hydrargyro (*s*) qui vix deglutitus tenaces alioquin vitæ suæ bestias exstinguit; nuce vomica, quæ nondum fere ventriculum ingressa, convulsiones (*u*) lethiferas sciet; arsenico (*w*), drastice medicamentis (*w**) aliis. Solent autem per inflammationem ventriculi fere occidere. Adde post nostra, experimenta Clar. HILDFELDI in scylla (*x*), staphisagriæ semine (*y*), gummi guttæ (*z*), oleo anisi (*a*), nuce vomica (*b*), cocculis (*c*), viridi æris (*d*), tur-

(*k*) CANGRISH *Exper.*

(*l*) WEPFER *cicut.* p. 83.

(*m*) PECHLIN. *purg.* p. 151.

(*n*) MEIBOM *de ulcerib.*

(*o*) HARVEI *Exerc.* 53. *de gener. anim.*

(*o**) LEWIS, *mater med.* p. 469.

(*p*) BERNABE *delle morte improvise.*

(*q*) L. XII. p. 70.

(*r*) MISC. BEROL T. VI. p. 81.

(*s*) SPROEGEL p. 29. 44.

(*u*) WEPFER *cicut.* p. 213.

(*w*) SPROEGEL *Exp.* 31.

(*w**) WENKER *vuln. ventric. obs.* 1. HOFMAN *imprud. med. morb. caus.* ALBERTI *med. leg.* T. I. P. 2. p. 546. A tartaro emetico *Lett. al S. CURZIO* p. 23. Ab Euphorbio II. v. HEERS *obs.* 25.

(*x*) p. 13. 15. 17.

(*y*) p. 21.

(*z*) p. 28.

(*a*) p. 38. 39.

(*b*) p. 5.

(*c*) p. 34. 37.

(*d*) p. 48.

petho minerali (e) (cobaldo (f), sublimato mercurio capta (g). Etiam mechanica irritatione, ventriculus evertitur per omentum detractus (h), aut a pilis equinis (i), aspica fecalis (k) deglutita; a pluma. Ab erucæ pelle occisus canis (l), & a fabulo ventriculi gallinacei sumpto (m) mors secuta est.

Sed etiam solum frigus in potu nimium non solum ventriculum inflamat (n), sed pene subito etiam integerrimæ valetudinis hominis enecat (o). Convulsiones in integra familia ex cucumerum usu vidi supervenisse. Sic a melonibus, mitissimo cibo, unice ventriculum inflante, subitæ mortes (p), frequentes sequuntur; aut ab aliis ventriculum irritantibus, ut a lactis usu post vinum potum (q), demum a potu post magnam sitim largiori (r), qui sola copia ventriculo molestus esset.

Opium & sensum ventriculi tollit, & vim irritabilem minuit (s).

Ab acri ventriculi sensu deduco, quod ventriculus polypi neque plantas (t), neque propria, quæ sæpe devorat, brachia digerat (u).

Est autem etiam ea in re varietas. Sunt enim homines vix sentientes, quos acerrimis pharmacis necesse sit sollicitare, ut ventriculus ad vomitum moveatur. In Curonia jalapæ grana viginti vix alvum emonent (x). Nuce vomica Russi vomitum sibi movent (y), & eo finè vase ex arsenico confecto siamenses utuntur (z). Fuit, qui Euphorbi dimidiam drachmam ferret (a).

(e) p. 61.

(f) p. 63.

(g) p. 43. 44.

(h) VESAL. p. 603.

(i) BRUNING. *Singult. Exp.* 5.

(k) K. *Swensk. Wetensk. Handl.* 1759. p. 266.

(l) PLANQUE *bibl.* T. III. p. 567.

(l*) BIRCH T. IV. p. 342.

(m) LINN *amoen.* V. p. 59.

(n) HOFMAN *remed. benign. nox.* BLAS. P. I. *obs.* 21.

(o) CANIS SCALIGER VALISN. II. p. 172. POMPEJUS Card. COLUMNA apud MASINI *de abusu aq. geled.* p. 174. 175. FRANC. DELPHINUS *Ibid.* p. 154. add. VALISNER. II. p. 518. CARDAN. *subtil. exerc.* 33. SCHNEIDER *Catarrh.* L. V. p. 137. BOYLE *util. phil. exp.* p. 311. MARCELL. DONAT. L. IV. c. 6.

(p) PATIN. *valetud. tuend.* p. 354. 355. PANAROL *Pentec.* l. c. *obs.* 39.

(q) CHRYNE *valetud. infirm.* p. 43.

(s) ZUCCHELLI *relat. di Congo.* p. m 72.

(s) SPROEGEL p. 26.

(t) *Rejicit incoctas* TREMBLEY p. 129.

(u) TREMBLEY p. 113.

(x) LENTILII *miscell.* p. 214.

(y) *Relat. des voy. au Nord.* T. VIII. p. 285. *Idem* mercurio sublimato ad salivationem ciendam utuntur *Id.* & ex relatione CAMPBELLII olim nostri.

(z) *Hij. de l'Acad.* 1703. p. 52.

(a) PECHLIN. *Cent.* II. *obs.* 49.

Animalia pleraque multo homine robustiora sunt (*a*): equo (*b*) a croci metallorum uncia semis alvus modice purgatur, cani a drachma una. Satis memini canes, in nostris, & SPROEGELII, experimentis immensis demum præbiis opii (*c*) datis etsi varia symptomata excitarentur, non quam periisse: aliis a dosibus apud alios enectos fuisse non recuso.

Vegetabilia venena ut tithymalum (*d*), cicutam (*e*) aquaticam, phytolaccam (*f*) canes nostri vix senserunt.

Id crassiori villosæ tunicæ tribuas: quam ab acribus crispam & infensilem redditam accuses, quoties ad arsenicum, aliave venena ferenda longa consuetudo hominem aptum reddidit, quale quid de MITHRIDATE EUPATORE narratur.

§. XXII. *Vasa lymphatica ventriculi.*

Cum & in superiori arcu ventriculi (*a*) & in majori (*b*), glandulæ conglobatæ sint, in ventriculo etiam vasa lymphatica merito expectes. In arca certe minori vidi quam maxima (*c*), tendentia in ductum thoracicum, eaque & inflato in cellulosa (*d*) tela prope venam aliquam aere CASSEBOHMIUS ostendebat, vir sollertissimus, & per experimentum, quod tamen non describit (*e*), ILL, KAUF in omni parte ventriculi

(*a**) Diversus habitus animalium ad venena. Pleraque hominem robore superant. Canis a granis 30 vitri antimonii non purgatus est, neque 2 granis opii 17. dormit GARMAN.

Ovis, homine minor, tamen quadruplas fert doses. Tartari antimonialis grana 12. homini dantur, ovem etiam 22. non movent BOURGELAT *mat. med.* p. 43. Ursus ab uncia arsenici, & a multo mercurio sublimato nihil passus est *Hist. de l'Acad. des Sciences* ann. 1747. p. 54. Bos fert vitri antimonii unciam semis, & sex drachmas MAUCHART *de lue vaccar.* In equo doses purgantium ad humanas doses sunt octuplæ in agarico BOURGELAT in aloë 24 plæ, & in universum 24. plæ & 36 plæ MORIGI *refless. sopra l'Apol. di Perales* p. 37. & medicamenta demum post 24. horas equum purgant BOURGELAT *mat. med.* p. 38. & crocus metallorum tantum perspirationem movet. IDEM p. 21.

Infusum unciae vitri antimonii dosis est pro equo BONSI *ippiatr.* p. 115. & aloes sex unciarum, cum jalapæ drachmis duabus præscribit Osmer *diseas of hors* p. 106. Afari folia a semiunce ad unciam BUCHOZ *plant. de Lorraine* II. p. 47. Vitri antimonii grana 80. equum tamen vehementer purgarunt BOURGELAT p. 43. & grana 120 tartari antimoniati mulam p. 44. 45.

(*b*) NEUMANN *oper.* ed. ZIMM. p. 1473.

(*c*) Drachmæ *exp.* 15. 21. duæ drachmæ *exp.* 22. 23. resinæque opii tandumd. *exp.* 24. tum res denique drachmæ *exp.* 25.

(*d*) SPROEGEL *exp.* 6.

(*e*) *Exp.* 9. 11.

(*f*) *Exp.* 14.

(*a*) p. 125. Conf. etiam de his vasis ILL. MEKEL ad me p. 10. 11.

(*b*) Ibid.

(*c*) Habet PETSCHKE n. 83. versus oesophagum euntem.

(*d*) BOEHMER *Fasc. obs.* 1. *praf.* p. XV.

(*e*) KAUF n. 632.

Porro

pellucida vasa demonstrabat. Per arterias ea replet, & in ductum thoracicum usque ducit, ALEX. MONRO *Alex. fil. (f)*.

In animalibus varii generis paulo uberius dicta sunt (*g*).

Porro non lymphatica, sed omnino lactea vasa, in ventriculo (*h*) VESLINGIO aliisque (*i*) vetustioribus anatomicis dicta sunt, per pancreas (*k*) euntia, & ad lienem (*l*), hinc in cisternam (*m*).

Sed imprimis *Paulus Hyeronimus* BRUNI (*n*), in proprio libello, describit plurima vascula, quæ anno fere 1708. in cane viderit (*o*), ex fundo ventriculi nata, exeuntia in trunculos, per omentum versus hepar tendentia, ut versus jecur anserino calamo non minora sint (*p*): addit eadem eo loco in minora denuo vascula per hepar dividi (*q*); & injecto liquore conspicua; plena esse valvulis, quæ stylum ad hepar admittant, contrario ductu refutent.

Testes etiam sui inventi producit (*r*), in vitulo FELICEM SGALLUM (*s*); in ove MARINONIUM, & alios, inque verre. Etsi autem vasa chylifera (*t*) fuisse dicit; eaque dissecta chylum dimisisse, & candore suo conspicua fuisse addit, & diversa a lymphaticis; necesse tamen esse fatetur, ut continuo in calido animale res inquiratur, & oportere ligare venas vasque chyliferum, canemque esse pendulum, & inania vasa sanguinea (*u*).

Ea esse vascula pergit, per quæ brevi via aquæ acidulæ ad sanguinem veniant: & ob eam causam supervivere, quibus ob clausum ventriculi exitum nihil ad intestina, neque ad vulgata vascula lactea venit (*w*). Olim DOLÆUS scripserat, in variis animalibus aquam, quæ ventriculum replevisset, in vasa omenti ventriculo adtenfa transiisse (*x*).

(*f*) *Vas. lymph.* p. 39.

(*g*) In ruminantibus habet PEYER *merycol.* p. 88. 709. in aliis animalibus RUDBEK *fig. post.* 5. NUCK *ib.* p. 143.

(*h*) *Ep. posth.* p. 62.

(*i*) WHARTON *adenograph.* GLISSON *de ventric. & intest.* c. 3. p. 134. Etiam per omentum BROEN. NILOE *de ferment. & nutrit.* qui non est ad manus.

(*k*) RHOD *mantiss.* n. 31. GLISSON.

(*l*) Apud DEUSING *alim. depur.* n. 18.

(*m*) GLISSON.

(*n*) *Esame d'alcuni canaletti.*

(*o*) p. 18. seq.

(*p*) p. 20.

(*q*) p. 21. 49.

(*r*) p. 29. 42.

(*s*) p. 20.

(*t*) p. 42.

(*u*) p. 46. 47. 48.

(*w*) p. 95.

(*x*) KLAUNIG *obs.* 15.

Haller *Physiolog.* Tom. VI.

X

Verum alba quidem in ventriculo vasa nuperior industria non (γ) reperit, neque admiserunt viri in vivis animalibus incidendis plurima experti; & ipse Cl. BRUNI (α) tamen de proprio experimento dubium se esse demonstrat, neque testimonium dicere voluit, quem socium suorum experimentorum dixerat, PALATIUS (α).

Et ego in cane vasa lymphatica ab omento in ventriculum venientia vidi, qua sede eorum erant trunculi.

§. XXIII. Pori inorganici.

Avide ejusmodi poros physiologi aliqui quæsierunt, per quos credebant, phænomena aliqua commode explicari, celerem nempe aquarum medicatarum ad venas commeatum; hydropici laticis per intestina, & imprimis per vomitum celerrimam expurgationem (a^*), earundem aquarum a cibis receptum odorem (b), fetidi fetus & putridi pædorem in vomitu matris conspicuum (c).

Non hic poros volumus, qui in venas ex ventriculi cavea pateant. Sed poros, qui per ipsam naturam solidam partium ventriculi faciant sibi viam: Et primo patent a cavo abdominis, sive a membrana ventriculi externa, in ejus cavum pori. Nam in experimentis, ventriculus inversus, & in aquam demissus, aquam infusam sorbet per villosam tunicam, & per extimam membranam guttatim dimittit (d).

Deinde contrario ductu ostenditur, poros aliquos ducere a cavo ventriculo, per ejus externam tunicam, ad abdominis cavum. Nam ventriculus absque inversione, aquam, qua repletus fuerat, clausis ostiis, per villosam tunicam sorbtam de omni, ambitu externæ tunicæ pariter dimisit, minimis stillis (e). Inversus & repletus, cum nunc peritonæum esset in-

(γ) DRELINCOURT *canic.* 11. 17. BRUNNER *de duoden.* p. 61. J. Henr. PAULI in egregio libro *anat. Bilfianæ anat.* p. 49. 51.

(α) p. 74.

(α) p. 24.

(a^*) *Obs. of a Societ. at Lond.* T. II. p. 298. MARCELL. DONAT. *hist.* p. 424. *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 9. 10.* p. 57.

(b) *Hist. de l'Acad.* 1721. *hist.* 1.

(c) La MOTTE *obs.* 238.

(d) KAAUW *de perspir.* n. 189. 190. VIEUSS. *nov. vas. syst.* p. 33. 34. MORIN. p. 201. *Mém. de l'Acad.* 1701. p. 201. Conf. etiam de experimento MONCONIS *voyag.* T. II. P. 2. p. 47. & imprimis J. Guill. PAULI *progr. de syst. Wolf.*

(e) KAAUW n. 563. MORIN. *ibid.* p. 200. MERY *Hist. de* 1700. p. 12.

terius, & aquam sorberet, aquam etiam transmisit, minus quidem celeriter (*f*).

Vias autem peculiare esse creditum est, quod eas aer (*g*) non sequatur, etsi aquæ patent: similesque etiam in urinaria vesica, paria per experimenta ostenduntur, & in intestinis.

Satis novi, vulgo hæc ita exponi (*h*), ut in ventriculo inverso aqua in vasa nunc resecta, & ostiis suis apertis introrsum patula, resumatur: deinde per villos exhalantes (*i*) jam ostensos destillet: Et contrario modo in ventriculo non inverso per villos venosos (*k*), pariter ostensos, resorbeatur, & per truncos vasorum extus resectos, depluat.

Sed repondet ILL. KAAUWIUS (*l*), omentum, & quæ lienem & reliqua, quæ poterant facere, ne externa vasa hiarent aperta super ventriculum se congestisse, & tamen eundem fuisse experimenti successum: & J. G. PAULI manifesto confirmat, non per vasa, sed undique aquam perstillare (*l**).

Mihi res videtur simplicissima. Cutis ipsa, absque illa de truncis resectis suspicione, & corium, nisi crassissimum fuerit, aquam, & potissimum calidam transmittit (*m*). Et bilis manifesto per vias non vasculosas in exteriorem faciem vesiculæ penetrat.

Utique ergo, ut in aliis corporibus, ita in nervea ventriculi, & in peritonæo pori sunt inorganici, quos aqua penetrare idonea est. Omnes membranæ corporis humani, quæ saccum faciunt, inversæ aquam dimittunt (*n*). Vesicæ apud tonsores pannorum flocculis replentur, & ova salinariorum in muria cocta saliantur.

Num ideo in vivo animale humor per eos poros vere penetret, possit dubitari. Ostenditur, vesicam urinariam plenissimam repertam esse, absque ulla lotii in abdomen effusione, cum exitus urinæ per ureterem interceptus esset. Ventriculus ob clausum pylorum, cibis & potui imperius (*p*), extenditur in immensam molem, indicio, potum non adeo

(*f*) J. H. PAULI.

(*g*) MERY. *hist. de l'Acad.* 1700. p. 13.

(*h*) LANGOUTH. n. 30.

(*i*) p. 137.

(*k*) Ibid.

(*l*) n. 19.

(*l**) L. c.

(*m*) Conf. L. XII. p. 35.

(*n*) DEIDIER p. 74.

(*o*) FRANK *diapedes.*

(*p*) p. 136.

facilem viam reperire, per quam effugiat. In aquam hydropicam potus se non admiscet, quæ coagulabilis sit indolis, quale nihil bibimus. Et in sano homine, etsi plurimum bibit, præter vaporem nihil est in abdomine. Cum cæruleo pigmento ventriculum vivi canis replem, tinxit lactea vasa, cæterum in abdomen is color non exiit, neque se, ut fuerat necesse, suo colore extulit.

Crediderim in Cl. virorum experimentis pondus aquæ vim ejus penetrabilem adjuvare. Et in cadavere, uti continuo, exhalante aquula privata, membranæ nostræ ficcantur, ita pori inanes nascuntur, in quos aqua subit, quos in vivo animale aqua replebat, vaporve viscidulus. Etiam per experimenta certum est, in animale, cui clausum est abdomen, & omnia compressa, minus bene per villos aquam in ventriculum penetrare (q). Aliquid viam sibi facere posse, quando via per pylorum clausa est, & urgat externa pressio, non negaverim: aliquid etiam valde tenue id iter legere non recuso; patulam esse viam, & memoria dignam copiam aquæ transmittere non video.

SECTIO II.

FAMES ET SITIS.

§. I.

Inevitable hic reperi vitium in ordine, quo ciborum coctionem propono. Aliqua enim supersunt prius explicanda, ut famis sedes & causa intelligatur. Et tamen famem prius exponere necesse est, quam cibos recensamus, qui ob famem sumuntur, aut eorum ipsorum ciborum coctionem exponamus. Quare superest, ut caveamus, ne recipiamus aliquid, quod verum non sit; quin posteriori loco plenius aliqua retractemus, evitare non poterimus.

§. II. *Necessitas ciborum potusque.*

In eo sapientia animalium conservatrix elucet, quod ad ea; quæ ipsis utilia sunt, & præmiis adliciantur, & cogantur poenis. Vitam animalis.

ad definitum terminum protrahi DEO visum est : Sed eo protrahi nequit , absque cibo & potu. Ergo invitavit nos suavi gustu , qui est in cibo fumendo potuque : & eam suavitatem auxit in ratione necessitatis. Malignus est divitis otiosi appetitus , quem vix ex ultimis Indiis repetita aromata fuscitent. Rustico ab aratro reduci , venatori qui velocia animalia pertinacia insequendi superavit , tanta est in nigro & vetusto pane edendo voluptas , aut in aqua frigida haurienda , ut omnes Petroniorum delicias superet , quando naturæ satisfacit.

Et tamen CREATOR hominem , & perinde animal , ad quietem & inertiam pronum , cui labor molestus sit : noluit soli voluptati regendum permittere. Addit adiutorem severissimum sensuum , dolorem , summum , immanem , intolerabilem quem ut vitet , etiam pigrum animal potum quærat , & pro cibo laboret. Oportet autem sermonis facere initium ab ea ipsa necessitate , propter quam OPTIMA RERUM natura divina his tormentis nos iussit esse obnoxios.

§. III. *Decrementum humorum & partium solidarum.*

Cum homo quotidie , modicis positis calculis , ad uncias quinquaginta per cutem perspiret (a) , & tantundem fere per lotium amittat (b) , aliquid etiam per alvum , per sputum , aliisve modis ipsi decedat , facile intelligitur , non posse fieri , quin corpus insigniter decrescat , si nihil redderetur amittenti.

Omne famelicum animal amissam partem sui macie fatetur : & pondere evidentissime minuitur , etiam quatuor in viginti quatuor horis libris (c). primus adeps disparet , celeritate incredibili (d) : sic pisces hieme macilefcunt , & testudines (e) ; & marmotæ vere macilentæ sunt (f). Macilentissimæ (g) fuerunt asitæ illæ feminæ omnes , quarum historiæ continuo legentur. Qui fame perierunt , in iis fasciculum fibrarum nitidissimi , & quasi argentei fuerunt (g*) Sed omnino brevi & lac (h) desi-

(a) L. XII. p. 68. inter uncias 60. & 30.

(b) Ibid.

(c) ROBINSON *Essay* II. p. 454. ad uncias 42. & 48. *on food and discharg.* [p. 84.

(d) In alaudarum exemplo L. I. p. 41.

(e) *Oeconom. Nachricht.* T. VI. p. 329. seqq.

(f) *Hist. des terres austral.* T. II. p. 68.

(g) *Ray Wisdom of God.* p. 292. Sed conf. L. I. p. 41.

(g*) *Præf. ad hort.* p. LIV. Ancylosis & summa macilentia in puero , quem mater substracto cibo necare volebat KAAUW *impet. fac.* n. 456.

(h) Vide iconem in Cl. LOSSAV. *casu ined.* LOSS. *obs.* 21. L. I. &c.

nit generari, ut solum antiquum & rancidum supersit, & semen, & pus (*i*) nunc cessant suppeditari. Etiam alii humores peculiare nulli nunc parantur, & serpentes (*i**) absque periculo mordent.

Ipsa autem sanguinis materies, non solus adeps evanescit. Nam inedia refrigerat in principio, cum a sanguine calor sit (*k*). Et in homine a fame enecto venæ non conspicuæ, inque ipsa vena cava sanguis fere nullus fuit (*l*).

Hanc partem decrementi manifestissime in ranis vidi, quibus sicubi jejunæ incidebantur, dimidia fere vasa (*m*), arteriæ pariter venæque, inania erant, paucis flavisque globulis relictis; quæ ipsæ ranæ, quoties bene pastæ experimento subiciebantur, ruberrimo sanguine plenas habebant venas. arteriasque.

Sed & causa virium, quæcunque demum ea sit, & a fame dispareret (*n*), & sarcitur edendo. Mirum est, quam celeriter jumenta, ad mortem usque fatigata, a bono sibi que proprio cibo, aut a spirituofo vino, vires ad laborem iterque recuperent. A fame deliquia animi (*o*). Omnes illæ jejunatrices, nam fere feminae sunt, quæ absque cibo vixerunt, debilissimæ (*p*) eadem lectoque fere adfixæ fuerunt: debilissima etiam animalia (*q*), quæ diu absque cibo vixerunt: debiles & emaciati homines, quibus ob ventriculi vitium cibus maligne ad sanguinem pervenit (*q**),

§. I V. *Humorum acrimonia spontanea.*

Prima ergo cibi sumendi necessitas fuit, ut materies humorum humanorum, & proculdubio etiam partium firmarum restitueretur: quam in pueris, & iis

(*i*) KNIGHT *vindic.* p. 83.

(*i**) BIRCH l. c.

(*k*) Ad quatuor gradus in biduo MARTIN. *anim. simil.* p. 224. Sic frigida fuit jejunatrix J. NAUNTON. BIRCH T. II. p. 387.

(*l*) DIEMERBROEK *anat.* p. 299. HARTMAN *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 7. obs.* 18. Ab inanitate venarum famelicos interire GALEN. *usu part.* L. IV. n. 7.

(*m*) *De motu sang. Exp.* 71. 73. 74. 75. 78. 81. 84. 86. 172. 182. 218. 219. 225. 226. 233.

(*n*) Arabs in deserto languens THEVENOT T. II. c. 28.

(*o*) GAGE in *agem. Reis.* p. 658.

(*p*) JOHANNA NAUNTON BIRCH T. II. p. 387. SIBBALD *append. to the natural. hist. of Fife.* FANTON. *diff. anat.* p. 39. BIRCH. T. II. p. 387. RAULIN *obs. de med.* p. 250. Sic qui sola eucharistia se sustentabat erat debilissimus LORRY *des alim.* p. 241.

(*q*) Canis STALPAART l. c. Serpens caudifonus BIRCH T. II. p. 393.

(*q**) FANTON. *diff.* p. 36. &c. Conf. de vitiis œsophagi p. 100. 101.

omnibus, qui incrementum suum nondum abfolverunt, ex cibis necesse fit repeti: & in adultis etiam, plenæque staturæ mortalibus, pro iis particulis solidis suffici (a), quas ostendemus & ipsas multo vitæ usu deteri.

Sed celerior est altera necessitas. Nempe & sanguis noster, & omnes humores humani, ex sua indole ad salis urinosi naturam proclives, sibi relictæ (b), calido loco, celeriter, putrescunt, acres fiunt, & ad vitam alendam ita inidonei, ut continuo, vel a levi illa in modica febre subnata putredine, & ventriculi, & intestinorum motus peristalticus destruat. Pereunt ergo cibo destituti homines, etsi sanguinem in vasis habent (c).

Neque in humoribus de corpore animali exeuntibus solis hanc degenerationem locum habere: sed eam in vitæ exercitio (d) etiam celerius supervenire, omnia docent.

Ostendimus, etiam modico a jejunio fætere animam (e), etiam in purissimo femina corpore. Sic lac continuo rancescit, & urinæ intoleranda fit acrimonia. Angli (f) & olim BONTÉKOE lotium suum bibebant in alto mari (ab omni aquæ commeatu femoti, ut sitim sedarent: sed ea paucis diebus ita acris facta est, ut bibere nequirent, & sanguinis modo ruberet.

Sed diutius si inedia protracta fuerit, ab erosione ut videtur nervis, dolores non tolerandi nascuntur (g), & vasa rumpuntur, ut hæmorrhagiæ narium (h) superveniant, & sanguis in ventriculum avicularum effusus visus fit (i), inque intestina (k). Celeriter etiam mens emovetur (l), & morositas primo atque mentis pene alienatio (m), & epilepsia, inde

(a) L. XXXI.

(b) L. V. p. 83. 84.

(c) In LEHNELSÆ & SCHREYERÆ exemplis.

(d) L. V. p. 84. 85.

(e) L. XVIII. p. 53. Os scorbuticum & ginginæ cruentæ in jejunatrice Johanna NAUNTON BIRCH T. II. p. 386. Capræ insulæ adscensionis, quæ non bibunt, non sunt edules OSBEK resa p. 290.

(f) Voy. aux terr. austr. T. I. p. 187. & nuper ann. 1762. in Lond. Chron.

(g) BIRCH T. II. p. 381.

(h) In historica addita T. II. Itin. ROBINS. CRUSOE.

(i) HARTMANN l. c.

(k) CASP. a REYES p. 736.

(l) Die tertio in sylva L. Mag. 1752. & quarto Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 2. Sub ruinis die septimo BOCCON. obs. di fific p. 5. & fere perinde, Lond. Chron. 1759. p. 315. Die decimo L. Mag. 1735. p. 627. in fodina.

(m) CHARDIN. Voyag. T. VII. p. 355.

(n) WAINEWRIGTH of meat. p. 172.

demum delirium [n], deinde plenus furor [o] superveniat, mortemque fere præcedat.

Quare ut ab acuto aliquo morbo, ita ex fame, homines celeriter pereunt, eo promptius, quo quisque junior fuerit [p] & robustior, Sunt, qui primo [q] secundo & tertio [r] & quarto [s] die perierint, ut inter COMITIS UGOLINI filios, quos Pisani in carcere necarunt, juniores priores exanimati, reliqui, & quo adultiores, eo diutius vixerint [t], & die quinto & sexto [u] interierint: Pater ut omnibus ætate provectior, octavo nondum elapso [w] vitam reliquit. Melancholicus qui ad septimum diem cibo & potu abstinuit [x] eo die exspiravit. Alii septimo [y] extincti fuerunt, aut nono demum, ut princeps Sueciæ nycopingiæ in carcere desertus [z].

Undecimo hominem perire PLINIUS [a]. Decimo tertio die obiit melancholica virgo haarlemensis [a*], & 19. demum, qui voluntaria fame vitam abdicabat [b]; & vigesimo gravida, quæ omnia revomebat [c]; & vigesimo primo puerpera [d]; & demum die 28mo alius [e].

§. V. *Cur animalia & homines nonnulli diu absque cibo obdurent.*

Non possum hic omittere exempla tot hominum & animalium, quæ diu absque cibo demum etiam absque potu supervivunt. Neque enim rationem alioquin reddere possem, cur fames necessario enecet, & tamen aliquibus cum conditionibus eadem diutissime toleretur.

(o) LERY *voy. de l'Amer.* p. 409. BORELL. *Cent. III. obs.* 81. (die 3.) RADZIVIL *Itin. Palæst.* p. 19. TULP. L. I. c. 43. *Voy. à la mer du Sud.* p. 145. TULP. l. c. 43. *Lond. Magaz.* 1752. M. Oct. KAAUW *impet. fac.* n. 456.

(p) In scopulo *Aug.* a LAURENTIO *discept.* I. p. 30.

(q) Juniores inedia minus ferunt CELSUS.

(r) Ibid.

(s) CARDAN. *in aphor.* n. 42, SALA *Alim. facult.* II. p. 32.

(t) CARDAN.

(u) SALA l. c.

(w) CARDANUS SALA.

(x) MARC. DON. p. 364.

(y) SANCASSANI *dilacidaz.* p. 90. *Conf. Lond. Chron.* l. c.

(z) Eruditiss. & disertissimus DAHLIN *in historia Suecica* T. II. p. 402.

(a) L. XI. c. 54.

(a*) PAW. *Ep. XIII.* CRAANEN p. 223.

(b) ALBERTI *med. leg.* T. I. 372.

(c) STALPAART *Cent. II. obs.* 15.

(d) HOR. AUGEN. *de vena scē.* L. VI. p. 239.

(e) KAAUW *Impet. fac.* n. 456.

Et

Et primum infecta (*a*), ut hieme nihil amittunt, ita nihil edunt; ut polypi (*b*), vespæ (*c*), hirudines in aqua (*d*) servatæ, pisces in limo sepulti (*e*), aut in aqua sola, qui toto anno (*f*) edurant.

Sic papilio, brevi equidem vitæ destinatus (*g*) absque cibo vivit (*h*); & vermis casearius ad septimum mensem supervixit, ut etiam transformatione sua defungeretur (*i*), Oestrum pari quidem ex causa ne os quidem habet (*k*). Formicaleo (*k**) sex mensium jejunium tolerat: & hirudo bene pasta etiam octo mensibus demum elapsis cutem, ut fugat invadit (*k***). Araneæ ad multos menses cibo carent (*l*), tum scorpius (*m*), & cancer marinus (*n*) totis 18. mensibus.

Sic etiam classis serpentum, aut quadrupedum frigidorum, absque cibis diutissime victitat, ut vipera & caudifona (*o*), & vulgaris (*p*, & cerasces (*q*), & anguis (*r*). Salamandra per annum (*s*), chamæleon tantundem (*t*),

- (*a*) LYONNET *theolog. des Insect.* p. 255. REDI *anim. viv.* p. 57.
 (*b*) TREMBLEY p. 114. 116. BAKER p. 137.
 (*c*) REAUMUR *hist. des insect.* T. VI. p. 268.
 (*d*) VALISNER. T. II. p. 451. ad tres annos PLEMP. *valet. togat.* p. 237.
 (*e*) *Oeconom. Nachricht.* T. VI. p. 329. seq.
 (*f*) BATHURST *pralect.* p. 201. PERRAULT *Ess. de phys.* T. III. p. 169.
 (*g*) Octo dierum de GEER p. 246.
 (*h*) REAUMUR *Mém.* T. I. p. 640. GEOFROI T. II. p. 5. *Tr. des meuriers blancs* p. 64. De GEER. *Mém.* II. p. 55. du HAMEL *insect. de l'Ang.* p. 24. 25. Nisi florum aliqui succum degustant, nam saccharum amant SWAMMERDAM. Nempe iis animalibus, quando in volatilem naturam transeunt, ventriculus & intestina arctantur SWAMMERDAM p. 678. Neque post venerem locustæ edunt ZINANNI *cavalett.* p. 48.
 (*i*) *Hist. de l'Accad.* 1702. p. 25.
 (*k*) REAUMUR T. VI. p. 354. *Mém. de 1704.* p. 238. periit tamen.
 (*k**) GEOFROI *Inf. aut de Paris II.* p. 431.
 (*k***) K. Sw. *wetensk. Handl.* 1760. p. 135.
 (*l*) JOBLOT I. p. 105. Diu ARISTOT. *hist. anim.* L. VIII. c. 4.
 (*m*) *Hummer* KALM. *americ. resa I.* p. 81. 82.
 (*n*) REDI.
 (*o*) Quinque, sex mensibus MEAD. *of poisons.* p. 12. Quatuor TYSON *Phil. tr. n.* 144. Tribus quatuorve mensibus SEVERIN. p. 250. Sex mensibus JOBLOT. I. p. 102.
 (*p*) Multis mensibus VALISN. III. p. 47. Novem mensibus REDI *viper.* p. 22. Decem de *anim. vit.* p. 55. Undecim mensibus DE SAULT *de la goutte.* p. 63. Addit PERRAULT l. c. etiam crescere. Anno integro *Mém. de 1704.* p. 173. Captos non edere CHARAS p. 5.
 (*q*) Quinque annis SHAW. p. 429. ut etiam cutem mutaret: periit tamen ultimo BIRCH T. II. p. 393.
 (*r*) Quinque mensibus SEVERIN. p. 247. decem BELLON. *obs.* p. 219.
 (*s*) JACOBÆUS p. 117.
 (*t*) Quinque mensibus PARISINI. Anno BELLON. l. c. add. PECHLIN. p. 389.

& lacerta (*u*), & crocodilus captus (*w*), perinde vitæ absque cibo tenaces fuerunt. Ita ranæ in aqua sola (*x*), aut in hibernaculo lutofo (*y*), ore optime clauso, & absque motu (*z*), etiam per annum cibo carent (*o*). Etiam diutius vivunt testudines & ad octodecim menses (*b*).

Inter calida animalia, aliqua ob pigritiam (*c*) longo etiam tempore absque cibo vivunt; glires hibernantes tota hieme (*d*) per inediam transigunt: tum melis (*e*), mus montanus, ursus (*f*). Manis duobus mensibus absque cibo fuit (*g*).

Minus ferunt cibi desiderium agilia, & calidi sanguinis animalia, & tamen cum pleraqua homine robustiora sunt, famen, ut a sua vitæ conditione vix separabile malum, norunt fatis diu tolerare; lupus ad quinque dies (*h*): Ossifraga diebus septem (*i*), catus sylvestris diebus viginti (*k*); conis ad 25. dies (*l*), & ad 41 (*m*), phoca quatuor septimanis (*n*). Capo jam octavo die interiit (*o*).

(*u*) Id. p. 118. Bimestri tempore PARIS. octo mensibus REDI *anim. viv.* p. 12.

(*w*) Octo mensibus RICHER. *voyag. de Cayenne* p. 323.

(*x*) JACOBÆUS p. 118. Quatuor mensibus BLANCAARD *Jaarregister I. Cent. IV. n. 69.*

(*y*) VALISNER. T. II. p. 436. *Lettres édifiantes* T. XVI. p. 10. FROGER *voy.* p. 150. *Phil. transf.* n. 194.

(*z*) *Oeconom. Nachricht.* T. VI. p. 335.

(*a*) BATHURST l. e. p. 197.

(*b*) CALDESI p. 30. REDI *anim. viv.* p. 55.

(*c*) Haut sive ignavus ad tres septimanas THEVET *Franc. antartique* p. 976.

(*d*) SARRAZIN. *Hist. de l'Acad.* 1714. p. 27. In domo educatus excitabatur singulo triduo & quadriduo, & edebat FANTON. Ed. II. p. 41.

(*e*) BUFFON. T. VII. p. 107. Mense integro REDI *anim. viv.* p. 55.

(*f*) SARRAZIN l. c. ÆLIANUS *anim.* L. VI. c. d. HILLERSTROM *jämtelands diur. fänge* p. 15. CHARLEVOIX *hist. nat. de la nouvelle France* T. III. p. 117. HILLERSTROM *lappornas biornfänge Beskr af Satacunda bürad.* p. 64. Vulgo creditur de glandulis in pedum planta lacteum succum sugere BUFFON T. VIII. p. 161. ÆLIANUS. RUGE *förnuftige tankar.* CHARLEVOIX. LEHMAN *Berg. Chronica* p. 340. BOYLE *de frigore* p. 23. Sed repugnat exemplum glirium, & murium montanorum, quibus similis hiemis absque cibo tolerantia, neque ejusmodi penus est. Neque habent accuratiora scire idonei viri FIELLSTRÖM & HILLERSTRÖM, aliamque dat iste rationem, pilas resinæ & foliorum abietis & formicarum devoratas, & motus peristaltici defectum add. *Satacunda härad.*

(*g*) K. SWENSK. *Acad. Handl.* T. X. p. 267.

(*h*) FABER ad *hermandez* p. 488.

(*i*) CAII *anim. rar.* p. 87.

(*k*) REDUS *anim. viv.* p. 55.

(*l*) IDEM *ibid.*

(*m*) *Hist. de l'Acad.* 1706. p. 6. paucissimo cum cibo.

(*n*) REDI *insect.* p. 124.

(*o*) *Anim. viv.* p. 54.

§. VI. *Homines diu jejuni.*

Univerſa hiſtoria medica a primis temporibus plena eſt hominum, ſed potiffimum feminarum, quæ menſibus integris, demum annis, abſque cibo vixerunt. Neque, ſi fraudulentæ aliquæ hiſtoriæ (a) intercedunt, quarum aliquam ipſe vidi (b), neganda fides eſt veris rerum documentis, cum præterea nuperis temporibus ſumma cum cura obſervati (c) homines, abſque cibo, potu, & excrementis, diu vixerint.

Tres quatuorve dies jejunant gaſpeſii (d), quoties eos dira urget neceſſitas. Quarto die ſervatus eſt qui in ſcopulo vixerat (e). Quinti diei perfectio jejunio ſanata ſtulta (f). Quinto die vivebat, & refocillatus eſt ille in deſerto Arabs (g). Quintum in diem & ſextum fames (h) toleratur a Tartaris (i), & ad ſeptimum (k): tum ab eo qui ſub nive vixerat (l), & ab alio (m), ut iter acceleraret voluntario jejunatori; & ſunt in Græcia calojeri, qui non ultra ſexies in jejunio quadrigeſimali cibum admittunt (n). Octavo die puella, quæ ob impactam gulæ teſtam abſque cibo & potu fuerat, ea ejeſta convaluit (o).

Octiduo jejunatores aliqui ſacri obdurant, etiam ſæpius repetito periculo (p); & novem diebus in India (q). Nono die (r), & decimo ſuperfuit caſu (s) iſte; alterque voluntarie aſitos (t). Duodecim dies in

(a) REGIUS *phyſiol.* p. 17. WIERUS *de jejun. commentit.* HILD. *Cent. V. obſ.* 33. qui & alias hiſtorias habet, tum SCHURIG p. 220. add. SWALWE *querel. ventric.* p. 82. 291.

(b) *Chriſtianæ* KRAZER in arce thorberg ſervatæ, quæ ad cibum rediit, cum ſeverior præfectus ſucceſſiſſet indulgenti. Exſtat de ea libellus Cl. RITTERI.

(c) Cuſtodes adhibiti HAMILTON *voy to Eaſt. Ind. I.* p. 153. tum in hiſtoria puellæ ſpirenſis, Apoll SCHREYERÆ, Johanna IEHNFELS. *Puer Journ. de Méd. T. 17. P. 441.*

(d) Le CLERK *nouv. deſcr. de la Gaſpeſe* p. 108. Quatuor etiam diebus ille apud C. REYES p. 732.

(e) *Aug.* a LAURENTIIS l. c.

(f) PLANQUE *bibl.* l. p. 60.

(g) THEVENOT.

(h) SAAR. *Oſtind. Reiſ.* p. 125.

(i) *Voy. au Nord.* T. VI. p. 455.

(k) SWALWE *querel. ventr.* p. 84.

(l) *Phil. tranſ.* n. 337.

(m) BLOKS *bedänkiande ofwer Eſthers Iobns dottars foſtrande* p. 9.

(n) De BRUYN *Kleyn azien* p. 71.

(o) HOOGLIED *wondſchouw.* p. 195. Octo diebus in febre PISONI *ſpicileg.* p. 169.

(p) STELLA *del tabacò* p. 303. & apud MARC. DON. L. IV. c. 12. & SCHURIG *Chyrol.* p. 185. FABER p. 734.

(q) FRYE *trav.* p. 103.

(r) *Lond. Chron.* 1759. p. 315.

(s) BOCCONE *muſ. di fiſic.* p. 5. Strangurioſus PISONI l. c.

(t) Melancholicus apud FABRUM & hystérica apud La METTRIE p. 6. Add. RHOD obſ. 55. & 57.

apositia (u) superati; & vita in alio exemplo cum minimo cibo (w) tolerata. Quatuordecim dierum jejunium in melancholico (x). Decimo quinto die (y), & decimo sexto alius servatus est, qui sub ruinis vixerat, sed in equidem homines brevi vitales superfuerunt (z). Diebus quindecim (a) ex odio, & etiam viginti alia cibis abstinuit; & 17. diebus melancholica (c). Dies 18. absque cibo vixit scorbutica (d): Dierum undecim 20. & 30. in ediam toleravit, qui se Clementi XI. obtulit (e) & 25. diebus, sed isti aqua adjuti (f). Dies 27. cum perpetuo vomitu (g) cibo alius caruit. Post trigefimum jejunatrix vestalis servata est (h). Ad mensem sola cum calida supervivunt in Madure, provincia chersonesi coromandelicæ (i). Ad mensem etiam solo cum potu puella Valisnerio dicta (k). Ad trigefimum quintum diem absque cibo, aqua cum spiritu nitri sumta, phthificum hominem sola aluit (l).

Paucissimo cum cibo, sed frigido loco, homines aliqui ad 35. diem vixerunt (m). Alius 22. dies etiam potu abstinuit, ex tristi adfectu (n), & subinde ad 20. & 25. dies alia (o), & ad 30. (p), & 33. (p*), & (q) denum ad quadraginta. Vetusta est. *απνους* illa HERACLIDIS (r), quæ cum absque spiritu quadraginta dies vitam toleraverit, procul dubio & absque

(u) *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. P. I. obs. 51.*

(w) PONTOPIDAN. *Hist. Norveg. p. 177.*

(x) PLOT. *nat. hist. of Stafford hir. p. 287.*

(y) *Hist. de l'Acad. 1706. p. 6.*

(z) RZACZYNSKI *Hist. Natur. Polon. p. 372.*

(a) HELWIG. *obs. 73. And. SILVA Conf. 18.*

(c) HELWIG *obs. 9.*

(d) De GORTER *de fame & siti p. 50.*

(e) CARDAN *subt. p. 357.*

(f) BIRCH T. IV. p. 208.

(g) MATTH. *de GRADIBUS.*

(h) LABAT *voy. d'Italie. T. IV. p. 102.*

(i) *Letr. edif. T. XVI.*

(k) *Gal. Min. T. VII. p. 153.*

(l) CHEYNE *Diseas. of bod. and mind. p. 109.* Asitiæ exempla plurima. Dierum 22. in hysterica PASTA in *aphor. p. 19.* mensis integri SAUVAGES nosol. II. P. 2. p. 236. Dierum 34. deinde 54. ex mærore Act. Edimb. V. P. II. n. 43. Dierum 40. SAUVAGES I. c. p. 319. & quadraginta quinque *Diar. Venet. I. p. 7.* Dierum 54. etiam absque potu G. v. SWIETEN IV. Vita per quatuor annos sola aqua sustentata *Hist. de l'Acad. ann. 1761.*

(m) *Phil. trans. Vol. 49. P. 2.*

(n) PANAROL. *Pentecost. V. obs. 201.*

(o) *Journ. de med. 1756. Maj.*

(p) SIBBALD *app. to the natural hist of fife.*

(p*) *Hysterica Journ. de med. T. 17. 435.*

(q) Absque potu BIRCH T. II. p. 389. etiam repetito.

(r) *Conf. L. VIII. p. 266.*

cibo fuit. Eisdem quadraginta dies ex superstitione aliqua eduravit G. BERNHARDI, quam nobis historiam memini ILL. olim collegam nostrum RICHTERUM (s) memini narravisse, etsi & alibi descripta exstat.

Melancholica puella menses integros absque cibo & potu vixit (t). Ad diem quadagesimum sextum (u) sed aqua usus, ægrotus superfuisset VALISNERIO dictus. Pene nullo cum cibo, femina 50. (w) demum die interiit. Solo pene potu ad 55. diem vita (x) protracta. Dies 34. deinde 54. ex moerore alia cibis abstinuit (y). Mors post asitiam duorum mensium ex tuberculis os ventriculi cludentibus (z) natam. Ad duos menses protractæ inediæ alia est BORELLI historia (a). Ad 69. dies ante mortem cum delirio (b) apositia. Decem septimanarum etiam absque potu (c).

Johanna NAUNTON nobilis virgo (d), sed indigens, cibis abstinent, ne paupertatem fateretur, & 78. diebus vix nisi succo limonum se sustentavit. In melancholica multarum septimanarum abstinentia (e). Ad 72. etiam dies femina in caverna sola cum pluvia vixit (f). Virgo alia ab omni cibo per 80. dies abstinuit, sola aquula contenta (g).

Et magis, atque magis miraculum crescit. Quatuor mensibus absque cibo & potu vixit Margaritba LAUWERIA nostra (h) : ad sex menses alia virgo (i), & ex spasmo cynico alia (k), & alia octo mensibus,

(e) De morte sine morbo p. 16. DETHARDING de inedia 40. dierum. In descriptione asitiæ ESTHERIS DÖBEL & Bresl. Saml. 1719. M. Sept. Similes sunt historiæ apud CARDANUM venen. p. 320. & HEINRICI ab HASSELT. apud WIERUM de comment. jejun. p. 761. PAW Epist. p. 13 cum aqua tamen, & in Nouv. de la Rép. des Lettres 1685. Febr. & Episcopi spirensis a PONTANO descripta, & in hysterica Opusc. scient. XIII. p. 462. & apud PLOT l. c. p. 287. & in gravida HILD. Cent. IV. obs. 30. Ad diem 45. cum potu ORTESCHI diar. p. 7.

(t) STALPAART v. der WIEL. Cent. II. obs. 15. Similis historia est apud. VALISNER. T. II. p. 501. ex CESTONO.

(u) Oper. T. II. p. 509. Tantundem dies jejunavit alius ALEXANDRUM BENEDICTUM oper. L. XI. c. 10. & 42. dies : alius cum aliquo potu apud G. v. SWIETEN T. III. p. 508.

(w) FANTON. diff. anat. p. 39.

(x) RAULIN. obs. p. 270.

(y) Essay of a societ. at Edimb. V. P. 2. n. 43.

(z) FERNEL Pathol. L. VI. c. 1.

(a) Obs. 34. Cent. III.

(b) Journ. de med. 1757. Febr.

(c) PLOT natural histor. of oxfordshir. p. 200.

(d) BIRCH T. II. p. 386.

(e) LOSS obs. 21. L. I.

(f) REYES Quest. 58.

(g) HAMILTON l. c.

(h) Sig. KOENIG in historia ejus morbi p. 8.

(i) VANDERMONDE Journ. de med. V. n. 4.

(k) Galer. di Minerv. T. VIII. p. 269.

cum omnia revomeret (*l*) & 35. septimanis a lapsu & contuso dorso (*m*).

Ad annum usque duæ CAJO (*n*) dictæ, ad 13. mensem alia (*o*). Annum superavit Maria JEHNFELS (*o**). Quatuordecim menses alia (*p*): fedecim virgo Martha TAYLOR (*q*).

Octodecim mensibus asitia fuit in virgine hadersleviensi (*r*), & per annos apud alios (*s*). Trigesimo nunc mense puer (*s**) jejumat superstes.

Triennis & ultra fuit nostræ Apolloniæ SCHREYERIE abstinentia (*t*), quæ & cibo caruit & potu. Et alia pene similis, cum paucissimo certe cibo (*u*), est spirensis illa G. BUCCOLDIANI (*w*), & alia RONDELETTI (*x*) historia.

Quatuor annis jejunavit puella BRUNSWICENSIS (*y*). Longissima etiam fuit abstinentia puellæ consolentaneæ (*z*), quæ præterea potu caruit.

Sexennem habet aliam PLANQUE (*a*) : Septennem HORST (*b*). Novem annis jejunavit Catharina BINDERZ (*c*). Decem annorum (*d*) pene plenam cibi abstinentiam, potus absentiam annorum pene sex, ESTHERA Johns dotter tulit, de qua celebri puella DÖBELIUS scripsit & BLOCKIUS, paralytica quidem. Decem annorum aliæ (*e*) abstinentiæ narrantur.

(*l*) C. a REYES p. 736.

(*m*) Journ. des Sav. 1681. n. 18. Nouv. de la Rep. des Lettr. 1688. apt.

(*n*) Ephemer. p. 230.

(*o*) Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 173.

(*o**) LOSSEAU Beschreib. eines casus ined.

(*p*) BESSE Analys. p. 470. Et pene integra per annum abstinentia BURCHARD de Secret. p. 31.

(*q*) BIRCH. T. II. p. 390.

(*r*) In historia Estheræ Johns dotter.

(*s*) SANCTOR. in 1. fen. avic. p. 127.

(*s**) Journ. med. T. 17. p. 439. seqq.

(*t*) LENTULUS in ejus historia. HILDANUS in Epist. ined. & Epist. 69. & Cent. III. obs. 85.

(*u*) SCHRADER obs. 1. & plene abstinens QUERCETAN. diat. p. 91.

(*w*) Prodiit cum Apoll. SCHREYER historia.

(*x*) De pisc. p. 29.

(*y*) HORST ad DONAT. histor. p. 650.

(*z*) QUERCET HORST. p. 652. &c.

(*a*) Bibl. p. 31.

(*b*) p. 651.

(*c*) Apud LENTULUM.

(*d*) Multis libellis celebrata Conf. etiam Bresl. Saml. 1723. M. Maj. SCHURIG p. 200.

(*e*) PLANQUE p. 74. & alia SMETIUS miscell. L. X. p. 551.

Octodecim annorum abſtinentiæ fed cum aquæ uſu (*f*), exemplum legitur. Et omnes ſuperat hiſtoria aſitiæ 50. (*g*) annorum, etſi ea ægra lactis ſerum, aut certe aquam admifit.

Longe plures hiſorias apud collectores varios reperiās (*h*).

In horum caſuum longe plerisque ciborum uſus denique reſtitutus eſt (*i*).

§. VII. *Uti has abſtinentiæ longiſſimæ hiſorias liceat interpretari.*

Inveniendum eſt, quare contra communem legem, hi mortales ciborum uſu potuerint carere, & quare aliqua animalia eo præſidio careant.

Homines quidem, qui cibo diu abſtinuerunt, fere ad unum omnes melancholici fuerunt, aut hyſtericæ (*a*) plerumque feminæ, & demum aliquæ ſenſu pene omni deſtitutæ (*b*) ſtupidæ (*c*), lethargicæ (*d*), demum ſtultæ (*e*), aut a nervis deſtructis (*f*) inſenſiles.

In his quidem ægris naturæ ſtimulos per ſurda organa anima non audit (*g*), in plurimis etiam perpetuam per deſidiam, & lectulariam vitam omnis alibilis humoris confumtio ita ſufflaminata eſt (*h*), ut MARIA illa JEHNFELS corium nitidum non maculaverit, in quod inſuta

(*f*) *Phil. tranſ.* n. 462. & cum ſero limpido *Phil. tranſ.* n. 466. tamen ut debilis eſſet.

(*g*) *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. V. P. 2. n. 44.

(*c*) Cl. LOSSAU. SCHURIG *Chylol.* c. 11. HORST ad DONATUM SACHS *Gammarol.* p. 444. Add. CONRING de *calid. innato.* c. 18. HILDAN. p. 415. *Cent. II. obſ.* 40. 42. *Bresl. Saml.* 1719. Sept. 1723. Mart. 1726. Jan. Macas. *prompt.* p. 969. *J. med.* T. 17. p. 435.

(*i*) SCHREYERA. JEHNFELSIA: ægra SIBBALDI l. c. Virgo dicta PANAROLO: *Stultus N. de la Rep. des Lettr.* 1685. Febr. tum apud PLOT. *oxfordsh.* p. 200. REYES *Quæſt.* 58. SMET. SCHRADER *Johnsdotter.* QUERCETAN p. 91. *Galer. di Minerv.* II. p. 269. T. VII. p. 153 *Journ. de med.* IV. n. 4.

(*a*) *Eff. of Edim.* T. V. P. II. n. 43. *Journ. de med.* T. XVII. p. 435. Melancholica fuit LOSS. l. c. MARTHA TAYLOR & ESTHER. Ex triſti affectu PANAROL. 20. Ex furore uterino *Journ. de med.* 1756. May T. 17. p. 135.

(*b*) BARTHOL. *Cent. IV. hiſt.* 82. *Eff. of Edimb.* V. II. n. 43.

(*c*) Apud SYLVAM, & puella conſolentanea RHOD. C. II. n. 55.

(*d*) JEHNFELSIA apud LOSSAU *caſ. ined.* & MACAS. *promptuart* p. 946.

(*e*) Stulta fuit Apollonia noſtra SCHREYER apud LENTULUM & HORST L. II. *obſ.* 15. *Stultus ille in N. de la Rep. des Lettres* 1685. Febr. Stulta apud PLANQUE p. 64. Maniacus apud FABR. in HERMANDEZ p. 734. Delira illa in *Journal. de medec.* 1757. M. Febr.

(*f*) *Journ. des Sav.* 1688. n. 18. a rota medullam ſpinalem vexante.

(*g*) Ira in ſene FISCHER de *Senio* p. 111. nullius cibi cupido.

(*h*) Cl. BECCARI *Comm. Bonon.* T. II. P. I.

fuerat, nec lintea alia, quam Cl. PLANQUE memorat (i). Fæces plerumque in afitia nullæ emittuntur (k).

In animalibus hibernantibus circuitus sanguinis pene nullus est, ut etiam sanguis frigescat (l). Pulsus in ciborum abstinentia plerumque exiguus (l*), & ventriculi tritus omnino nullus est, siquidem fæces non egeruntur, easque vere collectas habent (m) in intestinis. Insectis tota vita hieme fere suspenditur (n), nullusque est, ne in corde quidem motus (o). & nihil perspirant (p).

Sed etiam memoria dignum est, multos abstinentium hominum aqua (q) libere esse usos, quæ certe magnam partem eorum malorum temperat, ex fame oriundorum. Ita & pisces aquæ habuerunt usum (r). Nam aqua certe sanguinis putredinem admista impedit, dum sales diluit, & debilitat, olea dividit, ventriculi molestam rosionem moderatur; habet etiam, ut alias disquiretur, nonnihil particularum nutrientium. Canis absque potu pene rabidus factus est (s). Aquæ solius usu absque cibo pessimæ variolæ sanatæ (t), & vulgo ea curatione in calidis regionibus utuntur Neapoli, Malthæ, in Asia calidiori (t*).

(i) Nullus fudor *Journal. de Medec.* l. c. & cutis sicca, tum in virgine haderslebiensi. Vix speculum maculat puer *Journ. med.* t. 17. p. 441.

(k) L. XXIV. Nullæ fæces PLANQUE p. 64. 74. & in puella consolentanea, tum apud STALPAART l. c. & in obs. Cl. SAMPSON *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs.* 173. & in M. TAYLOR & *Journ. des Sav.* 1688. n. 18. & *Journ. de med.* T. IV. P. 4. t. 17. l. c.]

(l) L. V. p. 129.

(l*) Vide puerum *Journ. de Med.* T. XVII. p. 442. Etiam SCHREYERÆ pulsus profundus & obscurus fuit HILDAN. *Epist.* ad LENT. ann. 1607. data, & nullus omnino, nec respiratio, apud STALPAART l. c.

(m) In urso FIELESTROM l. c. HILLERSTROEM l. c. ROBERG *de urso* p. 29. *Oecon. beskr. of satacunda härad.* p. 64. In homine fame coacto AURIVILL. *læs. mot. vermicular.* p. 9.

(n) L. IV. p. 437.

(p) Ita de viperis MEAD. *of poisons* p. 12. de testudine CALDESI.

(q) In exemplis SANCTORII. *Phil. transf.* n. 462. 466. MARC DON. L. IV. c. 12. *Hist. des Voy.* L. XII. p. 103. LISTER. *de humor.* c. 261. 271. *Mém. de l'Acad. des Scienc.* 1704. p. 172. RIVIN. *de agrest. vit. salubrit.* RAULIN. *obs.* p. 270. CHEYNE PAW. *Edimb. Soc.* V. P. 2. VALISN. T. II. p. 501. 509. *Gal. di Min.* T. VII. p. 153. BIRCH T. IV. p. 288. T. II. p. 357. C. a REYES *Quest.* 58. SIBBALD *append. ad hist. natural. Com. Fife.* HAMILTON l. c. G. v. SWIETEN T. III. p. 508. ORTESCHI Capo absque potu octiduo, cum aquæ copia 24. dies oburavit REDI p. 54. CANIS cum aqua 36. absque ea 25. diebus vixit, ID. p. 55.

(r) BATHURST *prælect.* p. 201. PLEMP. *valet. togat.* p. 237. GUMILLA *hist. natur. de orinoque* II. p. 37.

(s) POZZI p. 77.

(t) BUCHNER *miscell.* 1727. p. 521.

(t*) p. 172.

S. VIII. Sanguinis dilutio necessaria.

Verum etiam citius cogitur sibi relictus sanguis, quam quidem in lixiviosam naturam abit.

Vix de vena emissus in grunium (a) densatur; inque ipsis vasis nostris & sæpe (b) densaretur, & perpetuo spissaretur, nisi cum aquæ copia, quæ satis sit, ipso motu suo subigeretur.

Eam spissitatem motus quidem, sed non solus, inhibet, siquidem ipse motus ad eam ipsam degenerationem confert; cum præterea sanguis ruber ex sua natura per nullum organum excretorium de vasis nostris decedat, per omnia vero decedat aqueus humor: neque quidquam ei addatur conspicui humoris, nisi quod bibitur. Non posset omnino fieri, quin sanguis ruber continuo aqua sua privatus consistat in grumi modum, nisi aquæ vis epota per venas in massam sanguinis rediret.

Hæc peculiaris aquæ necessitas *sitis* necessitatem fecit, quæ sit bibendi appetitus. Sunt equidem iterum, ut de cibo vidimus, & homines, & animalia, quæ potu non egent.

Et primum carnivora insecta, avesque (c) rapaces (d) & unguis, omnino non bibunt, & demum animalia aliqua quadrupeda, quæ raptu vivunt, parum bibunt, & raro: canes tamen frequenter & abunde (e). Felis zibethica semel in mense bibit (f).

Ob peculiares aliquas causas aliqua animalia diu abstinent potu, ut cameli, & dromedarii (g), hi propter aquæ penum, quam in ventriculi profundis cellulis (h) circumferunt: Oves in nonnullis pascuis alpinis (i),

(a) L. V. p. 16. &c.

(b) Ibid.

(c) ARISTOTELES *gener. anim.* L. III. c. 1. *Histor.* L. VIII. c. 3. Excipit tinnunculuna & milvum. Halætum tamen bibisse vidit BORRICHIVS *sapient. hermet.* p. 265. Alcyon, piscivora, non bibit FRISCH. *miscell. Berolin.* Cent. II.

(d) Non sitire aves TANCREDUS LATINIUS *de fame & siti* p. 94. Sed bibunt granivoræ.

(e) De fele. *Hist. de l'Acad.* 1713. p. 138. 139. quæ 19. mensibus totis non bibit IB.

(f.) *Phil. transf.* n. 30. add. L. XII. p. 89.

(g) Sexto die RADZIVIL *it. palest.* p. 214. etiam decimo quinto RUSSEL *nat. hist. of Aleppo* p. 56. add. TAVERNIER *voy. de Perse.* p. 130. Tota æstate, ut mihi dromedarii custos narravit.

(h) PERRAULT in *hist. Dromedarii.*

(i) VIRIDET *bon chyle* p. 12 in monte Ruble ditionis sanensis In Anglia, puto nimis laxè locutus, BELLON *obs.* p. 280.

puto ob humorem copiosum stirpium alpinarum potu non invitæ carent, tum suæ & equi in Jamaica insula [k], inque insula Guanaboa, ob aerem, ut creditur, humidissimum.

Homini potum non naturalem esse, neque [l] bibiturum, si præscripto a natura victu vegetabili contentus viverent, fuit conjectura.

Ad triduum, quidem sitis sustinetur [m]: & fuerunt etiam qui longiori tempore potu abstinerunt, diebus septem [n], & octo [o], & ad decimum & duodecimum, cum asitia [p], & ad decimum aut quindecimum [q], & demum ad quadraginta [r], & 45 [s], & sexaginta [t], & septuaginta [u] dies; & quatuor [u*], & sex menses [w]; & inter asitos illos multi, ut Esther illa Suecica, annis pene sex [x], & alia per 15. annos [y] potu caruerunt.

Deinde fuerunt, qui omnino non senserunt sitis necessitatem [z], ne in desertis quidem æstuosis Libyæ [a], etiam integræ, ut videtur, gentes [b].

Et novi omnino fuisse, qui ob hydropem [c] ad abstinentioniam potus pertinaciter animum adplicarent, iidem siti denique caruerunt [d], & porro perpetuo potus necessitatem ignoraverunt [e]. Cujusmodi exemplum sanati a parcissimo potu hydropis, in nobili viro mihi notum est. Ichthyophagos negat bibere DIODORUS [f]. Causam harum exceptionum, vel in morbofa insensibilitate quæras, ut in iis qui cibo abstinent; aut in

(k) STUBBE *Phil. transf.* n. 27. Conf. L. XII. p. 89.

(l) BAYNARD *of cold. bathing.* p. 329.

(m) SAAR *Ostind. Reise* p. 129.

(n) FABER ad HERNAND. p. 533. TOZZI *in art. med. Gal.* p. 94. *Lond. Chron.* 1759. p. 315.

(o) FABER & in puella HOOGVLIETI.

(p) In hysterica la METTRIE *obs.* 11.

(q) DAMPIER *travels* T. I. p. 320.

(r) BIRCH T. II. p. 389. *N. de la Rep. des Lettres*, 1685. Febr. Hic, stultus & asitus.

(s) FABER *ibid.*

(t) MARCORELLE *Mém. des Sav. étrang.* T. I. p. 193. 194.

(u) PLOT. *natur. hist. of Oxfordshire*, cum & cibo abstineret.

(u*) *Journ. med.* 1762. Jan. in grvida.

(w) WELSCH *Epistgm.* p. 84. *Journ. de med.* T. IV. p. 4.

(x) Ab anno 1707. ad 1712.

(y) PLANQUE p. 74.

(z) Non-bibentes, BORELL. *Cent. II. obs.* 68. RHOD. *Cent. II. obs.* 56. LOTICH *obs.* 3. c. 1. L. IV.

(a) PYRRHO apud LAERT, p. 1048.

(b) DIODOR. *Sicul. Bibl.* L. III. c. 18. de Ichthyophagis.

(c) MEAD. *monita.* p. 149.

(d) Die decimo quinto PANAROL. *Pentec.* IV. n. 38.

(e) PLINIUS L. VII. c. 18. PANAROLUS.

(f) L. III. c. 18.

maxima ubertate falivæ & succorum os faucesque irrorantium. Aut de-
mum in resorbitione aërea; quæ in nonnullis exemplis est manifestis-
sima (g); cum urinæ copię adsumptum humorem longe superaverit. Li-
bras quatuor ad sex quotidie rejiciebat puella, cui omnis, potus sex
uncias (h) non excedebat.

§. IX. *Sitis sedes & natura.*

Celerior tamen in universum est necessitas sitis, & intra paucas horas
intolerabilis; præterea æstuosum cælum accesserit (a). Notissima est
historia sitis crudelissimæ, quam Angli a regulo Bengalæ in angustum
carcerem stipati passi sunt: & Lyfimachi, fortissimi inter Alexandri suc-
cessores (b), celebre pariter exstat exemplum, quem sitis cum exercitu
hosti coegit se tradere. Ita Caroli V. in africanam expeditio id maximum
habuit incommodum, quod ex aquæ inopia plurimi milites perirent (b*).
Augetur præterea dira sitis, quoties aqua de hominis sanguine libe-
rius secessit, ut in hydropicis, in homine, cui de vulnere oesophagi po-
tus in thoracis cavum effluebat (c). in diabete (c*). Maxima est etiam
in vulneratis, aut in rota suspensis (d), & in universum in viscerum
inflammationibus (e), tum in iis, quibus putridus humor in ventriculum
adspirat. Libræ 12. aquæ vix sitim sedabant (f) hominis, cui vomica
erat in hepate.

Denique in ventriculi inflammatione sitis summa est (g); etiam a
bile in ventriculum reflua (h).

Inter externas causas augetur a sale potissimum muriatico, cujus basis
alcalina est (i); ab aromatibus calidis; ab acris alcalinis (i*); ab

(g) Conf. *historia monial.* PISAN. p. 30.

(h) *Abstinent. consolentan.* p. 127. 128. & plurimi alii casus L. XII. p. 89. 90.

(a) Aegyptii sitim ferre nequeunt P. ALP. *hist. nat.* I. p. 36.

(b) PLUTARCH. *de sanit. tuend.* p. 103. 104.

(b*) P. JOV. *hist.* L. III. p. 787.

(c) *Verhandl. van de holl. maatsch.* T. II.

(c*) RUYSCH *obs.* XIII. PISSINIUS *de diabet.* p. 7.

(d) HUNAUDE *de la rage* p. 19.

(e) Conf. BONNETTI *sepulchr.*

(f) BOERHAAVE *prax.* I. p. 180. Add. BONNETI p. 25. & ILL. ANON. *de febr. interm.* p. 29.

(g) BONNET *sepulchr.* T. II. p. 22. 23.

(h) BONNET p. 22. 27.

(i) COLBATCH *opusc.* p. 551.

(i*) Injecto in venas infuso cantharidum BAGLIV. *vesicant.* Exp. 32.

oleis salivam supprimentibus; ab iis omnibus, quæ per sudorem (*k*) perspirationem, urinam, alvum, humorem corporis humani disperdunt (*l*); ab iis, quæ humores nostros acres reddunt aut viscidos.

Ex his ipsis phenomenis finis potus sumendi intelligitur esse, ut & humorem amissum reparet, & acrimoniam minuat, qui in humoribus nostris nascitur.

Natura fitis in siccitate (*m*) est, quam humor nativus non contemperat, in lingua, ore, palato, faucibus (*n*), oesophago, ventriculo: neque enim etiam istum de sede fatis excludi posse ostendunt historię, quas modo enarravimus, in quibus manifesto in ventriculo fomes fuit mali: hinc in illis modo dictis dromedariis, quorum ventriculus humore non caret, fitis etiam nulla est. Idem vero fuerit, si omnino aquæ adest indigentia: si humor, quem oporteret ex iis osculis fecerni, viscidus nunc factus sit & immeabilis, quod iterum in febre accidit, ut illud in diabete, hydrope, vulnere oesophagi.

Cum siccitatis molestissimo sensu fitis conjungitur: a sola enim siccitate omnes fibræ animales, & etiam nervi, vel potissimum, celeriter indurescunt, & in aridos, fragiles, pene friabiles funiculos mutantur. Si diuturnius malum fuerit, ardor aliquis, & amaror conjungitur.

Neque remittit sensus ingratiſſimus, ni reparata aquæ in sanguine abundantia, & restituta libertate exhalationis aquosæ in ore, faucibus, ventriculo, eadem partes iterum irrigentur.

Incisiones fiti extinctorum raræ sunt. In cane Cl. Pozzius (*o*) vidit ventriculum rubrum, bilem peracrem, urinam perpauca. Mors a fiti per putredinem humorum & febrem acutissimam nasci videtur. Canis ille fere ad rabiem ex fiti actus fuerat (*p*). Post hydrophobiam ventriculus gangrænosus (*q*).

(*k*) Inde, puto, maxima illa in quartana febre fitis, ut infans ad sex mensuras Würtembergicas in 24 horas siccaret *Stutgard. Saml.* n. 3.

(*l*) Ut in illo oesophagi vulnere. A vehemente diarrhœa paucis horis os aridissimum in viro *ILL. J. B. MORGAGNO fed. caus.* II. p. 28. A diabete fitis inextincta *COLLE cosmet.* p. 239.

(*m*) *GORTER de fiti* p. 5.

(*n*) Sæpe tantum in suprema gula residere *GREW* p. 23. In ore & faucibus *GORTER* p. 7. In faucibus *BORELL mot. anim.* P. II. prop. 103. Hinc, puto ab inflammatione, post diuturnam sitim bibendi impotentia *GAGE itin. Mexic.*

(*o*) p. 77.

(*p*) *IDEM* p. 78.

(*q*) *DARLUE Journ. de med.* T. III. P. 3.

Deinde spissitudinis signa adparuerunt. Catellus absque cibo & potu a VALSALVA servatus, incisus sanguinem omnem habuit viscidissimum (r).

§. X. *Famæ necessitas.*

Nunc quidem aqua simplex maximæ parti ejus indicationi respondet, quam hætenus diximus. Diluit equidem etiam præcipue sanguinem; globulis se interponit; aque mutuo contactu eos distinet; gelatinam lymphæ adtenuat, mobilia reddit omnia; fibras molestissime aridas humectat. Deinde etiam sales omnes solvit & debilitat, particulas putrescentes dispergit, acrimoniam omnem subigit: ut omnino a sola aqua somni usum nautæ cibis destituti recuperaverint (a). A tantillo sui sudoris supplemento, quem de vestibulis suis fugebat, in illa Bengalenfi cella sensit se refocillari, & vitam conservavit Anglorum præses HOLLWELL.

Quare in exemplis, quæ recensuimus, diuturnæ inediæ; longè plerumque aqua causa fuit sustentatæ vitæ. Hinc etiam, qui potu abstinent (b) intra 60. dies pondere diminutus est septem librarum, quod bibendo reparatum est.

Adjuvat autem in siti admixtus ad potum acor. Is enim peculiariter irritabilem naturam osculorum excretoriorum salivæ, humorisque exhalantis oesophagi & ventriculi, aptus est provocare, ut novo salivæ suæ liquoris adfluxu, eas partes consoletur. Sed idem etiam acor acrimonie urinose magis, quam sola aqua resistit.

Deficit tamen in aqua copia sufficiens particularum densarum, oleosarum, gelatinosarum, quæ ad reparandam lympham sanguinis coagulabilem, fibrasque struendas sufficiat. Hinc in animalibus sola aqua contentis, pinguedo nulla (c). Sanguis aquosus, neque coagulabilis; viriumque defectus inevitabilis (d). Absque cibo pus non generatur in vulneribus, post cibationem abunde (e).

Ergo famæ, alter vitæ custos, addita est, quæ esculenta imperet, in quibus farina, oleum, gelatina, majori copia contineantur, possintque nova elementa & fluidis partibus sufficere, & solidis.

(r) *Caus. & sed. morb.*

(a) LISTER *hum. c.* 26. p. 275.

(b) MARCORELLE *Mém. des sav. étrang.* p. 194.

(c) RIVIN. *de agrest. cib. sanit.*

(d) IDEM *ibid.*

(e) KNIGHT *vindicat.* p. 82.

§. XI. *Famæ phenomena.*

Sensus est ingratus, dolorisque genus acrius & quasi lacerans, in solo quidem ventriculo.

Una bilis acerrima in ventriculum redit (*a*) & somnus disparet, & debilitas (*b*) succedit, & animi deliquium (*c*) & oscitatio, & ex humorum acrimonia fætet anima (*d*), & os totum excoriatur, & magis atque magis incitatur sanguinis degeneratio; ut lac acre, rancidum, urina (*e*) fætores fiat intolerabili.

Tandem vasa rumpuntur, sanguis effunditur in ventriculum (*f*), per nares (*g*), perque intestina (*h*), faucesque tument (*i*), & mens emovetur, & vera succedit mania (*k*), & denique mors paulo serius ocium sequitur (*l*).

Adeo vero fævi sunt dolores, ut omnia a natura humana aliena alimenta subigere cogant, tendines boum (*m*), corium (*n*), integros currus, calceos, res horridas, putridasque (*o*); ut lupum doceant lignum (*p*) julos betulæ, muscum, lutum; lapidesque vorare (*q*); ut obstinatus animus illius *Johanna* NAUNTON ad cibos sumendos fuerit compulsus (*r*); denumque adeo sanctissimos instinctus fortior vis mali destruit, ut amicus amicum suum devoraverit, propriosque infantes tenerrimæ ma-

(*a*) MORGAGN. *Adv.* III. p. 55. GORTER *de fame* n. 23. Icterus bilisque vomitus FANTON. l. c. & ipse vidi, in cane & fele, ab inedia ventriculum bile plenum fuisse.

(*b*) FANTON. *Diff. anat.* p. 39.

(*c*) GAGE l. c. BOYLE *of frost.* app. 27. VIRIDET *bon' chyle* p. 209. 210. Ex fuda, nisi ederet *Miscell. Berl. T.* VI. p. 81.

(*d*) p. 167.

(*e*) Ibid.

(*f*) Ibid.

(*g*) Ibid.

(*h*) Ibid.

(*i*) *Lond. Chron.* 1759. p. 315.

(*k*) p. 163.

(*l*) Ibid.

(*m*) SCHELHAMMER p. CXXIV.

(*n*) OEXMELIN. *Hist. des Avant.* V. p. 154. Rhegienses in obsidione DIODOR L. XIV. c. 12. Siameses naufragi TACHARD L. II. p. 211. Naufragioræ BENGALENSIS *hist. d'un naufr.* Addit LERIUS se famem non reformidaturum, dum coria & pelles suppeterent in itin. *Bresl.* p. 408.

(*o*) Pellem bubali in ora bengalæ deserta *Hist. d'un naufrage.*

(*p*) FABER ad HERMAND p. 488. 813.

(*q*) PONTOPPIDAN II p. 36. 37. SCHURIG p. 305.

(*r*) BIRCH T. II. p. 387.

tres (s) coxerint, & militibus rapturis (t) eripuērint. Demum violentas sibi aliqui manus (u) intulerunt: adeo serio natura necessitatem parandi cibi homini inculcavit.

Ventriculus una vehementer arctatur (w), quæ forte est ratio, quare frequenter satis legas, eos, qui a longa inedia ad cibationem redeunt, delinquere (x) animo, dolere (y), ægrotare, & denique perire (z) nisi mollientibus medicamentis utantur (a), aut lente valde ad cibum redeant, parce fumendo, non quantum appetitus posceret, sed quantum ferret ventriculi conditio.

Consumitur a fame adeps & humor, ut nitidissima viscera sint animalia fame enectorum (a*), & argentei fibrarum fasciculi (a**).

§. XII. *Famis causa proxima.*

Famem urgent & excitant robur corporis ut in Milone (b), in leonibus (c) aliisque (d) animalibus (e) summi roboris: deinde robur peculiare ventriculi; labor omnis generis (f) quo corpus exercetur;

(s) TULP. l. c.

(t) In obsidione Samariæ Reg. II. c. 61 c. Hierosolymæ apud JOSEPHUM, & oppidi SANCERRE in relatione LERYI tum apud Gaspestos frequenter LE CLERC, & apud Americanos venatores, qui Anglicas colonias in hudsoniano sinu frequentant ELLIS.

(u) TULP.

(w) Ex tenui diæta ventriculus intestino non major COLLINS p. 264. & in asita SCHURIG p. 200. LITRE *Mém. de* 1716. RUVSCH *obs.* 68. f. 56. add. SANTORIN. p. 164.

(x) TACHART II. p. 323.

(y) *Nouv. de la Rép. des Lettres* 1685. fev. BONTEKOE *voyag.* p. 277.

(z) AVICENNA p. 61. b. KERKRING *obs.* p. 80. LERY sub *fin. itin.* SAAR *Ostind. Reis.* p. 125. BEWERWICH. *Schat. der ongezondh.* p. 211. de peste Leidensi, & de BERNHARDO illo fanatico DETHARDING: & BAYER *loc. nov. testam.* p. 12. Etiam a siti, quando nimium bibunt, cameli pereunt. RUSSEL *depp.* p. 56.

(a) Lactis usus ille apud CARDANUM *var.* p. 320. humectantibus CL. LOSSAU *obs.* 21. L. I.

(a*) REDI *anim. viv.* p. 81. adv. HAYMAN *Comm.* III. p. 318.

(a**) CÖCCHI *hort. flor.* præf. p. LIV.

(b) Turkinenses maxime voraces, tanquam fortissimos, in militum selectu præferunt DAMPIER *Trav.* p. 71.

(c) Leo quotidie libras carnis vorat 20.

(d) Lupus ad 22. FABER ad HERNAND. p. 488.

(e) Hinc chalybs appetitum auget.

(f) Dithmarsi messis tempore sexies in die cibum capiunt SCHELHAMMER *ars med.* II. p. 86. Hinc ille coquus, quem ALEXANDER ADAE coquis præferebat: nocturnum nempe iter prandium gratum facit PLUTARCH. *sanit. tuend.* Hinc in somno nulla fames gliribus, expergiscentes vorant iidem FANTON. *diff. anat.* p. 41.

eo magis , si præterea in frigido aere fuerit susceptus (*g*) ; ut etiam in borealibus regionibus (*h*) major sit famis potestas.

Adjuvant famem lumbrici (*i*) qui partem consumunt succi utilis , & laxitas pylori (*k*) , quæ facit , ut ventriculus pene continuo inaniatur , quæ eadem voracissimis animalibus nativa inest (*l*).

Plerumque etiam acida quæque (*m*) , ut cœmor tartari , succus limonum , & quæ sunt ejusmodi , famem sustentant , dum , puto , succi in ventriculum confluentis augent copiam , & putredinem , fami inimicam superant. Inter numerosos fructus , quibus Indi orientales delectantur , plerique sunt acidi.

Sed etiam nervorum sensibilitas major famem facit majorem (*n*).

Est denique ignota conditio , quæ facit , ut homines aliqui super reliquorum mores , in fame (*o*) , in copia ciborum (*p*) in superandis demum absurdis (*q*) & difficillimis cibus , excelluerint.

Inter animalia ; brevi vitæ destinata , insecta etiam voracissima sunt. Eræca nihil nisi vorat & egerit (*r*).

(*g*) SUIDAS p. 447. Conf. L. XII. p. 70. VIRIDET bon chyle p. 209. 210.

(*h*) Qui Grönländiam adeunt sunt famelici LIND *bealth. of seamen.* p. 23, BOYLE *of frost. app.* p. 27. Nautæ in Magellanica pene insatiabiles *hist. des terres austr.* I. p. 217. Multo plus annonæ paratur navibus septentrionem adeuntibus , quam austrum petentibus PONTOPPID. II. p. 499.

(*i*) TRALLIANUS L. VII. c. 4. Bulimus sanatus ejecto verme *Phil. transf.* n. 264. BONNET p. 15. 16. Bulimus a pediculis in ventriculo SENAC. *Ej.* p. 604. BONNET *obs.* 9. p. 17.

(*k*) RUYSCH *obs.* 74. LAMY *disc. anat.*

(*l*) Sic cum vomitu perpetuo fames *Phil. transf.* n. 476.

(*m*) HELMONT *sextupl. digest.* n. 12. p. 168. VIRIDET bon chyle p. 107. BAYLE *corp. anim.* p. 312. LISTER *hum. c.* 5.

(*n*) In tetano universali endemio BARRÈRE *France equinox.* p. 73.

(*o*) SCHURIG p. 185. *Phil. transf.* n. 264. HILD. L. IV. p. 31. CRAUSE *agrot. bulim.* Jen. 1695. Acadenses DIEREVILLE p. 155. Nigritæ *Hist. des Voy.* L. IX. p. 322.

(*p*) Vitulum aliquis edisse dicitur MARC. DON. p. 203. MILO bovem. Panes bilibres stomachicus PRAXAGORÆ famulus ASCLEPIADES apud CÆLIUM *tard. affect.* L. III. c. 2. Vorax cantienfis celebris fuit CHARLETON *Enquiries of nutrition* p. 79.

(*q*) *Eph. Nat. Cur. Cent. II.* p. 195. BOYLE *de util. Phil. Exp.* p. 195. WALTHER *thesaur.* n. 88. BOEHMER *Diff. de polyphago* RZADSCZYNSKI *hist. nat. Polon.* p. 450. G. A. HAMBERGER *de imbecillit. ventr. per æst.* KUNDMANN *Selten. h* p. 1065. 1066. TILING *vqf. brev.* p. 398. MOEBIUS *inst.* p. 164. LEIGH. *natur hist. of Lancashir.* p. 301. CARDAN. *var.* p. 195. *Physiol. bat.* p. 80. REINES *varior.* p. 74.

(*r*) SWAMMERDAM p. 575.

Proxima denique famis causa, ex collectis animalium phaenomenis, videtur tritus esse, quando ventriculi (s) nervosa juga tenui (t) villosa crusta obducta, inque ventriculum pendula, super se invicem confri- cantur, quem motum, & ventriculo proprium, & a septo transverso, musculisque abdominis superadditum, interim tanquam ostensum liceat mihi fumere (u). Addit Vir ILL. videri nervos eos prurientes reddi a sanguine in eas plicas congesto, ut in omni irritatione fit (w). Non bene haec sententia refutatur, quod ventriculus ultra tertias contrahi nequeat (x). Ostendemus enim, contrahi, ut nulla cavea supersit (y). Voraci homini angustus ventriculus (z).

Ex aliis enim experimentis, exque sensu intolerabili frictionis cujusque in nuda cute factae, licet aestimare, quam acris debeat sensus esse numero- rosum nervorum, tantum non penitus nudorum, contra se invicem confrictorum. Ad solum ostium sinistrum non retulerim (a).

Hinc etiam intelligitur, quare adeo lenta fames sit, & diuturna in- edia, in serpentum genere (b), quibus tritus vix ullus est, cum ven- triculus parum carnosus sit: vis autem abdominis & septi transversi omnino nulla. Et quare in capone (c), quem exempli loco cito, omnium ce- lerrima mors supervenerit; celerior quam in cane, fele, aliisque carnivo- ris (d). Multo nempe gallinaceo genere, quam ulli quadrupedum, fortior est in ventriculo tritus. Etiam insectis (e), quorum minor est motus pe- ristalticus, hieme nulla fames est, aestate plurima (f), eo major, quo calor aestuosior (g).

(s) In oesophagi flexu sedem famis ponit VIRIDET *bon chyle*. Sed sensu hic licet uti.

(t) p. 133.

(u) *Seç. IV.*

(w) SENAC. *Eff. de phys.* T. III. p. 594. 595.

(x) *Elem. de Physiol.* p. 219.

(y) *Seç. IV.*

(z) ETTMULLER *progr. ad disp.* FRIDERICI. BONNET *obs.* 10. conf. p. 123.

(a) Conf. DUVERNEY II. p. 184.

(b) p. 169.

(c) p. 176. 179.

(d) p. 170. Ab amara bile in ventriculum fluente, appetitus deletus BONNET.

(e) LYONNET p. 255.

(f) BAKER p. 137. 142. de polypis TREMBLEY p. 114. 116.

(g) TREMBLEY p. 186.

De succo gastrico sum timidior. Is utique in jejūnantibus abundat, & de ore profluit, & acrior fit, & sensus quidam rosionis in fame videtur percipi. Et tamen cum eum humorem ad lixiviosam naturam vergere [b] certum sit, ea vero appetitum potius minuat, atque acor manifesto appetitui fit amicior, credam potius, quoties per moram factus est acrior, humorem ventriculi appetitum delere, uti efficaciter ab omni putrido liquamine deletur. Hinc forte appetitus aliquot a pastus tempore horis minuitur, si absque cibo manseris, dum interim os amarescit.

Reliquias ciborum [k] qui pro fermento causaque famis habuerunt, videntur oblitī fuisse, inanem demum ventriculum famem facere [l].

Mentis esse officium, & nihil habere mechanici, ex hypothesi dictum est [m].

§. XIII. Quæ famem auferant.

Famis finis est, hominem ad sumendum cibum compellere; ne ante diem destruat. Cibus sumtus utrique fini satis facit; nam reddit sanguinem tenuem, subacidum chylum, a putredinosa natura alienum, qui sanguinem in mediocritatem [a] acidam inter & urinosam naturam reducat. Idem sanguinem diluit; & adfert ad ejus massam oleum, gelatinam, aquam, sales necessarios, materiem nempe omnium partium firmarum & fluentium quæ reparatione indigent.

Sed uti necessitatem famis cibus tollit, ita tollit famem ipsam. Cibus enim, dum ventriculum replet, & distendit, tritum rugarum [b] sensum diminuit, easque a mutuis urget contactibus; & oblinit villosam tunicam miti materie, & acrimoniam obruit, si quæ in succo gastrico nata est, Sensationem delebat potum atramentum, inde aposita successit.

Alio modo fames destruitur [c], a nervosa quidem adfectione, five

(h) p. 143.

(k) WILLIS *ferm.* p. 25. VERHEYEN L. II. p. 257. 258. BARTHOLIN. p. 79. GLISSON. p. 325. W. SENGUARD *philos. natur.* p. 416.

(l) Add. GORTER l. c. p. 11. Cum per tres menses pullum in ventriculo serpens generet, interim, omni cibo abstinet THIBAUT *Relat. de la Martinique* p. 100.

(m) NENTER: *physiol.* p. 190.

(a) HALES *hemastat.* p. 218.

(b) p. 185.

(c) BECK. *palpit. cord.* p. 36.

cerebrum insensibile fuerit (*d*), aut ligati nervi (*e*); sive tristes fuerit aliqua animi passio (*f*); desiderium vehemens: sive mechanici quid, ut a vertigine per rotationem mota (*g*). Sive sensus nervorum ab oleo, opio (*h*), nicotiana, spiritu vini, plumbo (*h**), diminutus: sive potus calidus (*i*) nimia copia sumtus fuerit, qui ventriculum maceret, debilitet, reddatque tenuem & inertem (*k*). Videtur per hæc omnia vel impediri nascituram in nervis famis sensationem: vel natam intercipi, ne ad cerebrum perveniat.

Tollit etiam famem plerumque putredinosum omne, sive in cibo fuerit ingestum; sive intus ab ulcere aliquo, aut ab hepate (*l*) corrupto fuerit inspiratum. Vetulam dissecui, quæ multis annis sola cerevisia tenui vixit, quod ejus ventriculus aperto ulcere in colon pateret, ut solidis scybalis in stomachum aperta via esset. Et pleræque apositæ, quas vidi insuperabiles, a vitio fuerunt hepatis, putridæque bilis (*m*).

Nauseam hic addas, oppositum fami malum, in quo ciborum desiderium destruitur. Infinitæ ejus causæ sunt, potissima vero putridum aliquid in ventriculo hærens, vel simplex ejus putridi idea. Cum quatuor mensibus in ventriculo lactes cyprini indigesti remanerent, eo toto tempore cibi superfuit horror (*n*).

(*d*) Apoplecticus neque bibens, neque cibos desiderans VIRIDET 1. c. p. 460. Senex quem citavi L. XVII.

(*e*) BRUNN. *Disp.* p. 38. &c. WILLIS 172.

(*f*) BRUNNER *duoden.* p. 32. Inde pleræque inedia p. 175.

(*g*) HAYMAN *Comm.* T. III. p. 312.

(*h*) DARVIEUX *Mém.* T. III. p. 21. 22.

(*h**) Paralysis, cibi non cocti a saccharo saturni HIALEFELD p. 57.

(*i*) Mala ventriculi a Theæ potu habet BOERHAAVE *prælect. in propr. instit.* n. 75. Cardialgia inde facta VIRIDET. *bon chyle* p. 563. Syncope HARTSOEKER *conf. phys.* p. 53. ZWINGER *de Thea helvet.* p. 3. Etiam chorda tensa a vapore calidæ continuè laxatur ARBUTHNOT. *of air.* p. 61.

(*k*) In SCHRADERI inedia trienni nihil mali fuit nisi ventriculus tenuis & intestina *obs.* 1. Add. BONNET. adde asitos & adiposos ob villosam non continuam ventriculi VIRIDET p. 109. 40.

(*l*) BONNET T. II. L. III. S. I. *obs.* 15. 10. 6. *Conf.* GHERLI *obs.* 57. *Cent.* II.

(*m*) Asitiæ sedes plerumque, aut semper, in hepate LIEUTAUD *précis.* p. 416.

(*n*) STORCH *Krankh. schwang. Frauen.* p. 241.

S. E. C. T. I. O. I. I. I.

CIBUS POTUSQUE.

§. I. *Auscultandum utrique sensui.*

Subtilitas fuerit, famem sitimve aliò nomine quam dolorem dicere; aut peculiarem sensum (*a*) efficere, ad quem pertineant.

Fidi autem naturæ (*b*) duces sunt, utraque, si ea sola, absque idearum adfociatione audiatur: neque necesse est, quantum sit nutriendum, ex pondere (*c*) aut perspirationis modo metiri, ipsa enim fames superstes jubet ultra cibari, sedatus amor edendi docet abstinere. Itaque animalia omnia indocta modum tenent alimentorum.

Cum porro eadem causæ sitim faciant, quæ faciunt necessitatem bibendi [defectus nempe humoris (*d*) acrimonia humorum; aut visciditas] æquum est eadem mensura & finem obtineri ob quem bibitur, & terminum facere desiderii. Reparato enim humore, sublata, acrimonia, visciditate resoluta, nihil causæ est, cur ultra bibatur; & famis eadem est ratio. Adeo fidelis autem est horum desideriorum vox, ut etiam speciem cibi, potusque omnino aptissime distinguant. In febribus acutis veram (*e*) curationem ipsa sitis indicat, aquam subfrigidam cum acido humore mistam: & ipsa fames suo silentio edere vetat, quo tempore putredo, humorem imminens, non finit cibum sumere, absque certa corruptione, iterum morbum auctura.

Est etiam aliquanto plus in fame commodi. Sæpe ægrôti minus solitum cibum magno desiderio flagitant. Id desiderium suadent maximi medici (*f*) pro norma haberi. Ita acidi (*g*) succi, plerisque aliis

(*a*) GORTER esse gustum internum PERRAULT *du goût*.

(*b*) WAINWRIGHT *of meat*. p. 157.

(*c*) GORTER *de fame* p. 71. 75.

(*d*) p. 180.

(*e*) Felix eorum usus in malignis & pestilentialibus febribus confirmatur a doctissimo A COCCHI *del vitto pitagorico*

(*f*) G. v. SWIETEN T. II. p. 131. BRUNNER apud DANIEL *Beyträge* II. p. 96. BOHN *offic. med. dupl. diff.* 3. n. 6 APPERLEY *obss.* p. 183. *Essay of a Societ. at Edimb.* T. V. P. 2. n. 46. Citriorum libris quatuor superata atrophica PANAROL. L. II. *obs.* 38.

(*g*) Cucumeres acidi OEHME II. p. 59. add. DANIEL l. c Brassica FABRIC *scia graph Butisbac* 32. Pepones inanorexia PEIRESCI *vita* p. 21. Melongena MARC. DON. L. VI. c. 5.

medicis suspecti, etiam in dysenteria putredinosa, salubres fuerunt, & in acutis (*b*) morbis.

Ita fassamenta (*i*), adeo parum diversa a sale ammoniaco, quem laudabat MUYSIUS, ab ipso naturæ instinctu in febribus intermittentibus poscuntur, optimo eventu, si auscultatum fuerit.

In marcore ostrea, mitissimum cibum, utiliter desiderata lego (*k*), & in phthisi fraga (*l*).

In ascite cerevisia, diuretica ut puto, cum desiderio pota morbum superavit (*m*).

§. II. *Homo omnivorus est.*

Si ex appetitu iudicium petere licet de cibo a natura homini destinato, sequetur omnino, pene ad omne genus ciborum hominem natum esse, cum pene nullum sit in mari terræ plantarum & animalium genus, quod gens aliqua in cibum non receperit; neque venenatis fungis, neque animalibus pariter venenosis (*a*), neque iis exceptis cibis, a quibus propter fætorem natura nostra abstineat (*b*).

Quare, cum quæstio sæpius sit agitata (*c*), num herbivorus homo sit, num pariter carnivorus, de ea poterat vel ex naturæ appetitu defini.

Sed etiam reliqua consentiunt. Homini enim inter carnivora animalia & herbivora media est fabrica, & de utraque habet, ut credas tamen aliquanto propius ad herbivora accedere.

Differre dicuntur hæ classes, ventriculo, dentibus, intestinis, & etiam potissimum cæco intestino. Ventriculus tamen etiam in herbivoro equo hu-

(*h*) Etiam cerevisia, ut puto, tenuis HAGEDORN *Cent.* II. n. 49.

(*i*) SCHELHAMMER *Ars med.* T. III. p. 287. HELWIG *obs.* 155. add. *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. *obs.* 59. *Bresl. Saml.* 1724. p. 440. & in anorexia WIGAN. *Itin. philiatr.* p. 58. & C. TRIOEN p. 2. in aliis malis. Feliciter in febre falsis usus fuerat TRALLIANUS L. XII. p. 748. 766.

(*k*) TULP. II. c. 8.

(*l*) DANIEL I. c. p. 88.

(*m*) PECHLIN. I. *obs.* 63.

(*a*) Japonenses *Hist. des Japonois* p. 162. Fungis venenatis Russi.

(*b*) Conf. paulo post. n. 5.

(*c*) Contra victum animale WALLIS *Phil. transf.* n. 269. *Auctor tr. des dispenses du Carême* P. I. c. 7. ROUSSEAU *tr. de l'égalité* not. 4. & nuper COCCHI *de victu pythagorico* Contra vegetabilem ANDRY *des alimens* I. p. 19. TYSON *Phil. transf.* n. 269. ARBUTHNOT *of alim.* BIANCHI sive I. PLANCUS *vir cel. de victu pythagorico.*

mani est similis (*d*), tum in porco, ex sua natura radicibus & fructibus arborum viventi, qui demum per hominis societatem omnivorus fit (*e*).

Dentes iterum cum equo conveniunt, cum caninos paucos (*f*), plures molares planos homo habeat, tricuspides (*g*) vero, quales carnivora animalia, nullos, solamque pene earum cuspidum umbram. Non adeo videtur natus esse ad ossa dentibus confringenda, nempe non esse rapax animal.

Intestina ~~fun~~ universa longiora, & quæ inter ea crassa dicuntur, ea largiora sunt, & in herbivoris (*h*), animalibus, & in homine.

Iterum carnivoris cæcum intestinum breve (*i*) & curvum, herbivoris plerumque longum (*k*) est & grande. Ea in particula homo ad utramque naturam accedit: graciliorem enim, quam ipsa carnivora animalia, & nullius momenti appendiculam habet, cæcum vero intestinum etsi amplum, tamen breve (*l*). Crassa porro intestina multo quam in carnivoris longiora habet, si cum canis recto intestino comparaveris, aut alterius animalis carnivori. Deinde idem colon humanum cellulis (*m*) interrumpitur, quod in iisdem animalibus carnivoris simplex est.

Si præterea, quos nunc addemus, ciborum varii generis ab homine adsumptorum, eventus addideris, apparebit, hominem salubriter, & diu vel solo vegetabili cibo, vel solo animale victu, vel commisto utroque vitam posse sustentare.

Pygmæus ille pene homo, & omnivorus est, & liquores spirituosos concupit (*n*).

Est etiam in aliis animalibus, certe plerisque, aliqua in victu variando libertas (*o*). Nam inter manifesta herbivora, vaccæ (*p*),

(*d*) p. 128. & ubique Cl. BERTIN *Mém. de* 1546.

(*e*) Non ergo debuit carnosus granivorarum animalium ventriculus hic produci, qui hominī non sit datus ANDRY l. c.

(*f*) p. 25.

(*g*) p. 27. TYSON *Phil. transf.* n. 269.

(*h*) MONRO *comp. anat.*

(*i*) Conf. interim *Comm.* BOERH. T. I. p. 405.

(*k*) Ibid TYSON *ibid.*

(*l*) Cum herbivoris consentire TYSON, non undique vere.

(*m*) Vide *Comment.* Boerh. T. I. p. 525. & GREW t. 23. in viverra, cane, felle.

(*n*) TYSON p. 30.

(*o*) BRADLEY *improvem. of garden.* p. 27.

(*p*) ZORGDRAGER *Walfischfang.* PONTOPPIDAN II. p. 11. PEYRERE *relat.* p. 8. Etiam osse vaccina rodunt, KALM *Amer. res.* I. p. 129. Pecora foliis piscibus putridis alantur circa Mascate OVINGTON *Voyag.* T. II. p. 130. & apud Tartaros Jupi *hist. des Chinois* p. 82. De Gedrosia olim PLUTARCHUS in ALEXANDRI vita, & nuper THEVENOT *itin.* T. II. l. 3. c. 5.

oves (*q*), equi (*r*) discunt piscibus vivere : Sed etiam carnibus equos (*s*) in arabia littorali , & cuniculos sanguine humano (*t*) pinguescere , & apros , radicivorum animal , pelles avium , & capreolorum , fetusque suos & humanos devorare (*u*) ; & gallinas , cum suo granis commolendis destinato ventriculo , tamen araneas , insecta , lumbricos , carnem concisam , ova amare : ut etiam pulli calecutici nuper nati ovis bene alantur , & pereant iidem cum acido odore , si nimis mature iis fagopyrum propinatum fuerit (*w*). Porro cornices & carne vivunt & granis (*w**). Sed etiam gyri- nus lenticulam aquaticam pascit ; idem ranæ indutus personam , insecta rapit , & potissimum cochleas (*x*) : talpæ & radices & serpentes vermes- que (*y*) sectantur ; & erucæ aliquæ herbivoræ aluntur vernibus & erucis (*z*). Sed ipsæ cochleæ & gramen pascuntur (*a*) & se mutuo devorant. Con- tra canis (*b*), & felis carnivora , discit pane uti , aliisque vegetabili- bus , & milvum pane vixisse ALDROVANDUS auctor est , & aquilam (*c*) spane & hordeo se sustentasse BORRICHIVS testatur , gravis autor. Alia animalia aliunde omnivora sunt ; erinaceus (*c**) , cancer (*c***).

Hæc eo minus debent absõna videri , cum & ipsa animalia tamen ve- getabilibus succis alantur , unoque gradu intermedio leo a gramine distet , quod in bovis carnes mutatum rapit : atque adeo non maximum inter succos animales & vegetabiles discrimen sit (*d*).

Est equidem in plantis aliquanto pronior ad acidam natura (*e*) , ad- urinofam in animalibus. Sed tamen etiam plantæ in acervos congestæ ,

(*q*) ZORGDRAGER *Walfischfang* p. 70. tum ARRIANUS. PLUTARCHUS in ALEXAN- DRO. PEYERRE : HORREBOW *de Island* p. 229.

(*r*) ZORGDRAGER p. 70. *Phil. transf.* n. 289.

(*s*) RADZIVIL *Iter. palest.* p. 215.

(*t*) BEHRENS *diæt.* p. 175.

(*u*) BUFFON T. V. p. 119.

(*w*) *Hanov. Seltenh.* p. 147.

(*w*) *Natuurlyke historie* T. IV. p. 36.

(*x*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 825. *Leipz. Saml.* T. V. p. 752. 753. & Scarabæos JACOBÆUS T. 9. 49.

(*y*) BROWNE *err. popul.*

(*z*) De GEER p. 202.

(*a*) LISTER. *de cochl.* p. 90.

(*b*) Uvis , piris , pomis , REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 491.

(*c*) *Hermet. Aegypt. sap.* p. 175.

(*c**) LINN. *Oelandska resa* p. 265. Hinc neque cæcum habet , neque colon *Phil. transf.* n. 269.

(*c***) BASTER *uytspanning* T. II. p. 12.

(*d*) NEEDHAM *microsc. obs.* p. 271. SHAW p. 155. 156. BRADLEY *improver.* p. 27.

(*e*) Vide panis analysin *Mém. de l'Acad.* 1732. p. 29.

putrescunt & fatent (*f*), & per putredinem volatilem falem urinosi (*g*) generosis fundunt & destillantem dant humorem alcalinum (*h*), & per ambustionem fixum lixivum falem.

Denique omnibus comparatis, proprie sola gelatina nutrit (*i*). Atqui gelatina (*k*), non in sola animalium lymphæ, sed in farina pariter vegetabilium habitat. Olim in pane extracti gummosi vim invenit Cl. GEOFROI, ad 6. drachmas in 32. (*l*).

Deinde ut Ill. J. Bartholomæus BECCARI (*m*) in farina tritici duplicem reperit materiem, alteram pulveream amylaceam, alteram glutinosam aquæ non miscibilem; amylacea illa, vegetabilis naturæ tenacior, acidum elementum continet, & cum aqua vinosam naturam induit, cum lixivo sale fervet (*n*) & syrupum violarum parco quidem rubore tingit (*o*), deque eadem subjecto igne acidus spiritus destillat (*p*).

Contra pars glutinosa ad animale indolem accedit (*q*) & ad cadaveris modum putrescit (*r*), inque aqua diffusa cum acidis fervet (*r*), aliaque lixiviosæ naturæ signa dat (*s*), igneque subdito spiritum urinosum (*t*) & oleum suppeditat.

Eadem nuper suis experimentis auxit & confirmavit CLAR. KESSELMAYER (*u*).

Gluten (*w*) quidem, ex tritici eluta farina dupla amyli portione eduxit insipidum, adhærescens, in ore non solubile, laminosum, in aqua

(*f*) BOYLE *Hist. of the air* p. 45. cum cadaveroso factore. Mentha apud STAHL *Chem. fundam.* T. III. p. 114. Brassica apud ROGERS p. 41. Inde morbus malignus ibid.

(*g*) WEDEL *de sale volat. plant.* in ampla certe gente nasturcinarum, quarum plurimæ in cibum recipiuntur. Sed ex acetosa æque partes volatiles educuntur, ut ex cochlearia *Mém. des Sav. étrang.* T. II. p. 330. Ex melissa putrida sal volatilis urinosus HOFMAN *labor. Altd.* Ex pomio citrio putrido alcali volatile *Phil. transf.* n. 392.

(*h*) Ex tritico PUTATUS *viß. acut.* p. 74. 75. Ex plantis cichoraceis TACHEN *hipp. chem.*

(*i*) LUDWIG *de vißu anim.* LORRY *tr. des alim.* p. 22. &c.

(*k*) KESSELRING. GEOFROI *Mém. de* 1732. p. 29.

(*l*) *Mem.* l. c.

(*m*) *Comm. Bonon.* T. II. P. I. p. 123.

(*n*) p. 123. 124.

(*o*) p. 125.

(*p*) p. 126.

(*q*) p. 123.

(*r*) p. 124.

(*s*) p. 125.

(*t*) Ibid.

(*u*) p. 126.

(*w*) In *Diff. argentorati defenfa de quorundam vegetabilium nutriente principio.*

vix mutabile, ficcitate in verum gluten rediturum, deque eodem superque ignem stillaverunt (x) vapores albi & spiritus empyreumaticus, cum acore fervens (z), & oleum: carbonem vero reliquit insipidum.

Eadem sponte computrescit (a), & caseum olet fætidissimum, & aquam imprægnat vi urinosa, ut cum acidis quibusque ferveat.

Contra amylacea pars, omnino ut apud BECCARIUM, cum aqua macerata non putrescit, & odorem spirat acidum, & succos cæruleos rubro colore (b) imbuunt, eademque subjecto igne dat spiritum acidum (c), inque carbone sale fixum lixiviosum relinquit.

Portiones etiam harum in farina partium definivit vir Cl. ut spelta glutinosa habeat plurimum, ad libram, triticum hibernum uncias decem, & eo minus ut fuerit vilior farina (d). In secali amyli minus est, glutinis nihil (e); in hordeo fere perinde (f): in avena (g) minus, quam in hordeo mucaginis amylaceæ; quæ in mayz acida fit (h). Pisi (i) plus habent partium nutritiarum, phaseoli (k), lentisque (l) minus, solanum (m) tuberosum perpaucum alibile.

Denique etiam hoc perspicax vidit, glutinosam partem cum aceto subactam (n) in amylaceam abire, atque adeo in ipsa planta acidi abundantiam amyllum facere, quæ ut dissipata fuerit, gluten nascatur.

In pane denique cocto glutinosum ab amylaceo non distinguitur, & videtur, acorem nunc per totam massam diffusum esse, qui in solo amylo habitaverat (o).

(x) p. 5

(y) p. 9.

(z) p. 10.

(a) p. 8. 9.

(b) p. 7.

(c) p. 8.

(d) p. 15.

(e) p. 20.

(f) p. 22.

(g) p. 23.

(h) p. 24.

(i) p. 27.

(k) p. 26.

(l) p. 28.

(m) p. 30. 31.

(n) p. 12.

(o) p. 15.

(p) *Traité des aliments* T. I. p. 325.

Mudum ex fermentatis pisis falem volatilem adscendere vidit Cl. LEMERY (p), cum ignem subiecisset, & optimum, qui absque fermentatione novissimus prodiisset.

Adparet adeo, etiam in farinoso urinosum & glutinosum, quod in animalibus est, & elementum latere, neque adeo quidquam ad alendum deficere.

§. III *Cibus vegetabilis.*

Historia primæva hominem in asia mediterranea reperit, fervido sub cælo, feraci dactylorum, & fructuum sponte nascentium. Ex RUMPFIANO enim opere nostris cum herbarum indigenarum catalogis comparato, intelligimus, immensum esse regionum calidarum in ferendis diversis, & numerosis fructibus horæis (a) herbisque sponte edulibus privilegium. Nullum edulem cibum præter baccas Europa sponte protulit.

Ea ergo in opportunitate, cum neque ad agrum colendum metallorum usus, aut animalium subigendorum ratio inventa esset: neque ad occidendas feroces belluas homini armorum esset satis: neque sēpes, & stabula nosset exstruere, quibus mitiorum animalium secula captiva concluderet: videtur victus ab arboribus esse repetitus. Etiam id in itineribus didici, quacumque homo securim non adhibuisset, per vastam illam americanam, per africanam, per borealem Sibiriam, per antiquam Islandiam, ubicunque ferax est, ibi sylvam fuisse, quæ per sub assyrico cælo potissimum palmarum fuit. Ad selectum autem cibi saporem (b) procul dubio duce hominis usus est; deinde historia eventus: ut enim quisque ab ignorato fructu bene habuisset, aut male, ita filios docuit nepotesque. Hæc prima fuit & diæteticæ origo & medicinæ (c). Nam homines in analepticas, in refrigerantes, in acidas, in alvum laxantes, in emeticas, in narcoticas, in variarum virium plantas per peregrinationes incidisse est probabile. Vegetabilis ergo vita prima fuit, fructuum, herbarumque & radicum, erudorum omnium. Et etiam nunc, eodem sub cælo, pene eodem modo vivitur. Ita Persæ apud KÆMPFERUM (d) in palmetis solis dactylis

(a) Omnes pene refrigerant conf. PAXMAN *med. ind.* p. 16.

(b) *Spéct. de la nat.* VI. p. 313.

(c) Vidit olim HEISTER in *orat. inaugur.*

(d) *Amanit. Exot. Fasc. IV. Relat.* 9. In Ægypto multæ familiæ solis vivunt dactylis, NASSÉLQUIST p. 501. Musam addunt alii p. 494.

tylis beati vivunt. Bramines (e) vegetabili victu etiam nunc utuntur; pomis fere & aqua (f). Iisdem & lacte caprillo Arabes aliqui vitam sustentant (g), populorum antiquissimi, morumque aurei seculi tenacissimi. Cucumeribus pene solis, & crudis, constantinopolitani cives plerique (h) aluntur.

Etiam ad græcos Poetas, multo quidem posterioris ævi, ea fama manavit. Glandes (i), sub multo deteriori cælo, & arbuteos fetus nominant, illas equidem in Græcia & Hispania hætenus edules. In Suecia autem in cibos fuisse receptas, & de earum usu ex legibus constare, de nostra glandium acerba specie ægrius credo (k). Castaneis, adfini glandium fructu, apenninicolæ fere unice vitam tolerant (l).

Uti sensim per novum orbem se hominum genus dilatatum extendit, ita ex regionum varietate alii & alii terræ fructus in cibum sunt recepti, melones, herbæ succulentæ, ipsi musci, lichenes (m), & fungi. Natura enim humana nihil detrectat, nec gramina quidem, quæ puerum edentem vidi, & quæ eadem ille TULPIANUS (n) edit, nec filipendulæ radices (o), plantasque venenatas (p). Cortices arborum tritas pini & abietis boreales gentes (q) non dedignantur. Gummi quod arabicum dicunt, mauros (r) alit.

Sensim artes inventæ, & primum, puto, radices effossæ sunt, quæ in regionibus fervidis multæ & bonæ nascuntur: Cassava (s) certe panem insulis sacchariferis ministrat, nymphaeæ radix, & papiri Ægypti

(e) GROSE *voyag.* p. 297.

(f) SUIDAS p. 454.

(g) RADZIVIL p. 215.

(h) TOURNEF. *Voy. au Lev.* II. p. 286.

(i) In Hispania secundis mensibus glandes inferuntur PLIN. L. XVI. c. 5. Iis vescuntur Lusitani STRABO *descr. Afr. occid.* L. V. p. 350. In Africa & Hispania edules sunt REDT *Lett.* T. V. p. 44. 46. & inter nuperos facetissimus CERVANTES in II. heroicorum equitis D. QUICHOTTE c. 67. Et *Quercus fr. eduli* Enzina apud CARDAN. *subtil.* L. VIII. *Quercus parva sive phagus Græcor & Esculus* PLINII I. B. T. I. L. II. p. 74. Etiam Japonenses glandibus vescuntur *Hist. des Japon.* p. 176.

(k) GADD. *Frostnäster* RUDBEK *atlant.*

(l) PINELLI *de acido sang.* p. 72. 73.

(m) Japonenses, Algonquini LAFITEAU *mœurs des Sauvages* T. II. p. 92.

(n) L. IV. *obs.* 10. p. 296. Alius apud RASCZYNSKI p. 355. Alius apud KERGER *ferment.* p. 187.

(o) Veteres fucci; ari aquatici radices radices nuperis.

(p) Japonenses l. c. p. 162.

(q) HÖGSTRÖM *lapland.* p. 24. LÖCHSTÖR *method. med.*

(r) ADANSON *relat.* p. 38. Caravana abyssinica eo vixit HASSELQUIST p. 533.

(s) A COSTA, WAFER p. 101.

tios aluit. Hottentotti multas radices in usum recipiunt : Inhamies & Solana , illa quidem in America calida , hæc in Peruvia ipsa , plurimo usu veniunt. Ipsi Jakuti , alique per sibiriam Tartari , radices varias lathyri , hedyfari , liliorum , & quas non alias in cibum recipiunt.

Aliquanto ultra profecti in artibus homines demum gramineas plantas peculiari studio excolere ceperunt , quarum farinosa semina multum alimenti suppeterent , & plus , quam horæi fructus , redderent virium , & præterea non perinde usu absumerentur , sed circa hominum tabernacula ea copia , qua esset necesse , possent excoli , & ad remotos usus fervari. Ergo Mayz in America continente (t) , in Africa milii genera varia , oryza in India orientali , sesamum in calidioribus Asiæ regionibus , ubi triticum deficit (u) , triticum & aliæ plantæ ejus tribus in Asia citeriori , & in Europa magna copia cultæ , necessitatem fructuum horæorum , glandiumque minuerunt. TRIPTOLEMUS , agri colendi auctor , glandibus otium fecit.

Mature etiam mitia animalia , oves , bovesque ; etiam capras , equos & camelos hominum industria jugo suo subjecit , habuitque paratas inde dapes , lac ex feminini lactis familiaritate notum : exque lacte paratum pro varietate regionum caseum , butyrumve. Lactis analysis fere quæ plantarum est , succosque dat acidos (w) , absque fere urinoso sale : Sed etiam fermentationem concipit & destillando dat spiritum inflammabilem (x) , ut mihi , ægrius credenti , de equino lacte fidus testis GME-LINUS confirmavit , a juventute familiaris meus (x*).

Probabile fit , & ostendunt primævæ historiæ diu , & aliquot puto seculis , vegetabili cibo solo & lacte (y) homines contentos fuisse. Nominant fabulæ Hyperboreum , Martis filium (z) , aut PROMETHEUM (a) aut Pygmalioni coævus (b) homines suis civibus detestatos (c) , qui primi sustinuerint aratori bovi jugulum aperire , aut mitissimæ ovi se præstare carnifices.

(t) A COSTA *hist. natur.* L. IV. c. 16.

(u) DIODOR. L. XIX. c. 13.

(w) GEOFROI *Mém. de l'Acad.* 1732. p. 22.

(x) LISTER *de hum.* p. 134.

(x*) Vide L. XXVIII. S. 1.

(y) Ante diluvium eam fuisse diætam HECQUET *med. Theol.* P. I. & olim patres ut TERTULLIANUS in *Epist. de cib. Judaico* & HIERONIMUS adversus JOVINIAN. L. I.

(z) PLIN. L. VII. c. 3.

(a) Ibid.

(b) PORPHYRIUS *περι αποχης* L. IV.

(c) Homines facinorosos *infirm. valet. tuend.* p. 119.

Erat enim fatis virium alibilium in iis, quæ enumeravimus, vegetabilibus; ut inde homo vitam sustentaret, magnæque etiam nunc regiones; gentesque, nihil ultra in cibum recipiunt. Etiam unicâ harum dapum vita commode alitur. Solo fructu cacao (*d*) nautæ integro mense læti vixerunt. Castaneis (*e*) fere solis, ii quos dixi, appenninicolæ, & Chii in obsidione urbis (*f*) suæ se sustentarunt; hordeo tosto canarienses (*g*) insulani; fabis cum pane (*h*); aut fabis solis, alii (*i*). Fagus prunifera illa californiam nutrit (*k*). Aqua falicis, aqua hordei & oryza in lacte amygdalato ex febre Spahani convaluit celebris itinerum scriptor, eques CHARDIN (*l*). Pane & aqua ad remum damnati aluntur, & etiam alii casu ad eum cibum compulsi (*m*). Pomis & aqua Brachmanes (*n*) senescunt. Pane, succo limonum, & oleo Ligures (*o*) genuensis oræ montanæ incolæ; Melle, Mandioca [f. Cassava.] & pomis acajou (*p*) Brasiliiani vivunt. Solis fructibus horæis RONDELETIUS (*q*). Solis ficibus MOSCHUS & ANTIMOLON sophistæ (*r*), Dactylis cum lacte Arabes (*s*). Sponte nascentibus herbis, radicibus & aqua primi in Thebaide (*t*) eremitæ. Gummi milio & lacte Senegallenses (*u*). Leguminibus absque igne juvenis Ægyptius (*w*). Rhizophagos, & hylophagos æthiopes DIODORUS habet (*x*).

(*d*) FUNNEL *voyage* p. 59. Chocolata sola alii AVANZINI *de chocolata* p. 20. & ad senium usque gubernator insulæ GUADALOUPE de MILHAU *du cacao*, tum aliquot annis I. Fr. GABRIELLI apud SERAFINUM p. 14.

(*e*) PINELLE.

(*f*) PLIN. L. XVI. c. 5.

(*g*) SPRAT *hist. of the Royal. Societ.* p. 212.

(*h*) Ad triremes damnati *Hamburg. Magaz.* T. XXI.

(*i*) MUNDIN *Escult.* c. 2.

(*k*) Apud Mich. de VENEGAS in *hist. Californ.*

(*l*) *Voyag.* T. III. p. 189. Conf. p. 176.

(*m*) Phthificus in carcere. MANETTI ad SAUVAGES p. 116. WILLIS *Pharm.* II. p. 70. Alius, arthriticus CRATON *confil.* L. IV. p. 110. Add. CAMER. *Cent.* IV. c. 5. 6. la METTRIE p. 153. *Apoll. Med.* p. 41. b. MEAD. *monit.* p. 203.

(*n*) SUIDAS p. 454.

(*o*) PINELLI p. 73.

(*p*) PISO *hist. brasl.* L. I. p. 12. 15. add. LERY p. 109.

(*q*) STOLLE *Hist. der medecin. Gelarth.*

(*r*) ATHENÆUS.

(*s*) RADZIVIL p. 215. conf. p. 194.

(*t*) Conf. vitas PAULI & ANTONII, & FRANCISCUM BACON de VERUL. *hist. vitæ & mort.* p. 139. 179.

(*u*) ADANSON l. c.

(*w*) GALEN *facult. anicæ.*

(*x*) L. III. c. 23. 24.

NEWTONUS, dum optica scribebat, solo pene vino, pane & aqua vixit (y).

Denique & solo lacte, & ex ejus diminutione aliqua, fero, de quo pinguedo plurima secessit, vita etiam ad multos annos sustentatur. Lacte vixit vir eruditus *Vincentius* PLACCIUS Hamburgensis Professor. Lacte & pane alius (z) 20. annis, & olim nomades (a): & is victus adversus podagram (b) tabemque (c), in consuetudinem abiit. Lacte, & paucis, diebus 37. Bergomolettanæ feminæ vixerunt, & alii per menses homines (d). Vix alius cibus alteri per 26. annos fuit (e). Tota vita PHILINUS (f) lacte sustentavit. Hydrogalacte per tres annos puella (g). Sed fero omnino lactis solo per 18. annos vixit FERGUSON (h), & femina per 16. annos (i); summusque testis BOERHAAVIUS (k). Cum pane biscocto magnos inter labores alii (l). Imo, cum alter porcus lacte, fero alter, aut aquato certe lacte (m), aleretur, iste potius obesior factus est (n). Nostri etiam Alpicolæ plurimos porcos solo tenui lactis fero educant, quod & de caseo superest, & de recocta.

Vita animali plurimi Monachi carent (o) olimque Philosophi (p); aliique (q) multi, inter quos est de nostra cognatione vir decrepiti nunc senii, totique familiæ superstes, qui nunquam carnem gustavit. Et

(y) CHEYNE *diseas. of body and. mind* T. II. c. 2. p. 80 Cum sua vegetabili diætâ Brachmanes sensibus, etiam gustus & odoratus tenerioribus fruuntur GROSE *voyag.* p. 297. & Benjanæ ad opera textoria Europæos superant, quod digitorum sensu sint acutiori *Hist. de la guerre des Indes* T. I. p. 10. HARVEYUS, ut accuratius luderet, pane & aqua cum dimidio in diem puilo se sustentavit, apud G. CHEYNE *diseas of body and mind* T. II. t. 2. p. 80.

(z) BAYNARD p. 470.

(a) Add. GREISEL *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs.* 141.

(b) FOREST L. IV. c. 10. NARDI *Not. Genial.* p. 61.

(c) SOMIS *raggionam* p. 124.

(d) COLUMELL L. VII. d. 2. Numidæ lacte vivunt cum farina SALUST. p. 216. Eas puto vult gentes ARETÆUS curat. *diut.* I. c. 8.

(e) *Journ. de Med.* 1760. Aug.

(f) Apud THEOPHRASTUM.

(g) BUCHNER *Miscell.* 1728. p. 979.

(h) *Phil. transf.* n. 466. UMFREVILLE proprio lib.

(i) BRUYERIN. L. II. c. 6.

(k) G. v. SWIETEN *Comm.* T. I. p. 115. *Prælect. Boerh.* T. I. p. 121.

(l) MARTIN *Western. Isl.* p. 203.

(m) CHEYNE *Sanit. infirm. tuend.* p. 233.

(n) CHEYNE *diseas. of body and. mind.* p. 130.

(o) RECUEIL *Obs.* XI. In M. Catharinæ longævi & fani HAYMAN *reyzen* T. II. p. 182. 183. Monachi de la trappe ap. HECQUET *pharmac.* p. 290. Reiseliiani, non romani, monachi apud ACKELL *nyc Sverige* p. 442.

(p) ZENO. PLOTINUS, CHRYSANTIUS, apud PLEMP. *valetud. togat.* p. 156. 157.

(q) HEERS *obs.* p. 247.

in universum in regionibus calidis parvus carniū usus est (r); primumque, ad quod in adversa valetudine stomachus horret, caro est, dum fructus horæos, acoremque vegetabilem appetit. Ferunt etiam facilius etiam majorem eorum ciborum usum, qui nobis nimis refrigerare videntur, ii homines, qui in iis calidis regionibus vivunt, & sunt in Persia, qui 35. pondo melonum absque malo vorant^(s).

§. IV. *Cur ad carnes sit ventum.*

Salubris utique victus est excarnis, quem hactenus descripsimus, ut & hominem suum bene alat (a), & vitam ad multos annos producat (b), & morbos ex aliqua nimia sanguinis acrimonia & spissitudine ortos, aut arceat (c), aut fanet (d).

Sensus etiam Brachmanibus accuratiores esse legas (e), & athletas tritico & caseo pastos fuisse, ante PYTHAGORAM (f) iatraliptem.

In universum tamen sunt sua incommoda victu vegetabili. Sæpe tentavi, ob podagram; ob bilem putrescibilem, quæ faciebat, ut carnes non ferrem absque agrypnia. Semper sensi debilitatum (g) universum corpus, ad labores, ad venerem inertius.

(r) Minorch CLEGHORNE p. 55. in Persia CHARDIN. L. IV. p. 166. in India IBID. in Italia RAI *topogr. observ.* p. 395. in Ægypto, æstuosis mensibus MAILLET II. p. 227.

(s) CHARDIN. L. IV. p. 51.

(a) BARRY *triple digest.* p. 97. CHEYNE *of health and long. life.*

(b) *Tr. des dispenses du Carême* T. 2. p. 14. In *Theologica sua Medicina* HECQUETUS longævitate, antediluvianarum ab usu carniū diminutam fuisse dixit.

(c) Nulla podagra in Apennino ob acidi abundantiam PINELLI Firmiori fuisse valetudine nobilem familiam, cum ob paupertatem pomis, pane & aqua sustentaretur BAYNARD p. 439. Similia SINOPEUS habet *parerg.* III. p. 63. 64. Pulchræ sunt, quæ castaneis vivunt solis TARGIONI *viag.* l. c.

(d) In tabe FOREST. In hæmoptoe cum fætido halitu, a carcere & aqua mera sanitas restituta WILLIS *Pharm.* II. p. 70. Phtisis superata MANETTI l. c. Podogra lactis usu sanata LOBB. p. 270. BAYNARD. l. c. GREISEL victu tenui PORPHYRIUS. APOLLO. MEAD. *monit.* p. 205. CRATO *Consil.* L. I. p. 102. & 106. RAHM ad RONCALL. *Europ. med.* p. 135. LOBB. p. 216. 222. CAMER. *Cent.* IV. *obs.* 5. 6. &c. Epilepsia CHEYNE *febr. lax.* caries tibiæ DEIDIER *consult.* III. p. 96. Benjani minus morboſi CHARDIN IV. p. 80. 81. Febres tertianas evitant, qui horæis fructibus multum utuntur CLEGHORNE p. 179.

(e) GROSSE *voy.* p. 297. add. NEWTONI exemplum.

(f) SCHULZE de *Athlet.*

(g) Etiam CHEYNE *of the gout*, p. 18. 19. ROBINSON *Essays of Oecon.* p. 354.

Ita expertus est *J. Theophilus* DESAGULIERS (*b*), ita plurimi eorum, quos citavi (*i*). Macilenti sunt illi Riefeliani (*k*). Itaque robusti homines tenerum victum vix tolerant (*l*), & ad duros cibos redeuntes melius convalescunt (*m*).

Robur fibræ a vegetabilibus succis, & ab aqua minuitur (*n*), & solidum stamen ab ea diætâ non sine periculo relaxatur (*o*) & sanguis flavus manet, faciesque pallida (*p*). Ex victu hordeaceo & ptisana frequens anasarca. Hispaniolæ incolæ debiles ob cibum potissimum vegetabilem (*r*). Sola pulte robur suum non alere possunt Americani, nisi carne vel piscibus se confirment (*s*).

Video objici, gentes solis vegetabilibus usas, feroces tamen (*t*). Sed mihi utique videtur, quemque populum aratorem mitiorem esse, deinde pastorem, ferocissimos populos venatores, qui solis pene carnibus vivunt.

Et est omnino inter plantas succosque humanos minor, quam inter eosdem succos & animalia similitudo. Plantæ pleræque acescunt: & ostenditur proprio loco, quam pertinax plerisque natura acida inhæreat (*u*). Et tamen eam vincere oportet, ut nostri fiant.

Quæ plantæ aromaticæ sunt, eæ omnino parum faciunt ad alendum, cum viscido illo blando destituuntur, quod ad priores fibras adhærescendo nutrit.

Quæ alcalescunt, eæ ita succulentæ sunt, ut præter aquam exiguum quid farinosi superfit, idque ipsum nimis acre, cui parum cum chylo, & cum sanguine ipso conveniat.

Omnes quidem plantæ alere possunt, sed parciore parte sui, sola quam exiguum pleræque continent, farina; & ejus farinæ gelatinosa parte. Hinc immensa vis pabuli vegetabilis requiritur, & vacca batava 46. libras

(*b*) Apud LOBB. p. 218. 219.

(*i*) FERGUSON conf. p. 198.

(*k*) ACRELL l. c.

(*l*) BENNET *theatr. tabid.* p. 4.

(*m*) SWALWE *querel. ventr.* p. 101.

(*n*) ROBINSON *Oeconom. ed. II.* p. 314.

(*o*) KINNEIR *nerves.* p. 93.

(*p*) STURRE *phlebot.* p. 117.

(*q*) MONRO *de hydropt.* p. 9.

(*r*) CHARLEVOIX *hist. de S. Domingue.*

(*s*) LAFITEAU p. 89.

(*t*) MACCENZIE *hist. of bealth.* p. 49.

(*u*) L. XIX. Scæ. V.

graminis intra 24. horas confumit, non triplo homine ponderosior (*u**).

Et etiam eo majoribus viribus eget, & longiori vitæ labore, ut acefcens farina in glutinis alcalefcantis naturam tranfeat.

Hæc eft caufa, quare vegetabiles cibi minus nutrant, minus dent roboris.

Peculiariter etiam lac cum pane facile aut fodam facit, aut in con- gula mutatur (*w*) etiam valde diuturna, & magna datura mala (*x*), inque ipfos denique calculos tranfitura, qui per anum defcendunt (*y*).

Acida vero nimia, ipfaque poma citria (*z*), villofam tunicam erodunt, & colicam fecerunt pictonum (*a*).

Horæi cibi frigoris fenfum in ventriculo faciunt, ex cucurbitaceis fructibus etiam graviorem & periculofum (*b*).

Farinofa cum aqua cocta in lentam pafam coeunt, quæ in ventriculo hærens cephalæam fecit & fcotomiam (*c*). Eadem fere omnia etiam flatibus abundant, ut quorum pars magna (*d*) fit aer. Etiam in flore- nte planta tantum eft aeris, ut ventriculus inde ovibus crepet & equis, nifi incifo intestino fanarentur (*e*). Ex pifis vehemens colica (*f*).

In obfidione farinofa aquofum fecerunt languorem (*g*).

Ex victu gramineo dysenteria epidemica dicuntur fuiſſe (*h*) nata. Ex antiſcorbuticis fummus fætor oris in hypochondriacis (*i*).

(*u**) BOERHAAVE *prax.* I. p. 171.

(*w*) ZELST *de podag.* p. 34.

(*x*) La METTRIE *obſ.* 48. MONGIN *d'un Epiploon. petrifié.*

(*y*) MONGIN. *ibid.*

(*z*) ORTLOB apud ADOLPHI *oper.* p. 311. A nimio ſucco limonum cardialgia melan- cholica, fale tartari fanata celeb. LORRY *de melanch.* p. 258. Nihil tamen mali a plurimo o leo vitrioli fenſi, quod aqua dilutum ſumſi, paulum a pari copia alcoholis domitum.

(*a*) TRONCHIN *colic. picte.* p. 84.

(*b*) HASSELQUIST *de batech.*

(*c*) ANDRY *tr. des alim.* p. 293.

(*d*) HALES *veget. ſtat. exp.* 57. Piſorum integra tertia pars eſt aer.

(*e*) CHESELDEN *anat.* p. 161. *Corps d'obſ. de Rennes* II. p. 84. Ex lupinis perit. hip- popotamus HASSELQUIST p. 202.

(*f*) *Tr. des diſpenſ. du Carême* p. 106. 107.

(*g*) HIPPOCR. *de diata* L. II. p. 216. LIND.

(*h*) XERXIS ex Græcia profugi exercitus HERODOTUS L. VIII. c. 115.

(*i*) BOERHAAVE *prax.* I. p. 169.

Multæ etiam inter plantas venenatæ sunt, fungi (*k*), umbelliferarum sæpe radices, etiam pulcherrima poma (*l*), quæ novi orbis invento-ribus frequenter imposuerunt.

Denique in regionibus ad boream valde vergentibus raritas est ve-getabilium, cum neque fructus horæos tellus ferat, neque etiam radi-ces (*m*), edules satis abunde reddat; sed neque graminis demum ferat tantum, quantum miseris incolis, ad stipanda tibialia, & arcendum frigus est necesse. Ibi, cum terra noverca hominem neget nutrire, mare fere eam curam suscipit, pisciumque abundantiam suppeditat.

§. V. *Victus animalis. Pisces.*

Nescio an non primi inter animalia pisces in cibum sint recepti. Muti cum sint, non poterant eos sui doloris testes planctus edere, a quibus antè adfuetudinem credam haud multo segnius homines ad misericordiam commotos fuisse, quam nunc commoverentur, quando familiare sibi, carumque animal jugulant. Benjani etiam in antiquissima religione carent animali victu, præter pisces: & Ægyptii, qui Israelis tempore videntur armentorum sanguine abstinuisse, pisces tamen in usus suos traxerunt, & nostro ævo (*a*) trahunt, iis mensibus, quibus carne abstinent. Plures etiam longe populos reperio ichtyophagos, quam carnivoros.

Porro piscium natura inter vegetabilia & animalia ambigit. Putrescunt equidem, & celeriter quidem (*b*), & plus dant fætidæ alcalini liquoris, quam carnes bubulæ (*c*), etsi ob aquæ (*d*) copiam minus habent salis ficci (*e*).

(*k*) Frequentes inde monspeli morbi GUIARD p. 295.

(*l*) Manzanilla DAMPIER I. p. 39. OEXMELIN *avantur* p. 16. 17. *Journ. de médec.* 1757. Dec. Ricini tertia species amygdalarum similis, tamen vehementer purgat LEWIS *mater. med.* p. 469. Manzanillam nullum animal tangere, neque homini ad pomum nocere posse, quod ob scindentes apophyses lente demum edi possit, ut interim acerrimus sapor se prodatur Cl. JACQUIN *Plant. Antill.* p. 251. 252.

(*m*) Ipsa cassava recens & succi plena WAFER p. 101. Mel colchidis venenatum DIO-DOR. L. XIV. c. 37.

(*n*) *Hamb. Patriot.* T. III. p. 404. & imprimis EGEDE *Gamle Grönlands nye per-lustration.* Et circa *hudsonhay avoyag. for the discovery of the northwest passage* p. 218.

(*a*) MAILLET l. c.

(*b*) *Mém. sur la maniere de rassembler &c.* p. 53, hinc spiritum debilitant in quo suspenduntur.

(*c*) *Mém. de l'Acad.* 1732. p. 23.

(*d*) BOYLE *chym. scept.* P. II.

(*e*) LEMERY *cours de chymie.*

Gelatinam etiam suppeditant (*f*), pene æque abundantem; cæterum paucissimi cum sint sanguinis, & pinguedinem vel nullam habeant, vel perpaucam, cum gelatina etiam aquosa sit & tenuior, minus utique alunt, minus sanguinis rubri faciunt, minusque dant roboris, quam carnes: ut eam debilitatem & ipse expertus perceperim, & invenias tempore quadragesimali ab aliis esse perceptam (*g*). Non adeo absque ratione monachi, generationi non destinati, a Romana ecclesia aut ad majorem, aut ad unicum piscium usum, legibus adstringuntur (*h*).

Et tamen multæ sunt, etiam nunc, gentes quæ pene ex solis piscibus vitam sustentant: miseri primo incolæ novæ Hollandiæ (*i*), quibus præter pisciculos a recedente mari in foveolis per arenosa littora desertos; nullum nutrimentum suppetit: Deinde circa persicum sinum, & in Arabico littore, & in Persico: nam circa Mascata (*k*), ipsa pecora diximus piscibus, & quidem putridis, ali: & eos circa Æthiopiæ fines ichtyophagi populi olim exstiterunt (*l*). Piscibus etiam Africani aliqui pene solis vivunt (*m*).

Sic in littore Kermanico (*n*) & Gedrosico (*o*), & olim & populi Babylonæ finitimi (*p*), & circa Araxem (*q*) alii piscibus unice se suæque pecora aluerunt, & nunc alunt (*r*).

Eadem, & major sub boreali cælo ejus victus est necessitas. In aridis enim sinus Persici plantæ tamen sunt, vicinæque palmæ: hic sub severissimo cælo ne gramina quidem adolescunt. Incipit is ex piscibus victus in insulis Hebridibus (*s*), Scotiæ vicinis, & in Orcadibus (*t*); transit in

(*f*) Caro bubula dat ex unciis quatuor extracti grana 108. vitulina grana 174. cyprinus grana 152. lucius grana 168. cancer carnivorus grana 177. Vipera grana 108. Ranæ nullam gelatinam dederunt. testudo perpaucam. Ex *Mem. de 1730. 1732.*

(*g*) Garthusiani pallidi, & debiles PECHLIN *obs.* p. 513. Bajulis a piscium usu minus est virium Id.

(*h*) Magis naturalem esse victum *macrum* HECQUET *tr. des dispenses du carême.*

(*i*) Apud DAMPIER.

(*k*) OVINGTON.

(*l*) HERODOT. L. III. p. 193. DIODORUS *Sic.* L. III. c. 16.

(*m*) Tamen cum nucleo palmæ LABAT *afriq. occid.* V. p. 168.

(*n*) NEARCHUS PLUTARCHUS.

(*o*) NEARCHUS apud ARRIANUM in ind. DIODOR. STRABO L. XV. p. 470

(*p*) STRABO. L. XVI. p. 512.

(*q*) HERODOT. L. I. p. 94.

(*r*) TAVERNIER L. I. c. 9. p. 258. THEVENOT.

(*s*) MARTIN. *West. Isl.* p. 267. 373.

(*t*) MARTIN. p. 373.

proximam Färö (*u*), & in Islandiam (*w*), & Lapponiam (*x*), tum in Grönlandiam (*y*), ubi omnino nihil suppetit alendo homini aptum. Pergit ea consuetudo in congenerem gentem Samojedorum, Ostiacorum (*z*), easque gentes, quæ habitant Jenisæ fl. & Ob. & Tass. frigidissima ostia.

Etiam in nova Marchia piscatores solis fere piscibus se sustentant (*a*) Sola testudine in America prædones itineratores sæpe diu vixerunt. Severiores inter religiosos Romanensium ordines, ut carthusiani; etiam virgines moniales aliquæ, idem vitæ genus sequuntur; singuli demum passim homines (*b*).

Tantum etiam valuit religio, ut ex ovariis sturionum (*c*), & belugæ piscis (*d*), & cyprini (*e*), sale conditis, contusis, inque sole ficcatis & in sphæulas compactis, oleoque submersis, cibus *caviar*; ex cephalo vero sive mugilis ovis sale adpersis, & pondere imposito pressis (*f*), folique expositis *ωα ταριχα* sive *boutargue* eodem scopo parentur, quorum utrumque ciborum genus per gentes græcæ ecclesiæ addictas maxima copia consumitur, etsi Philosopho itineratori TOURNEFORTIO detestabile visum est (*g*).

Miramur hodie, maxime qui a mari remoti habitamus, & vivos pene pisces desideramus, quos solos edere placuit, ut potuerit antiquitas sibi in putrido humore eorum animalium placere. Encrasicholum (*h*) feras, ex quo super prunas in aceto soluto optimum fit garum (*i*).

(*u*) DEBES p. 279.

(*w*) PEYERE *relat.* p. 8. ANDERSON p. 116. 120. *Melanges* I. p. 199.

(*x*) ANDERSON p. 120. Hi tamen & Islandi & Faröenses etiam alium cibum edunt.

(*y*) ANDERSON p. 251.

(*z*) *Relat. des Voy. au Nord.* p. 8. IDES. p. 55.

(*a*) RICHTER *Ichthyothéol.* p. 328.

(*b*) LEIGH: *natur. hist. of Lancash.* p. 141.

(*c*) TOURN. *voyag. au Levant.* T. III. p. 110. *Miss. du Levant.* II. p. 204. HARVEY *gener. anim.* p. 6. CATESBY II. p. XXXIV. QUIQUERAN *provinc. laud.* p. 426. PANCIROLL *invent. novant.* T. II. p. 308. GERING *disp. de piscat. Salm.* p. 20. BRADLEY *countr. lad. dir.* T. II. p. 23. AVRIL *Voy.* L. II. p. 96. PECHLIN *purg.* p. 450.

(*d*) *Diction. du Comm.* II. p. 491. PERRY *state of Moscow. Voy. au Nord.* VII. p. 326.

(*e*) Salmone apud suecos. GERING. *diff. de eo pisce.*

(*f*) TOURNEF. *Voy. f.* I. p. 931. PECHLIN l. c. PANCIROL. *Quiqueran.* p. 42. Ex *mugile & cyprino* HARVEY. Ex *pisce boury aut boutry* in Ægypto *Relat. des Miss.* T. VI. p. 241.

(*g*) L. c. Caspio tamen ex mari melius eorum ovorum genus, quam ex Euxino, adferri fatetur II. p. 259.

(*h*) ÆLIAN.

(*i*) RONDELET p. 210.

Sed veterum garum mera erat putredo (*k*), quam tamen auro (*l*) contra rependebant. Parabatur ex pisce primum garo (*m*), deinde posteriori tempore ex scombri (*n*), in Hispania, interaneis, quæ abjici solent, cum vino putrefactis.

Neque penitus gari usus obsolevit, cum in Lotharingia (*o*), in Tunkino (*p*), ex squillis & cancris fætidissimis in Aracan ex piscibus (*q*) etiam nunc paretur. Alia demum fæx non colata (*r*), & vinum gari romanis in usu fuerunt. Iis horridis putrilaginibus suum cibum intingebant, orbis domini.

Eo minus mireris Arabes (*r**) locustas edere, tum Mauros (*s*), & Californiæ incolas (*t*), & Æthiopes aliasque (*u*) gentes; & cicadas ab aliis (*w*), ab aliis bulones (*x*), in cibum recipi, ab aliis araneos, scorpiosque (*y*).

Parum enim hæc a piscibus differunt, cum quibus conveniunt frigido sanguine, & natura putredinosa.

Cæterum frequentior piscium usus in sanguine noxium facit acrimoniæ genus, ex quo scabies (*z*), mutata epidermis (*a*), morbus pedicularis (*b*), lepra (*c*), scorbutus (*d*), ulcera maligna (*e*), febres (*f*) sequuntur. In

(*k*) SUIDAS, SENEC.

(*l*) CONGIUS 2000. num. vendebatur.

(*m*) PLIN. L. XXXI. n. 43. ATHENÆUS L. III. MARTIALIS.

(*n*) Etiam thynni intestinis, & lupo, & apua PLIN. ibid. n. 44. Ex filuro & aliis CAEL. Chron. L. II. c. 1.

(*o*) STEPHANUS de nutrit. p. 55.

(*p*) GERVAISE voy. au Siam. p. 105. LOUBERE. Ex piscibus in Tunkin DAMPIER Voyag. L. II. p. 28.

(*q*) OVINGTON.

(*r*) PLIN. n. 44.

(*r**) HASSELQUIST p. 414. 415.

(*s*) ADANSON relat. p. 88.

(*t*) M. de VENEGAS Hist. of Calif. T. II. p. 38.

(*u*) In insulis Bashee DAMPIER Voy. I. p. 430. cui non displicuerunt. In Tonkin Id. Persæ pauperiores iisdem vescuntur KÆMPFER de palmiet.

(*w*) SALA de aliment. p. 8.

(*x*) Absque noxa Gall. di Min. T. VI. p. 310.

(*y*) BARTHOL. Cent. IV. Hist. 95. Bresl. Saml. 1725. M. Apr. RHOD obs. 91. Cent. III. SALA l. c.

(*z*) Epidemica ex usu Sardinarum Mém. de l'Acad. 1749. p. 134.

(*a*) Ex pisce asello Lingfish, ejusque potissimum hepate MARTIN p. 190.

(*b*) Apud Acridophagos DIOD. L. III. c. 29.

(*c*) In insulis Shettlandicis & Orcadibus pingui ex hepate MARTIN p. 373. In Farö DEBES p. 279.

(*d*) CHEYNE infirm. valet tuend. p. 61.

(*e*) Ex locustis VENEGAS l. c.

(*f*) Pisces ex Albi STÖLLER Wachsthum p. 40. Ex adipis balænarum usu aliquando Kamtschadalenses perire Natur. hist. of. Kamtsch. p. 141.

ipsis animalibus, quæ piscibus pascuntur, rancidus (*g*), adeps est & fluidus, lac ingratum, (*h*) carnesque fætidae (*i*).

§. VI. *Carnes.*

Incertum est, quo tempore carniū usus inter homines invaluerit: & possit credi, a diluvio (*a*) primordia ejus mutationis repetenda esse, cum arbores fructiferæ nondum ita convaluissent, ut cibi esset satis: etsi neque ea monumenta directe ad rem faciunt.

Necessitatem credas has cruentas & inimites dapes introduxisse; si animalia domestica prima in usus hominum cesserunt, ut ex sacrificiis (*b*) possis suspicari; non satis tamen firma conjectura. Vel vindictæ genus fuerit, si animalia ferocia, & noxia superata victoris hominis iram suo cadavere placarunt, uti ira etiam furorque bellicus homines anthropophagos reddidit, non quod humana carne ut cibo familiari alantur, sed quod hostes suos non satis reputent se ultos esse, nisi etiam mortuos lacerent (*c*).

Ex utraque causa carniū usus a suis principiis celeriter & continuo invaluit, frustra repugnantibus, ut aliqua vetusta documenta habent (*d*), legibus, & frustra revocante pristinam simplicitatem PYTHAGORA: si quidem revocare admisus est, nam alii ajunt, soli bovi aratori & arieti ejus viri leges pepercisse (*e*), aut solis nonnullis animalium partibus (*f*).

Præcipua utilium carniū penus est ex animalibus herbivoris (*g*), quorum lac mite, urinæque & fæcum modicus fætor, caro ipsa neque prædura est, neque fætida, & multum habet gelatinæ, potissimum ju-

(*g*) In porcis BIRCH T. I. p. 376. BOYLE *possib. of resurr.* BEHRENS *diat.* p. 188.

(*h*) KALM *Amer. resa* p. 129. In avibus *Fränk. Anmerk.* II. p. 448.

(*i*) Apud Tartaros *Jupi hist. des Chinois* p. 82. Notus est pisculentus sapor avium pisces rapientium BOHN *mensur. anim.* p. 476.

(*a*) *Genes.* IX. v. 3.

(*b*) Abelis *Genes.* IV. v. 4.

(*c*) Anthropophagos veros existisse in Brasilia defendit PRISO *de re natur.* L. I. p. 14. Sed negat, post tot itinera, DAMPIER se gentem Anthropophagam reperisse I. p. 485.

(*d*) PORPHYRIUS l. c.

(*e*) SUIDAS III. p. 243. add. LAERT L. VIII. c. 1.

(*f*) Melanuro: nullo pisci; cordi; vulvæ ID. p. 234. A corde & alba gallina & morticiniis abstinuisse ÆLIANUS L. IV. c. 17.

(*g*) CHEYNE *inf. val. tuend.* p. 34.

nior (*b*). Bos, & ovis macellum pene foli ingrediuntur: Equus, nihilo immundior, asinus, camelus, hircus (*i*), Tartaris, Patagonibus (*k*) & Arabibus solis placent. Lepus & cuniculus, & ejus classis in india animalia, pariter sed rariori sunt in usu, cum ea non sint domestica.

Carnivora quadrupeda parcius (*l*), in mensas hominum recipiuntur (*m*). Plus habent falis urinosi (*n*), inque ipsa carne ferinus odor residet. Qui canis, aut vulpis, aut felis, odorem norunt, vix credant iis, qui leonis (*o*), & tigridis (*p*), carnem vitulinæ comparant. Ipsa cornix cornicis carnem ingestam non potest coquere, & deglutitam vomitu rejicit (*q*).

Europæi, eorum animalium usum olim non dedignati, dudum deseruerunt, nam catelli inter HIPPOCRATICI temporis cibos reperiuntur (*r*). Chineses nihil detrectant animalis simile (*s*). Nigritæ oræ auriferæ canem, catum, elephantum, intestina, aves cum interaneis devorant (*t*). Sic tartari Jakuti, aliique. Avium aliquis est delectus. Carnivoræ, ut gens aquilarum, & accipitrum, & noctuarum, & piscivoræ, nunquam nisi in ultima necessitate admittuntur, ob factorem putridamque carniū naturam.

Granivoræ, herbivoræ, etiam insectivoræ sunt in deliciis: ut tamen, quæ alba sunt carne, totum nempe Gallinaceum genus & pavoninum, optimum & saluberrimum alimentum homini præstent: non ita quibus caro fusca est, quibus omnibus etiam firmiores sunt fibræ, & ægrius superantur.

§. VII. Carnium commoda.

Non dubium est in carne alimenti esse plurimum: quæ succos con-

(*b*) Vide GÉOFFROI *Mém. de 1730*. Tardius quam vervecem & bovem digeri ROBINSON *food and discharg* p. 95. Mihi semper aliter visum.

(*i*) Edi posse absque noxa, sed ob virus vitari. FORT. FIDELIS *relat. med.* L. I. p. 135.

(*k*) Equina fere vivunt *voy. à la mer du sud*. p. 295.

(*l*) Conf. LORRY *tr. des alim.* p. 370.

(*m*) LEMERY. Plurimum viperæ insectivoræ

(*n*) Ad mundandos pannos ad modum bilis utile GESNER. *hist. quadrup.* p. 189.

(*o*) SHAW. *trav.* p. 172.

(*p*) Americanæ PISO *hist. nat. ind.* L. III. p. 103.

(*q*) CHEYNE *infirm. valet. tuend.* p. 34.

(*r*) Σκυλακία. In Africa canina adhuc utuntur SHAW p. 134.

(*s*) Glires, feles, *hist. des Chinois* p. 362.

(*t*) *Hist. des Voyag.* L. IX. p. 318.

tineat (a) nostrorum simillimos. Gelatina quæ est in vituli fibris, nihil fere differt a lymphâ sanguinis humani: parum ab adipe adeps; lac a lacte pene nihil. Ut adeo in humanos humores animalium succi transeant, pene sola extractione est opus, deinde transfusione. Firmior etiam gelatina, & densior ex quadrupedum carne cogitur, minusque aquosa sunt ea omnia quæ ex animalibus prodeunt.

Quare robur majus est ab eo alimento (b). Robur enim pendet ab eo reparato, quod est amissum, aque copia rubrorum globulorum, & a tenacitate glutinis fibrarum.

Ipsa animalia carnivora pro sua naturâ multo plus habent virium. Etiam dictum est, vivaciore esse aves carnivoras (c), & aquilas rostrum mutare. Sed ea nimia sunt, & a Psittaci exemplo refelluntur, quam avem fructivoram omnium certa fide notarum avium vivacissimam esse per experimenta constat.

Integras ergo gentes, venatorias imprimis, carnibus vixisse nihil habet insoliti, quales olim Scythæ fuerunt, nunc Tartari (e) etiam Mongoli (f). Spernunt panem Arabes (g). Deinde veteres Æthiopes (h) olim aratrum non curabant: nunc mutatis rerum vicibus didicerunt frumenta colere (i). Priscis afriis caro ferarum erat pro pabulo (k). Sic nigritæ Goreenses victum vegetabilem nostro ævo contemnunt (l), & ferocissimi Gallæi (m). Sed etiam Brasiliæ indigenæ absque vegetabili cibo olim vixerunt (n).

Equina diximus carne fere sola Patagones vitam (o) alere: Lapones potissimum avibus & piscibus vivunt, cum perpaucis plantis (p).

(a) Repete ex *Mém. de l'Acad.* 1730.

(b) WAINEWRIGHT of meat p. 190. CASTELLAN de carnium esu L. I. c. 2. ROBINSON Oeconom. p. 314. add. LUDWIG *vict. anim.*

(c) Fr. BACO *hist. vit. & mort.* p. 82.

(e) *Algem. Reif.* T. VII. p. 78.

(f) *Recueil d'observ.* T. II p. 241. *Relat. des miss.* T. I. p. 21. *Relat. des voy. au Nord* II. p. 103.

(g) RADZIVIL p. 215.

(h) PLIN. L. VII. p. 373. HERODOTUS L. III. p. 168. Aqua sola cum carne cocta ali scripsit.

(i) LUDOLPH. *hist. æth.* L. I. c. 9. Hier. de LOBO *relat. d'Abissin.* p. 85.

(k) SALUSTE *Jugurth* p. 112. Ed. Glasg.

(l) BUFFON T. III. p. 460.

(m) LUDOLPH L. I. c. 16. absque pane aut lacte.

(n) P. Michael Angelus de GUATTANI.

(o) *Voyag. à la Mer du Sud* p. 295.

(p) LINN. *Flor. Lapon.* p. 70.

Americæ septentrionalis populi *Esquimantzic* & sola carne (q) [cum piscibus] & sæpe cruda, vitam tolerant.

Etiam atavi nostri Germani (r) veteres, & Britanni (s), carnibus solis vixerunt, tantum ut lac addederent. Et cum piscibus suis carnes, etiam putridas conjungunt Färöenses (t). Venatores illi Boucanniers, Lominum durissimi, sola carne aprorum longissimo tempore per solitudines Americæ vitam sustentarunt: & passim post naufragia varii (u).

Singuli etiam homines a prima ætate solis carnibus vixerunt (w). Fortissimi athletæ (x) solis olim caprillis carnibus alebantur. Normannus vagabundus (y) sola carne cruda summum robur adtigit, tum in insula *Juan Fernando Alexander SELKIRK* (z).

Dudum est adnotatum, eas gentes robustissimas esse (a), quæ carnibus & iis crudis vivunt, ut Tartaros, Brasilianos, Esquimantficos (b), tum venatores, quos diximus. Maximum robur fuit puellæ (c) ex incognita gente in Galliam advenæ & solis crudis carnibus victitantis. Semestris puella (d) Magellanica crudivora dentes habebat multos, & sola absque auxilio incedebat; imo, qui sola carne vixerant, cum ad panem redirent de robore suo multum amiserunt. (e). Et macrobii olim, ut ex publico testimonio audiebant, illi Æthiopes (f) carnivori fuerunt. Arabes absque pane ad senium perveniunt (g), & cum sua sarcophagia Islandi (h).

(q) ELLIS *hudsonsbay* p. 139. CHARLEVOIX *nouv. France* III. p. 179.

(r) Ex POSSIDONIO MEIBON *de cerevis.* c. 2.

(s) CÆSAR *bell. gall.* L. V.

(t) Sebum ovillum vetustum in paludibus defossus DEBES. p. 239. 275. 312.

(u) Angli carne cruda per tres menses vixerunt *Voy. à la mer du sud.* p. 278.

(w) TOZZI *de sex reb non natur.*

(x) ATHENÆUS. NONNUS p. 176.

(y) Du TERTRE *hist. des Isles Antill.* p. 146. 147. Add. OEXMELIN *hist. des avant.* I. p. 122. & *Voy. de Harmanfon* p. 429.

(z) DAMP. *Voy. aux terr. austr.* p. 188. 191. paucis cum herbis.

(a) Etiam LEEUWENHOECK *Epist.* 160. p. 169.

(b) CHARLEVOIX l. c.

(c) In proprio libello & *allgem. Magaz.* T. VII.

(d) *Voy. V. vais. par le détroit de Magell.* 321.

(e) CHARLEVOIX *nouv. Franc.* T. III. p. 211. du TERTRE l. c. Agilitatem amisit, qua triginta leucas cursu intra unum diem relegerat. Sic ALEX. SELKIR.

(f) HERODOTUS.

(g) 100. & 120. annos THEVET *cosmogr. du Levant.* p. 112.

(h) ANDERSON p. 116. Addunt tamen serum lactis, tum faröenses DEBEI p. 275.

§. VIII. *Carnei victus incommoda.*

Natura nutritia est in gelatina plastica. Ea mitis (a), & modice falsa plurimum requirit aquæ, & olei aliquantum.

Quoties sal abundat, jam acris, & fluida gelatina fit, & naturam adhærentem amittit. Quare intelligitur, merum victum animale non (b) præstare ejusmodi alimentum, quale ad nutritionem (c) optimum sit. Nimiam enim habet salis urinosi portionem.

Diximus, quæ ex victu pisculento incommoda fiant (d). Similia certe ex victu carneo superveniunt. Abundat nempe sal urinosus, factidi fiunt humores, etiam anima (e), urina gravis est & sudor (f): inde pruritus (g), scabies (h), lepra (i). Sed in ipsis humoribus sales alcalinis (k) proximi gignuntur. Et paulatim habitus totius corporis patitur (l), obrepunt diarrhœæ (m), dysenteriae (n) febres (o) periculosa (p), hæmorrhagiæ per omnes corporis canales (q).

Ex iisdem causis scorbutus (r) invalescit in obsessis (s) urbibus, & in navibus longos marium tractus penerrantibus (t) familiaris, in quibus parcitas est victus vegetabilis: deinde in regionibus frigidis (u), in quibus putrida corruptio lentiora, quam in calidis, mala facit. Ea enim

(a) Recte neque salem, neque terram, neque oleum, neque aquam debere nimis abundare LORRY l. c. p. 70.

(b) LANGRISH *prælice* p. 27.

(c) Scorbuticorum vulnera non sanantur PYRARD *Voyag.* III. p. 38.

(d) p. 205.

(e) BRUYERIN L. VI. c. 1. HUXHAM p. 63. Res in canibus in vulgus nota est.

(f) In Athleta illo, quem ex ATHENÆO & NONNO citavimus, tum HUXHAMII testimonio in carnivoro homine.

(g) HUXHAM p. 68.

(h) Ex suillæ abusu in Westphalia PLEMP. *valet. togat.* p. 161.

(i) Insularis MARTIN. p. 235.

(k) HUXHAM *fore throat.* p. 65. & 62.

(l) In Anglis *Voy. de la mer du sud.* p. 278.

(m) Ab echinis marinis TOZZI *de sex reb. non natur.*

(n) Anglis in India carnivoris CHARDIN. L. IV. p. 180. 181.

(o) HUXHAM p. 63.

(p) Hæcticæ HUXHAM p. 68. ex ipsis quidem salibus alcalinis: sed ex victu carneo p. 62. febris nata est. Etiam Luscinia ex nimio usu vermium farinae marcescunt *Aedologie* p. 60.

(q) HUXHAM p. 68.

(r) *Comm. Litt. Nor.* 1738. p. 60. h. 15. CHEYNE *sanit. infirm.* p. 200. & in Eben Ezer novæ Georgiæ oppido BOLZ *historiæ Salzburgenſium Cont.* I. p. 332.

(s) Jam Olaus MAGNUS: tum BACHSTROM *de scorbuto* p. 5. 6, 15. 16. In obsessio monasterio Bethlehemi HASSELQUIST p. 154.

(t) *Algern. Reis.* L. III. c. 1. p. 119. COKBURNE *seadiseases* PYRARD III. p. 35. ANDERSON p. 27. Inter Gallos, in America septentrionali se vallo tuentes, scorbutus sævit J. CARTIER.

putrida degeneratio in eo morbo manifestissima est. Memini, cum imprudenti consilio male obsequiosus homo herniosus, cætera sanus, diu sola carne assa vixisset, in veram & funestam incidisse hecticam febrem.

Ipsam jus vitulinum BOERHAAVIUS ferre non potuit, in quo tamen multus superest acor (w). Qui carnibus per 30. annos abstinerat, cum ad earum usum rediret, in phrenitidem & convulsiones incidit (x). Ipse factor alcalinus (y) macellorum aerem inficit, & in vicinia pestilentiores reddidit variolas. Sic a vapore putrido sentinæ funesta febris putrida (z) nata est.

Inter partes animales ovi natura ab acida remotissima est (z*) : durissima eadem coctu sunt, & periculosi abusus (z**).

Deterior, si quid deterius esse potest, cibus est nimis pinguis (z†). Et obstruit enim, & putrefacit. In cute stagnans oleum rancidum sua rodens acrimonia, facit lepram, ut ex hepate piscium in Hebridibus insulis, & ex sebo (a) putrido in Färö. Qui ossibus cadaverum effractis, medulla in caritate annonæ voluerunt vitam sustentare, perierunt continuo (b). Sic porci porcina carne pasti propria peste interierunt (c). Acrimonia rancida omnium est teterrima (d). Plerumque tamen ipse stomachus id veneni genus refutat (e), aut natura olei vim per lactea non finit transire. Villos in homine, nimis pingui carne abutente, adipe plenos & obstructos ostendit LIEBERKUHNUS (f).

Putredo ipsa carnes veneno facit similes, ut hypercatharSES inde nascantur (g) : adeo non reddit digestibiles (h), etsi reddit molliores, forte & iis sapidiore, qui factorem non timent.

(u) Monkii nautæ ad unum pene omnes extincti ZORGDRAGER p. 64. 65. Sic nautæ Lassenii, in nave IRKUZK orientales asiæ fines indagaturi.

(w) G. v. SWIETEN *Comm.* T. I. p. 115.

(x) *Journ. de Medec.* 1760. Aout.

(y) ROGERS p. 47.

(z) RUTTY p. 148.

(z*) PRINGLE p. 416. Vitellus minime omnium fermentat.

(z**) Mors a duris ovis 18. adsumtis LINN *Skonska resa* p. 300.

(z†) LUDWIG l. c.

(a) Apud Färöenses p. 209. hebridenses MARTIN. p. 285. 273.

(b) AVENZOAR *Theisir* T. III. c. 4.

(c) PETIT *de morib. Anthropoph.*

(d) BOERHAAVE *Mém. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 129.

(e) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 3. obs. 253. instar sebi coacta.

(f) Apud LOESECKE *von Arzneymitt.* p. 111.

(g) Conf. LANGRISH. *practice* p. 356. Ovum putidum vomitum movet BELLIN. *apusc.* p. 28.

(h) KNIGHT *vendicat.* p. 16.

§. IX. *Victus mistus.*

Quare natura nos ipsa in viam reducit. Sola vegetabilia debilitant (*a*), nisi multus labor copiae accesserit, solisque ardor. Sola animalia putrefaciunt. Utrumque ergo victum oportet commiscere, ut & vires a carnibus sufficiantur: & putredo per vegetabilem victum avertatur.

Scorbuti summum & pene solum auxilium est, in herbis recentibus (*b*), & in horeis fructibus (*c*), maxime acidis, ipsoque in citrio (*d*) pomo. Quibus herbae recentes suppetebant, nullus erat scorbutus circa Temeswariam, cum praesidiarii eo morbo vulgo perirent (*e*). Et soluta obsidione, atque reddita copia vegetabilium, sponte evanuit (*f*). Lepra insularum hebridum sale cum acetosa superatur (*g*),

Porci, ex piscium marinorum usu rancidi, restituntur dato ante mortem frumento (*h*).

Ergo uterque victus ita contemperandus, ut aliquantum praeponderet vegetabilis, sub coenam etiam magis, quia nocte minus recte digeritur, atque adeo major a putredine metus est. Deinde in regionibus calidis, morbisque acutis (*i*) vegetabilem victum augere oportet, in frigidis plus carni permitti potest. Ut praeterea quisque magis vehementis est

(*a*) p. 200. 201.

(*b*) COCKBURN *seadiseas*. p. 214. In classe, quae in Peruviam adplicaverat *Voy. de la flotte de Nassau* p. 80. 81. Add. *Voy. de Verhoeven* p. 20. *Voy. des terr. austr.* T. II. p. 27. BACHSTRÖM p. 8. 11. 18. &c. In Sibiria FERBER *ager. hort. praef.* p. 17. In Islandia ANDERSON p. 27. In Madagascaria oryza nuper nata salutaris fuit I. *Voy. aux Ind. Orient.* p. 328. Bethlehem nasturtium aquaticum HASSELQUIST p. 155. Scorbutus cum mania superatus victu vegetabili ORTESCHI *diarr.* p. 140.

(*c*) In Nova Zembla *Trois. Voy. au Nord.* p. 200. ex fructu pruni simili salus. In Hudsonsbay ex rubo ZORGDRAGER p. 64. 65. Add. PYRARD l. c.

(*d*) SAND. *abscess. ventr.* n. 21. LISTER. LIND *on scurvy* p. 144. BOERH. *Prax. med.* I. p. 190. *Saml. von Reis.* T. III. p. 449. HUXHAM *fevers.* p. 260. 261. Hinc divites minus aegrotant nautis.

(*e*) BACHSTRÖM p. 6.

(*f*) IDEM p. 15.

(*g*) MARTIN p. 285. Fructibus horæis & recentibus oleribus superatus est scorbutus ROUPPE *morb. navig.* p. 159. de Haen *rat. med.* VIII. c. 4. Ribesiorum tres librae in dysenteria utiliter sumtae DEGNER *dysent.* ed. nov. p. 310. Victu vegetabili sanata Epilepsia CHEYNE *sanit. infirm.* p. 52. & podagra PUIATI *preserv.* p. 285. Postea laudes habet BROKLESBY *obs.* p. 18. 19.

(*h*) BIRCH T. I. p. 376.

(*i*) Diarrhoea utilis in maniacis, quae ex multo horæorum usu ciatur G. v. SWIETEN T. III. p. 480.

temperii, ut viribus valet, & ætate est ad robur aptiore, ita carnes minus fert, melius iis usus, si plus in ejus humoribus erit phlegmatis, minusque in solidis partibus virium.

Hæc omnia ipsa magistra experientia cunctas pene gentes docuit, quotquot in quietâ republica moribus reguntur (*k*). Panem nempe, vel aliquid ex cerealibus paratum panisque simile, omnes edunt, oryzam, cassavam, fago, inhames, patatas, mayz, milium, forghum, triticum, zeam, hordeum, ut quæque terra aptior est his aut illis producendis (*l*). Ita enim acescente farina victus (*m*) carneus apte contemperatur. Paucae sunt gentes, quæ arare detrectant, paneque carent, aut vagæ (*n*), aut sub eo cælo viventes, quod cerealia non maturat (*o*).

Cæterum non est omittendum, consuetudinem multum posse ad tolerandos etiam deteriores cibos. Cicutæ anus attica adfuevit (*p*); venenis variis MITHRIDATES Ponticus. Tritum subtiliter vitrum, Germanus nescio quis absque vitio deglutiebat (*q*). Ipsum arsenicum (*r*) studiosus paulatim ferre didicit, cum adipe ejus violentiam moderaretur, ut demum pusculum tetri veneni absque malo toleraret.

Eam consuetudinis vim ita interpretor, ut nervi ventriculi sensibiles ab acrimonia, venenata perculsi, occallescant, vimque amittant sentiendi, uti a luce nimia oculi, ab acri cibo potusque linguæ papillæ, a frictione repetita, & ab oleo vitrioli, cutis sensum sensim amittunt.

S. X. *Fossilia non alunt.*

Ex minerali regno nihil sibi sumit homo, præter aquam, si eo placet referre, falemque. Instrumentum coquendorum ciborum nobis non est hujusmodi; ut ex iis nimis duris, nimisque simplicibus corporibus aliquid

(*k*) Etiam feroces Americæ septentrionalis populi CHERAKISI, *Irokeſi*, & Africani qui suos vendant liberos.

(*l*) Catalogum plenissimum dedit SLOANIUS. Fungos pani admiscunt Ruscinonenses, v. MONNIER p. CCVII.

(*m*) Lacti præfert MALOUIN *Chym. I.* p. 224.

(*n*) Arabes apud RADZIVIL p. 215. Tartari LUCA l. c. Britanni CÆSAR L. V.

(*o*) Grönlandi ANDERSON p. 251. Insulani Scotiæ vicini MARTIN. p. 373. Lapones, alii.

(*p*) GAL. *Simpl. med. fac. L. III.* c. 18.

(*q*) PANAROL *pentec. IV. obs. 6.*

(*r*) KREUGER *diatet. p. 22.*

utile extrahere possit : & si in acri aliquo liquore solveris , non tamen , ut sunt aspera hæc elementa , ad nostras fibras adhærescunt.

Lapides equidem aves (a) devorant , sed , ut alibi ostendemus , non digerunt. Qui homines filices (b) deglutierunt , magnos inde dolores & languores passi sunt. Nuper veterator per urbem meam patriam iter fecit , puerumque circumduxit , quem ajebat , male ficta fabula usus , in deserta insula , ab ipsa necessitate compulsus , lapides didicisse edere. Deglutiebat utique miser filices. Sed inventum est , nebulonem infelici puero sub noctem purgans medicamentum obtrusse , ex quo , multo cum dolore , lapides decederent : huicque demum miserrima servitute infelix juvenis est ereptus , juvenum quorundam Bernatium felice curiositate.

Terram utique nonnulla animalia edunt , eaque aluntur lumbrici (c) , vermes tipularum (d) , ephemerorum (d*) , asili (e). Arenam tellinæ (f) vorant & cochleæ (g) , & lumbrici marini (h) ; testas ranæ , quas optime digerunt (i) ; saxa balani (k) , vermesque (l) proprii lapidi vori. Homini ea pica subinde accidit , ut margam , terram , arenam scriptoriam (m) , testas echinorum (n) devoret ; ut lupi , & apri (o) terram , quando eos fames & edomuit , ingurgitant. Sed ex iis naturæ inimicis dapibus scirrhi mesenterici , & passim mortes succedunt ; neque credo GUMILLÆ , qui Ottomachos suos terram , & sabulum , & cretam , abque malo devorare scribit (p). Fuscæ legas , ut in America Anglica (q) miseri Salzburgerisium pueri ab ea ipsa terræ pica ad interfectionem

(a) Vide *Seçt. IV.*

(b) *Phil. transf.* n. 253.

(c) REDY *anim. nelli anim.* p. 53. VALISNERI *oper.* T. III. p. 463.

(d) REAUMUR *Mém. pour l'Hist. des Insect.* V. p. 12.

(d*) SWAMMERDAM *biobl.* p. 249.

(e) IDEM p. 660.

(f) BORELL.

(g) SWAMMEDAM *biobl.* p. 173.

(h) KALM. *resa* T. II. p. 105.

(i) *Leipz. Saml.* T. V. p. 352. 353.

(k) BONANNI *recreat.* p. 236. 237. BORELL. *H. Prop.* 192. Negat tamen LYONNET *insect. Theol.* p. 258.

(l) La VOYE *Journ. Sav.* n. 32. Etiam polypi marini & lumbrici VALISN. I. p. 243.

(m) REINES *var.* p. 35.

(n) TOZZI l. c.

(o) BUFFON T. V. p. 119.

(p) *Hist. Natur. de l'orenoq.* p. 271. 282.

(q) In Cl. BOLZII *relationibus.*

deleti fuerint, & par est BROWNII (r) testimonium. Terra in ventriculis & intestinis caporum & cuniculorum (r*) non mutatur (s). Ex luto quidem veram gelatinam gustu gratam (t) paravit Cl. WIDMER, hactenus solus. Neque alibilem esse farinam fossilem, recte ostendit Cl. SCHÆFFERUS (u). Calx cani obtrusa alvum & urinam movit; miserumque animal emaciavit (w). Arenas a perdicibus devoratas inter carnes occurrisse experimentum est a SCALIGERO prolatum, aliis quidem studiis eminente (x).

Metallorum etiam deterior est conditio. Etsi enim plumbum a muribus rodi dictum (z) est, & struthiocameli (a), atque casuarii nummos cupreos & ferramenta devorant, suntque nonnulla (b) experimenta, ex quibus credas ostendi, solvi in eorum stomachis ea metalla, tamen non aliis metallis, & omnino perire (c) ostendetur. Etsi porro terram ferri utique in hominis ventriculo solvi novimus, quod & ab aqua simplici solvatur; etsi idem metallum certo in sanguinem (d) venit, adque rubros globulos constituendos confert, nulla tamen in eo metallo aut saporis gratia est, quæ faciat ut admittatur: nulla in dentibus vis, qua subigatur; nihil etiam glutinosi, quod adhærescat: ut omnino in partibus firmis vix ullum reperiatur (e). Sed id ferrum mistum aquis, mistum plantarum succis, & solutum, in sanguinem advenit (f).

Hydrargyrum per intestina immutatus descendit (g) aut in sanguinem quidem recipitur, nihil tamen mutatus, cum fluidus in ossium cellulis & redivivus (h) reperiatur. Gallinam bracteis tenuissimis argenteis aureisque pastam posuisse argentea ova, & habuisse viscera inargentata & deaurata, non

(r) Ex marga subdulci Nat. Hist. of Jam. p. 64.

(r*) De terr. Nucerin p. 47.

(s) A. DELLA FABBRA de arthrit. p. 24.

(t) Margraf. Bad. p. 197.

(u) Vom Bergmeel p. 35.

(w) SCHENK de calce n. 43.

(x) In ARIST de plant. p. 40.

(z) p. 14.

(a) Sect. IV.

(b) Conf. interim Comm. in Praelect. Boerh. T. I. p. 270. 271.

(c) L. XIX. Sect. IV.

(d) L. V. p. 118. 120.

(e) p. 118.

(f) p. 123.

(g) JORDAN de peste p. 575. 576. ubi subrideas ad medicorum metum. RORAR. in contradiet. GALENI. In cane WEPFER cicut. p. 299.

(h) L. XII. p. 85. 86.

credas ex alio referenti SCHNEIDERO (*i*), cum per annum aliis in periculis, eadem aves hæc eadem metalla fideliter per alvum reddiderint (*k*).

Plumbum ex malignioribus venenis est, lentum (*l*) sed potens. Eo infectum vinum: aut vitiatum ex tectis (*m*) plumbatis aqua (*n*), peristalticum motum destruit, & colicos dolores pene insanabiles excitat. Etiam ex polline tritæ cerussæ respirato colica pictorum (*o*). Sed omnino inflammationes ventriculi (*o*^{*}), & ulcus, & funesta asthmata (*p*) idem metallum facit.

Cuprum promptius venenum est, & aut ventriculum continuo subvertit, aut omnino enecat, etiam canes (*q*), avesque (*r*); nihilo benignius in hominibus (*s*), etiam aerem pestilente fumo imprægnaturum, ut accolæ infirma valetudine, & mali sint coloris (*t*), neque stirpes præter empetrum aerem cupro plenum fahlunensium fodinarum ferant. Olim God. THOMASII, vir acuti ingenii, epilepsias pueriles a lacte deduxit; in vasis cupreis male stannatis adservato (*u*).

§. XI. *Sal marinus.*

Ex fossili regno falem possis repetere: etsi enim falsi fontes eo imprægnati sunt, manifestas tamen videmus in rupibus nostris saliferæ inter Grandeau & Avençon fl. regionis nidos salis veri in durissimii lapidis rimis coacti, nulla figura, qua nota a sale distinguimus, qui in aqua solutus fuit, is enim aut cubi figura est, aut pyramidis quadratæ concavæ,

(*i*) *De catarrh.* L. III. p. 106. SPERLING *physic. instit.* p. 973.

(*k*) CONRING *hermet. æg. sap.* p. 248.

(*l*) FRICK. *venen.* p. 267.

(*m*) TRONCHIN. p. 66.

(*n*) Inde collectæ in contracta intestina fæces, in minimos rotundos globulos factæ, obductos lithargyro ILSEMAN *colic. saturn.*

(*o*^{*}) TRONCHIN p. 64.

(*o*^{*}) Ex saccharo Saturni HILLEFELD p. 54.

(*p*) ZELLER *docimasia* ann. 1707.

(*q*) *Journ oecon.* 1753. Jul.

(*r*) Cum de assere cæruleo & albo colore picto decerpissent KEUGER *von der Erziehung der Kinder* p. 163.

(*s*) Ibid. *Obs. a Societ. Lond.* II. p. 148. VANDERMONDE *Journ. de med.* T. II.

(*s*) Du BOIS *non ergo colica pictorum vena sect.*

(*u*) SCHULZE *mors in olla* n. 17. Cum passim cupri in vasis culinariis mali effectus soleant aut negari, aut certe minui, ecce exempla. Ab ea causa omnes in cœnobio monachi extincti BOVIO *flagell.* p. 23. Sic in orphanotrophio ab eadem causa tormina, & vomitus epidemicus Gal. *Minerv.* V. p. 118. & vomitus perpetuus, cardialgia, inflammatio abdominis & mors Ignatii VARI. A butyro in cupreo vase servato dysenteria Gal. *Minerv.* V. p. 115. Variæ inde noxæ SCHULZE *mors in olla* n. 9. 10. BUCHNER *nox. vasor. stanneor.* &c.

Sal ergo aut informis, & vere fossilis, est in Polonia, Catalonia, Transylvania: aut purus & cubicus ex falsis maris aquis solis tepore coctus in rupibus (a) maritimis Lusitaniæ, insularum capitis Viridis, insularum calidiorum Americæ, demum in stagnis argillofis Britanniæ minoris, Santonum & Linguædociæ: aut pyramidalis, artificio humano ex muria, ex ve fontibus falsis, coctus in Anglia, Gallia, Germania, Helvetia; aut ex plantis demum eductus (a*). Hæ falsis species non omnibus quidem dotibus, sed plerisque conveniunt.

Terra falsis marini est lixiviosæ indolis (b) & imprægnatur acore universalis (c), a quo solo vis est & ad condendum efficacia. Eo acore per ignem destructo, in sale decrepitato (d), quod reliquum est, jam syrupum violarum vidi colore tingit; & repetita demum dissolutione sal optimus porro iners fit, & destillatus spiritum acidum negat nunc reddere (e). Quare optimus sal est, qui a sole ipso paratur, cujus calor multo quam ebullientis aquæ calor, & in ea ratione minor est, quæ est 100. [in mediocri calore] ad 214. aut 150. ad 214. ardore solis maximo, quem fumus experti a 1762.

Optimus ergo sal marinus est, certe regionum mediocriter calidarum. Nam in fervidissimis insulis (f), sal etiam a sole coctus nimis acris est, & partem acoris amisit. Similis est marini, quem ego ex fonte falso *aux fondemens* ab aliquot annis paro, perinde cubicus, perinde violam redolens, durus, solidus, cujus spiritus plus saturat alcalini deliquescentis falsis, quam sal vulgaris, fere in ratione 4. & 3. Belgæ salem meracissimum, solum hæcibus bene condiendis idoneum, parant ex sale marino

(a) Majo & Tortuga DAMPIER p. III. p. 12.

(a*) GREW *hist. plant.* WALLERIUS *de nitro*. Ex omnibus vegetabilium salibus marinus potest educi HILL. *mat. med.* p. 122.

(b) LEWIS *mat. med.* p. 388. Add. HILL. *mater. med.* p. 326. Nolo hic eam litem subire, num sal potius nitrosus, num terra lixiviosa eam basin constituat. Si salem malis, tamen & ipsi terræ præstat fundamentum.

(c) L. VIII. p. 219.

(d) *Mem. des Sav. étrang.* T. II. p. 166.

(e) HÆRNE *act. laborat.* p. 65

(f) Carnes consumere LEMERY *tr. des alim.* T. I. p. 533. Etiam de Lusitanici falsis acrimonia queruntur.

(g) BROWNRIDGE.

in marina aqua soluto, cui dum ebullit, acidum serum lactis adfundunt, ut acor restituatur, quem ignis abegit.

Deterior sal est, & parte sui acoris mutilus, qui coquitur in lebetibus, deque aqua ad ebullitionem calefacta ad fundum amplissimi vasis decedit. Eo deterior autem est, quo vehementiori igne rapidius, excoquitur, ut denique amissa natura acida ad lixiviosam redeat, & in aere humido colliquescat, carnesque neget conservare. Acorem enim muriæ exhalare certis experimentis cognovimus.

Nunc hoc sale homines tanquam præcipuo condimento utuntur: quo & carnes suas a putredine servant: & recentes etiam, alioquin fatuas, cum valetudinis compendio reddunt sapidiore. Necessitas carnis faliendæ est in ejus natura putredini obnoxia, maxime in regionibus calidis, ubi carnes pene subito contabescunt (*g*). Non perfecte utrovis fungitur officio sal marinus: nam putredinem, etsi inhibet, tamen non totam impedit (*h*): & bubula (*k*) falsa in aquam dimissa etiam citius, quam pura, putrescit.

Quare adeo malignus usus falsarum carnum est, de quibus putredo naturam acidam vegetabilem abegerit, neque satis acoris sal adjectus restituerit. Quare febribus, & dysenteriis, & potissimum scorbuto generando sunt aptissimæ (*l*). Hinc frequens adeo inter nautas longinqua itinere prosequentes scorbutus. Salsa enim carne fere vivunt.

Cæterum si copia sufficienti in intima fuerit adactus, inque carnum profundas incisiones, diu plenæ putredini resistit, neque plus plerique homines petunt (*m*), quam aliquam putredinis mediocritatem.

Dictum est, cum exercitus in Hibernia sale careret, in dysenteriam incidisse, procul dubio per ciborum putredinem (*n*). Dictum est etiam acore suo ossa emollivisse, & eo retulerunt celebrem feminæ *Soupiot* morbum, quam ajunt per biennium salis usui indulgisse. Sed ea si omnino vera sunt, de sale per intinctum adhibito interpretamur.

(*g*) Inter quartam horam in Jamaica SLOANE introd. p. XV.

(*h*) LEWIS mat. med. p. 494. Omnium salium minima vis conservans est in marino sale PRINGLE *diseas. of the army* p. 330.

(*k*) HALES *ventilat.* II. p. 81.

(*l*) PRINGLE p. 354. REINIUS in *Itin. Chin.* PIRARD de LAVAL. *Voy.* III. p. 35. Caro suilla fumo indurata duobus mensibus in ventriculo hæsit RIEDELIN *miller* p. 829.

(*m*) COLBATCH *Essay on acid. and. alkali* p. 153.

(*n*) SUE ad MONRO *of the bones* p. 24.

Quam insuperabilis sit ejus natura alias ostendetur, quæ in urina superfit, & demum in ipso post tantam putredinis & ignis torturam phosphoro.

Videtur omnino aliquid in sale esse, quod naturæ animali conveniat. Nam pene omnes gentes sale utuntur; & etiam bruta animalia pleraque, certe, quæ ruminant (o), sale delectantur, & ab ejus usu bene habent.

Neque tamen defunt gentes, vagæ potissimum & parum industriæ, quæ sale abstinere in America (p), Brasilia (q); Caraibes (r), Lapones (s), Islandi (t), Ostiaki & Swetlobi (u), Africani Numidæ circa Thalam (w). Salis etiam usum ignorabat robusta illa puella ex gente Esquimantfic.

Alii populi adeo anxie falsum saporem quærunt, ut etiam ex cineribus fuci (x) sale coquant, aut ex igne lignis inmisso, quem falsa aqua extinguebant, aut denique ex vulgari de ligno exusto cinere (y).

Nitrum adfinis sali marino sal alius, phlogisto uberius prægnans, & amarus, ad intinctum ob saporem ingratiorem inutilis, carnes potius melius conservat (z), cum potentiorum acidum spiritum generet. Nitrum Ægyptium alterius erat indolis, verusque sal lixiviosus fossilis (a). Aqua calcis pisces conservat, non carnes (b).

§. XII. Alia condimenta vegetabilia.

Cum ab acore vis condimenti expectetur, acida puriora ea laude valere credas, acetum (a) ergo dudum adhibuerunt, tanquam purius aci-

- (o) Etiam cervi REICHART *Gartenbau* p. 67.
 (p) LAFITEAU *mœurs des Sauvages*. T. II. p. 368.
 (q) THEVET *France antarctiq.* p. 55.
 (r) *Saml. der Reif.* T. XVII. p. 482.
 (s) *Galer. di Min.* T. V. p. 131. MARTIN *de medecina lapon* L. L. ns. p. 10. LINNÆ *Act. Lapon.* p. 70.
 (t) HORREBOW p. 327. *Melanges* I. p. 199.
 (u) *Relat. des Voy. au Nord* T. VIII. p. 397. 400.
 (w) SALUSTIUS *Jugurth.* p. 216.
 (x) MARTIN *West. Isl.* p. 64. BORRICH *hermet. ægypt. sapient.* p. 343.
 (y) Umbri apud PLIN. ex cinere juncorum; Egyptii apud BORRICH *ibid.*
 (z) Quater PRINGLE p. 330. Alumen etiam trigelies *ibid.*
 (a) Eo utebantur Ægyptii. BELLON *funus med.*
 (b) *Phil. trans.* T. XLVIII. p. 163.
 (p) *Elem. Chem.* T. II. *proc.* 50. & 127.

dum succum, debiliorem equidem (*b*) fossilium salium acidis liquoribus, sed gustu gratiorem, neque meracitate sua membranas nostras crispaturum.

Salubre omnino & condimenti genus est, & denique potus. In fervidis Archipelagi insulis bubula in aceto maceratur, in quo sal marinus dissolutus est; tunc ad solem siccatur; ita & putredinem effugit, & ligni pene duritatem acquirit (*c*). Spiritu nitri aqua misto in phthisi & temperie febrili utiliter utimur (*d*). Non alio modo bilis putredinosam corruptelam, ex cadaverum frequente incisione natam superare potui, quam oleo vitrioli plurimo totis annis sumto. Quatuor pintæ aceti utiliter in causo datæ (*d**) sunt. Oportet autem, ut recte carnes condiant, acetum in vitreo vase circumfunderè. Acore enim suo & terram, & marmor ipsum, facillimè erodit, tunc saturatum absorbente pulvere, & quasi enervatum, carnem putredini spontaneæ dimittit.

Sacchari in condiendo vires (*e*) insignes sunt, quas tamen fere ad vegetabilia sola adhibemus: carnem enim conservat quidem fortius & tutius (*f*), quam sal marinus, & tanti est acoris, ut cum ovilla carne (*g*) [corde] fermentaverit, abieritque in vini pene saporem. Verum cum saporem carnum in fatuum mutet, eo fine non adhibetur. Paratur autem, uti notissimum est, ex succo arundinis sacchariferæ; sed etiam ex culmo Mayz (*h*), ex radice dauci sativi, aliisque dulcis saporis plantis obtinetur. Mireris, ranas, columbas, alia animalcula a saccharo necari (*i*), quod Psittaci & aviculæ avide devorent.

Mel fere ad ea valet, ad quæ saccharum, & veteres eo cadavera dicuntur condidisse: id tamen experienti CLAUDERO non successit.

(*b*) Saturatio salium lixiviosorum mensuram dat roboris acidorum liquorum, ergo vires olei vitrioli sunt uti 41. Spiritus nitri ut 172. Spiritus salis ut 8. aceti ut 8. *Mém. de l'Acad.* 1699. NAUMANNUS p. 182. Oleum vitrioli proinde duplum fere robur est, si cum spiritu nitri conferas.

(*c*) TOURNEFORT *Voyag. au Levant.* T. I. p. 321.

(*d*) CHEYNE *discuss.* p. 109.

(*d**) DEGNER *dysent.* p. 199

(*e*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1732. ubi vires diversorum salium in carnibus condiendis videas ad suas mensuras reductas.

(*f*) Duplo *Journ. æcon.* 1737. M. Oct. Pridem BECCHER *Physic. subterr.* p. 143. PETIT *Mém. de l'Acad.* 1732. etiam PRINGLE p. 354.

(*g*) *Journ. æcon.* l. c.

(*h*) LAFITEAU T. II. p. 152.

(*i*) *Journ. æcon.* 1757. M. Oct.

Solo scopo putredinis avertendæ butyrum carnibus circumfufum (*k*) utique infervire potest, & quotannis ex Megalopolitano ducatu anates, aliæque grati saporis aves, in vicinas regiones abunde mittuntur, multo butyro circumfusæ. Cæterum vereor, ne saporem vel tactu corrumpat; quod ipsum rancescat, etiam sale conditum. Ejus vis est in aere arcendo, & infectis avertendis.

Aromata, quæ & ipsa infecta arceant, hic omitto.

Denique ipse fumus acidus ligni carnes ipse conservat, redditque saporem non ingratum, tantum ut duriores fiant, & in ventriculo facile hæreant (*l*). Turcæ carnes in furno siccant, & in pulverem comminuunt, quem in expeditionibus bellicis pro viatico circumferunt (*m*).

§. XIII. *Præparationem ciborum.*

Prima tantum rerum elementa hic tango. Primævi homines procul dubio & carnes, & horæos fructus, & ipsas edules herbas crudas, & absque ulla miscela in cibum receperunt. Et potest quidem ita vivi.

Nam in acetariis crudæ quidem herbæ deglutiuntur, & oleum potius deteriores reddit. Horæos fructus vulgatissimum est crudos manducare, & eorum, qui sapidissimi sunt, iidem pene semper crudi ad usus humanos adhibentur, ut ananas, uva, melo. Carnes testaceorum crudas devoramus, crudisque omnibus & olim multæ gentes usæ sunt, & nuper.

Etiam nostro ævo crudis vivunt nigritæ oræ auriferæ (*a*), Hottentotti, & gens late vaga *Esquimantfic* (*b*), quæ secundum plurimos auctores non aliter carnes adhibet; secundum aliquos certe in bellicis & venatoriis expeditionibus: tum versus meridiem similium etiam morum homines,

(*k*) DIGBY *poudre sympathique*. p. 182. BOYLE *de utilit. philos. exp.* L. IV. p. 28. *Exp. phys. mech. de aere* p. 209. 210. MAYOW *nitr. aere* p. 54. BRADLEY *farm. direct.* p. 9. *ladies dir.* II. p. 87. Alimentum est divitum apud Barbaros PLIN. L. 28. n. 35. GALENUS de eo tanquam de re rara dicit, se vidisse suis oculis conf. PLEMP. *valet togator*. p. 154.

(*l*) RIEDLIN. *millen.* n. 829. Nasci in carne fumigata ex sale volatili fumo & sale marino compositum salem ammoniacum CHEYNE *sanit. infirm.* p. 49.

(*m*) BELLON. *obs.* p. 366.

(*a*) *Hist. des Voy.* L. IX. p. 318.

(*b*) ELLIS *hudsonsbay* p. 139. CHARLEVOIX T. III. p. 179. *Account of a voyag. for the discov. of the northwest passage* p. 33.

Patagoni (c) & Samojädi orientales, qui crudas carnes, crudos pisces vorant, & sanguinem bibunt (c*).

Eadem fuit consuetudo passim variorum hominum: ipsius ZENONIS (d) aliorumque obscurioris nominis (e), etiam insanorum, & (f) puellæ, in Gallia nuper captæ (g).

Neque solum perinde alunt, ut eæ carnes, quæ coquorum optimorum artificia sunt expertæ, sed robustissimos faciunt homines (h), ut denique coctas carnes sociali vita redditi vix ferant (i) & ex nova ea diæta vires suas amittant (k). Peculiaris est potissimum historia puellæ, quam diximus, viribus eximiis, celeritate summa, armatæ pollice insolitæ magnitudinis. Ea privilegia omnia amisit civili vitæ reddita.

Facile vero credas, ex robore magno ferociam, ex ferocia libertatem, vitam solitariam, averfationem legum, & statum naturalem sequi, quæ sunt omnia in Patagonibus & Esquimantficis. Nihil ergo hic nimium BUFFONIUS (l). Carnes tamen crudæ utique duriores sunt, ut DIOGENES hic infra canes manserit, neque potuerit crudas superare carnes, suntque auctores, quibus ex earum usu dicatur periisse (m).

Multæ tamen rationes sunt, quæ fecisse potuerunt, ut primævis jam temporibus aliqua industria ad cibos percipiendos adhibita sit. Et fructus quidem horæi maximam aeris copiam continent, ut per experimenta Cl. viri STEPHANI HALES pomum (n) aeris tantum ex calore generet, quantum sufficit replendo spatio quadragesies octies (o) eo pomo majori,

(c) *Voy. des V. vaiss. par le détroit de Magellan* p. 311.

(c*) *Mém. sur les Samojädes* p. 93. 94.

(d) SUIDAS p. 306.

(e) KUNDMANN *Seltenh.* p. 1065. 1066. HAMBERGER *de imbecill. ventr.* OEXMELIN *hist. des avant.* I. p. 122. BLANCARD *Jaarregister* I. n. 28. Cent. 2. RZASCYNSKI p. 450. Angli illi naufragi *Voy. à la mer du sud.* p. 278. Add. TILING l. c. MOEBIUS p. 164. MARC. DON. p. 205.

(f) REINES *var.* p. 74. BOEHMER *poliphag Voyage de HARMANSON* p. 429.

(g) L. c. *ibid. Algern. Magaz.* T. VII. conf. p. 209.

(h) Du TERTRE III. p. 146. 147. *Voy. de HARMANSON in Voy. de DAMPIER Patagoni Voy. des cinq vaisseaux.*

(i) OEXMELIN l. c.

(k) *Alexander SELKIRK, & puella illa ex gente Esquimantfic sæpe nobis dicta.*

(l) T. III. p. 446.

(m) LAERT. L. VII.

(n) HALES *hemastiat. Exp.* 87. p. 202.

(o) *Exp.* p. 38.

& fatis tamen elastici, ut duplam atmosphæræ pressionem sustineat, & aptus sit elevare libras 11776 (*p*).

Ita maxima pariter vis aeris est in farinis omnibus, leguminum, pisorum (*q*), fabarum, etiam tritici, in quo aëre præterea id est incommodi, quod in viscoso glutine involutus, lentius se expediat.

Nunc iste aer utique, in calore ventriculi humido, se de suis vinculis expedit; & naturam elasticam recuperat, stomachumque cum incommodo & periculo distendit.

A farina feminis lini femina inflata habuit hypochondria, & demum faciem (*r*).

Eo incommodo ignis adhibitus medetur. Is enim subito maximam partem aeris expellit. Ita coctum pomum vix quartam partem (*s*) aeris reddit, quam crudum generaret. In pane, ad quem multo major vis nudi ignis adcessit, multo minus superest aeris, ut tamen vis nutritia tota supersit (*t*). Multum emendatur, si bis coctus fuerit, & una a mucore defenditur. Res veteribus nota fuit (*u*): & antiquior usus videtur assarum frugum, qui neque nostro tempore obsolevit (*u*^{*}).

Carnes filamentosæ, maxime ferocium animalium, quæ prima forte in usus humanos cesserunt, per initia aliqua putredinis mollescunt. Id commodum vel sola adservatio (*w*) conciliat, quæ forte ratio est, quare suos cibos pene putridos aliquæ gentes recentibus præferant.

In vivi animalis agitatione (*x*) & venatione ante mortem plurima, aliisque crudelibus artificiis, ut suffocatione (*y*) morte lentiori (*z*) demum tusione (*a*), teneritas queritur, qua ipsam sæpius bubulam ita reddidi edulem, ut vix 10. minutorum ignis sufficeret, quo redderetur gratissima.

(*p*) Ibid. p. 209.

(*q*) Conf. breviter L. VIII. p. 186.

(*r*) TRAGUS. Sed de istis vide GALEN p. 201.

(*s*) BOYLE *Exp. phys. mech. de aere* p. 32.

(*t*) Plus nutrit panis quam ptisana GALEN *de ptis.* c. 5.

(*u*) SUIDAS p. 609.

(*u*^{*}) HASSELQUIST. p. 173.

(*w*) Nigritæ oræ auriferæ *Hist. des Voy.* L. IX. p. 318. conf. p. 204. 205. Gruis caro non est edulis, nisi aliquot ante dies juguletur CASTELLANUS.

(*x*) PORTA *Mag. natur.* L. 13. LABAT *Voy. d'Espagn.* I. p. 254. [255.]

(*y*) In capis VALISNER. T. III. p. 170.

(*z*) In Gallis indieis.

(*a*) VERULAM *Hist. vit. mort.* p. 335.

Homo ignem excogitavit, ad quem excitandum nullius animalis industria pervenit, etsi in eo, & in lumine sibi satis placent.

Carnibus ignis gratiam addit, dum sales, multa aqua, multoque visco involutos, paulum expedit, ut & olfactum vividius adficient, & gustum. Nulla pene proportio est, nostris certe palatis, crudæ vervecinæ ad eandem, quando ad ignem assata (b) fuit. Heroicorum autem, adeoque antiquissimorum temporum fuit, carnes assare, ut ex HOMERI infinitis locis constat. Gratissima vero, sed minus lucrosa, assandi ratio est, quando parte carniū neglecta, extima crusta (c) comburitur; interiora enim tunc, nulla amissa parte nutritiarum particularum, acceptissimo sunt odore & sapore.

Carnes elixare homines casu potuerunt didicisse, cum vellent lavare. Ita quidem vis nutritia dividitur, ut in jus pars pene major transeat, pars in carne maneat. Antiquum & ipsum est artificium, ut ex mosaica lege adparet, idemque in gentes etiam simplicissimas Americæ & Grönlandiæ diffusum. Plus tamen requirit adparatus, artemque excavandi lebetis, qua assatio carere potest. In universum carnes debilitantur elixatione, &, uti minus putrescunt (d), ita minus dant roboris (e).

Reliqua, in nostra brevitate omittimus; aromatum tamen mentio non penitus potest prætermitti, quæ non nutriunt quidem, cum nimis acria sint & penetrabilia; cibi tamen amorem aliquantum augent, saporem gratum addunt, & ventriculi vires musculares, etiam exhalationem internam, augent. Ea aromata (f) oleo essentiali abundant omnia, pingui nempe; in quo plurimus spiritus rector est (f*). Sapore sunt fervido, grato tamen, & ex India orientali pleraque repetuntur, quæ inter piper veteribus notius fuit, cinnamomum rarissimum; nucem moschatam, ejusque odoratam pulpam macis, & alia fere posterior ætas addidit. Europæum cælum vix eo est calore, ut tantum olei essentialis generetur, quantum ad dignitatem aromatis requiritur.

(b) Conf. VERULAM p. 335.

(e) LERY *It. Brasl.* p. 152. LABAT passim in *Itin. Antill.* maxime de testudine.

(d) BOYLE *Exp. phys. mech. aere cont.* p. 210. Etiam lac coctum minus acefcit ANDRY *tr. des dispens. du Carême* II. p. 3.

(e) BACO de VERULAM *hist. vit. & mort.* p. 338.

(f) Habet catalogum BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 18. 916. p. 127.

Est tamen aliqua aromatum imitatio, pro australi Europa in aurantiis pomis & citriis: pro boreali in acoro, angelicæ Laponicæ (*g*) caule. America propria sua aromata habet, ut Amomum Anglorum, corticem Winteranum. Notatu vero dignum est, in fervidissimis regionibus maximum aromatum usum esse, & necessitatem maximam. Nempe corpora earum regionum sunt debiliora, visque fibrarum universarum & ventriculi minor. Quare etiam nostro ævo allia & cepe Hispanis (*b*) & Ægyptiis, Assa fætida Indis maxime familiaris est, suo cum fætore, quæ Romanis Lafer erat, aut certe laferi proxima: & eo spectant garum illud falsum, nata omnia stimulando ventriculo, superando acori, qui gentibus potissimum parca carne utentibus (*i*), & plurimis fructibus horæis abundantibus, procul dubio molestior supervenit.

§. XV. Potus, Aqua. Ex pluvia nascitur.

Etsi aliquam in potu diversitatem hominum inventa fecerunt, major est tamen, quam in cibo simplicitas. Uti enim major pars sanguinis (*a*), humorumque reliquorum aqua est, uti etiam solidæ, quæ vocantur, corporis humani partes, plurimum habent aquæ, ita omnis potus aqua semper est, aut simplicior, aut fucata admisto oleo saleve.

Simpliciozem, aquam, quæ vulgo nomen retinet, natura ipsa fundit, pluviam puto (*b*), ex qua fontanas, fluviatiles, lacustres, & marinas aquas credo oriri. Legi, quæ ea de re inter VALISNERUM & BEZZIUM sunt disputata; sed certe, quantum ex plurimis per Alpes montesque itineribus didici nulla usquam in cacumine ullius montis est scaturigo: nulla, quæ non cum hiberno frigore insignissime minuatur, & demum siccetur, quæ pariter cum æstivo calore non redeat uberior, eoque sit copiosior, quo plus pluvix cecidit, aut plus nivium & glaciei ad solem contabuit. Eos nivis dissolutæ sudores manifesta videas in imis

(*g*) LINN. *flor. Lap.* p. 69.

(*b*) Ob eorum usum milites hispanos a morbis minus lædi MEI SEREY.

(*i*) Indis, Persis, Hispanis Ægyptiis.

(*b*) L. V. p. 98. BOYLE *Chym. Sept.* P. II.

(*b*) Etiam a rore in regionibus calidis copiosissimo DERHAM *Theolog. phys.* l. c. p. 5.

angulis planis convallium colligi, & milliones addi millionibus fimilium venarum, donec Rhodanus inde confluat: Alpesque omnes in valles excavari, in quarum medios & cavatos concurrentium planorum inclinatorum inciles humor consentiat.

Lacus dicuntur in Bructero M. & passim in summis Alpibus reperi. In illo quidem M. modicus est fons, paucorum pedum, in quem paludosum pratum, multo altius, se exonerat, ter enim quaterve ejus lacus aquam bibi: In alpibus valles sunt inter præaltas rupes, quarum pars ima aquas de collibus confluentes recipit.

Deinde ad originem fontium super telluris superficiem se efferentium speculandam; occasio mihi fuit plurima, in fodinis falsis montium super Panex, & super Fenalet. Etiam internæ aquarum venæ sunt ab aquis cælestibus, quæ per rimas rupium, supra exitum superiorem fodinarum certas & definitas, in terram subeunt, earumque rupium sequuntur venas obliquosve ductus, & demum mille & mille guttulis in scaturiginem de pertuso monte, ex argilla cærulea indurescente facto, effluentem conveniunt, quæ porro in lucem prodit. Aliis locis, ut in montibus Juranis, qui olim ad celebrem Abbatiam Romani Monasterii pertinuerunt, lacum videas, qui in montem per minimas rimas rupium se inanit: & aliis locis subterraneorum stagnorum manifesta sunt indicia, quæ ab aquis cælestibus per rupes se subducentibus repleta, magnas edunt scaturigines.

Aqua ergo pluvia, & ros, primigeniæ sunt aquæ; sunt etiam levissimæ (c), impuræ tamen, cum in utrisque, & in rore etiam magis, exhalantes de plantis & de animalibus humores, contineantur. Nam aqua pluvia putrescit (d), & fætidum limum deponit (e), ad sesquigrammum in pinta, in quo fere ea sunt (f), quæ in sedimento, per exhalationem ad ignem facto. In eo enim amarus sapor, & lixiviosa fætida natura est (g), cum syrupo violarum virescens, inque ea terra calcaria,

(c) Sub tropico toto aqua in pinta semunce est levior, quam nostra *Journal d'un voyage aux terres australes* T. I. p. 350. Id nimium. Pluvialis ad putealem se habetur. 740. ad 733. DETHARDING vom Stoppelficher.

(d) LUCAS of water T. I. p. 27.

(e) RUTTY p. 33.

(f) Terra absorbens & sal cum acidis fervens p. 33. 34.

(g) RUTTY p. 34.

& sal marinus, & alter acidus (*h*). Destillata pluvia, quando computruit, inflammabilem spiritum dat (*i*). Sed etiam infectis scatet. Negant etiam sitim solari (*k*); aut saponem cogere, quæ est injusta querela, cum ad lotionem linteorum omnibus præferatur, & supra omnes tinctoria sit, theæque infundendæ aptissima, quare ad potum ipsum a summis viris laudatur (*l*). Sed ad eos usus vitreos nostros fontes laudo, quorum frigus ventriculum roborat.

Ros etsi levior (*m*) est, est tamen etiam impurior, & servatus fætet (*n*), & peregrinæ materie ad 17½. grana in libra sedecim unciarum habet (*o*), quam tamquam sedimentum deponit (*p*). Negant tamen cum acidis fervere, falem (*q*) vero marini similem habere ajunt & nitrum calcarium (*r*). Saponem ros cogit, ejusdem adeo cum duris aquis criminis reus (*s*), quod quidem vitium a rore non expectassem.

Purior est equidem cælestis aqua, quæ fit ex nive super nivem delapsa (*t*), aut ex contabescente grandine (*u*), eamdemque negant etiam intra multos annos putrescere (*w*), & tamen fatentur non esse salubrem: in eo quidem erraturi (*x*). Nihil enim gratius quam sapor aquæ ex soluta in Alpibus nive per nudas rupes, puramque terram defluentis, quam sæpe cum summa voluptate, nullo cum incommodo, maxima dosi, per Alpium culmina anhelans gratus bibi, & tota armenta bibunt.

(*h*) RUTTY *Synopsis* p. 35. 36. 37. 40.

(*i*) LUCAS p. 27.

(*k*) WALLER *hydrol* p. 34.

(*l*) Optimam esse HIPPOCRATES *περί υδάτων. αέρ. τοπ. n. 20.* J. Bapt. de MALMEDY *de natura aq. Leodii.* 1735. HOFMAN *aq. med. univ.* n. 10.

(*m*) LUCAS p. 26.

(*n*) RUTTY p. 45. In vasis male clausis HENSHAW *Phil. transf.* n. 3.

(*o*) RUTTY *ibid.* & p. 46. EULER *Mém. de Berlin.* 1748.

(*q*) Salis 6760. MUSSCHENBR. *Essays de phys.* p. 782.

(*r*) RUTTY p. 47. 48. Nitrum verum se inde produxisse HENSHAW. Calcem BERGIUS l. c.

(*s*) RUTTY p. 45.

(*t*) WALLERIUS *hydrolog.* p. 11. 21. RUTTY *Synopsis* p. 39. BOERHAAVE *Elem. Chem.* l. p. 601.

(*u*) Revissimam esse in MARSIGLI in Danubio. HIPPOCRATES *περί υδάτων* n. 20. VALISNERI *Oper.* T. II. p. 468.

(*w*) WALLER *ibid.* Recte defendit LUCAS T. I. p. 29.

(*x*) RUTTY, WALLER,

Nullam ergo aquam ad usus humanos aptiorem novi, nisi eam, quæ de pluvia per terram arenosam (z), quarzofam in aqua certe non solubilem, purasve rupes, tanquam per colum, destillans, profluit cristallina, levissima, etsi aliquanto, tamen, quam pluvia, gravior; frigida, sed hieme difficulter congelabilis, & etiam per rigidam brumam fluere pertinax: a pluvia non mutabilis, cum sapone facile spumam largitura, legumina coquens ad mollitiem, non putrescens facile, neque colligens virorem, aut conservans: sitim facillime sedans, & spiritu (a) quasi aliquo linguæ placitura.

Ejusmodi aquæ hic Rupe ex leni clivo, sed altis marmoris rupibus subiecto, longa serie, ipso in prædio nostro profluunt, centum scaturiginibus, immutabilis bonitatis, neque in rigidissimo frigore, quale nostrum cælum admittit (a*), unquam congelatæ. Eam dotem videntur aliæ gentes adeo ignorare, ut etiam inter bonas-notas ponant, facile congelari (b). Neque in Helvetia ejusmodi fontes rari sunt, quos Aquileienses populari nomine vocant *des Eaux douces*, iique suum a congelatione privilegium etiam aliis aquis admitti impertiunt.

Levissimæ etiam sunt thermæ aliquæ, ut Fabarienses (c), non cessuræ pluvialibus, & spadanus *savenire* (d). Laudant etiam veteres æthiopicarum (e) aquarum levitatem, indeque earum salubritatem demonstrant, tum recentiores aliqui aquarum africanarum (f) exploratores, quæ etiam cum nostris perinde sint incorruptibiles (g): uti etiam CLAVIANA illa aqua (h), in vitro equidem hermetice clauso, jam dudum per 50. annos immutata & putredinis expers, mansit. Cæterum pondus aquæ G. J.

(z) WALLER p. 23. Naturam imitatur AMY *hist. de l'Acad.* 1748. p. 121. etsi postea, spongas arenæ substituit.

(a) Ejusmodi spiritum serio in aquis admittunt CÆSSENZO p. 153. VALISNER II. p. 468. HOFMAN *method. exam. aq. fals.* n. 3.

(a*) Gr. 19. REAUMURII infra o.

(b) Non bene optimam facile congelari LUCAS p. 28.

(c) Ad quam pluviam ut 1138 ad 1142. RAHN *de fabar.* p. 16. & ut 1138. ad 1140. ad alias aquas. Omnium aquarum levissimæ & purissimæ sunt Lucas p. 38 Aqua pluvia = 1000. destillata = 997. marina = 1. 021. & 1. 030. MUSSCHENBROECK *introd.* p. 558.

(e) HEROD. III. p. 191.

(f) Quarta parte leviolem esse BOYLE *util. phil. exp.* p. 35. Sed negat alias aquas aliis quarta parte leviores esse NOLLETUS *leçons* T. IV. p. 34. Negat etiam ipse BOYLE aquas aliis adeo multo esse leviores *med. hydrol.* I. p. 107. A calore vero potest levitas fuisse aliqua.

(g) KOLBE apud KUNDMANN p. 614. &c.

(h) L. a CAPOA *dell' incert.* &c. II. p. 25. BONANN. *recreat.* p. 170. Negat aquam Jordani putrescere RADZIVIL p. 96.

s' GRAVEZANDE (*i*) in pede rhen. cubico posuit 63. libr. unc. 7. drachm. ij. scrupul. 2. & in pede Anglico libr. 62. 4996. ponderis a verdupois f, civilis J. DESAGULIERS (*k*). Parisino demum in pede aquæ invenit libras 70. CL. PAIOT D'ONSEMBRAI (*l*) ; & libras 69. unc. 9. P. de la HIRE (*m*).

§. XV. *Aquæ duræ, molles.*

Cæterum & istæ omnium aquarum optimæ hæctenus impuræ (*a*) sunt, sed modice, ut in sedecim unciis unicum granum elementi peregrini adpareat, sive $\frac{1}{160}$. totius molis, vel etiam minus (*b*). Spatum in iis adgnoscat HILLIUS (*c*).

Fluviatiles aquæ deteriores his scaturiginibus, cæterum non graves, sed admodum putrescibiles (*c**) sunt. Bonæ rhenanæ, in quarum 160. libris sola grana 210. atque in libra non supra $\frac{4}{3}$. grani (*d*) solidi est elementi. Leves aquæ Thamefis (*e*), & Tiberis (*f*), & Vistulæ (*g*), & in universum fluviorum aquæ. Non malæ Londinenses rivales, in quibus infra granum in libra (*h*).

Sed longe major est terræ elementivæ peregrini copia in puteali aqua, quæ mihi semper omnium deterrima (*k*) est visa, imprimis in regionibus planioribus. Viennenses puteales ad bonas numeros, quæ 14. tantum 15. & 16. grana sedimenti habeant in libris quatuor (*l*).

(*i*) n. 1551.

(*k*) II. p. 128.

(*l*) *Mém. de l'Acad.* 1739. p. 68. Conf. MUSCHENBR. *inst.* n. 913.

(*m*) *Mém. de* 1701. p. 170.

(*a*) Sensit jam SANCTORIUS in *I. Fen. avic.* p. 139.

(*b*) RUTTY *Synops.* p. 8. Eam mensuram communem facit C. de la GARAYE ed. *Salib.* &c. Abundantem vocat CRESSENZO p. 160.

(*c*) *Mat. med.* p. 318.

(*c**) Thamefis BOYLE *of mens ignorance in the use of natur. things.* PRINGLE *diseases* p. 411.

(*d*) HOLZBERGER l. c. p. 16.

(*e*) LUCAS p. 135.

(*f*) B. CARYOPHYLLI *Therm. herculan.* p. 9. LANCIS l. c. p. 46.

(*g*) ERNDL. *warfav. phys. illustr.* n. 3. Unici grani in tribus libris.

(*h*) LUCAS p. 137.

(*k*) Etiam HENKEL *rediy.* p. 134. Male ergo Lugdunenses medici putealem aquæ Rhodani præferunt.

(*l*) BESENECKER *cerevis. austr.*

Neque malæ Erpacenses (*n*), quibus 21. grana in libris decem, aut Buxovillanæ, quibus grana 120. in libris 64. nempe in libra fere grana duo (*n**). Neque deteriores argentinenfes, quæ in 96. libr. non supra drachmas duas aut tres, atque adeo in una libra non supra 2. ad summum grana (*o*) habent. Non nimis bonæ fontanæ Warfavienses, in quarum libris tribus grana sint solida quadraginta (*o**).

Ejusmodi aquas *molles* vocant, in quibus in 128, unciis non sint supra grana 5. ad 40. (*o***), atque adeo in 16. unciis grana ad summum 5. Eæ aquæ cum sapone spumam agunt: pisa coquunt, tincturam Theæ benignius excipiunt.

Duræ vero sunt, quæ a 40. gr. ad 120. & ultra sedimenti ponunt, atque adeo in 16. unc. a 5. gr. ad 15. (*p*) 17. Huc Londinenses illæ pertinent, in quibus gr. 11 $\frac{5}{4}$ (*q*), gr. 12 $\frac{1}{2}$. (*r*), in ea mensura reperit Cl. LUCAS. Malæ illæ Rostochienfes, quibus in libra grana sunt 38. supra pondus pluvialis aquæ. Ut omnino fontanæ ipsis aquis mineralibus ponderosiores sint, in quibus tamen ex manifesto sapore plus peregrinæ materiæ expectarès (*u*).

Eædem tamen duræ aquæ continuo putrescunt, fætentque paucas inter horas, & nonnunquam ita plænæ sunt aspera terra, ut sitim potius augeant, quod ipse sum expertus, cum lingua fabuli minutissimi sensum sibi impressum fervaret.

§. XVI. *Aquæ in universum dotes.*

Fecit autem nuperiorum (*a*) potissimum scriptorum industria, ut propius ad naturam aquæ liceat accedere. Prima vero elementa sola nos adtingimus.

(*u*) KLEIN *Hist. Natur. com. Erpac.* p. 31.

(*n**) BINNINGER *oryct. agr. buxovill.*

(*o*) HOLZBERGER *aer. aq. loc. argent.* p. 15. 16.

(*o**) ERNDL. l. c.

(*o***) RUTTY p. 9.

(*p*) IDEM *ibid.*

(*q*) LUCAS p. 140.

(*r*) p. 42.

(*s*) DETHARDING : comparatæ nempe cum aqua pluvia.

(*u*) BOYLE *of miner waters.*

(*a*) BOERHAAVE *m. Elem. Chem.* EULER in *Mém. de Berlin* 1748. WALERIUS in *hydrolog.* aliisque scriptis, LUCAS.

Tota quidem aqua in frigore genus est vitri (*b*), quod vocatur glacies, tantum ut calor non superet 32. gradum Fahr. Infra eum gradum porro congelatur, & similiter fere in majori frigore, neque frigoris diuturnitas ejus status naturam mutat fusilem, etsi id dictum est. Sempiterna glacies Alpium perinde ad tepidum aerem contabescit, etsi id aliter narratur.

Inde supra gr. 32. porro aqua fluida est, & fluiditate omnes alios humores superat; eadem hactenus incompressilis (*c*), ut dicta sit per sphaeras aureas sub specie sudoris (*d*) penetrasse; etsi per rimas potius exstillasse Cl. HARTMANNUS (*e*) expertus est. Minimas ergo particulas praedurat esse adparet (*f*), & creditum est, esse minutissimas, ob naturam earum penetrabilem, esseque globosas (*g*). Levissimas certe esse probabile fit, cum vulneratam cutem, nudumque nervum, nullo dolore adficient.

Sponte se aqua trahit, & in guttulas colligit satis valide, & ob eam vim in glaciem coit, diminuto igne, qui fluidam servabat. Ad pleraque corpora adhæret, & in minimos tubulos adscendit & in spongiosos ductus, & sales suspensos tenet, calida etiam facilius. Eadem multis corporibus est pro glutine, aliquando sola, plerumque cum olei aliquo momento conjuncta. Argillam aqua sola unit. Ab igne expanditur, eo magis quo intensior ignis est, ut tertia (*h*) fere parte sui rarior sit, quando ebullit, gradu nempe Fahrenh 212. ad 214. Summo frigore octava parte fere sui densatur (*i*).

Apta valde est ad edendos vapores, ut etiam glacies exhalet; experimenta tamen mea & cum valido borea exhalationem minimam esse ostendunt, & manifesti cum calore augeri.

Li vapores mutata natura elastici (*k*) sunt, quam diu calent, fummasque vires exercent, etiam pulvere pyrio majores, ut sub atmosphæra prelo

(*b*) BOERHAAVE p. 614.

(*c*) MUSCHENBROECK in *Ciment*. II. p. 63. 65: *Instit.* n. 911.

(*d*) CIMENTINI & NOLLET T. I. p. 119. MUSCHENBROECK ibid.

(*e*) Et fere BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. I. p. 560.

(*f*) Tamen sed majori vi compressilis NOLLET *Mém.* 1743. p. 221. Aqua paulum compressilis est, & de suo volumine $\frac{1}{10730}$ partem amittit, si a pondere atmosphærae duplo compressa fuerit. *Philos. trans.* Vol. L. II. P. 2. p. 643.

(*g*) MUSCHENBR. *Instit.* n. 916.

(*h*) IDEM. n. 919.

(*i*) HAWKSBER *Exp.*

(*k*) MUSSCHENB. n. 923. BOERHAAVE n. 620.

in 14000plo majorem molem (*l*) dilatentur. Exhalat autem aqua & in spatio ab aere vacuo (*m*), & in aere quocunque. Celeritas tanta est, ut experimenta nostra multis annis repetita aqua falsa ad tres lineas (*n*) suæ profunditatis in die æstivo amittat, nam unam lineam in permodico calore amittit.

§, XVII. *Admixta peregrina. Ignis. Aer.*

Hæ aquæ sunt dotes, tanquam liquoris homogenei, sed ab ea natura longe remota est, utcunque pura fuerit.

Continet primo ignem, tum ea quæ fluit, tum ipsa glacies. Illa, quod determinato gradu caleat: ii enim omnes gradus in thermometro, qui sunt supra calorem congelationis, ii omnes sunt ab admixto igne, & eo, per sales adtrahentes, educto fluor aquæ ita evanescit, ut media æstate aqua vi nitri aut ammoniaci salis, aut circumfusæ glaciei, & ipsa congeletur.

Sed etiam in glacie ignis est, exhalat enim (*a*), & continuo pondere minuitur, usquedum sponte evanescat; ejusque frigus adfuso spiritu nitri vehementer augeri potest, nempe ignis de glacie extrahi. Calorem autem non paulo minorem recipit, sibi relicta, quam & in sanguine animalium; in quibusdam aquis etiam minorem. Quæ in specubus latet, aut de aquæductu aliquo naturali profundo (*b*), neque aeris mutationibus obnoxio erumpit, ea 53. fere gradu calet, qui medius est inque subterraneis cavernis perpetuus. Hinc hieme calida videtur, quando aer friget ad gradum 32. frigida æstate, quando calor atmosphæræ est 70.

Dantur autem aquæ aliquot gradibus aere frigidiores, in Alpibus passim (*c*) conspicuæ, qualem ad medicos fines haud longe a Lucerna urbe nunc novimus quam maxime ab accolis adhiberi. Referas ad glaciale frigus, quod in ea superest, quando ex soluta glacie nascitur, perque ejusmodi canales descendit, in quibus primævum frigus a solis radiis, tepidove aere, non frangitur.

(*l*) MUSSCHENB. n. 924.

(*m*) WALLER *K Svensk. wettensk. handl.* 1738. p. 379.

(*n*) Ad $\frac{2}{5}$ pollicis HALBY *Phil. transf.* n. 166. Sed in minoribus alveis expertus.

(*a*) MUSCHENBR. n. 941.

(*b*) HIPPOCRATES *περὶ ὕδατος* n. 13.

(*c*) Talem in *Wepcha M.* describit SIMLER *de Alp.* p. 316.

Sed etiam aer in aqua plurimus est, *fixus* (*d*) & elateris sui quasi oblitus, donec calor ebullientis aquæ accesserit; aut gelu; aut aliæ conditiones, alias a nobis recensæ: tunc enim expedit se, qui latebat aer, viresque elasticas exferit. Aer est, quem Cl. CRESCENTIUS (*e*) pro spiritu habuit, qui a calore agitato vasa disrumpat, idemque sudorem moveat. Sed aer verus & elasticus in aquis mineralibus magis vividis manifestissimus est, etiam sponte bullulis, & strepitu conspicuus vasaque nimis clausa idem disjicit (*f*).

§. XVIII. Terra. Sales.

Proximum elementum aquæ immixtum terra est (*a*), quæ ejus sedi-
menti partem constituit maximam, de quo egimus.

Varii generis est, potissimum tamen calcaria (*b*) cumque acidis fer-
vens, tingensque violaceum succum viridi colore; quo *absorbentem* (*c*) aliorum Cl. virorum terram referas.

Argillacea (*d*), aut bolaris, terra in fluminibus passim continetur, ut in Rhodano nostro: ob eam inundationes vicini mihi fluminis pratis ferti-
litate impertiunt. Etiam tepidæ nostræ, Thermæque, ejusmodi terram continent, mollem & subpinguem (*e*).

Spatacea (*f*) terra in aquis circa Bex adeo abundat, ut bibi nequeant,
& late per fodinas crustas fistulasque pulchri stalactitis forment. In plu-
rimis aquis adeo multa est, ut etiam vasa, in quibus residet, tubosque

(*d*) L. VIII. p. 181.

(*e*) p. 153.

(*f*) HOFMAN *meth. exam. aquar. sal.* n. 6.

(*a*) MARGRAE *Mém. de Berlin* T. XII. LUCAS p. 57. Etiam ex oleo terra BOYLE
paradox. Chem. p. 29. HOFMANN *peregr. ob sanit.*

(*b*) HENKEL *rediv.* p. 134. KLEIN *Erpach.* p. 31. 32. LUCAS p. 134. BERGIUS p.
111. 112. RELHAN *Brighthelmstone* p. 47. *K. Sw. Wetensk handl.* 1762. Trim. 2. in
stagnis Landskronæ. Sedimenti efficiebat tertiam partem DETHARDING l. c.

(*c*) RUTTY p. 11. HOLZBERGER ad $\frac{4}{5}$. sedimenti, & in aqua Rhenana ad $\frac{5}{7}$. sed cum
pinguedine aliqua. LUCAS p. 125. 126. 134. hæc ad $\frac{2}{5}$. sedimenti: add. p. 114. 115.
117. 120. 121. 122. 123. 125. 126. 127. In Buxovillana aqua sedimentum fervet cum
spiritu vitrioli BINNINGER.

(*d*) BERGIUS p. 128. In stagnis Landskronæ l. c.

(*e*) Valde eas aquas argillofas laudat HOFMAN *peregrin. propter sanit.*

(*f*) HILL. *mat. med.* p. 318, CRESSENZO p. 159. eo enim foliola talcosa refero.

lineos, quos perfluit crassissima crusta (*g*) obducatur, quales in nostris aquis Panetenfibus nati lapidei cortices in speciem fusci cujusdam achatis se patiuntur poliri (*h*).

Inde in aqua sales solent habitare, varii generis, maxime *marinus* (*i*) qui a paucis abest. Cum in ejus salis copiam per aquileiense gubernium sollicitè inquireretur, & omnes scaturigines, rivi, torrentes, & fluvii ad examen revocarentur, nulla pene scaturigo fuit, neque rivus ullus, neque ipse Pater Rhodanus, qui absque admixto sale cubico essent.

Nitrum (*k*) olim in aquis Scultenfibus a C. GESNERO detectum, deinde ab anglis, & in plerisque aquis Holmienfibus (*l*) repertum est; longis nempe suis prismatibus, & vi detonante conspicuum.

Nitrum calcarium angli vocant, si recte eos intelligo, sale glauberiano analogum, fusilem, frigidum, minime detonantem. Is in aquis anglicis (*m*) plerisque reperitur: ejusmodi sale sponte in exhalante muria nasci videmus, incommodum certe, & exosum, etsi in sale purgantem anglicanum mutari potest. Sponte etiam in fissuris subterraneorum fontium nostrorum, debiliter sale marino imprægnatorum, generari vidi in rupibus cuniculorum sub Chamoscire.

Lixiviosi sales, de natri genere frequentius (*o*) fixi, aliqui etiam volatiles (*p*), in nonnullis aquis reperiuntur.

(*g*) STAHL *von Salz*. p. 358. HOFMAN *meth. exam.* n. 73.

(*h*) Ita etiam Carolinæ aquæ. Etiam aquarum *d'Arcueil* parisijs ductæ tubi terra inferciuntur LISTER *Journ. to Paris* 169.

(*i*) BORRICH *herm. Ægypt. sapient.* p. 400. RUTTY p. 9. BERGIUS *K. Sw. acad. handling.* 1759. Trim. III. In stagnis Lanskrone l. c. LUCAS p. 136. & alibi DETHARDING. HOLZBERGER in Illa fl. invenit minimum quidem momentum, grani in 16. libris, in aquis vero argentinefibus multo uberiores, fere ad 2. grana in libram. In Erpacentibus ad $\frac{2}{3}$. sedimenti KLEIN l. c. Grana tria in puteali dura. ID. p. 32.

(*k*) L. VIII. p. 220.

(*l*) BERGIUS utique, & in argentinefibus HOLZBERGERUS. Prismata etiam passim habet LANCISIUS.

(*m*) RUTTY p. 9. LUCAS p. 149.

(*o*) In aqua Rheni HOLZBERGER & in aqua Illæ ad viginti, & triginta grana in materie salinæ granis 210. 240. In putealibus aliquantum id. p. 15. 16. In Tiberi, ut videtur, LANCISIUS *Exp.* 8. in alia aqua *Exp.* 3. 4. In Brunnensibus aquis R. PAROLINUS *Europ. Med.* p. 158. Aquæ alcalinæ *Mém. des Sav. Etrang.* T. IV. p. 473. natro graves TRIPODI *lac Ceizens*.

(*p*) LUCAS p. 142. 150.

Acidum aliquid in quis ferreis conspectum SEIPIO potissimum debemus. Ejus aliqua vestigia in Londinensibus aquis latent apud *Johannem* RUTTY (q).

Vitriolum (r) ipsum in nonnullis fontibus reperitur, quod lac cogat.

Etiam cupro (s), in acore dissoluto, & demum arsenico credit fuisse in cornwallia fontem imprægnari Cl. BORLASE (t). Late vocem fumere oportet, nam arsenicum artis fere opus est. Sed hæc-rara sunt.

Bituminosi quid in plurimis aquis reperitur, quod cum terra (u) aquæ immista cohæret, aut sponte in multis & mollibus aquis in pavoninæ caudæ speciem per aquæ superficiem exit. Ex spissamento aquæ ad centesimam partem exhalantis oleum jam obtinuit BORRICHUS. Id oleum, etsi in aqua recente difficulter ostenditur, facillime tamen & ubertim adparet in aqua putrescente. Neque enim sola aqua Thamesis (w), per longam navigationem naturam inflammabilem, aut aqua fl. Vecht (x). Sed præque omnino aquæ (y), sub tropico eam naturam induunt: & depurata (z) demum aqua, quantum ejus fieri potest, & spuma obducitur ad solem, & oleum sulfureum suppeditat. Eodem redierit, si id phlogiston repetieris ex infectis (a) putridam aquam replentibus, etiam repetito (b) cum nova putredine renascentibus. Oportet enim ea infecta, quorum sola ova in aquam inciderint, incrementa sua, copiamque olei ab aqua sumpsisse. Ex rore etiam sedimentum habetur, de quo oleum & spiritus acidus destillant (c).

(q) p. 11. 210. Id acidum saponem cogit. Habet etiam BORRICH l. c.

(r) RUTTY p. 268. In aquis *Hartfell* scoticis crytalli vitriolicæ nascuntur. In stagnis Landskronæ est vitriolum martis l. c.

(s) Aquæ Cronebaum RUTTY p. 291. Neosolienses aquæ Wiklovensis *Com.* In aquis Riotinto Andalusiæ.

(t) *Natur. hist. of Cornwall* p. 133.

(u) HOLZBERGER in aqua puteali p. 15. 16. in Rhenana Id. in aqua Illæ p. 16. In aqua ad ripam Tiberis LANCIS *nativ. aer rom. qualit. Exp.* 1. 7.

(w) *Phil. transf.* n. 27. KALM *resa* T. II. p. 116. BIRCH T. I. p. 165.

(x) Vapor ex dolio erumpens inflammatur TITSING l. c.

(y) HELMONT *paradox. disc.* p. 5. LISIER *de calcul.* p. 50. 51. DES LANDES.

(z) ELLER *Mém. de Berlin* 1728. p. 8.

(a) *Journ. d'un voy. aux Ind. orient.* p. 355. 356. LISTER l. c. *Hist. de l'Acad.* 1722. p. 9.

(b) Nam etiam bis aqua eadem putrescit LISTER l. c. & *Hist. de l'Acad.* 1722. p. 9. *Journ. d'un Voyage*, & septies EPIGENES apud PLIN. L. 31. n. 21.

(c) ELLER p. 6.

Verum sulfur in multis aquis reperitur, nusquam uberius, quam in fontibus cuniculorum subterraneorum *aux fondemens*, adeo gravibus sulphure, ut ægre fluant.

Denique ferrum (*d*) ut in universum in omni argilla abundat, ita in plerisque aliqua tamen ejus vestigia reperiuntur.

Possis addere ad aquas potissimum palustres & pluviales, tenuissima effluvia putrilaginosa plantarum, & cadaverum. Ex utrisque dysenteriam aquæ de sequana (*e*) haustæ deducunt; ex istis dysenterias Pannonicas subitasque nonnunquam mortes (*f*).

§. XIX. *An omnia ex aqua.*

Etsi multiplex elementum in aqua latet, multo plura tamen ei & olim Cl. viri tribuerunt, & nunc tribuunt. Ex aqua nempe omnia nasci, & formari, animalia certe & vegetabilia; aquam in terram transformari, in oleum, in falem, in omnia adeo, quibus fabrica humana constat.

Salicem citant HELMONTII (*a*) jam experimento sola in aqua educatam, & quadragesies tamen se ipsa ponderosiores, cum nihil præter aquam ad vas accessisset; rapa ad triplum (*b*), sui ponderis aucta. Materiem adeo oleosam, falem, terream, quæ super primævam illam accessit, a sola aqua accessisse monent viri Cl.

Quercum (*c*) octennio integro in aqua vixisse, & novam quotannis frondium comam produxisse: Vites in arena marmorea (*d*) & in fossis cuneo in rupe dura excavatis crescere. Et in universum arbores in mera aqua utique vivere & vegetare (*e*).

In musco humido, spongiave aqua ebria, sola adeo ex aqua, omne genus arborum & plantarum adolescere & incrementa capere, etiam fido Caroli BONNETI experimento.

(*d*) Holmiesibus pene omnibus BERGIUS.

(*e*) LISTER Jour. p. 169. Hist. morb. Uratislav. 1699. p. 79.

(*f*) LIGON Barbados p. 5.

(*a*) Complex utique mist Elem. fig. mut. p. 88. n. 30. Habet etiam salicis ex mera aqua nutritæ historiam KUNDMAN p. 491. 492. & BORELL anim. mot. P. II. Prop. 193.

(*b*) KUNDMAN l. c.

(*c*) Gentleman's magaz. 1749. June.

(*d*) BORELL.

(*e*) Du HAMEL phys. II. p. 202. 207. In siccissimo fabulo cum vitro & conchis misto plantas educavit P. A. MICHELI *mélanges d'histoire naturelle* II. p. 224. Ex terræ libris 20. produxit amicus peponem 50. libr. neque terræ pondus decrevit ZAS *daauw der dier*. p. 53.

Sic alias plantas , ranunculum , mentham ex sola aqua nutritas vixisse , floruisse , suum aroma , suum characterem , BOYLEUS auctor est (*f*).

Cucurbitam sola (*g*) aqua irroratam increvisse , & in cinerem reductam , habuisse solitum suum pondus. Et in aqua terraque ficca nihil diminuta pepo increvit (*h*). Sponte etiam confervas & algas in aqua generari , nimis sane invitius vidi (*i*).

Neque differre valde addunt , si aqua destillata usus fueris , in qua terram paucissimam possis suspicari (*k*).

Sed etiam pisces (*l*) in sola aqua nutriri , & crescere , & patella (*m*).

Neque a terra plantas ali , sed omnibus sollicitè perpensis sola ab aqua (*n*).

Inque aqua invisibilia minutissimorum animalculorum (*o*) ova per putredinem evolvi , & generationes succedere generationibus , donec aqua supereft , quorum omnium materies , præter primævum illud perexiguum feminale principium , ex aqua est , sal nempe lixivus , & terra , & oleum.

Sed porro aquam solo repetito tritu (*p*), & coctione (*q*), variisque aliis modis (*r*) in terram mutari vitrescentem , diversam adeo a terra adventitia , aquæ hospite , calcaria.

Etiam dum corporibus adhæret , indurescere , cumque spiritu acido mistam incallescere , atque facile cum inflammabili elemento , vel cum terra coagulari (*s*). In spumam , in gluten (*t*), in membranam , in oleum ,

(*f*) *Orig. form. & qual.* p. 194. *Chym. sept.* P. II. PLOT. *Natur. hist. of Oxfordshire* p. 259. Du HAMEL *elem. d'agricult.* p. 62.

(*g*) ELLER *Mém. de Berlin.* 1746. p. 46. 47.

(*g*) BOYLE *Chem. sept.* l. c.

(*i*) NEUMANN I. p. 2.

(*k*) ELLER *ibid* & 1748. p. 6.

(*l*) BOYLE *Chym sept.* P. VI. GUMILLA *Oren.* II. p. 37. BATHURST *prælect.* p. 199. 200.

(*m*) BORELL. l. c.

(*n*) WALLER *fundam. agric. chem.* p. 118. SHAW *Suppl.* p. 49.

(*o*) In HILLII *Essays.* JOBLITI *experimentis* , & apud LEEUWENHOECKIUM *contin. arcan. nat. Ep.* 16. *Phil. transf.* n. 133. 203. 220. 221.

(*p*) WALLER K. *Swensk Wetensk Handling.* 1760. Trim. I. *Geocosm. senesc.* p. 12. ELLER *Mém. de Berlin.* 1746. p. 47. Non casu nasci MARGRAF *Mém. de Berlin.* T. XII.

(*q*) BOYLE *ibid.* p. 259. BORRICH *hermet. ag. sap.* p. 397. & NEWTON *Queries post optiks* n. 22.

(*r*) Add. WALLER *de indole aqua mutabili* : BOYLE *de orig. form.* p. 270. seqq.

(*s*) WALLER *aq. ind. mutab.* p. 26.

(*t*) *Id. ibid.* p. 30.

(*u*) p. 235.

folia putredine (*u*) mutari in falem cum acido universalis aereo (*w*) abire. Nam in aqua marina manifesto superiora strata acere, & syrupum violarum tingere colore rubro, in profundis minus.

Vicissim in aquam omnia resolvi. Pinguedinem repetito a fale tartari abstractam in aquam elementarem redire (*x*): Sales alcalinos in aquam & terram iterata dissolutione (*y*) reduci.

Omitto, quod dicatur, liquores dari (*z*), qui omnia in aquam resolvant.

Itaque olim THALES (*a*) omnium rerum aquam elementum esse, docuit; & ante THALETEM ÆGYPTII (*b*); deinde R. BOYLE (*c*); & J. B. HELMONTIUS. Inter nuperos ILL. viri J. Theodorus ELLER (*d*), J. GODESCHALK. WALLERIUS, alique (*e*).

Nunc quidem video, quæ reponunt viri ILLUST. BOERHAAVIUS (*f*), C. Gottl. LUDWIGIUS (*g*), HILLIUS (*h*), HENKELIUS (*i*), J. H. POTT (*k*), BRADLEY (*l*), WOODWARD (*m*), MONGIN (*n*).

Valida tamen videntur argumenta, quæ de plantarum in aqua pura destillata nutritione habemus. Incrementa ponderis multum superant ejus

(*w*) WELLER ad HIERNE p. 64.

(*x*) David van der BECKE *exp. natur.* p. 83. TACHEN *hipp. chem.* c. 10.

(*y*) TACHEN *ibid.* c. 12. van der BECKE p. 203.

(*z*) HELMONT *alcahest.* van der BECKE BOYLE *Chem. scept.*

(*a*) Apud LAERTIUM I. p. 26. CICERO *nat. Deor.* I. n. 25. Conf. REGNAULT. *phys. ang. med.* III. p. 5.

(*b*) LAERTIUS *ibid.*

(*c*) *Chem. scept.* P. II.

(*d*) *Mém. de Berlin.* 1748.

(*e*) MULLER de Thalete. MUSITANUS in *pyrotechn.* Neapol. 1683.

(*f*) *Elem. Chem.* p. 594. seq. tamen ut det, aquam cum partibus solidis animalium concrefcere p. 595.

(*g*) Ex tabescentibus squamis in aqua ali eas stirpes, quæ creduntur aqua nutriri *Inft. regn. veget.* p. 175.

(*h*) Aquam in terram converti negat, etsi exhalatione terra latens manifesta fit *mat. med.* p. 318.

(*i*) Salicem pene totam aquam esse, & 62. libr. carbonis querni dare cineris libras duas *flor. saturni.* p. 118. Sed HELMONTIUS quinque libras dedit salici quarum perinde pars maxima, & major quam adultæ, aqua erat.

(*k*) Respondet WALLERIUS in *diff. dubia quedam* &c.

(*l*) Pisciculos non vivere posse, in aqua, nisi terram admiscueris *husbandry* p. 7.

(*m*) *Phil. transf.* 253. Aquam nullam puram esse, & ex ea terra, quæ in aqua sit, plantas ali.

(*n*) *Chymiste physicien* Paris 1704. 12.

terræ portionem , quam possis credere in aqua latuisse (*o*) , & cujus nuper mensuras dedimus , grani in libra unius , etiam decem. Aquæ sibi relictæ & putrescentis phænomena (*p*) nimis manifesto ostendunt , posse ex ea sola , vitreis in vasis inclusa , magnam vim viscidæ , inflammabilis , & terreæ naturæ nasci. Sed id omne est , quod ab aqua expectamus , quando dicimus , ea stirpes , aut animalia ali posse. De metallis non adfirmavero.

§. XX. *Aqua est potus naturalis.*

Hæc , quam descripsimus , aqua , omnibus plantis & animalibus terrestribus a NATURA pro potu destinata est : Novem decimæ partes hominum etiam nunc ea sola contenti vivunt , per Americam universam , vastamque Africam , Asiamque Mahometanam , aut Benjanicam , perque ipsam meridionalem Europam , cujus & plebs , numerum in quaque gente pene sola affectura , & in universum sæminæ alium potum ignorant.

Vel a sola ratione vincitur , esse saluberrimam (*a*) , quæ sit a natura data. Accedit , quod omni alicujus momenti sale pura , æqua vi omnis generis corpora dissolvat , neque ut acida faciunt , cogat pingua , sanguinemve , & lympham ; aut ad terrea imbellis sit , ut sunt sales lixiviosi. Sola sales omnes debilitat diluendo (*b*) , ut etiam sublimati mercurii horridas vires mitiget. Sola viscorem resolvit , & sanguinem fluidum servat. Sola etiam elementum sanguini , corporique toti adfert , ex quo præcipue , aut unice struimur : cum potus illi medicati , a populis borealibus , aut a ditioribus , in usum recepti , particulis acidis , & inflammabilibus abundant , quas necesse sit separari & deponi , nisi continuo sanguinis miscellam corrumpi , & fibrarum naturam irritabilem velis obtundi. Quare abstemii melius appetunt (*c*) , gustu , olfactu , oculis , valent , etiam me-

(*o*) Video quam parva sit. p. 229. 230.

(*p*) Apud ELLERUM descriptæ l. c.

(*q*) VIEILLARD *Thef. Par.* 1739. *Ergo aquæ potus saluberrimus.* HJARNE *förste fiok* a principio : HANCOCK : CHEYNE *infirm. sanit. tuend.* p. 62. Recte SMITH & FLOYER & HOFMANN *aqu. med. und.* n. 19. ubi vires , quæ medicamentis aquis tribuuntur , potissimum ad aquæ elementum pertinere monent.

(*b*) In falsugine sanguinis utiliter potæ BRUNNER *gland. duod. fin.*

(*c*) Duplo CHEYNE *infirm. valet.* p. 74. Aqua edax HIPP.

moria (*d*). Aquæ puræ, qua ab anno ætatis 18. sola utor, tribuo; quod post tot in fulgido sole susceptos microscopicos labores omnibus sensibus, & oculis potissimum, non minus valeam, quam puer valui.

Eam vero ipsam aquam bibere oportet, si bona est, quam natura dedit, perinde crudam, & frigentem. Ea enim & gratior est linguæ, & sitim magis levat, & denique fibras ventriculi minus debilitat (*e*). Merito ergo in regionibus calidis (*f*) præfertur, & Hispani (*g*). Siculi (*h*). Melitenfes, Neapolitani (*i*), suæ aquæ etiam artificiale nivis frigus salubriter addunt; & aquæ frigidæ usu nupero febrium malignarum vehementiam remisisse (*k*), testimonia exstant. Sed etiam in febribus acutis (*l*) causo (*m*), synocho (*n*), febre erysipelacea (*o*), in cholera (*p*), mania (*q*), utiliter propinatur: tum in hæmoptysi (*r*), phthysi (*s*) & olim & nuper utiliter data est. Mihi quidem, toties febrienti, aquæ puræ nunquam fuit desiderium. Poscit natura adjecti ad aquam acidi quid, quod resistat putredini.

Non ignoro mala, quæ facit subito suo frigore (*t*), quando in æstuans corpus ingurgitatur, etiam in bestiis (*u*). Supervenerunt inde

(*d*) Qui triginta annis abstemius fuerat, is cum ad vini usum rediret, multum de memoriæ excellentia amisit SCHULZE de *gran kerm.* p. 23.

(*e*) ROBINSON *Eff. anim. æcon.* II. p. 356.

(*f*) ZOD GALL. T. IV. April.

(*g*) Le CAAN de *medic. milit. hisp.* p. 7. VALISNER. *Oper.* T. II. p. 468.

(*h*) PISANELLI p. 156.

(*i*) ADDISON *Journey to Italy* p. 145.

(*k*) PISANELLI p. 156. NONNUS p. 344. MAPPUS de *potu calido*.

(*l*) VALISNER. T. II. p. 509. HARRIS *diff.* p. 80. CYRIEL. *Phil. transf.* n. 410.

(*m*) Casu summa sanatus æger ZACUT *præx. med. mirab.* L. III. *obs.* 7. VALISNER. T. II. p. 515.

(*n*) RHAZES *divis.* c. 149.

(*o*) TRALLIAN L. XII. p. 691.

(*p*) In ea maxima spes erat *Johannis VIRIDET bon chyle* p. 524.

(*q*) GHISI *lettere* p. 27. seqq. Ipse cum summa utilitate, sed uberrimam, cum aliquo laxante medicamine admisto dedi maniacis. Hystericis nuper Cl. POMME.

(*r*) GHISI *lettere* p. 22. seqq. & in morbo a P. Anton. MICHELOTTO descripto.

(*s*) CHEYNE *diseas. of body and. mind.* p. 109. adde ad aquæ laudes COGROSSI *saggi della med. ital.* KLOEKHOF p. 18. GHISI *lettere* p. 30. & olim. GALEN. *meth. med.* L. VII. AVICENN. p. 3.

(*t*) WOLF *diat. liter.* p. 46. VALISNERI II. p. 46. 47.

(*u*) VALISN. l. c. in cane MORGAN. *princip.* p. 243.

pleuritis (w), phthisis (x), febres malignæ (y), mortes subitæ (z). ex ruptis vasis (a), & gangræna mesenterii (b).

Ipse sum expertus, semel in Alpibus a frigidissima aqua puncturum in pectore dolorem, & pleuritidis primordia mihi subnasci: Semel singularem quemdam stuporem, alpicolis non ignotum, cum aliqua animi dejectione, & ad omnes sensus motusque tarditate.

Sed ea frigoris sunt flagitia, non aquæ, & perinde accidunt, quando absque potu ullo in frigidas cellas (c) nos recipimus; perinde etiam a cerevisiæ (d) & ab aceti frigore (e). Neque nocet unquam ingurgitata etiam, glacialis aqua, dum a potu corpus exercueris; solam enim per quietem sanguinem in pulmone coagulare apta fit.

Absurdum ergo est, bonam aquam coctione (f), reddere deteriores, etsi ea veterum (g) luxuria fuit: Neque unquam, etiam post coctionem, nive refrigerata gratiam suam recuperat, etsi ea NERONIS (h) fuit decocta. Videntur levissimæ, & penetrabilis maxime, atque linguæ placituræ partes continuo avolare, quando ignem fenserunt.

§. XXI. *Aquæ impuræ.*

In regionibus planis in universum, & in palustribus, quales nunc ab industriis & celebribus populis habitantur, & olim, aquæ adeo ma-

(w) PETSCHÉ n. 99. 100. a frigido potu explicat arteriam venamque pulmonalem faccumque venæ cavæ per latus dextrum tangente, dum per gulam descendit.

(x) In Laponibus WALLER.

(y) In CORDO FORESTUS L. I. præf. qui morienti adstitit.

(z) *Act. Mar. Baln.* 1700. p. 118. L. BOURGEOIS apud BARTHOL. *de nive* p. 204. AMAT. LUSIT. L. II. cur. 62. TITSING *Cypria* p. 40. De *Delphino Gallia* FRANCISCI I. filio & de HENRICO filio JACOBI I. M. B. Regis similia leguntur.

(a) In abdomine L. BOURGEOIS.

(b) In cane MORGAN.

(c) AMAT. l. c. L. XII. p. 82.

(d) HILDAN. *Cent. III. obs.* 149.

(e) Post equitationem ADOLPHI *de equitat. usu med.* p. 424.

(f) TRALLES *Vorsorge redlicher Mütter* p. 108, 109. HECQUET *digest.* p. 392. PORTIUS *med. milit. valet.* p. 80.

(g) Ex Philemone POLLUX p. 1040.

(h) PLIN L. XXXI. n. 23. add. SUETONIUM in Nerone. LANZONI *Giora de Lett.* T. XXXII. art. 13.

læ (a) sunt, adeo plenæ calce, putrilagine, & admixta nonnunquam vicini maris falsugine, ut bibi omnino non possint. Nunquam potui Göttingensium aquarum potum ferre. Sed etiam valetudo ab ejusmodi aquis læditur, & dysenterias inde nasci, jam monuimus alibi, & phthisin (b), & in calidis regionibus morbos malignos (c). Ex aqua fl. *Ussolka*, quando humi pars a gelu adstricta est, reliqua quæ fluit, armenta occidit (c*).

Ea prima causa fuit decoquendæ aquæ apud Chineses (d), etiam apud Lapones (e) belgasque, & ipse decocta sum usus, atque aromatibus condita. Ita pars aliqua impurioris sedimenti subsidet, & fluida potest sola ad usum servari. Neque tamen vel eo modo putrilaginosa miscela separatur. Leidæ neque Theæ infusio ex putealibus aquis palato placet.

Ab ea tamen decoctione calidus potus ortum (f) traxisse videtur: primum enim erat, siquidem coquebatur aqua, bibere calidam. Ita olim veteres (g) solebant, eratque ea pars deliciarum romanarum.

Potest aliquid in eo more esse gratiæ, & sitim certe æstumque non alia ratione consolamur suavius. Sed periculosa sunt deliciae. Aqua calida insigniter fibras debilitat, & ad decimam roboris sui partem (h) reducit; & cum etiam frigida nimio usu pene suffocet (i), & respirationem inhibeat, multo magis calida ventriculi vires & appetitum frangit (k). Frustra a BOERHAAVIO (l) monitus, cum nocturna juventutis meæ studia Theæ usu lenirem; ita stomachi robur debilitavi, ut ejurata ea firene, anno abinde pene quadragesimo, nondum vires ventriculi recuperaverim.

(a) HOFMAN *meth. exam. aq. salubr.* HENKEL *rediviv.* p. 134. HIPPOC. περί και υδατ και τοπ. n. x. Jam tum vidit, facere scorbutum.

(b) Kwenk. *Acad. Handl.* 1750. n. 3. & Belforti *Ad. Helvet.* T. III. p. 209.

(c) Negapatani. Eos morbos aquas per naves advecta sustulit H. v. RHEEDE apud HAMILTON *East. Ind. Voy.* I. p. 396.

(c*) GMELIN *Reise* T. III. p. 396.

(d) HAMILTON T. II. p. 222. 223.

(e) SCHEFFER *lapon.* p. 225. MASINI *de gelid. potus abusu* I. c. 17.

(f) Theæ apud Chineses HAMILTON I. c. Laudat VALISNERI T. II. p. 468.

(g) NONNUS *Ego mihi thermopotabo gutturem* PLAUTUS: conf. ROBERG *de caldae potu*; & GEBAUERI viri summi lib. *de potu calido* & REDI T. V. p. 158.

(h) BOERHAAVE *Aphor.* n. 75. ROBINSON *Oecon.* p. 297. de capillo cujus robur a 100000. partibus redit ad 6250. conf. ARBUTHNOT *on air.* p. 61.

(i) LORRY *alim.* T. II. p. 290.

(k) ZWINGER *de thea helv.* p. 5. Ex theæ abusu tres virgines, cum sicassent mensuram sextam, in debilitatem summam cum pallore incidunt FABER *thee histor.*

(l) Et olim HIPPOCRATE *aphor.* 16. Sect. V. de usu liquor. n. 3.

Alio modo aquæ fluviatiles & turbidæ per lapidem porosum (*m*) mexicanum, arenam (*n*), aut spongiam (*o*), longa cum quiete (*p*) defæcantur; a terra quidem, non a putrido miasmate. Putredo ipsa dicebatur (*q*) aquas purificare, sed adparet (*r*) eam, quæ computruerat, fætidam manere, etsi limpida est, & denuo verminare conservatam.

Montanam ergo, puram frigidamque ut gustus, ita valetudo jubet bibere. Fluvitialis in ejus defectu ferri potest. Nilum (*s*) bibunt Ægyptii (*s*^{*}), Sequanam Parisini (*t*), cujus aquas ajunt etiam pro medicamento a celebri medico rusticano venditas fuisse (*u*). Tiberim Romani laudant (*w*), Choaspem Persæ.

Putealem ultimo loco pono, etsi passim frigore blanditur. Dura fere semper est, inepta saponi solvendo, & coquendis leguminibus.

Lacuum, etiam ex purissimis aquis natorum aquæ, etsi pellucidæ videntur, tamen ab insolatione tepescunt, & fatuæ sunt vapidæque.

Marinas omitto, etsi bibi possunt (*x*), & a piscatoribus sæpe bibuntur, & etiam nunc in anglia ad scrophulosos tumores, ut puto, merito laudantur. Certe enim vidi, & sæpe, strumosos homines Massilia sanatos rediisse, ut etiam aeris marini adflatus thyreoideam glandulam resolvat.

Mineralibus particulis graves pariter omitto, etsi locum aquæ naturalis tenere possunt. Etiam rupicapræ Thermas Valderianas bibunt (*y*).

(*m*) VALENTINI in diff. propr. PORTIUS.

(*n*) PORT. ibid.

(*o*) AMY in propriis colis.

(*p*) HOFMAN meth. exam. aq. n. 14. aliquot dierum frigore.

(*q*) BOYLE of man's great ignorance of the usu of natural things. Philos. exp. p. 367. HALES exper. p. 58. Philos. transf. n. 27. de aqua Thamefis; & de aqua septies putrefacta PLIN. L. XXXI. n. 21.

(*r*) Journ. d'un Vaiss. aux Ind. Orient. p. 355. 356. Post quartam putredinem incorruptam esse Phil. transf. n. 27.

(*s*) MAILLET p. 19. Ex ejus usu pinguescunt.

(*s*^{*}) ALPIN. Med. Ægypt. L. IV. p. 146. Eam in nocturno aëre refrigerant GALEN. Epid. VI. 4.

(*t*) Salubritatem ejus laudat CHEVALIER Thef. an. 1743. etsi insuetos vehementer purgat. Calculosas esse fluviatiles jam HIPPOCR. l. c. 21.

(*u*) Le Médecin de Chaudrai le FRANÇOIS reflex. T. II. p. 160.

(*w*) BRUYERINUS, magnates eam adfervare.

(*x*) K. Svensk Wetensk. Acad. 1757. p. 185.

(*y*) VALISNER. T. II. p. 517.

§. XXII. *Vinum.*

Sive voluptas fuit, five necessitas, per universum fere terrarum orbem homines potum aliquem quæsierunt, qui spiritus, ut vocant, excitaret, homini fatigato, aut dejecto, alacritatem redderet, denique inebriaret, delirium nempe breve lætūque produceret. Perantiqua est, & universo orbi communis cupido. Nam etiam in ultimo orbis angulo Kamtschatka, Russi (a) in farina membranulisque caulis sphondylii maximi, materiem detexerunt, qua exoptatum delirium sibi conciliarent.

Cæterum etiam aves (b) vinum amant, & quadrupeda ei adfuescunt.

Græci vinum Baccho inventum tribuerunt, non valde multo Trojano bello antiquiori homini, si Semeles filius fuit; Jovisque, cujus filii & nepotes Trojam aut obsederint, aut sint tuiti (c).

Sed antiquior res est, ex sacrae scripturae testimonio, neque nuperior diluvio (d). Noachico, nisi etiam eo est antiquior.

Succus nempe recentium & dulcium fere baccharum exprimitur, nondum enebrians, quamdiu mustum est. Idem in vasis clausis, cum aere quo totus turget, sibi permixtus, sponte in motum intestinum cietur, fervet (e), calet, spirat halitum inebriantem, in quo vis dementans latere videtur (f): deinde sedimentum ponit, & limpidus idem atque acidior, potui nunc aptus, vini nomine venit. A vapore (g) vini solo vim inebriantem pendere experimenta ostendunt, in quibus cellæ halitu ex doliis male clausis repletæ, suffocant ingressos; ipsum vero vinum halitu eo amisso viribus nunc cassum & vappa est (h).

(a) GMELIN *flor. sibir.* T. II.

(b) MALOUIN *Chym. medic.* T. I. p. 382.

(c) Add. I. ab ALMELOVEEN *nov. antiq.* p. 83.

(d) *Genes.* c. IX. v. 20.

(e) Conf. BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 166. seq. STAHL *Fund. Chem.* T. II. p. 124. seq. BECCHER *Physf. subterr.* L. I. Sect. V. c. 2. HALES *vegetable stat.* c. 6. TANNEBERG *de ferment.* p. 20. 21.

(f) Conf. BECCHER *Physf. subterr.* 164. Etiam aquæ minerales aliquæ suo vapore inebriant. De aquis *Altwasser Primit.* Polon. T. II. p. 253.

(g) De eo vapore L. VIII. p. 212.

(h) STAHL *Fund. Chem.* T. III. p. 91. Non sulfur esse, sed Gas BECCHER *Physic. subterr.* p. 161.

In eo vino plurima aqua est, & acidus sal, cujus specimen est in tartaro, & oleum, in nonnullis vinis ita expeditum, ut flammam (*i*) concipiant, & dulce magna viscidumque, & demum odoratæ volatilesque particulæ, quæ sanguinem receptæ exagitant, cerebrique quietem turbant.

Vini princeps materies est in uvis vitis viniferæ: paratur tamen etiam ex aliis baccis, ex ribe acido (*k*), & olente; ex rubo idæo (*l*), & fructu ejus simili (*m*); ex pomis, celebre in Normannia, & Anglia (*n*), inque Turgovia nobilissimum (*o*); ex saccharo cum addita aqua (*p*); ex melle (*q*); ex palmarum quarundam succo (*r*), quod in tanto cæli calore celerrime perficitur; ex baccis Juniperi, in Sueciâ celebratum.

Sed vites tamen superant in regionibus, quæ inter 50. gradum sunt & 20: calidissimæ (*s*) enim, quæ nullas hiemis vices norunt, uvas imperfectas producunt, cum baccæ baccis perpetuo aliæ succedant, neque ullum commune tempus habeant maturitatis. Ultra 50. gradum ægre maturescunt, suntque tenuia & similia aceti. Cæterum & in America California bona vina suppeditare didicit, & in Africa Caput bonæ spei. In Asia occidentali tamen primum vites videntur cultæ fuisse: indeque sensim per Europam se extendisse, trans Indum fl. nullæ.

§. XXIII. *Vini dotes.*

Omni vino commune est calefacere, vires ingenii & corporis augere, incitare pulsum, deinde adfectus animi præcipitare, inebriare, sopire, ut nimia ejus copia sumtu fuerit.

(*i*) Vina ad Cedram vicum PLIN. L. XIV. c. 6. De Thuringiacis vinis, alioquin parum spirituosus, STAHL *Fund. Chem.* T. II. p. 165. Add. S. PETERI *de condim. corp.* p. 20. Ad viride aeris parandum præfertur, quod melius flammam alit MALOVIN *chymie medecin.* T. II. p. 29. & *Mem. de l'Acad.* 1750. p. 392.

(*k*) *Phil. transf.* n. 124. PAPIN. *digest.* p. 80.

(*l*) MAGNUS NORDENBERG in proprio libello.

(*m*) *Voy. à la Mer du Sud.* p. 297. 298.

(*n*) Gracilibus salubrius POISSONNIER *Thef. Par.* 1743.

(*o*) EVELYN *Pomona* p. 61.

(*p*) BECCHER *Physic. subterr.* p. 168.

(*q*) Poloniæ familiare. Mire placebat Johanni MESUE p. 135. b.

(*r*) ADANSON *relat.* p. 110.

(*s*) In Mexico non maturefcit uva J. a COSTA *hist. natur.* L. III. c. 22. neque in insulis antillis, sed in mitiori Peruvia.

Fibram animalemodico usu confirmat (a), majori hebetat & debilitat. Quo plus continuerit effervescentis vaporis, eo inebriat celerius, ut vina a 45. gradu ad 35. nascentia. Eadem minus dant spiritus vinosi (b). Quo plus habet acidi humoris, eo minus calefacit, minus inebriat, & majori copia bibi potest, & per urinam facilius transit. Ita vina circa 50. acidissima nascuntur, mosellana, rhenana, quorum acorem sola ætas frangit.

Quo plus olei dulcisque magmatis vinum habet, eo minus per urinas sudoremve excernitur, & diuturniorem edit effectum, cæterum minus inebriat. Vina hispanica & malvatica helveticis minus in eo effectum valent, cum, cocta, multum sui vaporis amiserint (c). Num aliud vinum minori dosi rationem vincat, pedesque debilitet vino octodurensi, ego quidem ignoro, cujus sapor non multum sit infra spiritum vini igneus: & cujus dimidium nemo ferat ejus, quod in reliqua Helvetia generosum crescit.

Omne vinum medicamentum est, non potus. Acidum cum sit, in vappam in ventriculo degenerat. Carnes, adipem, fructus horæos, non solvit, ut pene cogat & conservet. Sitim multo minus solatur, nocetque febrientibus, ut non alia ratione funerum major numerus nascatur, quam ex infano more, quo ægris febrientibus, tamquam optima quæque optaturi, rustici vinum rubrum propinant. Ad calculum generandum dicitur plurimum conferre: ut CYPRIANUS adfirmet, inter 1400. homines, quibus calculum extraxerit, Oenopotas se multos, cerevisia potos nullos vidisse (d). Et ego in urbe non divite, cum cadaveribus pauperum cerevisia utentium abunde theatrum anatomicum instrueretur, vix bis in trecentis & quinquaginta cadaveribus calculos renales aut vesicales vidi. Accusatur etiam ob arthritidem podagramque (e) Ei JULIUS PALMARIUS, & RONDELETIUS, tot alii, ob valetudinis curam coacti fuerunt renuntiare (f). Falsum tamen videtur (g) parcere podagram

(a) ROBINSON *Ess.* p. 314.

(b) LEMERI *cours de Chym.* P. II. c. 20.

(c) STAHL *Fund. Chem.* III. p. 51. In Campania LABAT *voy. d'Ital.* IV. p. 32. in Sicilia ibid T. V. p. 151.

(d) SLARE *of Sugar.* p. 13.

(e) Ideo Burdigalæ podagræci abundant SAPORTA *de tumore* p. 474.

(f) PATIN *valet. tuend.* p. 401.

(g) Sanati podagræci, qui vino renunciarunt Alex. BENEDICT L. XXIX. *procm.* aut ad paupertatem redacti necessarie eo abstinerunt.

abstemiis, & convalescere, qui vini usui renuntiant. Ego quidem a quadraginta pene annis abstemius, tamen quatuor, aut quinque longos podagræ paroxysmos non effugi.

Magis nocet in regionibus calidis (*b*), in juvenibus robustis, & æstate, minus hieme, in regionibus frigidis, in senio. Modica copia sumtum cardiaci medicamenti loco est.

Acida & immatura vina fibras intestinorum callofas reddunt, motum peristalticum ita destruunt, ut inde colica pictonum sequatur (*i*).

§. XXIV. *Cerevisia.*

Cum homines se per novum orbem diffunderent, in regiones delati, viti generandæ parum idoneas, aliquid quæsierunt, quod desiderium ejus humoris leniret. In Ægypto adeo, bonis aquis præter Nilum pene destituta (*a*), primum inventum est, farinosis seminibus, cum aqua decoctis, & simili fere fermentationi expositis, qualis vinum gignit, *cerevisiam* (*b*) parare. Id artificium in ultimum orientem (*c*), pariter ad vitam alendam ineptum, penetravit, adque Sinas & Japonenses.

Sed etiam in America ex granis Mayz (*d*) manducatis (*e*), & fermentationi permixtis, vel ex cassavæ farinosa radice (*f*), aut patatas (*g*), *cerevisiæ* genus paratur, & Hottentotti radice suæ regioni propria ad potum fermentantem faciendum utuntur, perinde inebriantem (*g*^{*}).

(*h*) Non bibi potest in Brasilia vinum ZUCHELLI p. 80. Equus Barbaricus periit, cum vino ad cursum incitaretur, TOZZI *sex reb. non natur.* p. 235.

(*i*) ASTRUC *tract. pathol.* p. 100. HUXHAM.

(*a*) Quod aqua mareotici lacus falsa uti non possent.

(*b*) Zythum ibi vocari THEOPHRAST *caus. plant.* L. VI. c. 15. Habet PLIN L. XIV. fin. & L. XXII. n. 82. conf. DALECH. ad L. XXII. *cap. ult.* Bouzah modernis dicitur SHAW *travels through Ægypt.* p. 407. Ofiridis inventum est DIODOR L. I. p. 17. aut BACCHI Id. L. III. c. 73.

(*c*) *Tarasu* Sinarum ISE. IDES p. 141. *Lettr. cur.* L. XI. p. 251. Mentionem ejus facit RHAZYS ad mansor L. III. c. 6. Ex oryza manducata Formosani vinum faciunt *Voy. de Rechteren* p. 2. 4. Datum olim elephantis bellatoribus ÆLIAN L. XIII. c. 8.

(*d*) DAVIS *exped.* p. 468. BENZO *Amer* IV. p. 135. WAFER *of the isthmus* p. 154. a COSTA *Hist. Nat. Ind.* IV. c. 16. Brasilienses STADE in T. de BRV *Amer.* P. II. c. 15.

(*e*) A vetulis DAVIS. WARREN, WAFER, LIGON. Aipi MONTANI *Amer.* p. 365. A puellis THEVET *Antart.* p. 46. in Brasilia.

(*f*) Circa Surinam WARREN *of Surinam* p. c. 3. In Barbades LIGON p. 32. In insulis Caribanis, *Relat. des Caraib.* p. 23.

(*g*) Mabey. LAFITEAU *mœurs des Sauvag.* p. 117.

(*g*^{*}) La CAILLE *Journ. hist.* p. 133.

Celtæ (*b*) frumentis & hordeo potissimum eo fine usi sunt, ipsique Thraces (*i*) deinde Illyrici (*k*), inde Galli (*l*), ante vites fatas, quas ad PROBI Imp. usque tempora ignoraverint, & Hispani (*m*), denique Germani (*n*), Belgæ, Angli, Sueci, Dani, quibus omnibus vites nullæ succrescunt.

Longo vero usu simplicitatem veteris Zythi varie emendare didicerunt.

Hordeum in cumulos conjectum permittunt leni fermentationi, ut vehementer incalasciat, & germinet. Tunc divulsis acervis in loco aeri perflabili, aut in craticula ficcant. Eam *Maltham* aquæ infundunt, deinde cum ea coquunt; addito amaro aliquo medicamento, quoties volunt eum potum ætatem ferre, ut lupulo, dauco cretico, gale, L. pulmonario (*n*^{*}). Etiam bilem, puto minus bene, admiscent. Ejus amaroris virtus est, nimiam acedinem inhibere.

Coctam cum frumento aquam nunc exponunt (*o*) fermentationi. Ita vaporem emittit, similem ut vinum (*p*); & fæcem ponit & demum depuratur liquor, inque subacidam naturam mutatur.

Minus quidem, quam vinum, calefacit, æstivo potui aptior; cæterum pariter in acetum abire paratus, & spiritum (*q*) daturus, parciolem (*r*) tamen, ut omnino a gelu sapor cerevisiæ prius destruat, quam in vino; et si neque vinum fortiori frigori resistit. (*s*). Inebriat suo vapore (*t*), tum pota, sed lentiori & durabili delirio; Vino generoso æquiparabat (*u*) BOERHAAVIUS.

(*h*) Curmi ATHENÆUS. ex POSSIDONIO.

(*i*) ATHENÆUS.

(*k*) Ex milio Pæones; ex hordeo vel tritico Illyrici REINES *var.* p. 484.

(*l*) Ex fruge madida PLIN. & L. 18. 22. DIODOR L. V. c. 26. In eum spurium Bacchum exstat JULIANI. Cæs. epigramma Conf. MEIBOM. c. 12.

(*m*) PLINIUS.

(*n*) Jam Taciti ævo *de morib. German.*

(*n*^{*}) GMELIN *Reisen.* T: III. p. 427.

(*o*) G. v. SWIETEN *Comm.* T. I. p. 105. *Leipz. Saml.* T. I. BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. *proc.* 42. p. 174. *proc.* 43. p. 192. seqq. BEHRENS *diat.* p. 321. Paulo aliter muma paratur, secundo calefit BRUKMAN *Ep.* 52. Chineses oryzam immaturam in aqua per 20. & 30. dies infundunt, tum coquunt & fermentationi permittunt.

(*p*) Ex Gofa tamen fl. parata flammam alit BRUKMANN *Epist.* 38. Negat NEUMANN p. 755. 756.

(*q*) BOERHAAV. T. II. *prac.* 45.

(*r*) Cerevisia ad $\frac{1}{50}$. per frigus coacta in spiritum abit BAYNARD. p. 332. Destilando ad $\frac{1}{227}$. reduxit BESENECKER *cerevis. austr.*

(*s*) (*Voyag au Nord.* p. 123. 131. ubi de canariensi quidem vino sermo est.

(*t*) NEUMAN.

(*u*) p. 192.

ita adfuetus, quem etiam vidi vina illa fatua dulcia, quæ Gallica vocant, & bibere & amicis propinare. In vitifera regione nati aliter sentiunt.

Habet id commodum cerevisia, quod diminuta sola copia hordei, & aquæ momento aucto, debilissima fieri possit; qualis ex pane Quass, Russorum potus, & Bouillon (w) Picardorum est, ex furfure cum aqua fermentato, & posca Bellonii (x), & debilis cerevisia Cofent, quæ in morbis acutis ob vim farinosam levem, & acidam indolem, potest pro potu admitti, celebris ex SYDENHAMII laudibus.

Quæ ex lupulo amarorem concepit (y), creditur calculo & podagræ resistere, certe nonnullis in urbibus cocta (z): & si meraca fuerit, habetur pro cibo pene potuque vehementer, & constantius, analeptico, quam quidem vinum, a BOERHAAVIO, aque TRONCHINO eo fine commendata. Eadem adeo stabiliter est mista, ut absque jactura aut virium, aut gratiæ, iter in utramvis Indiam perferat (a).

Accusant, qui non adfueti sunt, aeris in viscore inclusi copiam; in nonnullis *albis* belgarum cerevisiis manifestissimam; hinc ortos dolores colicos (b), diarrhoeas dysenterias (c), choleras.

Etiam bona cerevisia potius artificiosis quam naturalibus potus generibus accenferi debet (d). Nam in ventriculo acefcit, & vappescit, ut vinum.

§. XXV. Acetum.

Et ex vino, & ex cerevisia (a), iterato per fermentum acidum (b) excitato fervore, dissoluto, & remisto in ipsum liquorem tartaro, sive acida crusta.

(w) PATIN. *valet. tuend.* p. 403.

(x) Ex farina in aquam coniecta, cum qua absque igne ebullit *obs.* p. 347.

(y) Catalogus cerevisiarum Germaniæ exstat apud BEHRENS p. 331.

(z) Königsletteræ nulli ex eo genere morbi sunt BRUKMAN.

(a) *Phil. transf.* n. 27. BEHRENS *diatet.* p. 333.

(b) Mors a cerevisia fermentante, colo per diaphragmatis foramen vitio natum in pectus protruso S. ANDRE *Phil. transf.* n. 351.

(c) BOERHAAV. *Præl.* T. I. p. 138.

(d) HOFMANN *med. syst.* I. p. 549.

(a) LEMERY *Cours de Chym.* P. II. c. 21.

(b) Uvarum petiolis *Phil. transf.* n. 61.

(c) LEMERY. Etiam in cerevisia LISTER *de hum.* p. 127.

doliis vino plenis adhærente (c) generatur *acetum*, liquor manifestius acidus, neque inebrians, non absque omni tamen oleo, sanguinem refrigerans, non cogens, sed nigro tristisque colore fædaturus, sæpe vivis anguillulis plenus. Etiam ex palmarum (d) succo, & ex melle & saccharo acetum fit, & ex cerevisia, sed ex ista quidem debilius, & in univsum ex generoso vino (e) acetum nascitur nobilius.

Olim frequentius quam nuper inter potulenta recipiebatur, aquæ mistum, *poscæ* nomine, qui militaris Romanorum (f) potus fuit, & siti fallendæ aptus certe, & vitandis in calidis regionibus morbis acutis, qui mihi Romanis in remotissimis & fervidissimis regionibus militantibus minus, quam nostris, videntur funesti incubuisse.

Putredini adversum, carnes conservat; ad scorbutum utile nautarum præsidium (g). In acutis equidem morbis (h) & olim (i), & nunc, sæpe etiam enormi copia (k) feliciter adhibitum est, neque alteri remedio plus tribuebat in dysenteria HARTMANUS v. der HEYDE.

Ego aliquoties expertus, nescio quare non perinde utile reperi, ut limonum succus in leviori malo est, & in graviori spiritus sulfuris. Nescio an latens in aceto putredo fraudi fuerit. Cardiaci tamen quid habet & stimulantis. Servi ad remos damnati propinata posca refocillantur (l).

Meracus acor aceti a ventriculo male fertur. Vidi, cum ad obesitatem solvendam fumeretur, ventriculum in uncialem crassitiem intumuisse, in numerosas laminae fictam. Vidit ab ejus usu morbum hecticum J. VIRIDET (m), & C. J. LANGIUS ab aceti usu ob varia mala coactus est, desistere (n). Ex atramento, cujus non remota ab aceto na-

(d) ADANSON p. 110.

(e) *Phil transf.* l. c.

(f) ROLLIN *hist. ancienne* T. XI. P. I. apud SPARTIANUM PESCENNII NIGRI editum exstat, quo milites jubentur, sua posca contenti esse.

(g) HUXHAM *fev.* p. 261.

(h) DEGNER *Bresl. Samlung. Supplem.* III. p. 238. In petechiis KRAMER *Comm.* nov. 1733. n. 32.

(i) MESUE multis syrupis admiscet de syrup. L. I.

(k) Lagenæ BOERHAAVE *Bresl. Saml. Supplem.* III. p. 240. Quatuor pintarum in ardente febre DEGNER *dysent.* Edit nov. p. 310.

(l) Van der GRÖBEN *Orient. Reisebeschreib.* p. 39.

(m) *Des Vapeurs* II. c. 5.

(n) *Oper.* T. II. p. 68.

tura est, tumores cutanei in orificio oesophagi nati, & caseosa in glandulis mesenterii materies coacta est (o).

Adfine aceti est serum lactis acidum, princeps Islandorum (p) potus, in tanta putrilagine reliqui victus perutilis. Diximus alios (q) solo lacte, ejusve sero utiliter vitam traxisse, etiam per quinquaginta annos (r).

§. XXVI. *Spiritus vini.*

Dubites num hoc, sive medicamentum, sive venenum, inter potus species oporteat referre. Neque tamen penitus id silentio præterire jubet frequentior, quam unquam fuerat, ejus ardentis aquæ usus: qui in septentrione, Russia, Suecia, Dania, Germania septentrionali, Belgio & Anglia apud plebem fere in familiarem & quotidianum potum evasit, & ab Europæis in universum orbem circumlatus, & Nigritarum, & Americanorum septentrionalium furor est. Sed etiam Sineses suum Arak per Indiam ultra Gangem vendunt. Neque Helvetia increbescentem *aqua cerasorum* potestatem effugit, neque gallicus miles absque spiritu vini ad pugnas dimittitur. Septentrionem tamen hæc cupido magis occupavit, in regionibus vini feracibus rarior.

Est autem spiritus vini, meracior pars vini, & ad volatilem naturam paratior, quæ subiecto igne per longos, & refrigeratos tubos stillat. Paratur ex vino, ex cerevisia, ex frumento fermentante, ex omni materia, quæ vinum dat, & cerevisiam, dum ab interno motu ferveat, ex ipso demum lacte, certe equino (a). Alcohol est minera plumbi (b); qua oculos pingunt. Nescio an a vi vocis perfectionem sonante ad hoc Arabum inventum nomen translatum sit.

Aqua (c) est, occulto acore (d), & plurimo phlogisto ebria, quod oleo vitrioli admisto de aqua secedit (d*). Adeo plena est natura inflammabili, ut ignem admissum totâ cum flamma capiat, & abs-

(o) BECK *palpit. cord.*

(p) HORREBOW. p. 156.

(q) p. 198. *Tartari Recueil. d'obs. curieuses.* p. 241.

(r) *Edimb. Eff.* T. V. P. 2. n. 44.

(a) GMELIN *Comm. Lit. Nov.* 1732. hebdom. 21. &c.

(b) SHAW *trav.* p. 294.

(c) BOYLE *Chym. scept.* P. II.

(d) Nam cum cinere clavellato non fervet. HENKEL *Bergsucht* p. 49.

(d*) HOFMAN *de acido vitrioli vinoso.*

que residuo deflagret, quoties meracius alcohol paratum est. In ea aqua vapor inebrians plurimus est, ut & minori quam vinum dosi temulentiam faciat, & vehementiorem, & facilius funestam. Ipse tristem casum vidi vigilis, qui studiosi funestissimæ voluptatis copiam fecerant ad arbitrium: is inter bibendum, & dum gratias agebat tantæ liberalitati, miserrime exspiravit (*e*). Ostendetur alias, in ipso ventriculo sponte in flammam erupisse.

Vehementissime calefacit; & sanguinem in cerebrum congregat. Brevem adeo alacritatem excitat, quam sopor & miserrimus corporis animique status sequitur.

Fibras animales ventriculi, intestinorum, demum omnes, ad contractionem incitat; & arctat, etiam experimento teste, ventriculum (*f*), & pylorum (*g*). Sed una fibras callosas reddit, & fragiles (*h*), & ad omnem porro stimulum furdas (*i*), etiam ad famem (*k*). Vasa omnia angustat. Bronchi inde ad tertiam partem angustiores (*l*) facti. Humores omnes (*m*) cogit præter aqueos, & injectus in venas animal enecat (*n*). Quare ab ejus usu tendines (*o*) osseos, & arterias osseas (*p*), & osseas crustas in pleuræ cellulosa tela (*q*) natas legimus. Ventriculus ab ejus abusu in crassitiem carnosam vertitur (*r*), ut perangustus (*s*) tubus liber supersit. Fæces alvinæ pene lapideæ in coli cellulis colli-

(*e*) Supra duo cochlearia potus Usquebaugh Baul, ex hordeo in insula LEWIS parati, bibere mors est MARTIN *Western Island*. p. 3. Mors intra duas horas, post singultum: a potu quartæ aquæ vitæ vulgaris in Anglicis novis. Mors a nimio spiritu vini OLEAR. *It. Persf.* p. 426. Mors subita in catella a frumenti spiritu SCHLICHTING l. c.

(*f*) In PECQUETO, celebri anatomico.

(*g*) SCHLICHTING ad VERBRUGGE p. 47. 48.

(*h*) In capillis experimentum fecit HALES *Ventilat.* II. p. 196. Add. ROBINSSON *Eff.* p. 311.

(*i*) BOERHAAV. *Chem.* II. p. 200.

(*k*) BEHRENS *dietet.* p. 394.

(*l*) *Medic. Exper.* p. 336.

(*m*) L. V. p. 82.

(*n*) L. III. p. 129.

(*o*) KULMUS *tend. achill rupt.*

(*p*) Ibid. PICOTE. *Ergo aq. vit. aq. mort.* Paris 1729. In sene spiritu vini abuteſſite, aorta offeis fibris varia BASS. *Dec. III. obs.* 4. Inde hepar peramplum, steatomaticum BADER *obs.* 28.

(*q*) ETMULLER *progr. ad dist.* SCHUSTER DAUBENTON *hist. gener. & particul.* III. p. 163.

(*r*) HOFMAN ad Poterium p. 46. LOESEKE *obs.* p. 36.

(*s*) SCHACHER *mater. offif.*

guntur (*t*), & scirrhi per universa viscera glandulasque regnant (*u*). Gangrænam alias in duodeno fecit (*w*). Conjuncta vi coagulante humores & fibras constringente inflammat idem ventriculum (*x*), intestina (*y*), etiam in mesenterio abscessus facit (*z*).

Sed demum in genus nervosum malum transit, & tremores, pâralyfes convulsiones ex eo abusu sequuntur (*a*).

Etiam bruta animalia partim in rabiem agit (*b*), parciore vero & diuturno usu in cane asthma fecit (*c*): in alio rachitidem staturamque infra legem sui generis depressit (*d*) quo scopo vulgo Bononiæ ajunt adhiberi, ut catellos nanos vendere possint. Sed etiam subito feles enecat (*e*).

Sæpe Göttingæ effectum perniciosæ consuetudinis observavi. Rauci fiunt homines, & peculiari asthma, plerumque funesto, laborant. Manus tremunt, corpusque languet, quamprimum vis præsentis veneni nervos non suscitatur, Ad omnia monita surdi coguntur novo igne se de stupore suo (*f*) excitare.

In Anglia viri boni publici amantes a multo spiritus frumenti vulgaris usu ipsam illam maximam orbis Metropolin quasi lento morbo tabescere, & baptismos annuos a 20000. ad 14000. reduci non sine dolore monent. Quare salutari consilio, legibus saluberrimis, pretium veneni auctum est, jubente GEORGIO II. qui & Hanoveræ ejus usum frenare paterno animo tentavit. In Anglia certe, postquam paulum de suo furore plebs remisit, ipsi mores, & valetudo civium in melius re-vertuntur.

(*t*) *Hist. de l'Acad.* 1706. n. 5. BEHRENS l. c. p. 394. l. c.

(*u*) *Hist. de l'Acad.* 1704. p. 23. 24. BEHRENS.

(*w*) ALBERTI *Jurisprud. Med. Leg.* T. VI. p. 715.

(*x*) HENRICI *abscess. mesent.*

(*y*) Ibid.

(*z*) Ibid.

(*a*) BOERHAAV. *morb. nervor.* p. 195.

(*b*) De fele PICOTE l. c.

(*c*) BIRCH T. III. p. 17.

(*d*) BIRCH.

(*e*) HOFMAN *Med. system.* T. II. p. 184.

(*f*) Hinc qui vel vini spiritum, vel cerasorum destillatum liquorem, quo erant abusi, subito obstinato animo deserunt, sæpe pereunt PLEMP. *valet. togator.* p. 76. de BAUDIO. Vidi tamen post diuturnum vitium subitam reformationem nulli fraudi fuisse præfecto, bene mihi noto.

Volunt equidem, in calidis regionibus, intus hominem frigere, & potus requirere calidissimos (g) Sed absque ejusmodi potabili igne aborigines insularum antillarum vixerunt; suosque coxerunt cibos.

Misera ergo fuit PECQUETI (h) fors, qui solo spiritu vini, tamquam quodam virium vegetabilium compendio, vitam alere adgressus est.

Cibos ipsos spiritus vini haftenus potest credi coquere, quod aliquam diu, in sano homine, ventriculi motum incitat, ejusque caveam arctat, ita aeris expansionem coercet, quam dicimus *status*. Cæterum omnes cibos indurat, cogitve, carnes & fructus contra omnem mutationem munit, lympham, jus carniū, lac coagulat, nullumque cibum resolvit, magnum incisorum in conservandis a putredine visceribus adminiculum. Merito adeo *Johannes Locke* (i) hominem male ad spirituosos potus adfuetum ad aquæ usum reduxit, & sapienti consilio sanavit.

Potus diæteticos, theam, virium ventriculi inimicam (k), cahveam, amaram oleoque (l) prægnantem minus hostili, chocolatam, plenam expresso oleo & nonnunquam ab adjectis aromatibus calidam; *limonatam aquam*, refrigerantem & acidam; emulsiones per æstivos calores gratas, ventriculo ob oleum suum noxias *punch Anglorum* (m) in quo vis spiritus ardentis ab acidis & ab aqua frangitur: tot alia ingeniosæ voluptatis inventa brevis in longo opere necessaria vetat persequi.

§. XXVII. *Mensura cibi & potus.*

Multa lego de ciborum salubritate, aut vicissim de eorum ad lædendam valetudinem potentia. Videor tamen dudum adnotasse, & in me ipso potissimum, & in aliis, plus justam mensuram ad integritatem vitæ, & ad cibi salubrem coctionem facere, quam ipsam selectum: & etiam deteriores cibos facile subigi, dum exigua eorum copia sit. Ita interpretor

(g) LIGON. *harbad.* p. 102.

(h) BOERHAAV. *prax. med.* I. p. 54. Etiam DIPPELII delirium fuit, hominem intra paucas septimanas calido spiritu saginare *Nov. Act. Erud. Suppl.* T. IV.

(i) In HARTSOEKER *suite des conject.*

(k) p. 242.

(l) WAINWRIGHT *of drink* p. 215. Duplum olei habet si cum tritico comparaveris.

(m) Ex ejus abusu colica pictonum insulis sacchariferis endemia CHEYNE *inf. sanit. tuend.* p. 83.

miram illam, alias a nobis enarratam corii, aliorumque durissimorum coctu alimentorum, in conservanda vita demonstratam potestatem (a).

Omitto nunc vastos nescio quorum hominum ventriculos, qui ad FROCLI & MAXIMINI modum viginti (b) & ultra cibi libras uno prandio in ventriculum inferferunt.

Sano homini cibi potusque summa mensura, & ad quam plerique periculose se dimitterent, ad sanctorianas illas octo libras adfurgit (c).

Proxima portio fuit G. RYE, qui septem libras unciasque quatuor (d): aut septem (e); & alias septem libras (f), aut quinque libras cum unciis octo (g) in diem absumsit. Deinde æstiva die libras 6. cum dimidia (h) hiberna quatuor (i) L. & quatuor cum semisse.

Cl. HOME quatuor libras cum unciis tribus (k) numerat: quod fere CAROLI II. prandium fuit, cujus corpus post pastum quatuor librarum cum semisse pondere augebatur (l). Eadem quatuor L. cum dimidia a G. CHEYNE admittuntur (m).

Potest autem multo parciori victu vita tolerari: Lactis in diem libra, tres (n) feminae, anivis r uina obrutæ, per 37. dies vitam sustentarunt, additque egregius medicus regius, duodecim in diem unciis lactis, cum aquæ hordei tribus libris, se certos homines aliquot mensibus aluisse (o).

Celebris ille ALOYSIUS CORNARO (p) viginti & sex unciis panis, ovorum, & farinosi cibi [minestra] vitam per plurimos annos produxit, neque absque labore, qui & in republica gerenda versaretur, & subinde ad agros metiendos, & designandas fossas se pateretur adhiberi.

(a) p. 182.

(b) Acadenses Sylvicolæ DIEREVILLE p. 155. conf. p. 123.

(c) *De alim.* L. II. p. 35.

(d) p. 254.

(e) p. 260.

(f) p. 256.

(g) p. 264.

(h) p. 285.

(i) Ibid.

(k) *Med. facts.* p. 343.

(l) BIRCH T. I. p. 393.

(m) *Sanit. infirm.* p. 95. 96.

(n) SOMIS *raggionament* p. 123.

(o) p. 124.

(p) *Della vita sobria.* p. 13.

Video equidem a multis strictius vitæ genus rejici (*q*). Certus sum tamen, propria per experimenta, hominem cum parco cibo, parce omnino carnoso, recte dormire, ad labores ingenii valere, bene appetere, vitæque muniis sufficere. Is idem CORNARUS, cum quadragesimo annō jam decrepitus sibi videretur, hac ipsa severissima diætā sanitatem integerrimam, & seculare senium adquisivit: idemque, cum semel duas uncias suo cibo addidisset, suæ licentiæ graves pœnas dedit, inque gravissimum morbum incidit. B. ROBINSON (*r*) paralyfin superavit, & ad rectam valetudinem rediit, potu tertia, cibo sexta parte diminuto. Salubritatem stipendiariorum Egranorum, quos Austriaci obsidebant, parcitati alimenterum castrensis medicus de MEISERY acceptam retulit.

Id intelligo, qui magnos corporis labores tolerare voluerit, aut pinguescere, ei plus deberi cibi. Avibus, quæ saginantur, quarta parte annonam augere (*s*) oportet. Video etiam, juventuti plus deberi alimoniam, senio minus. Animalia pleraque homine voraciora sunt. Eruca dantur & insecta, quæ intra unicum diem duplum sui ponderis devorant (*t*). Vacca (*u*) vorat in diem L. 46. sextam vel octavam partem sui ponderis. Homo quadragesimam. Nempe herbæ minus alunt.

§. XXVIII. Potus mensura seorsim considerata.

Magis in cibo, minus in potu peccatur, cujus major portio possit quasi infundi, quia ventriculo non retinetur.

Omitto helluones illos veteris ævi (*a*) aut 17. mensuras vini rhemani bibentem hominem (*b*), aut cerevisiæ bibacem feminam (*c*) quæ 20. L. in dies, jam 95. annos nata siccaverit. Sed certe absque ullo malo 200. (*d*) & 350, (*e*) uncias, & L. 25. [puto quadragintas

(*q*) PRIMIOS *vulg. error.* L. III. c. 3. CELSUS.

(*r*) *Food and discharg* p. 61.

(*s*) REAUMUR *art de faire éclore*, &c. T. II. p. 415.

(*t*) *Hist. Nat. des Anim.* T. I. p. 304.

(*u*) BOERHAAV *Prax.* I. p. 171.

(*a*) Mensurarum 4. f. pitarum 18. f. unciarum 288. vini in una cœna potarum meminit PLUTARCHUS de ALEXANDRO.

(*b*) FISCHER *morbi senil.* p. 66.

(*c*) LOTICH *obs.* L. IV. C. 1. *obs.* 2.

(*d*) Thermalium QUADRIO. *acque di trascorio* p. 63.

(*e*) Spadanarum HENR. ab HEERS p. 115.

uncias] aquarum mineralium aliqui bibunt (*f*). Alii, intra bihorium decem mensuras, librasve 20. (*g*) cerevisiæ *Duchstein* ficcarunt.

Et in universum varia quidem in variis potus ad cibum ratio est, ut tamen potus constanter superet. Plurimum bibebat SANCTORIUS (*b*), ut ratio ad cibum esset 10. a 3. Plurimum bibit C. LININGS, ut ratio sit ad cibum quæ 11. ad 3. Multo parcus B. ROBINSON & in ratione 5. ad 2. In ratione dupla G. CHEYNE (*i*), Parcius RYE (*k*), in ratione 4 - 3 : parcissime CORNARIUS, cui potus erat unciarum 14. ad cibi uncias duodecim, quæ ratio est 7. 6.

Non ideo nimis potus, etiam saluberrimus, non nocet. Ventriculum distendendo, & diluendo relaxat, appetitum destruit (*l*), aliquando etiam subito in cellulosas telas transiit, fecitque cachexias & (*m*) hydropes. Intemperans ille Babylonius Helluo tertia ab illa coena die periit (*n*).

§. XXIX. Cibi modus.

Laxissimus in eo fuit D. SALA, qui alibi quidem triginta sex unciis cibum diurnum definivit, cujus tertia pars esset carnum (*a*) : Alibi ad 50. & 60. uncias panis & similium victuum plenum extendit (*b*).

Triginta unciis aluntur, qui ad triremes damnati remum agitant, unciis nempe panis 26. fabarum vero 4 (*c*).

Georgius CHEYNE, sed in infirmis, non superat sesquilibram (*d*) CORNARIUS duodecim unciis sibi satis fecit (*e*).

(*f*) SCACCHI *Baln.* p. 390.

(*g*) LIEBERKUHN *vill. int.* n. 24.

(*h*) Conf. ROBINSON l. c. p. 35.

(*i*) l. c.

(*k*) ROBINSON.

(*l*) ZWINGER *de Thea Helvet.* p. 5.

(*m*) ZWINGER *ibid.*

(*n*) *Add. Journ. des Sav.* 1679. n. 12. post tridui abstinentiam.

(*a*) *De alim.* L. II. p. 36.

(*b*) p. 35.

(*c*) *Hamburg. Magaz.* T. XXI. p. 553.

(*d*) *Sanit. infirm.* p. 95. 96.

(*e*) l. c.

Tempora procul dubio præstat partiri, neque unico prandio vitam sustentare, ut in Anglia, inque septentrione ob negotiosam vitam solent. Præstat, inquam, partiri cibum, ut ad quemque pastum exigua sit ventriculi distentio, vires constringentes fortiores, major copia humorum humanorum (f).

Ante cibum recte jubet laborare BOERHAAVIUS (g), ut ventriculus evacuetur. Natura omnia animalia a pastu quiescere docuit.

Largius prandium esse convenit cœnam (h) parcam & excarnem: cum per somnum intestinorum & ventriculi motus peristalticus minor sit neque ad excernenda excrementa stimulemur, & tardius appetitus redeat, viresque adeo coquentes labascant. Hujus legis necessitatem in me ipso experiendo didici, & ad amicos transtuli, quorum neminem reperi, cui non utilitati summæ fuerit.

S E C T I O I V.

P H Æ N O M E N A V I V I V E N T R I C U L I.

§. I.

ET si difficile hic est legitimum ordinem sermoni præscribere, videtur tamen incipi debere a causis, quæ ad mutandum cibum potumque in vivo homine consentiunt; deinde enarrare mutationes, quæ in cibo in ventriculum recepto vera fide accidunt: denique dispiciendum quid ad eum effectum producendum quæque earum causarum conferat, quas descripserimus.

§. II. *Pressio diaphragmatis.*

Peritonæum, cujus historiam quidem nolumus (a) a mesenterio & ab omento separare, saccum efficit, in quo ventriculus, cum hepate, liene & intestinis plerisque concluditur. Is saccus ita plenus est, ita compressus, ut in vivo animale, quamprimum vulnus inflixisti, intestina, he-

(f) ROBINSON p. 94.

(g) & PANTINUS in CELS.

(h) MACKENZIE *art. of health.* p. 94.

(a) L. XX.

par, ventriculus, lien, & ipsi demum renes prorumpant, summa cum vi & celeritate. Cum vulnus esset in ulceroso pyloro, in id foramen hepar tanta vi est intrusum, ut totum obturaret (*b*).

Sed etiam absque vulnere, peritonæum totum (*c*) per inspirationem extrorsum antrorsum premitur. Quando ad instrumenta ejus compressio-
nis accuratius animus adtendit, adparet continuo, ea, quæ dixi viscera, erumpere per inspirationem (*d*). Magis autem hepatis pars anterior & ventriculus per vulnus urgetur, minus viscera, quæ tendineæ diaphragmatis parti posteriora subjacent (*e*).

Deinde accuratius considerata in ipsum ventriculum urgente septi transversæ actione, in animale, cui lobi hepatis ventriculum minus operiunt, vidi ipsum a septo transverso ventriculum deorsum urgeri, & una antrorsum (*f*), atque una concuti (*g*). Ea vero vis est prævalida (*h*) & cum in homine sedente, aut stante, e directo in ventriculum urgeat, tota utiliter infumitur, & una oesophagum urget & comprimit (*i*).

Ventriculum etiam a vi septi transversæ urgeri adparuit, cum de læso ventriculo bovis materia pultacea ad aliquot passuum distantiam projiceretur (*k*). Cum enim ea puls subinde & per intervalla profilierit, non fuit ventriculi contractio, quæ continua sit, & absque requiete. In humano vomitu potentem ejus septi vim alias dicemus (*k**).

§. III. Pressio musculorum abdominis.

Non repeto eorum musculorum historiam (*a*). Possis habere pro amplo cingulo, ex vertebrais orto, & anterieus peritonæo circumposito. Id cin-

(*b*) *Nov. lit. mar. balth.* 1704. p. 181.

(*c*) *Oper. min.* T. I. p. 294. *Exp.* 34. ubi lege *inspirationis* loco *expirationis*.

(*d*) *Oper. min.* T. I. p. 293. *Exp.* 32. p. 294. *Exp.* 33. 34. p. 295. *Exp.* 37. p. 296. *Exp.* 41. 44. p. 297. *Exp.* 50. 51. 52. *Add. obs.* 15. & *Elem. Physiol.* L. VIII. p. 84. BRUNNER *de pancr.* DRELINCOURT *canicid.* VII. SCHWARTZ *de vomitu* n. 89.

(*e*) L. VIII. p. 85.

(*f*) *Oper. min.* p. 494. *Exp.* 34. *Elem. Physiol.* L. VIII. p. 84. 85. DRELINCOURT *canic.* VII.

(*g*) *Oper. min.* p. 298. *Exp.* 54. 55. 56. *Elem. Phys.* L. VIII. p. 85.

(*h*) HAGUENOT *mém. de* 1713. p. 354.

(*i*) *Oper. min.* *Exp.* 56. 57. 58. 59. *Elem. Phys.* L. VIII. p. 87. SPROEGEL. *de venen.* p. 28.

(*k*) WEPFER ad PEYER *mericolog.* p. 275. 276. & FEUILLÉE *Suite du Journal* T. II. p. 30. in animale *Huanaco*.

(*k**) SCHULZ *de emesi* *Exp.* 2.

(*a*) *Elem. Phys.* L. VIII. *Sec.* L

gulum (b), dum agit, & brevius fit, omnia utique viscera abdomine contenta ad dorsum urget. Belgæ etiam artificiale cingulum ad juvandam digestionem abdomini circumponunt (c).

Nemo hic quidem dubitat, in vomitu tamen hæc actio etiam evidentior est. Tunc enim abdominis muscoli totum ventrem versus dorsum repellunt (d); hætenus septo transverso contrarii, quod eadem viscera antrorsum exprimit. Vis eadem perinsignis est, & potest hemisphæricum, quando ventriculus distentus est, abdomen in planitiem redigere, ut ejus capacitas ab 11. reducatur ad 6 : potest etiam ultra ad planitiem arctare, ut excavetur.

In nixu vis septi transversi & musculorum abdominis unitur. Eo in statu abdomen secundum omnes diametros minus fit : brevius quidem a descendente diaphragmate : angustius a dextris ad sinistra, & ab anterioribus ad posteriora, ab his ipsis abdominis musculis.

Ita pressio abdomine, necesse est omnia viscera eo contenta vehementissime comprimi, ut sanguinem in caput congregari videas : & quæ cava sunt in eo ventre receptacula, ea evacuari, ut de vesica, de intestinis ultimis, & de utero est notissimum. Quare & ventriculus urgetur quam vehementissime, & pleni stomachi arcus anterior ad posteriorem adigitur : ut necesse sit, si aliquod ostium apertum fuerit, inaniri ventriculum : Clauso utroque contenta quæcunque vehementer premi adparet. Nam vel in fetus capite in longitudinem educto, inque exitu calculorum per angustas urethræ femininæ vias, summum robur contractionis abdominalis percipimus.

§. IV. *Ventriculi vires contractiles.*

Primum ostendemus, ventriculum vi irritabili esse instructum.

Nempe ventriculus animalium calidorum, hominisque similium, caninum, felium, porcorum, extus penetrabili veneno tactus, ut spiritu vini (a), aut nitri, aut vitrioli oleo, aut antimonii butyro, in ea sede, quæ tangitur, contrahitur (b), fulcusque profundus nascitur, & rugæ (c), cibusque aliquando propellitur, ut a sede contracta fugiat

(b) Ibid. p. 70.

(c) ADOPHI *vincul. Chirurg.* p. 25.

(d) SCHWARZE n. 11. SCHULZE *de emesi Exp.* 2.

(a) SPROEGEL *Exp.* 26. p. 44. *Exp. nostr. de part. irrit.* n. 320.

(b) *Exp.* 327. BRUNING *de singultu Exp.* 7.

(c) *Exp.* 330.

(d). Minus tamen quam intestina ventriculus irritabilis est (e), hinc emetica fortiora necesse est purgantibus. A morte etiam majores ejus motus sunt (f), ut de intestinis novimus.

Deinde, cum quiesceret, nam plerumque in vivo animale quiescit, irritatus scalpello, aut radente acu, constringitur idem (g), inque motum cietur, qualem modo describemus, ut cibum propellat (h). Etiam a morte similia fiunt (i), ut aliis etiam ab irritatione locis constringatur (k).

Demum in vivis animalibus minime rarum est, ita arctari aut oesophagum (l), aut pylorum (m), ut nihil omnino de ventriculo effluere queat. Ea contractio etiam a morte superest. (n*) etiam resectus ventriculus nihil dimisit, cum se accurate constringeret, tum in pyloro (n), tum in oesophago (o). Idem in alio stomachi vulnere visum (p).

Ostendimus, ventriculum per totam longitudinem contractum fuisse (q), & in vivo (r) animale, & in nuper extincto (s), & in cadavere (t), & a venenis etiam vulgo (u) ita contractum reperiri.

(d) *Exp.* 307. FOELIX *de motu peristalt.* *Exp.* 6. ZIMMERMAN *de irritabil.* p. 47. 48. CALDAN. p. 329.

(e) SPROEGEL p. 44. *Exp.* 323.

(f) CALDAN p. 329. 335.

(g) *Exp.* 302. CALDAN. p. 329. WEPFER *de cicut.* p. 154.

(h) *Exp.* 297, 300.

(i) G. v. SWIETEN T. II. p. 235. Add. CALDAN. p. 329. In ventriculo diuturna irritabilitas superest LEVELING pag. 18.

(k) In femina PEYER apud WEPFER l. c. p. 287.

(l) *Oper. min.* *Exp.* 304. FOELIX *Exp.* 10.

(m) In cane SCHLICHTING ad VERBRUGGE p. 47. 48. in urso SCHRADER p. 16. in lepore *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 85. In Phoca HARTMAN *de eo anim.* page 8. In cane etiam WEPFER p. 222. 250. 195. in lupo p. 162. In puero MAUCHART *humbr. in duct. pancr.* In ascitico homine RICHARD *Epid. II* p. 149. In femina PEYER apud WEPFER p. 287.

(n) *Oper. min.* *Exp.* 297. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 85. A cobaldo HILLENFELD p. 63. a pulvere AILHAUD SCHAFONSKY *convuls. partur.* ad fin.

(n*) Ventriculus post longum morbum a morte contractus *Phil. Transf. vol. L. III.* HEUERMAN *physiol.* T. IV. p. 35. in homine omnia revomente BADER *obs.* 47. PRINGLE in lit. A scilla HILLENFELD p. 13. A colchico STORCK p. 23. Deinde a variis venenis contractus pylorus. A cucumeribus *mus. med.* I. n. 3. A pulvere scamnoneato D'AILHAUD SCHAFONSKY l. c. A cobaldo HILLENFELD p. 63.

(o) In mele ARNAULD de NOBLEVILLE P. III. 243. in cane WEPFER p. 195. 177. 250 in homine ab hydrophobia enecto *Journ. de med. Tom. III. n. 3.*

(p) WENKER *vuln. vent.*

(q) p. 122. 123.

(r) FANTON. *anat.* p. 162.

(s) WEPFER p. 179.

(t) In vituli ventriculo primo, & tertio CHARLETON *Enquir.* p. 43. In homine SCHRAEDER. SCHMIDT ad CÖTHEN. VALENTIN. *Chir. med.* p. 142. a vulnere oesophagi & asitia.

(u) HILDAN. *Cent. IV. obs.* 51. 79.

Ad eam vim irritabilem nervea natura aliquid confert. Nam opii usu (w) destruitur, & motus peristalticus nullus superest, plerumque certe, nam aliquando non totus deletur (x): & fætidis cibus plenus est ventriculus (x*). Operatur autem opium, dum in ventriculo continetur (y).

Sed etiam a nimia vi veneni, ut a mercurio sublimato, ut aliis in musculis ita in ventriculo, motus peristalticus deletur (z).

A ligatis nervis, ut in aliis musculis, videtur vis contractilis primo irritari, deinde destrui. Nam octavo pare ligato vomitus ex convulsione excitatus (a) est. Deinde a morte stomachus cibus plenus reperitur, & fætidissimis, ut in crasso intestino, fæcibus plenus (b). Et etiam absque vomitu ab opii usu ventriculus immobilis fæcibusque plenus visus (c) est.

Quare a plena morte, destructa nunc vi irritabili, aqua ventriculo injecta non expellitur, & ventriculum pressione sua dirumpit (d).

§. V. Mensura hujus contractionis.

Multum de ventriculi vi contractili disputatum est: & primum negatum a PITCARNII adversariis (a), omnino ita propria sua vi stomachum contrahi posse, ut inaniatur. Fibram enim circularem non posse ita contrahi, ut ad centrum accedat; sed ventriculi fibras omnes circulares esse.

Additum est, ex universali motus muscularis theoria, fibram non posse (b) plus tertia parte suæ longitudinis breviorē reddi, aut per $\frac{2}{11} = \frac{a}{b}$

(w) Oper. min. Exp. 321. 325. 326. SPROEGEL Exped. 21. 24. etiam a plumbi veneno HILLEFELD p. 57.

(x) Oper. min. Exp. 322. 329. SPROEGEL Exp. 16.

(x*) A plumbo HILLEFELD.

(y) G. v. SWIETEN T. I. p. 371.

(z) SPROEGEL p. 46.

(a) A BRUNN. lig. nerv. p. 39. 40. Comm. Acad. Bonon. T. III. p. 285. 286. 287. 289.

(b) BRUNN. p. 39.

(c) IDEM p. 43. add. MORGAGN. Ep. X. n. 37. VIEUSSENS tr. des liqueurs p. 271.

(d) LORRY Journ. de med. 1757. Janv. HALES hemastatiks. p. 178.

(a) Vide ASTRUC. Epist. de causa concoct. cibor. p. 33. &c. de la digest. p. 63. &c. & responsiones PITCARNII in præf. & BOERI in literis ad PITC. p. 256. ASTRUCIUS fibras habebat pro polygono infiniti latero, cujus vires constringentes sunt, ut sinus versiangulorum ejusdem polygoni, adeoque infinite parvi. Respondet III. SENAC Ess. de Phys. ed. nov. p. 12. fibram circularem, ut chordam tympano circumdatam, tamen aqua injecta breviorē fieri.

(b) L. XI. pr 472. 473.

ex qua mensura haberetur ratio areæ circuli cujusque ventriculi axin fecantis, cujus diameter est b , ante contractionem $= [bb]$ & 121 si b est 11: post contractionem vero $bb - aa = 81$. si a est iter contractionis, ut adeo in minima sua latitudine ventriculus retineat $\frac{2}{3}$ latitudinis

sua, a qua primum se contraxit (c). Ita, addit Cl. ASTRUC, potest integra libra cibi in ventriculo manere neque comprimi.

Sed hæc omnia nimia sunt, & ex hypothese sumta. Certum est enim, etiam ostia ventriculi posse ita arctari (e) ut nulla via, etiam vaporum patula, supersit.

Porro in medio ventriculo contractionem evidentissimam, & in homine, & in animale, ventriculum bipertientem sæpissime vidi (f), & alii (g) Clar. viri ante me viderunt, adeo constantem in nonnullis, ut in castore altera ventriculi cella fluidiorem cibum contineret, altera solidiorem (h), & in homine strictura ea plerumque post mortem immutata supersit (i). Ejusmodi summa ex contractione angustia ubique & in ventriculo vivi animalis (k), & a morte (l) visa est. Recte adeo dictum est, ventriculum ad omnem cibi parci copiam posse se adaptare (m), cum se ipse (n) inaniat.

Denique certum est, ventriculum integre evacuari, & sæpe inanem

(c) L. c. p. 68. SENEZ *Mém. de l'Acad.* 1715. p. 270. Ita fere *Elem. de physiologie* p. 219.

(e) De œsophago p. 261. de pyloro ibid.

(f) Ab irritatione veneni *Exp. nostr.* in *oper. min.* p. 303. tum in cadaveribus humanis ibid a spiritu vini DAUBENTON.

(g) SCHRADER *Dec. I. obs.* 8. WEPFER *de cicut.* p. 117. Prope pylorum LUDWIG *fem. cui ossa moll.* Conf. p. 122.

(h) *Act. Erud.* 1684. p. 361. p. 361. Add. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 52.

(i) Non crassior tenui intestino G. v. SWIETEN T. I. p. 37. Ventriculus valde contractus VATER *chordaps.* SALMUTH. l. 43. Versus pylorum in duos quasi divisus MORG. *sed & caus. morb.* p. II. p. 30.

(k) WEPFER p. 162. 177. 179. 221. 250. 253. &c. *Oper. min. Exp. nostr.* 298. 302. 305. Ad duos digitos SCHURIG p. 377. WALÆUS l. c. WEPFER p. 199.

(l) WEPFER p. 185.

(m) WALÆUS apud BARTH. *Ep.* II. p. 763.

(n) *Exp. nostr.* in *oper. min.* p. 307. 330. Proprio motu se evacuare jam LANC. *Physiol.* p. 77.

reperitum esse, & in homine (*o*) & in animalibus (*p*) quadrupedibus piscibus (*q*), avibus (*r*).

Video reponi, posse a septo transverso inaniri, & a musculis abdominis: neque repugno de fluidis ventriculi contentis, de massa, qua ventriculus valde plenus sit, de vomitu. Sed confusæ & nullam vel ad pylorum, vel ad œsophagum, directionem habenti pressioni eam inanitionem non credo tribui posse, cum etiam minima & gracilissima corpora certa lege, & ad solum intestinum converso itinere, de ventriculo exeant, & per pylorum amendantur.

Aciculas (*s*) volo, acus, spinas piscium, quas adeo frequenter & legimus & vidimus, in cæco intestino, inque recto, collectas, aut per vias vi factas in vesicam urinariam, inve adipem ano (*s**) circumpositum expulsas esse.

Uti adeo musculi in universum miris modis breviores redduntur, & super omnes mathematicorum calculos, ita ventriculus, & intestina, & vesica urinaria, & fellea, adeo fortis contractionis insitæ participes sunt, ut presente stimulo non desinant arctari, donec eum stimulum expulerint. Ita in calculis fit, & in ventriculo se inaniente: aut certe circa causam stimulantem, ut circa calculum vesica urinaria, ita circa pilam ventriculus se continuo contrahat, quoad eam undique amplectatur.

Vidi sæpiuscule ex vaccis excisas pilas (*t*), rotundissimas, vix triuncialis diametri, quas vix credas a tam vasto ventriculo potuisse tam exi-

(*o*) In homine WEPFER p. 173. & apud PEYER *Merycol.* p. 273. In Bironio Marchallo bihorio a pastu occiso RIOLAN *oper.* p. 609. In Cardinale BORROMÆO CARCANUS: & ipse vidi in homine fame enecto, inque cane, & fele, a coboldo, a fame, aliisque causis enectis. In testudine CALDESI p. 29. in glire FANTON. p. 162.

(*p*) In fele: in vitulo CHARLETON p. 43.

(*q*) In piscibus plerumque inanis est WEPFER apud PEYER *merycol.* p. 271.

(*r*) Nullæ in iis cibi reliquiæ. FLOYER *præternat. state of humours* p. 28.

(*s*) Duæ aciculæ de ano egestæ WIER *opera* p. 106. Acus major crinalis *a bodkin.* BIRCH. T. II. p. 372. In vaccæ, vasti animalis, ventriculo aciculæ pene detritæ PEYER *merycol.* p. 95.

(*s**) Sina piscis *Giorn. med.* P. ORTESCHI p. 174. 175. Acicularum & acuum, quæ devorata fuerant, per abdomen exierunt *mem. de Chirurg.* II. p. 388. per crus MOINICHEN obs. 21. CASTRO *morb. mul.*

(*t*) ALDROVAND *quadrup. bisulc.* p. 39. 40. LESSER p. 265. JACOBÆI *Mus* p. 7. 8. THORESBY *topog. of Leeds.* p. 433. BLANC. *Jaarregist.* I. C. V. n. 64. BUFFON T. IV. p. 537. VALISNER. *oper.* T. II. ANDERSON *Beschreibung von Gronland.* p. 37. SEMMEDO *Fascic.* CHARLETON *lithias.* p. 29. MORTON *Northamptonshir.* p. 450. SETTALA *Museo* p. 147. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 110. *Dec. II. ann. 1. n.* 17. PEYER *Merycol.* p. 103. DEUSING *bezoar.* p. 334. LEIGH. *natur. hist. of Lancash.* p. 47. 48 PLOT. *nat. hist. of Staff.* p. 263. t. 22. f. 14. FABER ad HERNANDEZ p. 635. *Bresl. Saml.* 1719.

guum

guum modulum (*u*) recipere, factas fere ex pilis lambendo deterfis, quibus mucus ventriculi crustam circumdederat (*w*). Res vulgò nota est, etiam in equo (*x*), asino (*y*), ove (*z*), cervo (*a*), porco (*b*), felle (*c*), cane (*c**), marsupiali (*d*); denique in homine (*e*).

Possunt etiam fibræ (*f*) lignæ cum pilis (*g*) misceri. In rupicapris stirpes fere & radiculae (*b*) plantarum capillacearum (*i*) sunt, quibus hieme aluntur, cum pilis. Etiam hæ pilæ exiguae sunt, nucis mole, ut eum ad modulum ventriculum se contraxisse necesse sit. Stramen (*i**), foliola muscus (*i***), cuspis teli (*i†*), fibula (*i††*), ligna, fructus, lapilli in ventriculi calculo nucleum efficiunt.

p. 740. *Act. Suec.* 1725. p. 100. GREW. *mus.* p. 33. LANCIS. *de peste bovill.* TYSON l. c. CARDAN. *subtil.* l. VII. p. 210. KERKRING *obs.* 84. BARTH. *Cent. II. hist.* 21. *Ess. of a Societ. at Edimb.* Ed. nov. T. II. p. 352. PIS. *Hist. Nat. Ind.* p. 327. KUNDMAN *Seltenh.* p. 175. PLANQUE *Bibl. T.* III. p. 543. 554. Ex pilis bubulis, in manu convolutis, similis facta pila BIRCH T. III. p. 436.

(*u*) In ove nucis mole HORREBOW *Descr. Island.* p. 136. Avellanæ in vacca CAMELLI *Phil. transf.* n. 305. In ventriculo secunde.

(*w*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. App.*

(*x*) *Phil. transf.* n. 282. JORDAN. *de peste* p. 588. BARTH. Ex sparto anglico PLOT *nat. hist. of Staffordshire* p. 261,

(*y*) PAULIN. *de asin.* p. 50.

(*z*) KLETT *de trichiast.* ANDERSON. *Grönl.* HASTFER p. 129. GREW *Hist. gener. & partic. T. V.* p. 55. BERTHOL.

(*a*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 159. *Dec. I. ann. 9. 10. obs.* 169. CAMELI *Phil. transf.* p. 305.

(*b*) *Bresl. Saml.* 1722, M, Octobr.

(*c*) PEYER *Merycol.* l. c.

(*c**) WEPFER *cicut. aquat.* p. 43. PEYER *merycol.* l. c.

(*d*) TYSON p. 28. oblongam figuram ventriculi imitatus.

(*e*) BLANC *Jaarregister.* C. I. n. 22. Ex filio devorato STALP. van der WIEL *Cent. I. obs.* 20.

(*f*) DUVERN. *posth. T. II.* p. 444. 445. VALISNER.

(*g*) ALTMAN *Eisgebürg.* p. 193. *Mém. de l'Acad.* 1710. p. 242. BUFFON T. IV. p. 469. SLARE *bezoar.* p. 40. SEBA *Thef.* T. II. p. 147. VALISN. III. p. 569.

(*h*) PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. App.* HARDER *apiar. obs.* 14. PARIS. in rupicapra C. B. *bezoar.* p. 67. 68. qui Doronicum non bene nominat.

(*i*) SCHEUCHZ. *It. alp.* IV. p. 186. *It. VI.* p. 448. Radiculæ VALISNER. III. p. 569.

(*i**) In bezoar occidentali SEBA *Thef.* II. p. 132. In orientali CA. a COSTA. In Simio SEBA p. 131

(*i***) In bezoar occidentali SEBA p. 132.

(*i†*) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs.* 115.

(*i††*) *Giorn. de Letter.* T. 32. p. 140. 141.

Sed etiam in homine (*k*) omnibusque fere animalibus, calculi in ventriculo gigantur, mole quidem varii, & in grandibus animalibus majore, ut in equo (*l*), tamen semper exigui, & quos ventriculus nunquam figurare potuerit, nisi vehementer contractus Viginti in uno equo fuerunt (*m*); & anserini ovi mole in tanto animale (*n*). Reperiuntur etiam similes in bove (*o*) etiam avellana non majores (*p*): in agno (*q*), in ove peruviana (*r*); in cervo golcondano (*s*); in ipso ibice, cujus calculi peculiariter bezoar vocantur (*t*), perexigui iidem (*u*), etiam ramulis circumnati (*w*); in simia (*x*), aliisque.

Calculos veros autem hic intelligo, non biliosa concrementa. Rotunda vero omnia sunt, quæ in ventriculo reperiuntur (*y*).

§. VI. *Vis contractionis ventriculi in avibus.*

In avibus ventriculus ex musculis potentissimis fit, & dubito, nunc ipsum cor, tanto in eodem animale mollius & tenuius, ejusmodi effectum edere aptum fit.

Vix merentur recenseri experimenta, in quibus vitri anguli detriti (*a*), & arenæ de vitro absterfæ (*b*), & nummorum æneorum facies convexa

(*k*) Vomitu egesti lapilli GREW *anat. plant.* p. 253. CONTULI *de lapid. podagr.* p. 59. SCHURIG *lithol.* p. 151. Prope pylorum repertus CONTULI.

(*l*) Librarum 20. PLANQUE ambitu 19. pollicum *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. II. p. 351. Librarum 28. *Lond. Magaz.* 1737. p. 396. Capitis mole MOCK. p. 136.

(*m*) PLANQUE T. II. p. 531.

(*n*) JORDAN. *de pestil.* p. 588.

(*o*) THORESBY p. 433. trium pollicum ambitu Id.

(*p*) In vacca *Phil. transf.* n. 305.

(*q*) BARTHOLIN. *Dan. Med. Dom.* p. 54.

(*r*) WAFER p. 200. nisi ii a bile virides fuerunt.

(*s*) Cum fibrillæ sint pro nucleo CAMEL. *Phtr.* n. 305.

(*t*) KÆMPFER *amæn.* p. 400. & olim GARC. ab ORTA. L. I. c. 45. CARDAN. *varietat.* p. 675.

(*u*) KÆMPFER *ibid.*

(*w*) *Gal. de Minerv.* I. p. 18.

(*x*) LABAT *Æthiop. Occid.* p. 178. CAMELLI *Phil. transf.* l. c. BONTIUS ad GARC ab ORTA c. 45. FRYER *travels* p. 212.

(*y*) HECQUET *de la tritur.* p. 115.

(*a*) In gallo calecutico STALPAART *obs.* 48. Cent. II. REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 294. WALDSCHMIDT *de ferment. ventr.* p. 16. HELMONT *calor effc. non d'gerit* n. 22. p. 163.

(*b*) REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 275.

folâ terendo levigata (c) ad papiri fere tenuitatem (d) extenuata, & expoliti calculi (e) leguntur.

Sed omnino anseres tubos vitreos (f) devoratos fregerunt, ut in incilia verterentur, & devorati ex avium more calculi in eos tubos fubirent: similisque vis est aut major gallorum indicorum de pavonum genere, in quorum ventriculo tam validi tubi rupti fuerunt, ut ab infistentis Academici pondere rumpi negerent (g). Idem animal nuces facillime in ventriculo frangit & digerit (h). Avellanas nuces gallus in fragmenta variæ magnitudinis comminuit (h*). Officula olivarum (i), avellanas, & pistacias a gallis indicis confringi olim BORELLUS viderat (k).

Guttas quidem, quæ vocantur, Batavicas (k*) caporum ventriculus non fregit, neque columbæ vitreas pilas (l), ut majorum avium vires majores sint.

Porro cum vitreas sphæras calecutici galli, & vulgares, & anates devorassent, omnino eæ de ventriculo evanuerunt, ut neque fragmenta in intestinis adparerent, indicio, minora fuisse quam arenæ granula (m): neque tamen stomachus læsus erat (n), cum vulgari gallo tanti tamen roboris sphæraulæ intrusæ fuissent, ut a duodecim libris elidi non possent (o). In minutissimum etiam pollinem detritas, lacteumque (p) humorem, cavas quidem sphæras intra paucas horas, denique tamen etiam solidas (q), magnum est roboris documentum.

(c) DUVERNEY *posth.* II. p. 451. In tardis PARISINI in struthione ILD. & WARREN *Phil. transf.* n. 394. In gallo pavone TEICHMEYER *Anthrop.* p. 141. Ad tritum etiam refert DUVERNEY T. II. p. 451.

(d) GEUDER. *de ferment.* p. 73.

(e) *Hist. de l'Acad.* 1754. p. 75.

(f) REAUMUR p. 277.

(g) ID. p. 275.

(h) p. 292.

(h*) Vide avem corvi similem PLUMIER in *Journ. de Trev.* quod non est ad manus.

(i) REAUMUR p. 293.

(k) *Mot. anim.* L. II. c. 16. *prop.* 191.

(k*) REDI *int. alle gozze &c.* p. 79.

(l) POZZI *Comment. Ep.* p. 76.

(m) *Mém. de* 1752. p. 272. 273. 274.

(n) ID. *ibid.*

(o) *Ibid.* p. 273.

(p) CIMENTINI p. CCLXVIII. CCLXIX. BORELL. *Prop.* 189. p. 355. *Prop.* 192. p. 398.

(q) REDI *Esperienze* p. 49. intra tres septimanas.

Denique tubos ferreos stanno obductos IDEM ILL. olim noster Collega & amicus paravit, & calecuticis gallis dedit devorandos (s) : reperit compressos mutataque figura, & curvatos, flexos in spiræ modum (t), disruptos denique tubos. Sic plumbeos globulos vacuos, ligneas pyramides, contusa omnia, & erosa (u) Vir ILL. memorat.

Cum ponderibus experiretur vim, quæ ad eos tubos elidendos & rumpendos requirebatur, alias $80 \frac{2}{3}$. libras, alias 286. aut 360. alias $437 \frac{1}{2}$. & denique $535 \frac{1}{2}$. libras requiri comperit (w).

Quare proxime ad verum accessit BORELLUS, quando potentiam ventriculi in gallo indico libris 534. (x) æstimavit, quod perinde avelanas frangat, ut homo quidem dentibus molaribus eas dirumpit : musculorum vero maxillas adducentium vires 534. lib. æstimaverat (y). Vir ILL. etsi ex errore operis posthumi in edito codice non 534. sed 5350. libr. scribantur, quæ in priori opere non sunt humanorum, sed caninorum aut leporinorum musculorum vires, quibus animalibus maxilla longior est (z).

Nescio an industriæ alicui aut NATURÆ providentiæ adscribi oportet, quod pleræque aves lapillos eligant devorandos; neque ausim pronunciare, ejusmodi lapillos ad ciborum meliorem digestionem requiri (a). Crederes, si vere solæ aves ejusmodi lapillos deglutirent, quæ carnosio musculo (b) ventriculi duros cibos adterunt, ut gallinaceus pullus (c), urogallus (d) avis Dronte (e), cygnus (f), anser (g), struthio (h),

(s) p. 279. 280.

(t) p. 281. 282. 283.

(u) BORELLUS p. 395.

(w) REAUMUR p. 284. 285. Hæc eadem experimenta excerpta habentur in *Journal des Savans* 1753. M. Jun.

(u) L. II. Prop. 191. p. 398.

(y) L. I. Prop. 88. p. 172.

(z) L. II. l. c.

(a) REAUMUR l. c. & IDEM *Art de faire éclore* II. p. 114. BORELL. l. c. Prop. 195. DUVERN. II. p. 450. HARVEI *de gener. anim. exerc.* VI. Asperos feligit RAI *Wisdom of God*. p. 130. LUDEEN. lithogr. p. 139.

(b) DUVERNEY l. c.

(c) Capo HIGHMOR p. 24. gallina HARDER *apiar. obs.* 16.

(d) Ad $3 \frac{3}{4}$ loth five dr. 15. HAHOW *Seltenb.* p. 272. BRUKMAN *Ep.* LVIII.

(e) BONTIUS L. IV. c. 17. p. 20.

(f) BARTHOLIN. *anat. cygni* p. 35. BORELL. Prop. 194.

(g) REAUMUR l. c.

(h) ÆLIAN. XIV. c. 6. *Hist. de l'Acad.* 1754. p. 75.

cognatum anseri animal, *Nhandu Guacu* (*i*), psittacus (*k*). Eas aves adeo sollicitas esse legimus, ne sibi in ventriculo non sint dura corpuscula, ut conchulas deglutiant, quando lapillorum raritas est (*l*).

Sed videtur repugnare, quod non aviculæ solæ insectivoræ & carnivoræ perinde lapillos deglutiant, ut hirundines (*n*), corvi (*o*) falcones, aquilæ (*p*), accipitres (*q*), ardeæ (*r*), onocrotali (*s*), & aves carnivoræ universæ (*t*), etsi id ab aliis negatur (*u*): sed etiam manifesto carnivora animalia, *Crocodylus* (*w*) *Lupus* (*x*), *Phoca* (*y*), *Phoca maximus* qui *Leo Marinus* (*z*). *Manis* (*a*), nisi in ejus alimento fallor, calculos devorent; tum animalia tenui & humani simili ventriculo prædita, cujus tritus non potest cum tritu ventriculi avium comparari, ut elephas (*b*), rupicapra (*c*), nam & ista lapillos habent in ventriculo: cum præterea struthio, casuarius, stulta animalia, ipsæque gallinæ carbones, ferramenta, globulos plumbeos (*e*), certæ sibi noxæ futuros, pari aviditate devorent. Sed neque lapides aut metalla coqui credam, aut alere, ut de struthione (*f*), de *Nhanduguacu*, americana struthioca-

(*i*) PISO *Hist. nat. utr. Ind.* p. 84.

(*k*) *Phil. transf.* n. 211.

(*l*) MARSIGLI *Danub.* VI. *misc. obs.* p. 11.

(*m*) PLIN. L. XI. p. 630. PEYER *Exerc.* p. 157. BARTHOL. *Epist.* XI. Cent. II p. 439.

(*o*) PEYER *exerc.* p. 188.

(*p*) HARVEY *gener. exerc.* VII. p. 21.

(*q*) HIGHMOR *disquis.* p. 29.

(*r*) PARIS. in scope Numidica.

(*s*) ALDROV *Omith.* L. III. p. 50.

(*t*) LISTER *hum.* p. 141.

(*u*) Nullos aut minimos insectivoræ DERHAM p. 200. 201. nullos DUVERN. l. c.

(*w*) *Journ. de Trevoux* 1705. Febr. p. 129. OEXMELIN *hist. des avant.* p. 102. (ad 50. l.) GUMILLA *hist. natur. de Peronoq.* T. III. p. 142. (ut corbes iis repleres). BORRICH *herm. aegypt. sapient.* p. 276.

(*x*) *J. de Trev.* l. c.

(*y*) *Phil. transf.* n. 469.

(*z*) *Voy. des terr. Afr.* II. p. 114.

(*a*) K. Sw. *Wetensk. handling* T. X. p. 267.

(*b*) MOULINS p. 18.

(*c*) ALTMAN *von Eisgebürgen* p. 190.

(*e*) Casuarius SAAR *Ostind. Reis.* p. 87. Calentes & nuper fusos struthio SHAW *travels* p. 453.

(*f*) ÆLIAN l. c.

meli specie (*g*), de cygno (*h*), & de crocodilo (*i*) referunt, qui in hac bestia etiam progressus gradusque destructionis lapidum dicunt se vidisse.

Contra ista certe observatum est capos, cum lapillos deglutirent, tamen fame enectos fuisse, & struthiocamelos adeo lapidibus non ali (*k*), ut ab eorum usu (*l*) etiam pereant (*m*) & a custodibus caveatur, ne quis hujusmodi scruta pretiosæ avi porrigat (*n*).

Quid ergo boni hi lapilli faciant? an vere melius digerant, quæ iis utuntur gallinæ (*o*), meliusque appetant (*p*): an non possint absque iis lapillis recte vivere (*q*), ego quidem nondum definio.

Ut ut autem de fine res se habeat, certe hi calculi cum cibis in ventriculo conteruntur, ut etiam in viva ave strepitum (*r*) exaudias, uti in misero puero exaudiebatur, quem dixi Bernæ ab ea servitute fuisse liberatum (*s*).

§. VII. In animalibus carnivoris & omnivoris.

Omnino negari nequit, insectis (*a*) quidem etiam polypis (*b*), alacrem satis in ventriculo motum peristalticum esse. In piscibus (*c*) frigidis obscurum video, a nemine, qui nunc mihi redeat in animum, observatum. Vivi in eorum ventriculo pisciculi supersunt, vivæque ranæ (*d*).

(*g*) PISO l. c.

(*h*) BORELL. p. 194.

(*i*) *Journal de Trev.* l. c.

(*k*) Non digerunt KOLBE III. p. 149.

(*l*) SCHOOK *ferment.* p. 380.

(*m*) A ferro & cupro PERRAULT. *Ess. de Phys.* ab æneo anulo *Mém. de l'Acad.* 1749. a nummis & lapidibus PARIS & RANBY *Phil. transf.* l. c. PECHLIN *de purg.* p. 71.

(*n*) PILARIN. *medic. difes.* JORDAN. *pest. phanom.*

(*o*) CIMENTINI p. CCLXVIII.

(*p*) BRADL. *farmers. direct.* p. 8.

(*q*) HIGHMOR.

(*r*) In falcone & aquila HARVEY *Exerc.* VII. in corvo BAYLE *corp. anim.* p. 347.

(*s*) p. 214.

(*a*) In hydrocantharo *Journ. des Sav.* 1696. p. 477. 478. in culice BAKER *microscope made easy.* p. 138. in pediculo ID. *ibid.* in Musca ID. *ibid.* in ape REAUMUR *Mém. pour servir à l'Hist. des insect.* T. V. p. 447.

(*b*) TREMBLEY p. 121. 122. 123. 124. 213.

(*c*) Ventriculus piscibus membranaceus est LISTER *conchyl. hivalo* p. 150. seqq. neque ullus in eo tritus. ID. *de hum.* p. 144.

(*d*) PLOT. *natur. hist. of Staffordsh.* p. 246. In blennio GISLER. *K. Svensk. Wetensk. handling* 1748. *Trim.* I. Anguillæ ab equis devoratae, de ano integræ erepunt, eoque remedio eorum animalium dura alvus solvitur. *Natural. hist.* VII. p. 101. Cæcilia a vipera devorata, integra de intestino exiit SEVERIN *viper. pyth.* p. 250. Eruca carnivora ex ventriculo egesta. *Hist. insect.* p. 51. &c.

Frigidis in quadrupedibus alias nullum vidi (*f*), alias tamen, certe ex stimulo, aliquem.

In animalibus quadrupedibus sæpe vix ullus adparet, ut etiam in vomitu pene quiescat in cane (*g*), cuniculo (*h*), ipso equo (*i*).

Ego non adeo infrequenter etiam perdebilem vidi in cane (*k*), fele (*l*), erinaceo (*m*), cuniculo (*n*); aliquando omnino nullum, in cane iterum (*o*), & in fele (*p*). Ita intelligitur, cur devorata in cane tessera levior quidem prodierit, absque tritu tamen, cum figuram cubicam conservaverit (*q*). Etiam in fano porco ventriculus crusta lapidea obductus visus est, in qua unice canalis digitum latus ab œsophago ad duodenum ducens liber superesset (*r*). Quare quadrupeda homine validiora, tum equi (*t*) fœnum pene integrum per annum egerunt, neque vis germinandi aboletur (*u*); & canes vel immutata ossa excernunt (*w*); vel emollita, non fracta, neque adtrita (*x*). Sed etiam in homine plurimis exemplis constitit, neque uvæ (*y*) quidem, etiam corinthiæ, aut ribis (*z*), aut vaccinii (*a*), aut belladonnæ (*b*), mollium baccarum, membranam a ven-

(*f*) In rana *Exper. nostr. de nat. irrit.* n. 318. 323. CALDAN. p. 329.

(*g*) SCHULZE *Exp.* 2. BAYLE apud SENAC *Ess. de phys.* p. 116. AINSLIE de vomitu idiopath. p. 15. SCHWARZ de vomitu n. 23. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4. observ.* 125.

(*h*) SCHWARZ n. 27.

(*i*) BERTIN. *Mém. de l'Acad.* 1746. p. 29.

(*k*) *Exp.* 302.

(*l*) Fele n. 319.

(*m*) Erinaceo n. 309. Cuniculo n. 327.

(*n*) Cane n. 328.

(*o*) Fele n. 296. 306.

(*p*) BIRCH T. IV. p. 304. *Hist. de l'Acad.* 1732. n. 3. *Comm. Noric.* 1731. p. 323.

(*r*) CHESELDEN p. 154. QUESNAI *Essays* T. III. p. 15. ARBUTHNOT T. I. p. 61. 189. & de boum ventriculo PEYER *rumin.* p. 120. 184.

(*t*) Etiam in elephanto KOLE T. III. p. 13. Equi Chrysanthemum segetum ferunt, aves viscum.

(*u*) POZZI l. c. p. 75. 76. Semen nasturtii illæsa vi germinandi de ano exivit REGIUS *app. ad scult. obs.* n. 1.

(*w*) WALÆUS apud BARTHOL. p. 764.

(*x*) MUFFET *health. improv.* c. 13. HARTSOEKER *extr. crit.* p. 11. KERKRING *obs.* 6. ASTRUC. p. 23. CHESELDEN *Id.* VI. p. 159. Add. *Bresl. Saml.* 1719. May. *Comm.* Nor. 1733. h. 25. GLISSON p. 272. De fructibus horæis ALBIN. *adnot.* L. II. c. 8.

(*y*) LINN. *ibid.* *Eph. Dec. II. ann. 1. obs.* 73.

(*a*) Ex vulpe LINN. *increment. tellur. habit.*

(*b*) *Journ. de Med.* 1759. Aug.

triculo frangi, aut cerasi, quæ quinto die integra alvo exierint (c). Ita demum grana avenæ (d) & pisa (e), in ventriculo germinasse dicuntur, ut vomitu rejectæ sint radiculae, culmi & folia, quæ in ventriculo sint nata, in quo per menses ea grana hæserant.

Corium credas exfugiri posse, cæterum non coqui. Nam post sex menses demum egestum (f) est, & lardi corium (g) per duos annos in ventriculo servatum; & intestina (h) per 14 annos circumgesta demum vomitu excreta: aliquando & caro (i) diutissime servata de ventriculo non subacta prodiit. Sed ne ipsi quidem canes corium digerunt (k).

Visus est etiam homo, cui ventriculus pene consumptus, & pene sola ostia & fundi pars integra superesset (l) in quo certe homine parum potuit a motu peristaltico sperari. De struthione etiam legimus, ventriculo ferramento transfixo supervixisse.

Ex his causis fieri potuerit, ut alii scriptores ventriculi in animalibus dentatis debilem motum peristalticum fecerint (m), neque supra tres uncias valentem (n). Alii omnino (o) ventriculi motum peristalticum rejecerunt.

Nimii tamen etiam in eo fuerunt. Nam is idem motus peristalticus, qui in animalibus iisdem aliquando adeo obscurus se quasi occultat, is alias manifestissimus est, ut in ranis (p) etiam a morte (q), potius major (r), adparuerit: tum in avibus (s) de quibus GLISSONIUS eum motum

(c) BINNINGER *Cent. IV. obs.* 65.

(d) *Journ. de Med.* 1761. Juill.

(e) BEHRENS *diatet.* post multos annos.

(f) HILD. *Cent. I. obs.* 3.

(g) ID. *Cent. IV. obs.* 33.

(h) BEHRENS *diatet.* p. 89.

(i) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 9. obs.* 82.

(k) VERCELL. *Sect. 2.* WEPFER.

(l) *Journ. de Med.* 1758. Mars.

(m) Le FRANÇOIS *reflex. crit.* p. 307. LIEUTAUD *Physiol.* p. 135. HELVET. *Mém. de* 1719. p. 341. ASTRUC. *Epist. citt.* p. 3. seqq.

(n) ASTRUC. l. c. p. 30. & c. p. 262.

(o) LANGGUTH in propria diss.

(p) CALDAN. p. 329. ROESEL p. 52. *Exper. nostr.* 314.

(q) CALDAN. *ibid.*

(r) ID. p. 335.

(s) Capone REAUMUR l. c. p. 295. pullis ovo exclusis *Exper. nostr.* 337. Ciconia *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs.* 97.

motum negabat (*s**), in illis certe avibus, in quibus strepitum volutatorum lapillorum HARVEJUS (*t*) exaudivit. Sed etiam tubos ferri stannati aliquos in milvi ventriculo REAUMURIUS comprimere vidit (*u*).

In quadrupedibus sæpe manifestissimum vidi, in cane (*w*), fele (*x*), mure (*y*), capella (*z*), cuniculo (*a*). Sed numerosa a GALENI tempore (*b*) sunt testimonia (*c*). Vidit eximius WEPFERUS motum ventriculi peristalticum in ruminantibus animalibus (*d*), & in carnivoris, ut in cane (*e*), fele (*f*), lupo (*g*). Ferramenta in boum ventriculo expoliri PEYERUS (*g**).

Neque huc quidquam aeris ad ventriculum admissi stimulus facit, cum per pectus & diaphragma in abdomine integro ventriculum moveri viderim (*h*): & vicissim ventriculus de corpore eductus perinde pergat contrahi (*i*) vomitumque vel solus faciat (*k*).

Denique etiam in homine idem in ventriculo motus non est absque suis incidiis. Expoliri lapillos a stultis devoratos legimus (*l*). Demum in feminæ vivæ ventriculo, qui per ulcus patebat, contractionem & concussionem Cl. Vir oculis suis usurpavit, unico exemplo (*m*).

Quare ut in edacibus & robustis hominibus crassus est ventriculus (*n*),

(*s**) In vivis avibus *ventric. & intest.* p. 129.

(*t*) *De gener.* p. 21. Strepitum collisorum in ventriculo calculorum a misero devoratorum auditu percepit Cl. BOISSIER *nosol.* II. P. 2. p. 137. eodem, ut puto, puero de quo scripsi.

(*u*) l. c. p. 466.

(*w*) *Exp.* 298. 299. 300. 301. 302. 307. 308. 330. 331. 332. SPROEGEL p. 44. etiam SCHULZ *Exp.* 1, FOELIX *Exp.* 6.

(*x*) *Exp.* 310. 315. 322. SPROEGEL p. 44.

(*y*) *Exper.* 313.

(*z*) *Exper.* 316 317.

(*a*) *Exper.* 312. FOELIX *Exp.* 3.

(*b*) *Facult. natur.* L. III. c. 4.

(*c*) ELFWING *de motu peristalt. vit.* p. 36.

(*d*) p. 89. *Meryc.* p. 270.

(*e*) p. 199. 221. 250. 251. 297. 203.

(*f*) p. 185.

(*g*) p. 162.

(*g**) *Meryc.* p. 95.

(*h*) ZIMMERMAN *Exp.* 47. 48.

(*i*) WEPFER p. 177. 179. 253. 297.

(*k*) p. 221.

(*l*) *Physiol. bat.* p. 80. puto ex ALBINO.

(*m*) WENKER *propr. diss. de vuln. ventric.*

(*n*) VIRIDET p. 226. 562. Non latior intestino a tenui diætâ COLLINS p. 364.

& angustus (o), ita in iis, quibus debilis est & tener, etiam digestio ciborum pari est debilitate (p): tum quibus peramplus est (q). In magnatibus sæpe papiri tenuitate (r) repertus est. A venenis alias distentus (r*), ob aerem in clauso sacco expansum; alias angustus & corrugatus (r**) adparuit.

§. V I I I *Nimii ne fiat.*

Quæ ita dicta velim, ut suas motui peristaltico partes servem, non ut faciant æqualem 12951 (s), aut 117088. libris (t) elevandis; neque ut conjunctas ejus cum diaphragmate & musculis abdominis vires æstimmem lib. 461. 219. (u) aut demum 260000. librarum (w). Quæ certe potentia non uvæ, aut avellanæ, sed solidæ crysalli in pollinem contererentur.

Nempe PITTCARNIUS comparabat ventriculi pondus cum pondere musculi pollicem flectentis, cumque vires musculorum poneret esse in ratione ponderum, effecit illas suas 12951. I. Sumfit autem ventriculi pondus octo unciarum (x); neque memor fuit, minimam partem ventriculi musculosam esse, & nerveam tunicam, atque villosam, adipem, glandulas, vasa, nihil ad vires contractiles facere (y).

In cane, cui inmissis aquæ libris 104. (z) ventriculus crepuit, vires

(o) ETMULLER *progr. in urso* SCHRADER p. 11. in *coati mundi K. Svenska Wetensk. handl.* 1747. p. 286.

(p) *Eph. Nat. Cur. Vol. IX. obs.* 108. PLATER *anat.* p. 150. In morbo chronico BECKER *obs.* 11. earum quæ cum *l. de submers. morte sine aqua* prodierunt. In calculoso homine valde distentus & absque tono fuit, cum vomitu & lienteria *Phil. transf.* n. 207. tum in hydropico PETERMAN *l. obs.* 4.

(q) *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs.* 150. Ventriculus amplissimus, cum tamen pylorus liber esset, ex insensibili ventriculi natura, ut videtur, LIEUTAUD *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 224. seqq. In cardialgia paralytica, ventriculus ne emeticum quidem sensit SAUVAGES *l. c.* A pulvere D'AILHAUD papiracea tenuitate ventriculus valde distentus SCHAFONSKY. A cicuta WEPFER *cicut.* p. 312. A sublimato mercurio p. 335. A nuce vomica HILLEFELD p. 4. A cucumeribus *Mus. Med.* *l. c.*

(r) SCHURIG.

(r*) MORGAGNUS *Sed. caus.* II. p. 14. *Lett.* al S. CURZIO p. 23. HILLEFELD p. 43. 44.

(r**) A viridi æris HILLEFELD p. 48. A cocculis p. 34. 37. a radice scillæ p. 13. a turpetho minerali p. 61. conf. p. 123.

(s) PITCARNE *de vi qua ventr. cib. conf.* p. 85. Ed. Bat.

(t) Etiam FRACASSINI *de hypoch.* p. 63.

(u) PITCARNE, FRACASSINI.

(w) WAINEWRIGTH p. 35.

(x) Siccus est drachmar. octodecim BARTHOL. *anat.* p. 73.

(y) Vide epicrisim ASTRUCHI p. 141. & de *Lue Vener.* p. 1042.

(z) HALES *hamastat.* p. 178.

aquæ ventriculorum prementis facias librarum 39. quibus ejus animalis ventriculus ægre resistit. Bobus a vapore elastico trifolii sæpe crepat (a), etiam ab aqua (b).

Homini, quam cani debilior est ventriculus, & vis minor, facileque ligatus & inflatus diffilit: & fibra ventriculi rumpitur, quando una septima parte elongatur, a morte certe, nam in vivo homine magis obsequitur (c). Carnosos vero avium ventriculos ne nominare quidem licet, in tanta diversitate fabricæ (d). Nihil durius iis fibris, neque crassius.

§. IX. *Motus peristalticus ventriculi in universum.*

Non facile est, in re instabili, neque in naturali statu conspicua. plenum quid & bono ordine tradere.

Et primum sæpe quiescit ventriculus, neque videtur motu peristaltico agitari, nisi quando a causa aliqua irritatur, cibo, veneno, aere.

Deinde in universum ventriculi contractio cum laxatione alterna est, ita ut in suo motu, modo hic constringatur (b), modo alibi: deinde ea pars quæ constricta fuit, laxetur (c) & intumescat. Et eæ alternæ vires sæpe repetuntur (d). Hinc etiam in rana (e), cui ventriculus longus est, figuram mutat perpetuo, & quasi articulis dividitur.

Adparuit porro in sede irritata constringi, & videtur laxari, quando stimulo se liberavit. Hinc præsentē stimulo diutissime & pertinaciter, etiam post mortem constrictus manet (f).

Laxatus ventriculus intumescit, puto ob aerem (g), & aliam materiam ventriculo contentam, quæ contrahenti se musculosæ tunicæ cedit, & paulo post, liberata a pressione, se ex suo ingenio expandit.

(a) PEYER *Meryc.* p. 114. LENTIL *Jatromnem* p. 422. 423. CHESELD. P. 160. de agnis add. p. 201.

(b) BERTIN. *Mém. de* 1746. p. 36.

(c) SAUVAGES *Physiol.* n. 60. Puto de homine loqui. Ventriculi rupti historia *Verhandel der Hollandz maatsch* VIII. P. 2. Post vomitus vehementes SCHAARSCHMID *relat. ann.* 1740. n. 44. CLOSSY.

(d) LISTER c. 17. & ASTRUC.

(b) WEPFER p. 87. 221. 199. 250. 154. 177. 162. 185. 297. *Journ. des Sav.* 1696. p. 477. FOELIX *Exp.* 10. 3. *Exper. nostr.* 298. 300. 305. 314. 315.

(c) WEPFER *icut. aquat.* p. 199. 221. 87. 185. 162. 177. REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 295. *Journ. l. c. Exper. nostr.* 298. 300. 314. 315.

(d) WEPFER p. 199. 177. 87. *Exper. nostr.* 314. 315.

(e) ROESEL *de ranis* p. 52.

(f) WEPFER p. 155. 162. a veneno *Exper. nostr.* 303. 304.

(g) *Exper. n.* 298.

Hinc a morte, irritabili natura destructa, ventriculus, qui angustus fuerat, nunc intumescit (*b*).

Qua sede ventriculus contrahitur, ea sulci (*i*), inter fibras nascuntur, ut eæ manifestius se efferant: fiuntque ob fibras longitudinem (*k*) frequentes etiam similes rugæ, & circulares aliæ, ob ejus ductus fibras (*l*).

Sic ventriculus modo angustior fit (*m*), modo brevior, adductis ostiis (*n*).

Constrictus, una crassiori fit carne (*n*^{*}), & tenuis quando distenditur (*o*), eoque in statu sanguis de vasis expellitur (*p*). Durus (*q*) etiam fit, dum contrahitur.

A morte similia fiunt (*r*). Etiam particulæ ventriculi dissecti confringuntur (*s*).

§. X. *Directio motus peristaltici. I. Deorsum s. ad duodecim.*

Dandum est equidem, in ventriculo aliquamdiu nullum certum esse finem, ad quem contractus ventriculus cibum pellat, eumque & deorsum agitari, & sursum (*a*), & peristaltico motu, & antiperistaltico, quem non bene aliqui scriptores rejecerunt (*b*). Necesse enim est, quoties utrumque ventriculi ostium clausum est, (*c*) toties etiam vel inertem ventriculum quiescere, vel motu alterno cibum agi & retroagi. Ea autem alterna volutatio durat, quamdiu oesophagus clausus resistit, vel pylorus con-

(*h*) WEPFER p. 141.

(*i*) WEPFER p. 198. 154. 185. 162. 297. FOELIX *Exper.* 3. *Exp. nost.* 330. Funiculos carneos undarum modo per superficiem ventriculi reptasse REAUMUR *Mémoir. de* 2752. p. 295.

(*k*) p. 198. 297. *Exp. nost.* 330.

(*l*) p. 199.

(*m*) WEPFER p. 199. 154. 87. 303. &c.

(*n*) SCHULZE *Exp.* I. WEPFER p. 87.

(*n*^{*}) WEPFER p. 250. 162. 154.

(*o*) IDEM. p. 250.

(*p*) HALES *hæmaph.* p. 181.

(*q*) WEPFER p. 162.

(*r*) WEPFER p. 185. &c.

(*s*) SCHULZE *Exp.* I.

(*a*) WEPFER p. 251. 87. CALDAN. p. 329.

(*b*) HAGUENOT *de ileo* p. 14.

(*c*) Senper, ut credit, inter digerendum clausus est DUVERNEY T. II. p. 184. non bene; sed conf. p. 136.

nivens cibum repellit: solvitur idem, quando vel œsophagus cedit, vel pylorus cibum nunc laxus dimittit.

Organa motus peristaltici sunt tum transversæ fibræ pro ordine diverso, quo constringuntur: tum fibræ obliquæ, quæ ab œsophago descendunt, & in ventriculi utrumque planum se dimittunt, utrumque ad œsophagum adducturæ. Ostia etiam adducunt, & claudunt, irritatæ fibræ sensiles, quæ sunt inter duo ostia ventriculi.

Nam & oculus in ipsis infectis eum motum confirmat, inque omnibus animalium classibus (*d*): & aqua intra ventriculum in spumam vertitur (*e*); & manifestum est, si unicus esset ductus, secundum quem ventriculus constringeretur, fore ut intra perexiguum tempus inaniretur, cum ejus in homine permodica sit longitudo, & longum illud intestinorum fyрма a cibis intra 24. horas percurratur.

Verum non perpetua est hæc *delectatio*; nam post aliquod tempus cibus de ventriculo totus exit, ut inanis reperiatur (*f*): ductus ergo ejus motus videtur esse ejusmodi, ut reciprocatio aliqua locum habeat, quamdiu aliqua in ostio pylori est difficultas, quæ cibum per pylorum prohibeat exire.

Ea difficultas non eadem est. Etiam in sano statu locum habet potissimum ea, quæ oritur a pylori anulo intus tumido (*g*), quem diximus, & hætenus angustato, ut crassi solidique cibi, quos adsumimus, eam angustiam superare non possint, absque adlifu: quales cibi sunt crustæ panis, fibrarum carnearum fasciculi folia vegetabilium, buccæ fructuum horæorum admorforum, & alia id genus. Massam lactis coactam a pyloro vidi in cane refutari.

Altera causa sæpe cum priori conjungitur. Ea est ab irritatione, quæ fibras carneas anuli pylorici constringi cogit, ut omnino via ad duodenum intercipiatur. Constringitur vero, ut ostendimus (*h*), potentissime, ut ventriculus tumidissimus (*i*) se inanire nequeat: Oritur eadem irritatio a priori causa quam modo diximus, quando duriores & grandiores ciborum globi transitori pylori, sensiles tunicas tangunt: potest & ab acrimonia oriri. Morbosas causas hic prætermittimus.

(*d*) TREMBLEY p. 121. 122. 123. 213. in polypo.

(*e*) FOELIX *Exp.* 9. 10. 11.

(*f*) p. 264.

(*g*) p. 135. 136.

(*h*) 261. 135.

Pylorum non a ventriculi distentione claudi, sed ob pylori clausuram ventriculum distendi credam. Certe a morte inflatus, nisi liges utrumque ostium, aerem etiam integer & irritabilis dimittit. Hinc ventriculi a veneno sumto irritati, & clausa habent accurate ostia, & sunt distentissimi (*k*). Ea venena aerem non generarunt, sed irritarunt ventriculum (*l*). Cum steatoma duodenum comprimeret duabus horis a pastu magna ventriculi inflammatio (*m*) successit.

In sano homine pylorus non clausus est & modicè connivet (*n*). In certis hominibus per ulcus abdominis, continuo chylus cibique decesserunt (*o*), etiam semicrudi. Ergo ventriculus contractione ab oesophago orta cibum deorsum, versus pylorum urget (*p*): vel etiam alio loco & circa medium contractus (*q*), per liberum nunc pylorum cibum in duodenum expellit, quoad totus inanis fit (*r*).

Solet in eo naturali motu gula clausa esse (*s*), quod ibi contrahens vis major sit, & ab oesophagi ostio incipiat.

Erigi quidem duodenum in animale, dum cibus exiit, vidit WEPFERUS: id fit in omni curvo canali, qui a perfluente humore dilatatur. Cæterum in homine exitus ciborum, per pylori in pleno ventriculo erectionem mutatur. Circa id ostium enim, tamquam circa immobilem sedem, mobilis curvatura major ventriculi arcum circuli describit, & antrorsum erigitur (*t*). Ita angulus; quem cum ventriculo vacuo pylorus adductus efficit, is nunc evanescit (*u*), & cibus absque plica, recto ductu, etiam descendente, per pylorum expellitur. In homine in dorsum decumbente, is exitus etiam pondere adjuvatur. Lego facilius inaniri, si in dextra decubueris, neque satis causam intelligo (*w*).

(*i*) p. 123. 274.

(*k*) WEPFER *cie.* p. 195. 250. 335. conf. p. 274.

(*m*) SCHENK *Exerc.* p. 590.

(*n*) WALÆUS p. 763. conf. p. nostr. 136.

(*o*) MORBIUS *inst.* p. 198. *Phil. transf.* n. 176.

(*p*) *Exper. nostr.* n. 297. 300. 330. WEPFER p. 87. 177. GREW *of gutt.* p. 25. CALDAN. p. 329.

(*q*) WEPFER p. 87. 177. PITT. *Phil. transf.* n. 213. CALDAN p. 329. GREW *of guts.* p. 25. FOELIX *Exper.* 3. *Exper. nostr.* 300. 307. In ape REAUMUR *Mém. sur l'hist. des insectes* T. V. p. 447.

(*r*) FOELIX l. c.

(*s*) WEPFER p. 177. SCHWARZ l. c. n. 13.

(*t*) p. 120.

(*u*) Ibid.

(*w*) DUVERNEY T. II. p. 183. ROSEN *anat.* p. 309.

§. XI. *Tempus quo ventriculus evacuatur.*

Non facile videtur, in tanta varietate ciborum, id tempus definire. Paucum fluidumque cibum celeriter per duodenum inaniri adparet: lente, si figuræ suæ tenax, si coctioni ineptus, si acris fuerit, ut pylorum irriter, sibi que ostium præcludat. Nummi aurei a VAILLANTIO deglutiti, post plusculos demum dies per ovum decesserunt (*a*). Denarius cupreus multo tempore vaporem venenatum in os remisit (*b*). De globulis plumbeis devoratis aliquis tertio die vomitu rejectus est (*b**). In capone intrusæ pilulæ post 12. & post 24. horas in ventriculo aliquæ superfuerunt (*c*). Mensibus integris & annis, caro male manducata (*d*), membranæ, intestina (*e*), coria (*f*), adeps (*g*), ostrea (*h*), pisium (*i*) incoctæ lactes (*k*), caseus (*l*), prunum (*m*), nuclei, pisa (*m**) in ventriculo hæserunt; aliquando & uvæ (*n*), cerasa (*o*), & aliæ baccae [*p*].

Iterum intelligitur, recte WALÆUM [*q*] olim docuisse, esse cibis suum, quo de ventriculo exeant, ordinem: neque coctum cibum eum expectare, qui crudus in ventriculo superest. Visa est panis particula in

(*a*) *N. de la Rep. des Lettr.* 1707. Mars SPON. *voyag. de Dalm.* L. I. p. 20. alius nummus post mensem prodiit KERKRING *obs.* 1. alius die 8. MURALT *Chirurg. Geschicht.* n. 94. alius post annum AMAT. L. II. c. 69.

(*b*) *Phil. transf.* n. 246.

(*b**) DILTHEY *obs.* 5.

(*c*) REDI *esper. intern. cos. natur.* p. 51.

(*d*) ALBRECHT *Eph. Dec. II. ann. 9. obs.* 82. Duobus mensibus RIEDLIN *millénar.* n. 829. Aliquot annis *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 18.

(*e*) BEHRENS *dietet.* p. 189.

(*f*) Sex mensibus HILD. I. *obs.* 31.

(*g*) Omenti frustum post 40 dies ALEX. BENED. L. XIX. c. 5. Tanto tardius cibus per anum exit, quo plus habet adipis. ALBIN. *Adnot.* L. II. c. 8. *Eph. Vol. X. obs.* 4. Decimo quarto mense egestus adeps TULP. L. III. c. 18. Post duos annos lardi corium HILDAN. *Cent. IV. obs.* 33.

(*h*) Dies 14. BEHRENS *ibid.* p. 251.

(*i*) Pisces die septimo VIRIDET *bon chyle* p. 601.

(*k*) Post 4. menses STORCH *schwangeré Frau. Krankh.* p. 241.

(*l*) Duobus annis SCHOK *ferment.* p. 382. 383.

(*m*) *Phil. transf.* n. 349.

(*m**) BEHRENS *dietet.*

(*n*) Novem septimanis Bresl. *Saml.* 1719. Mai.

(*o*) Cerasa biennio retenta *Comm. Nor.* 1733. *Hebd.* 25.

(*p*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. ob.* 73.

(*q*) *Conf.* p. 763.

ventriculo retenta fuisse, cum reliquis cibis ad lactea vasa exivisset (*r*), Addit Vir Cl. primam aquam etiam mineralem, & mites humores exire, quas tanta copia post horam de vesica reddamus; tum lac (*s*). Inde sensim olera sequi. Panem quarta demum hora (*t*). Tum pisces, demum carnes hora 5. 6. 7. (*u*); bubulam octava: aliquando caro ad sedecimam horam in ventriculo morata est (*w*). Hæc fere in canibus adnotata.

Etiam *Johannes VIRIDET* aquosis semi horam, horæis fructibus, carnibus & pani, horas a tertia ad quintam, durioribus ad septimam & octavam suum tempus fixit (*x*), puto in homine. In ulcere abdominis & intestini primum a semihora lac, tum coagulum exiit (*y*), & in simili malo, semihora elapsa serosi quid, tunc crassus Chylus; inde cibus, vix manducatus (*z*) per ulcus exiit. In alio exemplo, cum intestinum per latus ulcere pateret, cerevisia hora altera, horæi fructus & legumina binis horis, caro & panis non nimia copia suntus ad nonam horam; butyrum tardissime, etiam tertio die (*a*) exiit; quæ eadem ad idem exemplum summus vir *ALBINUS* adnotavit (*b*).

Altera hora in cane vasa lactea conspici solent (*c*), quando canis lacte nutritus inciditur (*d*), tertia si lacti panis accesserit (*e*); sexta demum, si panis fuerit secalinus (*f*).

Nunc hæc omnia, per morbum nata, veram naturæ consuetudinem repræsentare non adfirmo, sunt tamen certe ad ordinem utilia, quo cibi de ventriculo exeunt.

Experimenta in me ipso hætenus cepi, cum essem *κακωσωμαχος*, & a cibis, vel paulo tenacioribus, ructus sapore sui cibi inquinati subinde mihi adscenderent. Hora fere quarta a prandio, carniū, quas maligne co-

(*r*) *IDEM* p. 764.

(*s*) Cerevisia hora altera *Eph. Nat. Cur. Vol. X. l. c.* In ventriculo erat caseus, serum in duodeno *VIRIDET du bon chyle* p. 232.

(*t*) p. 764.

(*u*) *Ibid.*

(*w*) *Ibid.*

(*x*) *Prim coct.* p. 253.

(*y*) *Phil. transf.* n. 176.

(*z*) *MOEBIUS* l. c.

(*a*) *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs.* 4.

(*b*) *Adnot. L. II. c.* 8.

(*c*) *BILS* apud *ZAS. van den daaw der dieren* p. 89.

(*d*) *Ibid.*

(*e*) *Ibid.*

(*f*) *Ibid.*

quebam, fremitum & tumultum percipiebam; is paulatim conquiescebat, ut post frugale prandium sexta hora ventriculus inanis esset, purusque aer regurgitaret.

Celerius aliis hominibus ventriculum evacuari credas, ut BIRONIO [g], cui post bihorium inanis fuerit; ut mexicanis, quibus tertia a pastu hora animus fere delinquat [h]. Credas enim, non incerta conjectura, tunc appetitum redire, quando ventriculus inanis est. Ex eadem lege interdiu septima fere hora ventriculus inanis foret; per noctem tardius.

Fuit, sed vitiose, cui intra dimidiam horam de ano cibi exirent [i].

Equis, quibus parvus & robustus ventriculus est, cibi pene continuo ad intestina transeunt [k].

§. XII. *Motus antiperistalticus. Vomitus.*

Contraria directio, & a pyloro orsa atque versus œsophagum retro-gradam, quando is laxus est & apertus, erumpit in ructum, qui meri est aeris, vapore cibi inquinati; aut in regurgitationem aquæ gastricæ, aut cibi nonnunquam, acidi rancidive; in ruminationem porro, quæ cibi est iterata manducatio, & denique in vomitum, in quo ventriculus contenta sua omnia per gulam & os expellit. In sano homine, & temperante, horum omnium nihil fit: ructus tamen est frequentior [a], potissimum a cibis nonnullis aere plenioribus, etiam in bestiis [b].

Regurgitatio parciore, & unius alteriusve buccæ, satis frequens est; & in debilis ventriculi homine vix digestio absolvitur, quin aliquoties, etiam sæpe, sapor ciborum in ventriculo hærentium in os redeat. Sapores maligni, a cibis male coctis, ab ulceribus internis sæpissime in os redeunt [c].

Ruminationem dicemus. Vomitus totus morbosus est.

In eo malo vel ab ipso duodeno [d] motus ventriculi contractilis oritur: sequitur pylori constrictio [e], inde medii ventriculi, demum supremi.

[g] RIOLAN. p. 609. add. 264.

[h] GAGE in *Itiner.*

[i] PECHLIN *Lib. I. obs.* 53.

[k] BERTIN. *Mém. de l'Acad.* 1746 p. 28.

[a] Solum hominem ructare, non bene ÆMILIANUS *de ruminantib.* p. 50.

[b] In cervo ruminante WEPFER *Merycol.* p. 273.

[c] Vid. *Nov. Eph. Nat. Cur. Vol. I. obs.* 31. de sapore casei.

[d] WEPFER p. 250. 251.

[e] Nulla animalia vomunt, nisi quibus ventriculus inferne angustus est PLINIUS L. XI. p. 619.

donec ad ipsam gulam bolus progrediatur, & a ventriculo se contrahente, inque rugas plicato, sursum per os expellatur [*f*].

Alias principium contractionis in pyloro [*g*] est, quem in vomitu clausum esse ponimus : inde motus peristalticus versus œsophagum per totum ventriculum retroagitur, usque dum materia ventriculo contenta per gulam erumpat [*h*].

Etiam in medio ventriculo aut integro [*i*], aut de corpore exempto, nata est contractio, quæ ventriculum per œsophagum deplevit [*k*].

Hæc a fibris circularibus [*l*] fiunt, tantum mutato ordine : uti stimulus inferiori loco, quam superno, potentior fuit. Sed etiam alium motum in ventriculo vomentis animalis vidi, in quo pars anterior ad posteriorem accessit, succussu quodam, & cum quadam crepitatione [*m*]. Eundem motum Cl. WENKER in homine vidit [*n*], ut pars anterior ventriculi elevaretur, superior descenderet, & cibus cum impetu ejacularetur. Hoc genus motus tribuas fibris obliquis, ab œsophago in planum utrumque oblique descendentibus, quæ antè planum & posterius ad œsophagum adducunt [*o*].

Adeo vero ventriculo proprius est vomitus, ut a voluntate neque produci queat, neque inhiberi : & dissecto diaphragmate [*p*] aut abdomine [*q*], aut quiescente septo [*r*] aut in ventriculo exempto pariter continuetur.

Singultus, qui non longe a vomitu distat, fit a ventriculi potissimum irritatione [*t*] : & sequi visus est, cum extus in parte superiori vexaretur [*u*], aut inter labia vulneris abdominis contineretur.

[*f*] WEPFER p. 154. 250. 251.

[*g*] CREW *of guts* p. 25. SCHWARZ n. 12. 23. RUDBEK.

[*h*] RUDBEK *obs. post tr. de vas. serof.* n. 20.

[*i*] PITT *Phil. transf.* n. 343.

[*k*] WEPFER p. 253.

[*l*] Etiam in apibus REAUMUR *Mém. pour servir à l'hist. des Insectes* T. V. p. 447. HARDER *apiar.* p. 254. VIEUSSENS *traité des liqueurs* p. 253. LIEUTAUD *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 226. seq. Add. CALDAN. p. 329. WEPFER p. 87.

[*m*] *Exper. nostr.* 330. 331.

[*n*] Subita concussione.

[*o*] p. 127. 128.

[*p*] WEPFER p. 221. PERRAULT *mouv. perist.* p. 154. WEPFER p. 250.

[*q*] PERRAULT *ibid.* etiam de singultu.

[*r*] WEPFER p. 253.

[*t*] BRUNING *de singult.* *Exp.* 7.

[*u*] *Exper.* 6.

§. XIII. *Causæ vomendi.*

Nunc quidem huic idiopathico vomitui maxime cum natura convenit. Causa enim ejus pene semper est in ventriculo, & simplicissima, quidem in ventriculo nimis pleno, atque irritato: ex quo vel ructus, si flatu plenus fuerit, vel cibum expelli necesse est. Is vomitus est infantum, quibus minimus, & brevissimus, atque rotundus ventriculus pultibus & lacte obruitur. Est idem vomitus helluonum, quibus ventriculus vino onustus invertitur, quando id vinum in vappam ingrati saporis abiit. Eum vomitum Romani imitabantur, qui *emetica* agebant, tepida absorbta, quoties lautius se invitaverant, atque novas dapes stomachum volebant præparare.

Proxima causa, & pene eadem est, ventriculi in pyloro clausi: eaque causa fere perpetua est, in iis hominibus, qui multis vel diebus vel annis cibum revomunt; his enim ventriculus scirrhusus [*a**] cis pylorum contractus [*a***], ulcere apertus [*a†*], pylorus arctus, cartilagineus [*a*], obstructus [*b*]; fungus obstruens pylorum, laminatus, callosus [*c*]; cartilagineus idem [*c**]; schirrhus obsidens angustissimum pylorum [*d*] aut similis clausio pylori a tumore ulceroso [*e*]; aut glandulosum con-

[*a**] Pugni mole RUYSCH *obs.* 39. Similia habent SIMSON p. 149. BLAS *obs.* 9. P. IV. GLISSON *ventr. intest.* LEMERY 1702. *hist.* I. & in casuario PARISINI.

[*a***] MORGAGN. *Sed. & caus.* II. *Epist.* 30.

[*a†*] Id. ibid. p. 16. Oræ callosæ foramen claudebant.

[*a*] BARRERE p. *nouv. obs.* p. 153. 157. Callosus DIONIS *mort. sub.* p. 125. BARTHOL. *Cent. IV. hist.* 77.

[*b*] BARRERE p. 147. *nov. Ed.* Sebacea materie infarctus SCHENK *exerc.* p. 321. gypsea ZOD. *hist.* I. m. Febr.

[*c*] RENEAUME *quæst. med.* p. XV. *Journ. de Med.* 1756. Dec. Callosus pylorus MORGAGN. *Sed. caus.* II. p. 23.

[*c**] Ventriculus inflatus, pylorus cartilagineus, in eo glans plumbea BARRERE *nouv. obs.* p. 153. seqq. Pylorus crassissimus, cartilagineus, osseus, cum angusto aditu PETIT apud LATTERMAN *de vomitu.*

[*d*] FANTON. *Ep.* ad MANGET II. & *obs.* 14. add. HAEN *rat. med.* VI. p. 13. 14. DIONIS. p. 185.

[*e*] LANGGUTH *de tabe sicca lethali ex callosa pylori angustia.* STÖRK *ann. med.* I. p. 155. HASENÖHRL p. 60. *Journ. des Sav.* 1695 n. 30. Add. ARNAULD *des hern.* p. 252. BARTHOL. *Cent. IV. h.* 47. Pylorus parvus cum ulcusculo MORGAGN. *Sed. caus.* II. p. 426. Pylorus durus, crassus, parce apertus cum hepate steatomatoso STORCK II. p. 360. Pylorus plenus tuberculis duris & congestis Giorn. *Med.* P. ORTESCHI I. p. 213. aut tuberculis sensilibus WILLIS *Pharmac. Sect. II. c.* 1. Tumore ad pylorum circularis cum foramine rotundo, in hepatis ulcus communicante ORTESCHI p. 160. Ventriculus durus versus pylorum arctatus & putridus MORGAGN. *Sect. II. p.* 13. A pylori scirrhus vomitus tertia quartave die PERRAULT *de la sève* p. 227.

crementum in principio duodeni [*f*] : Scirrhus pylori [*g*] & membranæ ventriculi crassiores [*h*] : & cavitas minima [*i*] : aut pylorus, & duodeni & ventriculi pars crassa indurata [*k*] : aut tumidum pancreas [*l*] ; aut steatoma comprimens [*m*] : aut omentum [*n*] scirrhusum : aut tumores in cæco intestino bini, in quorum altero portio costæ ovillæ [*o*] : colive scirrhus [*p*] : aut volvulus intestini jejuni [*q*] aut cæci [*r*], aut coli [*r**] : aut ilei futura [*r***] aut injectum vinculum [*s*] : aut causæ mechanicæ intestinum obstruentes, ut glomer membranofus duorum pignorū mole [*t*], globuli aurei deglutiti, alicubi per intestina latentes [*u*].

[*f*] *Comm. Acad. Bonon.* T. II. P. I. p. 157.

[*g*] HARDER *apiar. obs.* 62. SALMUTH L. I. *obs.* 20.

[*h*] *Journ. de Med.* 1759. M. Nov. *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. II n. 25. Add. ROEDERER in *progr. Phil. transf.* n. 491. SCHMIEDEL *pericard. &c.* p. 21. 28.

[*i*] ROEDERER, FANTON ad MANGET p. 200. vix fabæ capax. *Phil. transf.* n. 491.

[*k*] *Journ de Méd.* 1757. m. Mars.

[*l*] DEIDIER *physiol.* p. 72. *de hum.* p. 60. MILITIA in *morbi historia* p. 74. BARRERE p. 51. 52. BORDEU *recherch. sur les glandes* p. 310. PANAROL. *Pentee.* n. 44. PETERMAN *Dec. II. obs.* 6. HAEN VI. p. 204.

[*m*] *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. III. n. 26. RONCALL. PAROLIN. p. 171. cum glandulis pylorum & œsophagum comprimentibus.

[*n*] HAEN *mir. morb. hist.* RONCALLI PAROL. *Europ. med.* p. 171.

[*o*] *Edimb. Eff.* T. I. p. 244. Ed. 4.

[*p*] HELD. II. n. 86.

[*q*] STORK *ann. Med.* I. p. 264. Volvulus cæci in colon suscepti JENTY II. p. 63.

[*r*] JENTY *cours. of anat.* II. p. 63.

[*r**] Ejus tumor, & contractio. Vomebat post triduum BOERHAAVE *Prax. med.* T. II. p. 224.

[*r***] *Phil. transf. Vol. XLIX.* P. I. p. 36. 37.

[*s*] SENAC. *Eff. de Phys.* p. 119.

[*t*] PUIATI *obs.* I. eo egesto sanatus.

[*u*] LOSS. *obs.* 12. L. 3. Vomitus perpetui a variis causis nati innumera exempla collegi præter priora. Et a pyloro quidem scirrhuso, calloso BADER *obs.* 17. 42 *Acta helvæt.* V. p. 179. 181. MORGAGN. *sed. caus.* II. p. 13. 23. *Bresl. Saml.* 1726. p. 604. add. MEIBON *de abcess.* A scirrhuso pancreatis CLOSSY *obs.* 2. MILITIA p. 74. BARTHOLETTI p. 268. Ab aliis scirrhis abdominalibus BADER *obs.* 19. RIDLEY, *obs.* p. 208. VALISNERI *oper.* T. III. p. 133. A pressione costæ TERNEL *pathol.* L. VI. c. 3. Ob ventriculū inflammatum, erosum VARI, SAUVAGES T. III. P. 2. p. 123. 124. WENKER *ventr. perforat.* BARON. *Mémoires des savans étrangers.* Ob intestina inflammata FABRIC. *scialograph. Butisb.* p. 71. aut incarcerata VOGEL *anmerk.* p. 148. 149. WHYTT *Ess. of a Societ. at Edim.* II. p. 336. Ob intestinum ultimum clausum SMELLIE T. III. 526. SAUVAGES *nosol.* T. III. P. 2. 124. Ob urinam retentam HEUERMAN *oper. chir.* II. p. 36. STÖRK *an.* II. p. 256. 257. PASTA *ad aphor.* n. 45. Ob aquam in cerebri ventriculos effusam, & calculos cornarii PRINGLE.

Ab his omnibus causis, quoties cibi in ventriculum aliqua copia descendit, ructus fœtidi (*w*), flatusve (*x*), & vomitus succedunt, etiam secunda hora (*y*) & quarta (*y*^{*}); alias demum die secundo (*z*), tertio (*z*^{*}), & quarto (*a*). In fele, ligatō intestino vomitus superveniebat, quando spatium inter ventriculum & vinculum (*b*) nunc fœcum plenum erat.

Alias in pyloro quidem & in toto itinere nullus perpetuus obex est, & ventriculus tamen invertitur a nimia irritatione, quam vehementissima constrictio sequitur, ut a venenis variis, & a medicamentis emeticis, ab inflammatione ventriculi (*c*^{*}); ab ejus ulcere (*c*), aut carcinomate (*d*), aut simili malo pylori (*d*^{*}): aut herpete (*e*): a calculis bilariis (*f*); aliisve (*g*): aut materia tartarescente (*h*): a bile, qua ventriculus repleatur (*i*): a cibo inconcocto (*k*), ut ab adipe coacto (*l*): a cibo quocunque vehementer displicente, fœtido, fordido, putrido (*m*), ab absurdis deglutitis, ut a clavo (*n*); aut a globulo plumbeo, quo percussus homini ventriculus (*o*): ab avena in a ventriculo germinante (*p*): a vermibus

(*w*) COLLINS p. 1151.

(*x*) Qui ranam se in ventriculo putabat habere, ei erat scirrhus in pyloro PORTIUS.

(*y*) DEIDIER *physiol.* p. 72. MORG. *sed. caus.* II. Ep. 30. (*y*^{*}) MORG. l. c. II. p. 23.

(*z*) BARRERE p. 160. (*z*^{*}) p. 284. not (*r*^{*}).

(*a*) ID. d. 147. seq. PERRAULT *de la seve* p. 227.

(*b*) SENAC l. c.

(*c*^{*}) MORGAGN. *sed. caus.* II. Epist. 30.

(*c*) HILD. *Cent.* III. *obs.* 20. COLLINS p. 338. SALMUTH I. *obs.* 43. DELIUS *amoen.* T. V. *Præf.* CHERLI *obs.* C. II. n. 37. BARRERE p. 160. *Nov. Litt. Mar. Balth.* 1704. p. 181.

(*d*) *Phil. trans.* n. 472.

(*d*^{*}) MORGAGN. l. c.

(*e*) PANAROL. *Pentec.* I. *obs.* 43.

(*f*) HAHN p. 32. BIRCH T. III. p. 315. HOFMAN *medic. conf.* T. II. Dec. II. c. 10. TACCON *adfect. hep.* CHEYNE *diseas.* p. 189.

(*g*) *Journ. des Sav.* 1690. GREW *anat. of plants* p. 253. ALEX. BENED. *Journ. de Trev.* KOENING in *lithogenes* p. 4. 5. 7.

(*h*) PANAROL *Pentec.* I. *obs.* 23.

(*i*) *Ess. of a Societ. at Edinib.* Ed. nov. II. p. 384.

(*k*) BERNER *de agro ruminante.* BENIVEN *abd. caus.* c. 36. Ab intestinis deglutitis BEHRENS *diet.* d. 189. ab ostræis ID. p. 251. ut die 14. revomerentur. A piscium copia nimia vomitus die septimo. VIRIDET *bon chyle* p. 601. A pedibus vitulinis die nono BINNINGER I. *obs.* 77. A corio porcino post 2. annos *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. ann. 2. p. 179.

(*l*) *Eph. Nat. Cur. Dec.* I. ann. 3. *obs.* 154. HOFMAN *de remed. magn. abus.*

(*m*) SOLORUM piscium MAZIN. *Med. mechan.* p. 65. Ab ovo putrido BELLIN. p. 28.

(*n*) *N. de la rep. des lettr.* 1688. p. 852.

(*o*) LOSS L. III. *obs.* 13.

(*p*) *N. de la rep. des lettr.* 1685. p. 995. A pisces retentis BEHRENS.

(*q*) : ab officulis fructuum horæorum (*r*) : a pilis retentis (*r*^{*}) : a putrida materie hepatis (*r*^{**}), aut mesenterii (*r*†), a materia nigra in ventriculum effluente (*s*) a nimio ventriculi sensu, post volvulum (*t*), & dysenteriam (*u*), post sumtum vitrum antimonii (*w*) : ab eodem eroso (*x*) : quo refero vomitus a vinculo nervi octavi pari injecto (*y*) : a nephritide (*y*^{*}) : & quo possis vomitum a tepida (*z*) referre, sensile ostium sinistrum, & gulam titillante.

Denique ab irritatione ventriculi mechanica, a trahente hernia (*a*) : a capite fetus ventriculum urgente (*a*^{*}) : a cartilagine xiphoide introrsum curvata (*b*) : a costa octava fracta (*c*) : a devoratis squamis percae (*d*) : a pluma devorata & in pyloro hærente (*e*) : ab inmissa excutia ventriculi (*f*), aut pilis equinis (*g*) : filove aspero (*h*) : chordave musica ænea (*i*) : aut spica fecalis (*i*^{*}).

Sed etiam subtiliores stimuli vomitum faciant, ut irritatio symphatica a

- (*q*) *Journ. de med.* 1758. Nov.
 (*r*) *Phil. transf.* n. 349.
 (*r*^{*}) BEHRENS *dictat.*
 (*r*^{**}) VIEUSSSENS *Obs. de med. pract.* p. 416. 412. ORTHESCHI *giorn.* I. p. 160.
 (*r*†) COETER p. 121.
 (*s*) SAND. *absces. ventric.*
 (*t*) MERY *Mém. de l'Acad.* 1701. p. 286.
 (*u*) LOESEKE *obs.* p. 37.
 (*w*) BLANC. *Jaarregist.* I. Cent. I. n. 71. Eo refero vomitum perpetuum jure pullorum sanatum MARCELLI DONATI *hist.* p. 312.
 (*x*) VALISNER. T. III. p. 133.
 (*y*) BRUN *disp.* p. 39. 40. *Comm. Bonon* T. III. p. 285. 286. 287. 289.
 (*y*^{*}) BRAKEN ad HARTLEY p. 5. STORK *ann.* II. p. 256. 257. POUTEAU p. 470. *Phil. transf.* n. 207. Singultus a crusta gypsea vesicæ urinariæ perpetuus RAULIN. *obs. de med.* p. 210.
 (*z*) Etiam in experimento WEPFERRI p. 250. 297.
 (*a*) HOFMAN *de vomitu* n. 38. VESAL p. 603.
 (*a*^{*}) BURTON *nev. system.* p. 150.
 (*b*) Ea restituta sanatus vomitus la MOTTE *obs.* 375.
 (*c*) SCHMIEDEL *de peric.* p. 21.
 (*d*) RICHTER *ichthyol.* p. 113.
 (*e*) PLANQUE *bibl.* T. III. p. 567.
 (*f*) BARTH. Cent. V. *Hist.* 26. PECHLIN. Cent. I. *obs.* 56. TRICHMEYER *de excut. ventr.* Est lamina spiralis, qua in ventriculum penicillus lanæ caprinæ introducitur.
 (*g*) BRUNING. *Exper.* 2.
 (*h*) ID. *Exper.* 4.
 (*i*) *Exper.* I.
 (*i*^{*}) K. *Swenska Acad. Handl.* 1759. p. 266.

vulnere cerebri; aut a spermate masculo in sanguinem recepto [*k*]: veneno gangrænofo [*l*]: & maligno miasmate, a quo miliares febres fiunt, & in quo vomitus fere mortem præcedi. Huc vapor putridus ventilatoris [*m*]: huc etiam venenum viperæ [*n*]: Oleum vitrioli in venas injectum [*o*]: Aer ille subtilis montium altiorum [*p*]; denu imaginatio rei indecoræ devorata. Hinc in tenero ventriculo ea sola retinebantur, quæ placebant [*q*]. Hinc cornix cornicis carnem ingestam revomit [*r*], & polypus polypum [*r**] aut plantas.

§. XIV. *Consensus diaphragmatis. Et musculorum abdominis.*

Qui Cl. Viri priori potissimum seculo in vivis animalibus incidendis diligentissimi fuerunt, ii, cum vomitum specularentur, sæpe viderunt ventriculum in ea violentissima actione [*a*] vix omnino moveri.

Porro *Franciscus* BAYLE (*b*) post propinatum emeticum digitum in ventriculum vivi animalis dedit, vixque motum percepit, & alibi adnotavit, aperto abdomine tolli vomitum, reddi confuto (*c*) Inde *Petrus* CHIRAC [*d*] exhibito emetico, vidit ventriculum vix, nisi debiliter, moveri, ut nullo modo ab imbecilli motu vomitus vehementissima symptomate expectares. Coram G. COLE [*e*] idem experimentum BACIACCUS, Genuens, repetiit, ut ventriculus pressioni externæ unice obediret. Eadem adnotationem nuperi Cl. Viri iteraverunt, ut in cane vivo irritatus ventriculus vomitum non faceret (*f*): inque vomente animale motus an-

(*k*) MAURICEAU p. 129. &c.

(*l*) DE FIEU *physiol.* p. 476.

(*m*) HALES *ventil.* II. p. 53.

(*n*) POUTEAU p. 155.

(*o*) BRUNNING *Exper.* 9.

(*p*) CAMPBELL *Voyag. a la mer. du sud.* p. 410.

(*q*) HALECES MERY *Mém.* 1701. p. 286.

(*r*) CHEYNE *infirm. valet. tuend.* p. 34.

(*r**) TREMBLEY p. 129.

(*a*) In cane WEPFER *de cicut.* p. 297.

(*b*) SENAC *Eff. de phys.* p. 116.

(*c*) *Corp. anim.* p. 348.

(*d*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 4. obs. 125.* inde apud TOURNEFORT *Hist. des plant. aut de Paris* Ed. 1700. in *præf.* & in *Hist. Acad. scient.* p. 116. atque apud H. HA-GUENOT *de Ile.* PURCELL. *of vapours* p. 47. sq.

(*e*) *De febr. intermitt.* p. 88.

(*f*) G. v. SWIETEN *Comment.* T. II. p. 153.

tiperistalticus lenis adpareret (*g*), aut fero certe superveniret (*h*): neque mea experimenta recedunt (*i*).

Proximum fuit, ut aliam causam vomitus viderent, siquidem ad eam violentiam ventriculus non sufficebat. In lupa ergo (*k*) ILL. WEPFERUS abdomen vehementer vidit contrahi, & tunc potissimum vomitum sequi, quando ea vis accedebat (*l*). Etiam diaphragmatis tensiones & relaxationes celerrime se insequi (*m*); & in cane concussionibus septi non quidem inertem ventriculum alternis succussionibus adjuvasse (*n*): demum diserte, quiescente fere ventriculo, diaphragma & musculos abdominis vomitus esse causas (*o*): quæ eadem P. CHIRACI fuit opinio & sequacium (*p*). Etiam in homine ex vomitu vehementissimo, cum convulsione nervorum mortuo, abdominis muscoli violenter contracti (*q*) visi sunt. Ita in nuperis exemplis Cl. SCHWATZIUS discissis quidem musculis abdominis, premente ventriculum manu, vomitum cieri [*s*]: cæterum in ea actione ventriculum a septo transverso costisque comprimmi [*t*], tum nudum ventriculum, tum per insidens hepar (*u*); laxari vero septi transversii appendices, quæ solebant œsophagum adstringere; & id ostium aperiri [*w*], idque fieri ab adductis costis, dum una descendens septum [*x*] ventriculum comprimit, & mire durefcit; atque

(*g*) AINSLIE *de vomitu idiopath.* p. 15. SCHULZE *de Emesi Exp.* 2.

(*h*) SCHWARZ n. 23.

(*i*) *Exper.* 304. 227. a sublimato argento vivo: *Exp.* 319. ab arsenico.

(*k*) p. 160. 161. 178. SCHWARZ n. 11. Stringitur inmissus in vulnus abdominis digitus de MAN. *de natur. human.* p. 21. 22.

(*l*) p. 161.

(*m*) p. 178. 250.

(*n*) p. 250.

(*o*) p. 297.

(*p*) Ad musculos abdominis vomitum refert PETIT *Mem. de Chir.* T. II. p. 100. DUVERNEY *Hist. de l'Acad.* 1700. p. 28. Ad diaphragma descendens solum PURCEL. Ad utrumque CHIRAC. du HAMEL p. 338.

(*q*) S. ANDRE *phil. transf.* n. 351.

(*s*) SCHWARZ n. 11. SCHULZE l. c. *Exp.* 3. 2. Adde de equo LAMORIERE *Mém. de* 1733. p. 515.

(*t*) n. 11. &c.

(*u*) p. 118. & PURCEL. l. c.

(*w*) SCHWARZ. n. 10. Laxari certe in vomitu & apertum esse SCHULZ. *Exp.* 2. Sed laxatur etiam in vomentis ventriculo exciso WEPFER p. 221.

(*x*) SCHWARZ n. 9. 10. SCHULZE *Exp.* 2.

brevi

brevius (*y*), & concutitur, donec succedat vomitus (*z*). Etiam contractis cruribus diaphragmatis, in ventriculo vomitus successit (*a*). Unam musculi abdominis ad interiora accedunt, & ventriculum comprimunt (*b*). Quare in remissione ab inspiratione vomitus fit, non proprie in expiratione (*c*).

Difficulus sæpe vomitus sequitur, ob gulæ ostium vehementer clausum (*d*).

Nunc si vomenti homini adstiteris, facile videbis, partitas ventriculi & instrumenti respirationis vices esse. In ventriculo enim fomēs mali est, inde nausea, anxietas, sensus tristis, ad deliquium accedens animi, vires resolvens, cum pallore faciei pulsuque parvo & debili (*e*), omnino in ventriculo, & in nervis a ventriculo in consensum actis suam sedem habent.

Deinde, insurgente nunc organo respiratorio, nixum videas, cum omnibus suis signis, inspiratione (*f*) vehemente: sanguine in caput congesto (*g*), dolore capitis (*h*), livida facie, calore frontis, ruptisque non raro vasis, vinctisque venarum (*i*), sudore tamquam in maximo labore fluente. Ut non alio remedio Angli frequentius ad omne languoris genus, & ad solvendas abdominis obstructions utantur (*k*). Sed etiam effectus vomitus majores sunt, quam quos ventriculo tribuas. Ruptus est inde oesophagus (*l*): ventriculus per foramen septi transversi in thoracem adactus.

(*y*) SCHWARZ n. 9.

(*z*) SCHULZ *Exp.* 2. SCHWARZ n. 9. 10.

(*a*) ID. *Exp.* 3.

(*b*) SCHULZE *Exp.* 2.

(*c*) VIEUSSENS *tr. des liqueurs* p. 263. ut DEIDIER *anat. rais.* p. 344. LIEUTAUD l. c. p. 230.

(*d*) SCHWARZE n. 11. SCHULZE *Exp.* 1. add. WEPFER p. 177. 195. 250.

(*e*) ROBINSON *food and. discharg.* & in *effect. of medicines*.

(*f*) Venam cavam stringi, & sanguinem stagnare SCHWARZ n. 15.

(*g*) G. v. SWIETEN T. III. p. 266. Rubri oculi ID. I. p. 185.

(*h*) SYLVA p. 146. 147.

(*i*) WOODWARD *cases* p. 22.

(*k*) ROBINSON *of food and. discharg.* p. 115.

(*l*) BOERHAAVE *morb. atrox.* I.

Sed etiam inter argumenta causæ potest referri, quod animalia robustis organis respirationis destituta, eadem vomere, nequeant (*m*).

Evidentissimum ergo videtur, vomitus quidem causam esse in ventriculo, eumque in contractionem niti propriis viribus, atque aliquando vomitum perficere (*m*^{*}). Plerumque tamen (*n*) irritationem in ventriculo natam, & sensum summæ anxietatis (*o*), quæ vomitum præcedunt, facere ut ad lavandam ægrimoniam vires diaphragmatis & musculorum abdominis excitatæ, atque molestiam de homine amolituræ, vomitum perficiant. Unde neque a sola voluntate in plerisque certe mortalibus vomitus fieri potest, neque a sola absque voluntate natura.

Quare recte conjunctas vires ventriculi & organorum respirationis Cl. Viri fecerunt (*p*). Et videtur diaphragma & abdomen plus virium habere, quando ventriculus aut cibus repletus est, aut clausis ostiis distentus: Tunc enim magis ad perpendiculum proximum ventriculum comprimunt, & tota contingunt.

Qui has vires a vomitu faciendo removent (*q*), atque negant, earum actionem in vomendo percipi (*r*) non videntur symptomata vomitus omnia esse contemplati.

Qui ventriculi negarunt (*s*) aliquas esse in vomendo partes, eos oportebat memores (*t*) esse experimentorum WEPFERI, & simplicissimi argumenti, vomitum nempe omnem voluntarium futurum, si a solis viribus respirationis fieretur.

Nunc quidem in avibus & piscibus utique vomitus a voluntate pendet.

Aves cibo de ingluvie regurgitante (*u*) pullos suos alunt, & eæ imprimis, quæ sunt carnivoræ, & tenui atque membranaceo ventriculo, vomunt facillime (*w*). Aluco (*x*) major mures deglutit, & semicoctos re-

(*m*) p. 291.

(*m*^{*}) Cum ventriculus totus peritonæo adnatus esset, ut contrahi non posset, nullus vomitus de HAEN *rat. med.* VI. p. 15.

(*n*) p. 289. & de cane SCHWARZ n. 14.

(*o*) BARRERE p. 157. &c.

(*p*) SCHWARZ n. 12. De MAN *de natur* n. 21. 22.

(*q*) LIEUTAUD n. 226. VIEUSSSENS l. c. SCHELHAMMER *analec.*

(*r*) p. 229.

(*s*) BAYLE, CHYRACUS, PURCEL. *of vap.* p. 47.

(*t*) Conf. MORGENBESSER *de vomitu* p. 50.

(*u*) HARVEI *gener. anim.* p. 21. DUVERNEY II. p. 449. CHARLETON *of nutrit.* p. 36. Colubæ pisa emolita pullis reddunt VIRIDET *bon chyle* p. 75.

(*w*) MORTON *Natur. Hist. of Northamptonsh.* p. 355. REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 463.

(*x*) RSASCZYŃSKI II. p. 355.

vomit, & aves rapaces vulgo pilulas (*y*) rejiciunt, ex ossibus & fordibus deglutitis factis. Demum ex granivoris, anseres bassani cibos pro lubitu revomunt (*z*). Sed & Psittacus utcunque ruminat, & regurgitantem cibum secundo deglutit (*a*). Urogallus betulæ fructibus ingluviem replet, iisque per hiemem eructatis famem solatur (*b*); eosque lente & commode digerit.

Piscium idem est privilegium: nam aselli (*c*) [Morue] revoluti ventriculo, quæ displicent, possunt revomere, ut etiam hamo deglutito se liberent (*d*). Sic etiam lucius (*e*) piscis deglutitos bufones revomit. Qui pisces testaceis vivunt, ii, quando nunc apertæ hospes animal dimiserunt, testas inutiles evomunt (*f*). Demum etiam vespæ cibo de ore reddito pullos alunt (*g*). Neque polypo alia via est, qua ventriculum inaniat (*h*).

Inter quadrupeda canes & feles facillime vomunt (*i*), ut etiam ideo venenis melius resistent: & canem catulum suum de suo ex ventriculo regesto cibo aluisse HARVEIUS auctor exstat (*k*).

Alia animalia, & potissimum boves & equi (*l*), non vomunt; illi, qui facillime ruminant, non vomunt ob musculos obliquos abdominis latissime discedentes (*m*), hinc minorem ventriculi compressionem: hi, ut creditur, & ob œsophagi angustiam (*n*) & gulæ obliquam inflectionem, quæ ureteris ingressui sit similis, & per quam pressio etiam ventriculo aqua non exeat (*o*): & ob musculorum abdominis atque diaphragmatis debili-

(*y*) *Hist. des anim.* III. p. 351.

(*z*) GREW *mus.* p. 11.

(*a*) PERRAULT, *Ess.* T. III. p. 213.

(*b*) OLAUS M.

(*c*) DENIS. *Amer. septentr.* T. I. p. 32. ZORGDRAGER p. 452.

(*d*) ANDERSON *Grönland.* p. 90.

(*e*) *Hist. natur. des Poiss.* T. II. P. I. p. 279.

(*f*) *Nouv. obs. sur l'ostreol.* p. 23.

(*g*) REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1715. p. 257.

(*h*) *Phil. transf.* n. 469. BAKER p. 107. 108. TREMBLEY p. 116.

(*i*) SEVERIN. *vip. pyth.* p. 466.

(*k*) L. c.

(*l*) SOLEYSEL. *Mém. des savans étrang.* T. III. p. 416. 417. LAMORIERE l. c. BERTIN *Mém. de 1746.* p. 44. seqq.

(*m*) SAUVAG. *malad. des bœufs* p. 20.

(*n*) BERTIN. *Mém. de 1746.* p. 48.

(*o*) BERTIN. l. c.

tatem (*p*). Ne vino quidem emetico (*q*) equi ad vomitum cogi queunt, etsi alii Cl. viri volunt, cum tussi tamen equos vomere (*r*). Verum experimenta nuper Lugduni in schola hippiatrica facta utique Bertiniana illa placita confirmant.

Homo non potest voluntate sua vomitum ciere sed irritatione eget. Legimus equidem exempla aliqua (*s*), etiam bibonis melitenfis, qui varie colorato vino, ad imperium adstantium, scyphos de ore suo replet: sed id forte fuit fraudis genus (*t*).

Id facilius dederim, homines esse, quibus facile cibi regurgitent (*u*), ut sapore integro, & incorrupto in os redeant, & non absque aliqua voluptate ruminari (*w*) possint. Sunt etiam, qui cum cibos non manducarent, altera die in os regurgitantes coguntur (*x*) ruminare. Et sunt alioquin, qui omnia facillime revomunt (*y*).

§. XV. *Ruminatio.*

Possis urogallorum morem huc referre, qui receptos in ingluviem betulae fructus hieme eructant, iisdemque aluntur; ut nuper diximus. Vera tamen ruminatio est in animalibus cornigeris, quibus quatuor sunt ventriculi. His oesophagus quidem in primum (*a*) ventriculum aperitur, cibumque in eum & secundum (*b*) dimittit, qui prioris est quaedam quasi appendix (*c*).

(*p*) LAMORIERE *Mém. de l'Acad.* 1735. p. 515.

(*q*) IDEM *ibid.*

(*r*) DELIUS *Fränk Anmerk.* I. p. 472. 473. II. p. 14. V. p. 64. 65. 66.

(*s*) BORELL. *Cent. II. obs.* 8.

(*t*) BARTOL. *Hist.* 39. *Cent. I.* BINNINGER. SANDRIS. *de ventr.* p. 299. *Munit. fund. plemp.* p. 202. & POWER p. 75. seqq.

(*u*) SALMUTH l. n. 90. H. v. HEERS *obs.* p. 250. WELSCH *epifagm. obs.* 37. FABRIC. *de gula* p. 136. RHOD *Cent. II. obs.* 59. *Phil. transf.* n. 193. BARTHOL. *Cent. V. Hist.* 16. KEYPER in BLANC. *Jaarreg. Cent V.* n. 38. PEYER *Mérycol.* p. 70. 71. & 122.

(*w*) *Phil. transf.* n. 193. KEYPER & priores, ut WEPFER in *mérycol.* PEYER p. 274.

(*x*) BERNER *de agro ruminante ob dentium defectum.*

(*y*) HEERS p. 250. *Journ. de Med.* 1756. Decemb. CARDAN. *variet.* p. 295.

(*a*) DUVERNEY *posthum.* p. 439. PEYER *mérycol.* p. 129. 130.

(*b*) PEYER p. 124.

(*c*) FABRIC. *variet. ventr.* p. 122. BUFFON T. IV. p. 461. 485.

Sed ab eo altero ventriculo perangustum est iter ad tertium (*d*), & eminentia quadam alterius ventriculi obstruitur [*e*]. Quare ex iisdem causis [*f*], fluida pars quidem iter suum urget. Cum vero id, quod siccum est, exitum reperiatur difficilem, cibus forti vi ventriculi primi, insigniter musculosi [*g*], aque secundi similibus viribus [*h*], per œsophagum expellitur, inque os redit, quasi naturali vomitu [*i*]. In ore secundo manducatur, & iterum deglutitur, inque primum & secundum ventriculum redit, in utroque macerandus. Et secundo eructatur, atque iterum tertia vice deglutitur quartaque: & quantum sufficit, in humore multo (*k*) maceratur, quoad totus nunc mollis sit, inque pastam abierit, cum plurimo succo gastrico subactus, possitque per angustum iter in tertium ventriculum venire (*l*); in quo, succi sui parte aut per reformationem orbatus, aut per transitum in quartum ventriculum exhaustus, multo magis nunc exsuccus reperitur (*m*), crassior certe pasta & cataplasmati pene sicco similior. In eo vero tertio ventriculo folia, proprio motu [*n*] agitata, conterunt porro cibum & triturant, & in quartum mandant, amplum, humani similem, etiam intus eminentibus laminis interruptum. In eo quarto ventriculo porro ob angustum [*o*] pylorum retentus, glanduloso [*p*] succo mistus, perfectius fervet [*q*], mollisque redditur, & pultaceus, mollior quam in primo, viridis tamen (*r*). Inde per pylorum angustiores tunc demum exit, quando optime coctus est: ad-

(*d*) DUVERNEY l. c. II. p. 441. BUFFON ibid.

(*e*) PEYER p. 123.

(*f*) p. 279. 280.

(*g*) DUVERNEY T. II. p. 454. 440. PEYER p. 112 116. 185. ic. 2. 3.

(*h*) ID. p. 124. ic. 5.

(*i*) DUVERNEY II. p. 439.

(*k*) PEYER p. 126. 182.

(*l*) DUVERNEY II. p. 341.

(*m*) PEYER p. 183.

(*n*) DUVERNEY II. p. 437. PEYER *merycol.* p. 139.

(*o*) VIEUSSSENS *des liq.* p. 274. 275. sphinctere munitum PEYER p. 145.

(*p*) PEYER p. 146.

(*q*) ID. ibid.

(*r*) PEYER p. 184. HELVET. *Mém.* 1719. p. 345.

(*s*) VIEUSSSENS p. 272. 274. In primo ventriculo quatuor faccos habet, munitos sphincteribus. p. 272. Etiam inter secundum & tertium torsionis ventriculum valvula anularis & iter angustum. TYSON. p. 21.

juvant enim ciborum coctionem in his animalibus sphincteres, qui ubique ventriculorum ostia ambeunt, & arctant irritati (s).

Miram interim pro potu fabricam natura paravit: Sulcus nempe (u), ab œsophago in tertium ventriculum ducit, qui aut apertus, aquam in primum & secundum ventriculum dimittere potest, (w), aut vicissim clausus & adstrictus in tertium (x) deferit. Ne ergo ficcus in tertio ventriculo cibus (y), ad iter in quartum ineptus sit, potus (z), quoties primus ventriculus, & secundus plenus est, per id nunc perfectum incile in ventriculum tertium deferitur. Lac etiam (a) & quicquid fluidius est, ea breviori via pergit ad quartum ventriculum. Hinc lactentibus agnis priores ventriculi pene vacui, quartus plenissimus (b); ad eum enim lac properat. Hæc singularis fabrica videtur solis deberi iis animalibus, quæ ficcis stipitibus herbarum aluntur, duris, longisque; neque eas tamen ob dentium incisorum superiorum defectum satis diligenter possunt manducare: præterea multivoris, homo enim, uti ostendimus (b*), parte sui ponderis quadragesima in diem alitur, vacca parte sexta. Ut adeo ii ficci, duri, multique cibi solvi queant hætenus, multa vis tritus & repetitæ manducationis, & agitantia cibum folia & muci, atque salivæ, humorisque gastrici multiplex admistio, videntur esse subsidio. Equo perangustus ventriculus minus ruminatione indiget (c), qui celerrime se in duodenum depleat (d).

Si vere lepus ruminat (e), simplici, unico sulco diviso ventriculo (f): si mus ponticus (g): si pisces (h) aliqui, solusve scarus (i): si inter in-

(u) DUVERNEY II. p. 438. 443. PERRAULT *Ess. de Phys.* T. III. p. 211. 213. t. 13. f. 2. PEYER p. 127. Etiam in huanace FEUILLET *suite du Journal de son voyage au Pérou.*

(w) DUVERNEY II. p. 443.

(x) Ibid. p. 443. PERRAULT, PEYER.

(y) PEYER p. 83.

(z) PERRAULT p. 214. PEYER p. 12. &c.

(a) FABER ad HERNANDEZ p. 623.

(b) CHARLETON *Inquir.* p. 43.

(b*) p. 200. 201.

(c) BUFFON T. IV. p. 315. DERHAM *Phys. Theol.* p. 200. BERTIN *Mém. de l'Acad.* 1746. p. 27.

(d) Equus eadem bibit 12., & est ventriculo 8. vel 10. pintarum capaci. Necessè est ergo partem potus continuo effluere BERTIN. l. c. p. 27.

(e) PEYER *Mericol.* HARDER *exercit.* p. 67.

(f) PEYER ic. XI.

(g) ARISTOT. *hist. anim.* L. IX. c. 50.

(h) Id. *ibid.*

(i) Id. L. c. 14. PLIN. L. IX. c. 17. ÆLIAN. *anim.* L. I. c. 53. OPIAN. L. I.

fecta locusta (*k*) & gryllotalpa (*l*), credas, ea animalia ruminare, quibus plures sint ventriculi cellulæ, distinctæ fretis (*m*), a quibus cibus, dum durior est, repellatur; quibus præterea ventriculus robustissimis fibris (*n*), instructus sit, quæ solæ, absque diaphragmatis, aut abdominis auxilio, cibum sursum agere valeant. Qui homines ruminasse dicuntur, iis œsophagus (*o*) (& puto ventriculus), musculi modo carnosus dicitur fuisse.

Num voluntarius motus sit (*p*), quæri possit, homini certe in ventriculum nullum arbitrium est.

§. XVI. *Calor.*

Primum quod intus ventriculo se circumfundit, calor est vicinorum viscerum. Cor nempe diaphragmati infidet (*a*), idhepati, & ipsi, qua hepar nullum est, ventriculo. Hepar (*b*) ipsam sanguine plenissimum, calet pro ratione rubri cruoris. Sic lien (*c*), non grandis, totus tamen sanguineus. Sed etiam aorta (*d*) inter duos ventriculi ostia descendit, maximus nempe sanguinis alveus. Hæc omnia, ut possint in cadavere remota videri, in vivo tamen homine, dum peritonæum integrum est, omnia sunt vicinissima. Calor ergo in ventriculo idem est, qui in humano sanguine (*e*) circa 96. (*f*) gradus Fahr., etsi in vivo animale inciso, inserto thermometro, minorem, & vix 90. (*g*) grad. reperi. Aer nempe admissus, & dimotorum viscerum secessus, continuo nativum calorem temperant.

Ita in homine, quadrupedibus, avibus, piscibus cetaceis. Nam frigidis aut piscibus, aut quadrupedibus & serpentibus non magis ventri-

(*k*) SWAMMERDAM *bloedelooze dierties* p. 33.

(*l*) PEYER c. 7. WELSCH *hecatost obs.* 1. n. 26. PERRAULT p. 213.

(*m*) In Gryllotalpa PERRAULT t. 13. f. 3.

(*n*) GREW *of the guts* p. 25.

(*o*) BARTHOLIN *Cent. V. hist.* 16. *anat. reform.* p. 67. RHOE *obs.* 59. *Cent. II.*

(*p*) RAI *Wisdom.* 275.

(*a*) EUSTACH t. 9.

(*b*) Id. *ibid.*

(*c*) p. 118.

(*d*) p. 159.

(*e*) Idem qui in corde WEPFER *sicut.* p. 199.

(*f*) L. V. 35.

(*g*) Ad 88. gr. in parva fele vid. *Comm. T. I.* p. 302.

culus calet, quam reliquus sanguis; paulum nempe supra atmosphæræ gradum (*b*).

§. XVII. *Aer.*

Diversis modis aer in ventriculum venit, non inspirando quidem, quo tempore & œsophagus adstringitur, & aspera arteria distenta gulam comprimit (*a*). Sed omnino aere per os inter deglutiendum recepto, uti aquam, qui submerguntur, deglutiunt (*b*); & uti fæces alvinæ metallariorum a fumo incensi plumbi, deglutito lithargio (*c*) obducuntur. Pestis etiam miasmata ex aere per ventriculum adveniunt (*d*). Sed etiam dum manducamus, aerem in cibum admiscemus. Denique in cibis omnibus, inque potu, plurimus est aer (*e*). Columbæ aerem in ingluviem ducunt, & aer ex inflata aspera arteria in eam subit (*f*). In piscibus (*g*) vesicula aerea, natationi præfecta, in œsophagum aperitur, ut in lucio (*h*), siluro (*i*), acipensere (*k*), hufone (*l*) Insectis aerea vasa numerosa ventriculum adeunt, in ape (*m*), papillione (*n*), aliisque omnibus.

Is nunc aer in ventriculo vi sua elastica potissimum operatur, calido enim, & pene clauso, loco atmosphæricus quidem aer rarefit (*o*), & viscidas bullas, in quibus inclusus est, diffringit (*p*), materiamque solidam, quæ cellulas circa foramina aere plena facit, dimovet, & diducit, frangitque, cellulofamque telam, ex qua maxima pars solidi cibi conficitur (*q*), minimis factam cavernulis, in spongiæ perpetuo latefcentis spe-

(*h*) L. V. p. 37.

(*a*) SCHREIBER *almagest.* p. 306.

(*b*) L. XVIII. p. 87. &c.

(*c*) ILSEMAN *Colic. Saturn.*

(*d*) SCHREIBER *de peste* conf. 13. seq.

(*e*) L. VIII. p. 182. 183. 186.

(*f*) PERRAULT *Ess.* T. III. p. 181.

(*g*) NEEDHAM *form. fœs.* p. 157. tab. 7. tot.

(*h*) BLAS *anim.*

(*i*) In stomachum du HAMEL p. 67.

(*k*) GREW *musf.* p. 7.

(*l*) MARSIGLI *Danub.* T. VI. tab. 11. *misc. obs.*

(*m*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 407.

(*n*) p. 575.

(*o*) L. VIII. p. 205.

(*p*) Conf. BOERHAAVE *Elem. Chem.* T. II. p. 178.

(*q*) L. I. p. 21.

ciem expandit, demumque divulsis fibris; quæ per gluten cohærebant, dissolvit omnia (*r*).

Idem aer in fluidis corporibus omnis fermentationis auctor est, ut absque eo nulla (*s*) oriri, eo subtracto nulla invalescere possit. In potu ergo vinoso, in succis acescentibus vegetabilis originis, in lacte, aer atmosphæricus motum proprium ciet, qui in horas invalescens calorem generat (*t*), spumamque, & spirituofum acerrimum halitum explodit (*u*), & demum partes crassas, tenerasque a fluidis separatas dejicit (*w*).

Sed etiam putrefactio ab aere pendet (*x*), quo excluso, per innumeraabilia *Roberti BOYLE* (*y*) experimenta, uti maxime fermentescibiles liquores, ita putredinosi, per integros annos & ætates conservantur. Aer ergo, in carnibus comestis, & ventriculo mandatis, aliud genus motus excitat, furdum magis, neque perinde streperum, sed potentissimum, quod sensim invalescens (*z*), omnium certissime omnia vincula resolvit, quibus fibrarum elementa continentur. Sola putredo plantarum stamina, ligni durissimas fibras, carniū telas, omni sublata duritate, in pultis speciem diluit (*a*). Ipsa ossa ab ejus lenta vi in pollinem dilabuntur (*a**).

Sed ea non solius aeris atmosphærici efficacia fiunt. Unitur aeris interni (*b*) elater, qui fixus prius & iners, nunc per putredinem restituitur (*c*), ex corporum cavernulis erumpit; confluit in bullas; natatilia facit quæ mergebantur; omnes suos carceres frangit; omnes cellularum parietes in tabum liquefacit (*d*). Fermentatio perinde aerem internum expedit (*e*).

(*r*) VARIGNON. *anc. mém.* T. II. p. 234.

(*s*) BOERHAAVE T. II. p. 186.

(*t*) Graduum 75. BOERHAAVE T. II. p. 293.

(*u*) BOERHAAVE p. 178. 180. seqq.

(*w*) BOERHAAVE *ibid.* p. 179.

(*x*) BOERHAAVE *ibid.* p. 292.

(*y*) In *cont. exp. phys. mech. de aere*.

(*z*) BOERHAAVE p. 289.

(*a*) n. 290.

(*b*) V. p. 86. KNIGHT. p. 19. Putredo ab aere interno *Mém. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 38.

(*c*) L. VIII. p. 185.

(*d*) p. 291. 292. L. V. p. 89. Conf. KNIGHT *vindicat.* p. 6. 7. HAMBERGER *Physic.* &c.

(*e*) L. VIII. l. c. HALES *vegetabl. stat.* c. VI.

Ab utroque aere se expandente ventriculus pariter expanditur, ut etiam per cutem tumeat (*f*) magis, quam pro ciborum mole: idemque multo cum murmure luctatus, quando spatia nactus est libera, ructus specie erumpit (*g*), aut ad intestina transit.

In animalibus (*h*) non rarum est, ventriculum nimis inflatum crepuisse, nisi vel subito gramina effervescentia bubulcus (*i*) de ventriculo eripuerit, aut cultro aperuerit eundem (*k*).

In homine aer ventriculum expandens dolorem facit, & irritationem, hinc ejus ostia constringit, & magis atque magis clausum receptaculum distendit. Minus tamen periculi est, quam possit videri. Vires enim ad flectendas fibras requisitæ sunt, ut sagittarum quadrata, & a pondere quadruplo fibra tantum duplo plus flectitur, a pondere (sive vi distendente) noncuplo tantum triplo (*l*). Et tamen ostendimus crepuisse ventriculum, & in cadavere (*m*), & in vivo (*n*). Plerumque tamen ipsa irritatio nimia & dolor vires (*o*) socias muscutorum abdominis & diaphragmatis in motum ciet, & ventriculum liberat.

Finis fit per debilitatem, quæ ostia resolvit, per dissolutionem cibi visceri, ut per pylorum transire aptus sit: demum quod fermentatio aeris, quem generat, partem absorberi faciat (*p*); resumtum in humorem, qui de ventriculo inhalat.

Distensus ventriculus multo majorem spatii abdominalis portionem sibi sumit, quare omnino vesiculam fellis (*q*) comprimit, & exinanit, etsi eam non absque medio contingit. (*r*).

(*f*) COWPER *Phil. transf.* n. 220.

(*g*) Etiam per vulnera *Phil. transf.* n. 176.

(*h*) In equis GIBSON p. 277. Hippopotamus ex lupinis inflatus perit HASSELQUIST p. 202. Vacca ex trifolii abusu *Corps d'observ. de Rennes* vid. 201.

(*i*) WEPFER apud PEYER *Mericol.* p. 275.

(*k*) CHESELDEN p. 160. 161.

(*l*) SAUVAGES *Physiol.* n. 55.

(*m*) In cane p. 275. & 201.

(*n*) Ibid.

(*o*) Ex cerevisia effervescente *Phil. transf.* n. 351. ex pisces ANDRY *alim. du Carèm.* p. 106. 107. etiam columbæ suffocantur a piscibus in ingluviem tumescentibus *Compar. anat.* p. 95.

(*p*) HALES l. c. p. 272.

(*q*) COWPER *introd.* ut facilius credas, in pleno corpore ventriculum cystidem evacuare; Intestinum rectum Cl. v. ROYEN inflavit. Ita de fede tenuia intestina deturbavit, & compressit vesiculam fellis, ventriculum, pylorum, duodenum *intest. crass.* p. 20.

(*r*) p. 121.

Hinc in famelicis (s), hydrophobis (t), morbo maligno extinctis (u) in aliis, quibus ventriculus inanis est (w), inque animalibus morbosus (x) & cibo abstinentibus (y), vesicula fellis maxima esse solet & turgidissima.

Sed etiam pancreas, ab eodem tumente ventriculo potest comprimi (z), ut ejus liquor acceleretur: tum hepar; ut omnino bilis copiosus adfluat, quo plenior est ventriculus (a).

Memini mihi *κακοσμομαχω*, ut paulum ventriculus mihi tumebat, pressis renibus, secretionem urinæ fuisse impeditam, diu nihil, deinde remisso paulum flatu, tenuis tandem & limpida aqua decederet.

Lienem etiam ventriculus distentus comprimit & inanit (b). Cum maximo ventriculo lien minimus (c).

De aortæ pressione alias diximus (d).

Hæc omnia majora fiunt ex nimia aeris copia & distentione nimia:

(s) p. 307.

(t) SCHURIG p. 382. DARLUE in *Journ. de Méd.* T. III. n. 3.

(u) In peste SCHREIBER *obs.* 12. p. 18. *Recueil sur la peste* p. 201. 278. 264. 398. 402. 539. P. a CASTRO p. 10. In dysenteria BARTHOL. *Hist.* 18. Cent. III. SPIGEL c. 238. In ventriculi inflammatione MORG. *sed. caus. morb.* II. *Epist.* 30. In febre ardente LIEUTAUD *precis* p. 30. In febre flava Americanorum *Eff. of a Societ. at Edimb.* II. p. 184. In tertiana maligna CLEGHORNE *Minorca* p. 165. In febre maligna *Journ. de Méd.* 1755. In morbo epidemico Pisano MALPIG. *posth.* In morbo convulsivo ex clavato fecali nato WOLLNER *disp.* LONGOLIUS apud BERGER *Post febres ardentes & malignas LIEUTAUD precis.* p. 30. *Journ. Méd.* ann. 1758. m. Novembr. MEDICUS *beobach.* p. 50. post malignas febres Americæ tropicæ BISSET *const. med.* p. 213. in hydrophobia JAMES *canine madness.* p. 64.

(w) A veneno HILD. Cent. IV. *obs.* 51. 79. In experimentis WEPFERI, in lupa *cicut. aquat.* p. 162. lupo p. 180. fele p. 242. cuniculo brasiliiano p. 236. a cicuta etiam data HARDER *apiar. obs.* 25. & in cane a vipera occiso *obs.* 23. Ab inedia nulla bilis adfluit NEIFELD *Jeeret.* II. p. 90. hinc in serpentibus vesicula plurima BORELL. *mot. anim.* II. p. 147. LISTER *humor.* p. 369. & in dysentericis per languores absque cibo mortuis *Phil. transf.* Vol. LII P. 2. p. 649. tum in morbis lentis, cum malo appetitu, ut videtur CAMER *hepat. exstisp.* &c.

(x) In morbo armentorum *Bresl. Saml.* 1724. M. Mart. MORG. *sed. caus. morb.* II. p. 442. *Giornal. de Lettr. d'Ital.* T. X. p. 72. *Galer. min.* VII. p. 120. GORLIKE *de lue contagiosa boum.* SAUVAGES *Mém.* p. 16. HEBENSTREIT *Progr.* ad SILVERSTEIN, PLANQUE *Bibl.* T. III. *Phil. transf.* n. 356. HILD. p. 26. LANGGUTH *de morbo boum.* RAUDOT. p. 22. BUCHWALD *script. Soc. Dan.* II. p. 393. *Fränk. Anmerck.* II. p. 115. Bile plenam vesiculam in nostrarum Alpium bovillo morbo nuper reperimus, ut etiam dirumperetur, & habent MARTYN *ad Georg. Virgil* p. 388. TURSEN *de lue boum* CÖTHENIUS *Eph. Nat. Cur.* Vol. IX. app. CHOMEL *de la malad.* p. 12. STIEF *Hamb. magaz.* VI. p. 4. KANOLD de eo morbo, MAUGHART, GOELICKE de eodem morbo.

(y) post inediam CARON *Zod. Med. Gall.* T. IV. ann. 4. M. Febr. RIOLANUS p. 125. GIERING. *Act. Francofort.* III. p. 379. MORG. *sed. & morb.* II. p. 15. BORELL *mot. anim.* II. Prop. 147.

(z) COWPER l. c. conf. p. 118. 121.

(a) LIEUTAUD *Eff.* p. 314. *Physiol.* p. 146.

(b) La SÈNE *Mém de l'Acad.* 1754. p. 193.

(c) LIEUTAUD *Mém de l'Acad.* 1752. p. 231.

(d) L. XVIII. p. 601.

In sano & sobrio homine aer quidem expeditur, non tamen ut ructus faciat, non ut ventriculi nimius sit tumor, non ut doleat. Semper tamen etiam per cutem ventriculus repletus tumet. Vesiculam & lienem non potest non comprimere.

Eo magis extendi, quo minus in fibris carneis roboris est, quod resistat, sponte intelligitur. Ructuosi hypochondriaci, & feminae hystericae (e), quibus fibrae omnes & peculiariter, in ventriculo debiles sint.

§. XVIII. Vapor.

Per poros illos inorganicos, quos a ventriculo ostendimus non abesse (a), vapor & de ventriculo exhalat, & vicissim videtur in ventriculum recipi. Exhalare ventriculum non dubium est, vel ex odoris fide & ex bilis exemplo. Penetrare in ventriculum eodem argumento bilis, per coli & duodeni membranas penetrantis, credas constare. Est autem is vapor de proximo, & per totam longitudinem ventriculo subtenso transverso colo: est de universo abdomine, omnibusque intestinis, & reliquis visceribus, quae omnia subfætum, subalcalinum, sub putrem, & penetrabilem vaporem exhalant.

§. XIX. Saliva. Mucus.

Saliva omnis in ventriculum venit, sive solam homo deglutiat, sive cibo suo per manducationem immiscuerit. Ejus neque dotes repetimus (a*) neque copiam (b). Non exiguam esse manifestum est, & in omni animali constantem, etiam insectis (c).

Mucus in ventriculo multus de glandulis nascitur, deglutitur etiam ex oesophago (d), de faucibus & de ore. Ab acris ingestis videtur uberius generari. Ab aqua stillatitia laurocerasi (e), in canis ventriculum infusa, ventriculus mucosus coagulato plenissimus repertus est. Sic in hydrophobico (f), cui ab irritatione ostium ventriculi valde contractum fuit. In vomitu mucus perpetuo, & magna copia rejicitur. In febribus inter-

(e) BARTHOL. Cent. III. hist. 21.

(a) p. 162. seqq.

(a*) p. 50. seqq.

(b) p. 58. seqq.

(c) Cochleæ duo ductus salivales in ventriculum aperiuntur SWAMMERDAM bibl. p. 124.

(d) WEPFER Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 251.

(e) B. LANGRISH physical. exper. upon brutes Exp. I.

(f) DARLUE l. c.

mittentibus pro causa mali eum mucum habuit TALBORUS (*g*), utilissimi corticum propagator.

§. XX. *Succus gastricus.*

Naturam succi gastrici, quantum licuit, exposuimus (*a*). Copiam accurate non possumus definire. Putes insignem esse, si amplitudinem organi, si arteriarum gastroepiploicarum (*b*) de utraque classe, & coronariarum (*c*) de utraque pariter classe, numerum, & lumina cum arteriis salivalibus comparaveris, quarum tanto minores arteriæ, tot uncias humoris fecernunt; si demum memor fueris, quam difficulter aqua, aut humor alius quicunque, in arterias impulsus, per ductus salivales (*d*) redeat: quanta contra facilitate in ventriculi arterias injectus (*e*) liquor, & ipsa adacta cera, in ventriculum effundatur. Quare & madet semper stomachus, & mador a morte renascitur (*f*).

In canis famelici (*g*) ventriculo magna copia gastrici liquoris reperta est, & sæpe in jejunis summa cum facilitate de ore regurgitat, ut certus sis, ventriculi non exiguum partem eo repleri. Tres libras (*h*) & quinque vomitu redditas legi. Maxima vis aquæ, ad libras 16. vomitu rejecta (*h**).

§. XXI. *Appendices pyloricæ.*

Inter omnia animalia minimum succi in ventriculo habent, ea quæ carnibus aluntur, cum procul dubio NATURA in ipso alimento uberius latentem humorem in calculos suos retulerit. Ruminantibus plus salivæ est, plus gastricarum glandularum. Avibus ex bulbo œsophagi, semper

(*g*) *Of agues* p. 23.

(*a*) p. 143.

(*b*) p. 146. 151.

(*c*) p. 143.

(*d*) L. VII. p. 379.

(*e*) p. 137.

(*f*) KAAUW *perspir.* n. 181.

(*g*) WOLF *Wirkungen der Natur* n. 411.

(*h*) Quotidie per triduum MARCELL. DONAT p. 308.

(*h**) MORG. *sed. caus. morb.* II.

glanduloso (a), multum in ventriculum succi adfunditur, quem ita sibi sumit coctionis negotium, ut tamen siccus fere in musculofo ventriculo cibus sit. Carnivoris, ut audivimus, succi plenum est alimentum, neque parciore glandulæ, Piscibus, quibus vix ullus œsophagus (b), nihilque ejus bulbo simile, & tenuis, membranaceus (c) est ventriculus, proprium organum natura dedit, quod ad alimentum, in ventriculum uberrimum, succum adfundat. *Appendices* sunt cæcæ, intestinula (d) nempe cylindrica, clauso fine, fabrica fasciculosa, plenæ albo (e), falso (f), etiam satis vehementer (g), succo, & mucoso, quem in pylori viciniam effundunt, ut eo alimentum irroretur, quod est in ventriculo, aut per intestina descendit. Eum succum glandulosa fabrica (h) in iis appendicibus generat.

Res ipsa ARISTOTELI non ignota fuit, tantum ut cibi receptacula (i) & fasciculata (k) vocaret, qualia in nonnullis sunt, non in omnibus. Ostendit autem MORGAGNUS mucosam plenam esse (l), non fascibus, & ita Pancreati similia, ut nullum (m), sit in iis piscibus pancreas (n), quæ appendices habent, & nullæ appendices, quando pancreas verum adest. Non recipere cibum constat, cum plenæ sint, quando ventriculus inanis, ut in salmone (o).

(a) p. 138.

(b) p. 55. 56.

(c) p. 270.

(d) PERRAULT *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. p. 202* BLAS *anat. anim.* a tab. 49. ad 53.

(e) PEYER *ibid.*

(f) Non est acidus SWAMMERDAM in *præf. bibl.* & in lucio *Amstelodamenses* apud BLAS p. 28. Amaricat in hippoglossis BLAS p. 278. in acipensere herbaceus ingratus BLAS p. 259.

(g) In asello rancidus & feminalis p. 262. Rancidi quid sapiens SWAMMERDAM in *vita* & in *bibl.* p. 403. Ex eo tamen sapore suspiceris, aliquid cibi illapsum esse.

(h) In xiphia SCHELLHAMMER HARTMAN. Add. PERRAULT p. 438. 439. PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. p. 202.* HOFMAN *Eph. Nat. Cur. Cent. IX. X. p. 449.*

(i) *Part. anim. L. III. c. 14.* GREW *of the guts*, sub fin.

(k) *Hist. anim. L. II. c. 17.* Habet etiam GESNER *hist. anim. L. III. de pisc.* p. 364. Pro cæcis intestinis GREW; pro intestinulis LISTER *hum.* p. 364. cibum excipientibus & retinentibus *Exerc. anat. II. p. 14.* Pro penu in fame N. *Comun. Acad. Petr. L. VI. p. 414.*

(l) *Epist. XIV. n. 33.*

(m) In omnibus piscibus deesse vidit JANUS PLANCUS *Comm. Acad. Bon. T. III. p. 333.*

(n) Negant in *nov. Comm. I. c.* Torpedo tamen dicitur & appendicem habere, & pancreas LORENZINI p. 24. tum rhombus *turbot* BLAS p. 259. & galeus. Et appendices canis & ductum pancreaticum habet CHARLETON p. 84.

(o) BIRCH *T. III. p. 425.*

Nonnullis paucae sunt, & quibus sunt plurimae, iis tamen sensim in communem ductum (*p*), ita aperiuntur, ut pauca tamen in pyloro sint ostia.

Unica est appendix polypo (*q*): rhombo *turbot* (*r*): sepiæ (*s*): torpedini (*t*): ammodyti (*u*): lucio (*w*).

Duæ xiphiæ (*x*): rhombo (*y*): cani carchariæ (*z*): blenno (*a*): falpæ (*b*): ranæ piscatrici (*c*) loligini (*d*): & in multis piscibus planis (*e*).

Tres in cernua & perca (*f*), inque pisce ex aselli genere (*g*), & in aurata (*g*^{*}), sparro [*g*^{**}].

Quatuor hepato (*h*): turdo [*i*]: doro (*k*): hippoglossio (*l*): perca (*m*): scaro (*n*): trachino (*o*): filuro (*p*): falpæ (*q*): variolo (*r*).

(*p*) In asello BLAS *anat. anim.* p. 262. LEONICEN. In acipensere ID. COLLINS p. 558 in hystrice marina REDI: in xiphia LISTER *Exercit.* II. p. 12. in salmone GLISSON; in pisce *lieu*. PERRAULT *Eff* T. III. p. 221. t. 12. f. 4. in fabro MORG. l. c.

(*q*) REDI *anim. intra anim.* p. 100.

(*r*) COLLINS t. 37. f. 3.

(*s*) SWAMMERDAM. p. 890.

(*t*) LORENZINI p. 24.

(*u*) HILL.

(*w*) BLAS p. 282. t. 53. f. 17.

(*x*) SCHELLHAMMER. Una HARTMAN.

(*y*) MORGAGN. *Epist.* XIV. n. 33. RONDELET p. 311. BLAS t. 50. f. 6. 7. CHARLETON p. 30.

(*z*) COLLINS *tab.* 71. Huic per ampla.

(*a*) GISLER K. *Sw. Wetensk. Acad.* 1748. Trim. I.

(*b*) BLAS *anat. anim.* p. 304.

(*c*) CHARLET. *mantiss.* p. 79.

(*d*) LISTER *conch. bivalv.* T. I. f. 2. SEVERIN. p. 352.

(*e*) HILL. *revieu* p. 117.

(*f*) GMELIN. SCHÆFFER *pisc. bavar.* p. 32. Duæ fere COLLINS t. 35. f. 2. BLAS t. 52. f. 12.

(*g*) RONDELET p. 70.

(*g*^{*}) HASSELQUIST p. 339.

(*g*^{**}) ID. *ibid.*

(*h*) RONDELET p. 148.

(*i*) REDI *ibid.* p. 103.

(*k*) IDEM t. 6. f. 1. PEYER *Merycol.* p. 17. SEVERIN *Zoot.* p. 351. Tres HASSELQUIST p. 339.

(*l*) BLAS *ibid.* p. 278. t. 50. f. 8. vocat vesiculares.

(*m*) RONDELET p. 165. etiam quinque.

(*n*) GREW *of. guts* p. 42. etiam tres.

(*o*) GRONOV *Aff. Societ. litt. Ups.* 1742. p. 99. octonæ forte.

(*p*) Etiam tres HASSELQUIST p. 375.

(*q*) MORGAGN. l. c. etiam quinque.

(*r*) SEVERIN. p. 373. etiam tres.

Paucæ mullo aspero (s).

Sex mustelæ fluviatili (t): & sciænæ (u): & antherinæ (u*).

Luciopercæ sex & septem (w).

Septem spirincho (x) & sepiæ (y).

Octo triglæ (z). Aliquot. in gymnoto (a).

Novem in gado (b): & afello (c), qui ejusdem generis est.

Plures quam novem pelamidi (d). Octo & novem in umbra (e): corvo (f).

Novem & decem in pisce *Rochet* (g): Decem uranoscopio (h).

Duodecim in pisce *Grondin* gallorum (i).

Thrachuro 10. ad 14. (k); sedecim boopi (l): Harengo septem decim (m): Totidem vel 18. mustelæ (n) vel, secundum alios, supra viginti (o): Alofæ triginta (o*): Triginta quatuor in pisce *Julienne* (p). Troctæ triginti sex (q).

(s) RONDELET p. 296.

(t) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 46.

(u) SCHONEVELD p. 44. Addit longas esse. De perca HILL. l. c. GMELIN. KLEIN *Miss.* V. p. 34.

(u*) HASSELQUIST p. 389.

(w) ID p. 355.

(x) GERING *pisc. Salm.*

(y) REDI p. 98. 99. SVAMMERD. unicam, forte ob ostium singulare.

(z) GRONOV *Ups.*

(a) IDEM *mus.* p. 20.

(b) *Act. Societ. Ups.* 1742. p. 89.

(c) REDI p. 95.

(d) RONDELET p. 70.

(e) IDEM *ibid.*

(f) *Ibid.*

(g) GREW p. 42.

(h) SEVERIN *Zoot.* p. 358.

(i) PERRAULT.

(k) HASSELQUIST p. 366.

(l) SEVERIN p. 50.

(m) SCHONEVELD p. 37. Etiam octodecim HILL. p. 117. Multæ *Oecon. Abbandi.* T. IX. p. 117.

(n) COLLINS t. 33.

(o) GERING ad 25. 26. Fasciculum insignem, sed ostia communia quatuor habet J. M. HOFMAN *Eph. Nat. Cur. Cent. X. app. obs.* 12.

(o*) HASSELQUIST. p. 390.

(p) PERRAULT.

(q) FANTON *Diff.* p. 161. add. REDI t. 4. f. 1. 2. Triginta GREW. l. c. Supra centum CARDAN. *variet.* L. VII. p. 222. Multa SYLV. *varior. corp. dissect.*

Quadräginta in fungi formam collectæ in hystrice marinâ (*r*): & in asello *whiting* idem numerus (*s*).

Numerosæ, sexaginta & ultra salmoni (*t*): in cruplea vel alofa octoginta (*u*), vel 94. (*w*).

Centum sturioni (*x*), pristi *Schwerdfisch* (*y*), cani (*z*). In scombro makreel 150. (*a*). In asello trecentæ sex in fasciculis (*b*). Quadringentæ quadräginta in pisce *Lieu* (*c*). Multæ in galeo (*d*), sphyræna (*e*), cuculo (*f*), carpione lacus Benaci (*g*), fabro (*h*), mullo imberbi (*i*), cinereo (*k*), & rubro (*l*), albula cærulea; pisce *Ester* (*m*): orbe (*n*), lepore marino (*o*). In umbla innumeræ (*p*).

Videtur etiam eo referendus esse acipenser (*q*), cui vastum pancreas, multis ductibus factum, sive membranosis appendicibus (*r*), plurimo succo plenum esse dicitur: ductus unicus est (*s*).

(*r*) REDI p. 110. *anim. viv. t. 25. f. 3. 6. t. 5.*

(*s*) GREW l. c.

(*t*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 85. A 20. ad 60. HILL. Sexaginta duæ GRO- NOV. Upsal. p. 62. Centum viginti tres ROBERG Disp. Octoginta GREW p. 42. Quadringentæ ID. t. 31.*

(*u*) HILL. Alofæ nomine BLAS t. 49. f. 5.

(*w*) PERRAULT p. 221. Sexaginta in duabus seriebus HASSELQUIST p. 390. Negat habere BLAS p. 260.

(*x*) HILL.

(*y*) IDEM.

(*z*) ID. Sed de eo vide not. 2. p. 203.

(*a*) CHESELD. p. 157.

(*b*) In asello plurimæ in sex fasciculos congestæ LISTER. *Exerc. anat. II. BLAS p. 45. 49. Numerosæ SCHONEVELD p. 20. GERING. pisc. p. 17. Nonaginta sex BLAS p. 262. Innumeræ asello COLLINS p. 558.*

(*c*) PERRAULT t. 12. f. 4.

(*d*) ROND. p. 283. IDEM cum pisce lieu, ut credo.

(*e*) p. 225.

(*f*) BLAS t. 52. f. 9.

(*g*) MORG. *Epist. XIV. n. 33.*

(*h*) IDEM.

(*i*) p. 295; & majori CHARLETON *pisc. p. 17.*

(*k*) COLLINS t. 36. f. 4.

(*l*) IDEM T. 36. p. 2.

(*m*) MARSIGLI Tom. VI. t. 20. f. 1.

(*n*) BARTHOL. Cent. II. obs. 1.

(*o*) SCHONEVELD p. 42.

(*p*) RONDELET L. II. p. 161.

(*q*) Fasciculus videtur appendicum numerosissimarum BLAS t. 49. f. 2. 3.

(*r*) LEONICEN *metamorph. apoll. & asculap. p. 96. 97.*

(*s*) Du HAMEL *hist. p. 67. BLAS ic.*

Paucæ (*t*) species sunt, quæ omnino carent appendicibus, ut *Blennus GRONOVII* (*u*), *acus piscis* (*w*), *lampetra* (*x*), *tinca* (*y*), *anguilla* (*z*).

Cetis, ut verum pancreas, ita nullæ appendices (*a*).

Denique etiam insecta ejusmodi succi fontes habent. Sex habet *papilio* (*b*) & *gryllus* (*c*): appendices sex ordinum (*d*) ad ventriculum cavas *scarabeus nasicornis*, & *eruca* (*e*).

Bombicy intestinum carneum appendicibus ramosum est pro pancreate (*f*).

Duodecim sunt in *locusta* (*g*). In cancro innumerabiles (*h*). In *locusta marina* duæ sed (*i*) multilobæ. In *cochlea* duæ (*i**).

Quoties autem pars aliqua animalis corporis per multas species regnat, magnam ejus utilitatem esse absque metu erroris concludimus.

Hoc est pancreas, quod in ventriculum piscium aperitur (*k*), cum quo viscere & *MORGAGNUS* comparavit (*l*), & *MALPIGHIUS* (*m*). Chyli coctioni servire *Clar. PERRAULT* (*n*). Hepata esse mavult *LISTERUS* (*o*).

(*t*) RONDELET p. 70.

(*u*) *Upsal.* p. 89.

(*w*) *HILL.* l. c.

(*x*) *IDEM.*

(*y*) *BIAS.* p. 304.

(*z*) *ID.* t. 52. f. 5.

(*a*) *RONDELET* p. 71. *HILL.* l. c. Nimio forte catalogo tædiosus fui, in quo præterea scriptorum auctoritates non consentiunt. Eam culpam deprecor, quæ possit, omiſſis his paginis, redimi.

(*b*) *SWAMMERDAM* p. 546.

(*c*) *Giorn. di* 1687. p. 64.

(*d*) *SWAMMERDAM bibl.* p. 313. t. 27. f. 8. 11. 12.

(*e*) *ID.* p. 576. 589. add. *MALPIGH.* t. 5. f. & *posth.* p. 57.

(*f*) *MALPIGH. gland. conglob.* p. 6.

(*g*) *PEYER* p. 8. de iis *MALPIGH. posthum.* p. 59. Sex numerat *RATHLEF T. II.* p. 221.

(*h*) *COLLINS* t. 39. f. 1. Unum maximum, sed ex cæcorum intestinorum fasciculis factum *LISTER cochl.* I. p. 84.

(*i*) *LISTER Exerc. anat.* II.

(*i**) Ex ventriculo in hepar intestinale euntes ductus *LISTER Cochl.* p. 73.

(*k*) *GRAAF* p. 19.

(*l*) *Epist. XIV.* n. 32.

(*m*) *Gland. conglobat* p. 6. *posth.* p. 57.

(*n*) p. 220. *Nov. Comm. Acad. Petr. T. I.*

(*o*) *Cochl.* p. 83.

§ XXII. *Bilis.*

Etiam bilis extra ventriculum in duodeni secundam lineam effunditur, sed & ipsa, minime obstante valvula pylori (*a*), frequenter in ventriculum redit, frequenter inquam, non semper. Nam vidi ad usque pylori valvulam venisse, ventriculum non subiisse. Sæpe tamen flavum in stomacho mucum vidi, & in homine, & in animalibus sanissimis, ut in cane (*b*) fele. In marasmo (*c*) Cl. Viri bilem in ventriculo viderunt, inque hydropo (*d*), peste (*d**). A venenis bile plenum ventriculum vidi. A fricto abdomine bilis (*e*) in ventriculo fuit.

Etiam calculi fellei in ventriculum redeunt, & vomitu expurgantur (*f*), & icterus vomitu bilioso solvitur (*g*). Amarus est & biliaris calculus, qui in hystricis (*h*) ventriculo reperitur, & mollis, ut sapo, dum recens est; Cum amarus sit, qui in elephanti (*i*) ventriculo sedet, ejusdem videtur generis esse.

Demum & fitis nascitur (*k*) a bile reflua, & nihil frequentius est bilioso vomitu: Quotidianum legimus (*l*) in iis, qui vocantur *πικροχολοι* (*m*), etiam ad summum senium (*n*) familiaris. Ex morfu viperæ (*o*), ex hydrophobia (*o**), & vulgo in omni vomitu, etiam a navium agitatione, sub finem bilis sequitur. Quindecim libræ bilis cum bonis ægri rebus egestæ (*p*).

Sed omnino vir summus, J. B. MORGAGNUS (*r*), in jejuno homine bilem constanter in ventriculum effluere docet.

(*a*) Non valde resistere, neque aquam injectam morari HAGUENOT *de Ile* p. 21.

(*c*) HILD. *Cent. IV. obs.* 40.

(*d*) G. v. SWIETEN T. II. p. 220. cum nausea. Bilis in ventriculo reperta a vomitu VALCARENGHI *med. ration. ann.* 1737. p. 105. A drasticis P. CASTELLI *Chrysolus* p. 28. MATTEI *anim.* p. 53. WENKER *perfor. ventr. obs.* 1. Hinc etiam cum calculis vesiculæ *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 29. Bilis vomitu reddita POMME *vappeurs* p. 256. JAMES *madness* p. 64.

(*d**) SOULLIER *recueil de la peste* p. 278.

(*e*) PAW. *obs.* 31.

(*f*) HEISTER *annal. Jul.* 1726. M. Aug.

(*g*) G. v. SWIETEN T. II. p. 192.

(*h*) BONTIUS ad G. ad ORTA c. 46.

(*i*) SEMMEDO *fascic. LABAT. ethiop occid.* p. 154.

(*k*) *Febr. interm.* p. 29.

(*l*) RHOD *Cent. II. obs.* 62.

(*l*) VESAL. l. modo cit. ZAGUT, &c. GALEN. *art. med.* p. 89.

(*n*) VALISNER. T. III. *off. var.* in femina 97. annor.

(*o*) POUTEAU *obs.* p. 155. A veneno, in fele.

(*o**) JAMES *canine madness* p. 64.

(*p*) RAYMOND. *malad. danger. à guérir.* II. p. 47.

(*r*) *Advers.* III. p. 66.

Demum in struthiocameli avis (s) secundo quidem ventriculo amarus succus, bile tinctus reperitur, & ductus ipse vix sex lineis a pyloro aperitur, orificio ita converso, ut bilem in ventriculum mittat. In piscibus certius est, passim bilarium ductum in ventriculum aperiri (t). In xiphia (u) idem inter duos ventriculos aperitur: In cyprino (w), in altero cyprino capitone, in anguilla (x), in barbo (y), cysticus ductus in ventriculum patet, & in hufone proxime pylorum (z). Phocæ vesicula fel in pylorum remittit (a) Etiam in serpentibus bilis in ventriculum venit (b).

Sed etiam gliri (c) [le Loir] cysticus ductus proxime sub ventriculo inseritur, & in hystrice (d) hepaticus in ipsum pylorum se inmittit.

Denique in homine bilarium ductum ramum in ventriculum mittere, videtur apud GALENUM (e) alicubi reperiri, etsi alibi disertius (f) negat. Mansit tamen ea quasi fama in hominum animis, & reperitur apud Arabes (g) & apud primos auctores (h), qui post instauratam anatomiam scripserunt.

Sed etiam experimenta sua, visamque eam in homine biliarii ductus in ventriculum insertionem & MASSA (i) protulit: & ad unum exemplum C. STEPHANUS (k), & ad unum VESALIUS (l): ad unum

(s) VALISNERI *notom d'un struzzo*. In ventriculum *Mém. pour servir à l'hist. des anim.* DUVERNEY apud Du HAMEL p. 382. 315. *Anciens Mém.* T. X. p. 27. *posth.* II. p. 552. 547. 492. nempe hepaticorum ductuum alter.

(t) VALISNERI l. c. p. 241. 242.

(u) SCHELHAMMER apud VALENTIN. HARTMANN in confinia ventriculi.

(w) BLAS *anat. anim.* p. 262. *Amstelodamens.* p. 39. *Comm. Litt. Nor.* 1738. hebdomada 47.

(x) CALDES T. V. f. 11. MURALT p. 388.

(y) ASTRUC *de la digest.* p. 255.

(z) MARSIGLI *Danub.* T. VI. t. 14.

(a) SEVERIN. *antiperipat.* p. 32.

(b) BORELL. *mot. anim.* L. II. *prop.* 147. LISTER *de humor.* p. 369.

(c) PARISINI.

(d) Du HAMEL p. 282. DUVERNEY II. p. 599. 492. Tinæ & cyprino bilem in ventriculo effundi, & in hirundine marina aliisque adfinibus ventriculum semper bile plenum esse VALISNER oper. T. III. p. 163. In pullo, qui ovo continetur, bilis in ventriculo perpetua est De homine suspicio exstat apud ILL. VALCARENGHIUM *medic. ration.* ann. 1737. p. 105.

(e) *Administ. anat.* L. VI. c. 12. *Add. art. medic.* p. 89 de picrocholis.

(f) *De usu part.* L. V. c. 4.

(g) RHAZE *de divis.* c. 64. AVICENNAM L. III. Fen. 15. tr. 1. de parvo ductu a vesicula, qui aliquando altero major fit.

(h) AL. ACHILLINUS p. 5. de subtili ramo a cholodecho ductu in ventriculum veniente. Secundum aliquos; ait CARPENSIS *Isagog.* p. 15. *add.* in MUNDIN. p. 256. A meatu biliario ductum in pylorum venire, in eo visum esse calculum Alex. BENEDICTUS p. 21.

(i) Rarum esse in hominibus bilem vomentibus reperiri, sibi tamen visum p. 25. b.

(k) p. 179. qui ait, se ipsum vidiisse alterum ramum choledochi ductus ventriculo inmitti.

pariter CABROLIUS [*m*], ad unicum Petrus PAW [*n*]; ad unicum JESSENNIUS ad JESSEN [*o*]; ad unicum HOEFERUS [*p*]; ad unicum demum MOTHUS [*q*] & ZACUTUS [*r*]. Proxime & ad uncia a pyloro insertum [*r**] RIDLEYUS. Novos ductus hepatico bilarios ad ventriculum venire in univ[er]sum PETRIOLUS [*s*]. Demum permultos ductus, in homine bilem vomente, de hepate venisse creditum est [*u*], & in ventriculum aperiri.

Mihi quidem probabile videtur, in ventriculo bile extus tincto, arteriam coronariam minorem, ex hepatica proxime ductus bilarios natam, his viris imposuisse. Primus, puto LEONICENUS [*x*] hunc errorem refutavit, deinde COLUMBUS [*x*]. Negat se vidisse ad ventriculum ire FALLOPIUS [*y*], & G. CUNEUS [*z*].

Breviter addo, etiam pancreaticum succum, perinde ut bilis, in ventriculum refluere posse [*a*]. In tursione tertio sacco ventriculi se inmittit [*b*]. Meconium visum est in ventriculum rediisse [*b**].

§. XXIII. *An spiritus.*

Conjectura fuit Cl. virorum, ipsos spiritus [*a*] de nervis ventriculi in ejus cavum effundi, & ciborum coctioni servire [*b*]. Hinc homines

(*m*) *Alphabet anat. obs.* 6. in picrocholo & vomente, de choledochu ductu locutus tout joignant le pilore.

(*n*) *Obs.* 15.

(*o*) *Anat. pragens.* p. 50. b. de perexiguo ductu.

(*p*) Ductum choledochum in Ferdinandi III. ventriculum insertum fuisse apud FANTON. *anat.* p. 92.

(*q*) *Epist.* ad WORM. n. 575. de ductu cystico.

(*r*) L. II. in picrocholo bilem. vomente. Collectionem habet RIOLANUS p. 128.

(*r**) RIDLEY *obs.* p. 220.

(*s*) Apud BARBIELLINUM p. 39. 40.

(*u*) VALCARENGHI *medic. ration.* 1737. p. 105.

(*w*) *Error.* PLIN.

(*x*) p. 231.

(*y*) *Obs.* p. 178. b. Duobus ramis in intestinum aperiri dedit, pro raro. Ex eo JASOLINUS c. 5.

(*z*) *Apolog.* p. 97.

(*a*) BRUNNER *duoden.* p. 54. MALPIGH. *posth.* p. 57.

(*b*) RAI *Phil. trans.* n. 76.

(*b**) *Epist.* 575. ad WORMIUM.

(*a*) PEYER *de gland. intest.* p. 20. 68. *de ruminat.* p. 100. BRUNNER *de pancr.* c. V. VI. *de gland. duoden.* c. 4. VIRIDET *du bon chyle* p. 502. PASCAL p. 285. BOERHAAVE. *praefat.* T. I. p. 306.

(*b*) COLLINS p. 303. 304. GREW p. 28. VERHEYEN L. II. p. 257. 258. MAYOV. *oper.* p. 337. SANTANELLI *lucubrat.* p. 150.

affectu (c) animi tristi obrutos, apoplecticos, etiam vehementer in aliquod opus intentos, nullum percipere famis sensum.

Hæc ita dicuntur, ut refellere nequeas, stabilire vix possis. Phænomenon certum est. Sed possunt nervi in tristi adfectu ventriculi fibras male stringere; ut omnes quidem musculorum actiones a nervis augeri possunt aut minui; potest aquæ ventriculi copia augeri, aut diminui; ut certe renalis secretio a nervorum diverso statu vehementer mutatur: potest ejus visciditas intendi, potest bilis secretio a nervorum irritatione pati; potest aliis nobisque ignoratis modis ventriculus a nervis adfici.

§. XXIV. *Emollitio.*

Enarravimus causas, quæ in cibum in ventriculum sumtum operantur: sequitur ut ex vivorum animalium, exque cadaverum, incisionibus eas mutationes colligamus quas in eodem ventriculo cibi experiuntur. Ordo difficilis est, cum earum mutationum plures eodem tempore cibo superveniant, & tamen in hoc opere altera ante alteram debeat exponi. Dilutio certe & emollitio ante acescentiam tempus suum habent. Nam in primo ventriculo capellæ herbæ unice mollescent; in secundo magis dissolvuntur, acescunt demum in tertio (a). Sic in vitulo cibus in primo ventriculo mollescit, in altero minutius mistus est, in tertio demum malvæ tincturam rubro colore tingit (b). In avibus etiam primum est, pisa in ingluvie emolliri (c), & intumescere (d).

Nempe immensa vis salivæ & gastrici succi ad cibum adfunditur potumque, & cum utroque motu peristaltico & antiperistaltico miscetur. Ita necesse est, potum quidem misceri cum nostris succis, & naturam induere ex utroque ingenio mistam: cibum vero molliori, dum aqua in loco calido in cellulas & cavernulas fibris interpositas laminisque, suo pondere, suæque vi attractili irrepit.

Nunc hujus, adeo simplicis causæ, efficacia tamen summa est. Nam in sola aqua communi (e), & in calida magis, omnes carnes, omnes

(c) VIRIDET l. c. Martes ex ira cibos non coxit GEUDER *ferment.* p. 96.

(a) VREUSSENS *tr. des liq.* p. 279.

(b) Ibid. p. 277.

(c) DUVERNEY *posth.* T. II. p. 449.

(d) *Anat. compar.* p. 95.

(e) CONF. SCHOBINGER *de textu cellul.*

membranæ, demum etiam durissimi lapides (*f*) contabescunt: & utile hic est experimentum ab ILLUST. ALBINO (*g*) alium ad finem prolatum, in quo membranæ post diuturnam macerationem evanuerunt. Videas aortæ durissimam membranam sensim intumescere (*h*), magnæque spatiosa nasci, quæ aqua repleat, fibrasque & laminas, quæ ea spatia claudebant, in dies laxari (*i*), ut plus aquæ, minus materie solidæ sit, fibrarum longitudo minuat, cohesio nulla sit, donec in spongiæ speciem primo solvatur, dictam VIEUSSENIO (*k*), inde in mucis naturam, in qua vix quidquam cohæreat, solidumve superfit. Hæc ego seriatim experimenta in cute, in dura matre, omnibusque corporis humani membranis repetii.

Si hæc omnia ab aqua sola furtim subeunte fiunt, non ergo mirum erit, si in ventriculo longe, quam a sola aqua citius, similia eveniant, ubi & calor sit, & aeris vis, & putredinis initium, & tritus, cujus maxima potestas est, dum lentus, longo usu repetatur. Sales notissimi sunt, in quos corpora, etiam multo duriora, a *Comite de la GARAYE* multo tritu reducuntur.

In hominis ergo ventriculo, & in cane, & in similibus animalibus semper vidi, cum subito a pastu mors superveniret, panem cum sua crusta cellulisque ingestum, cruda olera, fructus horæos non mutatos, carniū filamenta integra in ventriculo reperiri.

In homine, aut in animale post longius a cibo tempus enecto, inque ejus ventriculo & in duodeno, cum cibus nihil præter ventriculi vires passus fuisset, reperio nullam de pane figuram superstitem, dissolutam crustam, micam tabescentem, carnem absque conspicuis fibris, olera liquefacta, omnia in similarem pulvem (*m*) subcineream redacta.

In quadrupedibus similia fiunt. Ex cortice (*n*) & ligno, quo pascitur, castor merum liquamen conficit (*o*). In canis & lupi ventriculo altero tertiove die adparet, extremos ossium fines (*p*), incipere dissolvi

(*f*) Et ipsi imprimis vesicæ calculi.

(*g*) *Adnot. L. V. p. 120, 121.*

(*g*) Ut in pisce.

(*i*) Ut ea mollescant in ingluvie p. 298.

(*k*) Conf. L. II. p. 63. Cibus in ventriculo cito spongiosus fit WALÆUS p. 753.

(*m*) In cane panis in pulvem redactus FOELIX *Exp. 8.*

(*n*) WEPFER *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 251.*

(*o*) *Mém. de l'Acad. 1704. p. 5. seq.*

(*p*) VIRIDET *bon chyle p. 195. 196.*

& ossa in cartilaginis naturam mollescere (*q*). In animale boreali *Vielfras* ossa in arenulas comminuta per intestina (*r*) reperiuntur.

In avibus carnivoris prior ventriculus [puto bulbus] integros pisciculos, alter pallidos, maceratos continet. In buteonis ventriculo, inter tubos a REAUMURIO ingestos, reticulo filorum ab omni tritu defensos, carnis tamen pars in pastam totam mollem, abierat, pars per foramina operculi effluebat (*s*); & de ipsis demum ossibus, etiam præduris bovis ossibus, pars in gelatinam (*t*) soluta visa est. Margarita in ventriculo gallinæ emollita fuit (*u*). In ossifraga aquila pisces integri in mucum diffluunt (*w*), & ossa intra 24. horas consumuntur (*x*). Lari in ventriculo eo magis pisces coquuntur, quo fundo propiores sunt (*y*). Anguillam, in avis ventriculo, partim consumtam, & tamen vivam CORNELIUS (*z*) reperit. In oesophago corvi marini piscium pars digesta est (*a*).

In aquilæ ventriculo recepta pars avis in mucum consumta erat (*b*). Sic in noctua (*c*), ranæ ossa partim extenuata, partim consumta ventriculum repleverunt. Ranas semi digestas in ciconia (*d*) FABER.

In pisce, inque mustela fluviatili (*e*), cujus ventriculus membranaeus est, pisciculus fuit, cujus squamæ & spinæ in liquamen contabuerant. Etiam solum oculum (*f*), consumtum vidit auctor adnotationis, cum piscis reliquus viveret. In asellis (*g*) majoribus & aselli, & sepiæ,

(*q*) WALÆUS *Epist.* II.

(*r*) SCHURIG *chylol.* p. 29.

(*s*) *Journ. des Sav.* 1753. Jul. *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 70. 71.

(*t*) ID. *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 473. seqq. 480.

(*u*) SPERLING *Inst. Phys.* p. 974.

(*w*) LEIGH. *Nat. hist. of Lancash.* p. 157. ni fallor.

(*x*) BORRICH *hermet. med. sap.* p. 629.]

(*y*) COITER p. 133.

(*z*) p. 210.

(*a*) HELVETIUS *Mém. de l'Acad.* 1719. p. 349.

(*b*) WEPFER apud PEYER *A Merycol.* p. 271.

(*c*) BRUNNER *pancr.* p. 86.

(*d*) *Ad hernand.* p. 69.

(*e*) BRUNNER *de gland. duoden.* p. 103.

(*f*) PLOT. *natural. history of Staffordshire* p. 246.

(*g*) *Phil. transf.* n. 312. SCHNEIDER *decatarrh.* L. III. p. 44. & in asello cabeljauw ANDERSON p. 79.

& cancri, & caudarum pinnae & ossa tota in chymum solvuntur. In solea testæ pectinum (*h*) liquefcunt; inque raja pisces toti diffuunt, etiam testæ & cartilagines (*i*). In torpedinis ventriculo sepia, locusta, solea, alii pisces consumti ventriculi humori inmerguntur (*k*). In galei ventriculo excarnatos pisces (*l*), & in aliis pisces consumtos, inque mucum tabefactos (*m*) lego: in alio feminam devorata & intra paucas horas ad ossa usque consumtam (*n*).

Etiam in xiphiæ ventriculo ossa mollia (*o*) reperiuntur. In galei oesophago piscem emarcidum (*p*) vidit vir Cl.

In ipso oesophago lucii piscis necesse est pisces contabescere, cum rapax animal ranas piscesque se ipso crassiores devoret (*p*^{*}).

In ea ciborum coctione partes externæ, quas proxime succus ventriculi tangit, primæ fere dissolvuntur (*q*). Sic in serpentis ventriculo (*r*) avicula contabuit, & bufonis pars inferior in mucum conversa fuit.

In ventriculo lucii piscis alii pisces (*t*) devorati cum suis spinis in mucum (*u*) colliquefcunt, quousque glandulas attingunt: pars extra ventriculum integra manet. Sic in aquila (*x*), noctua (*x*†), mustela (*y*) fluviatili, serpente, (*y*) integrum fuit, quod extra ventriculum esset.

In vipera lacertæ (*z*) pars ventriculo contenta consumta fuerat, integra manserat, quæ extra ventriculum erat.

In stella marina (*a*), mucofo animale, cochleas semicoctas RONDELETIUS vidit.

(*h*) *Phil. transf.* n. 472.

(*i*) STENON. *musc. gland.* p. 46.

(*k*) LORENZINI *Crampfish.* p. 29.

(*l*) STENON *Act. Hafn. Vol. II.* p. 222.

(*m*) FABER ad HERNAND. p. 641.

(*n*) TOWNE in *Epist. RAI.*

(*o*) HARTMAN in *eius piscis Anatome.*

(*p*) CHARLETON *mantiss.* p. 84.

(*p*^{*}) PLOT. *natur. hist. of Staffordshire.* p. 275.

(*q*) TYSON. l. c.

(*r*) *Act. Hafn. T. I.* n. CXI.

(*t*) LEOPOLD *Oecon. Cur.* p. 621.

(*u*) *Phil. transf.* n. 162. add. VIRIDET l. c.

(*x*) *Not. b.* p. 212.

(*x*†) Tibia ranæ in gula superstitis (p. 312. not. c.)

(*y*) Illæsum quod non descenderat in ventriculum. Ibid. not. c.

(*y*^{*}) GEUDER *de ferment.* p. 71. VIRIDET *de Chyle* p. 73. *Similia VALISNER. T. II.* p. 167. &c.

(*z*) CHARAS *Viper.* p. 4. 5. T. II. r. r. s.

(*a*) p. 83.

§. XXV. *Monita*...

Duplici hic est locus adnotationi. Et primum cum cl. Viri ventriculi prærogativam (a) ornaverint, qui solus cibum dissolvere aptus sit gula ineptam adparet, aliquid esse ejus, receptaculi privilegium, cum multo plus habeat succi, rursusque potissimum, (quam gula. Neque tamen nimium oportere huic dignitati tribui, cum etiam in gula (b) aliquorum piscium cibi dissolvantur.

Deinde utique non esse, certe in animalium quadrupedum ventriculis, ejusmodi dissolutionem in intimas, quæ fibras penitus destruat. Nam & piscium spinae in homine, inque felibus, sæpe vidi circa coli valvulam congestas, & nimis utique integras, non ita modo...

(a) Porro fibræ herbarum in equorum fimo, & boum, supersunt, & in aqua restituntur, in quareum fimum dilueris (c). Quæ de seminibus dixi, non repeto. (d) Sed etiam in feruta utique (e) minora, pulveris similia, quæ in albo græco reperiatur (f)...

Sed etiam canis plerumque ossa integra non penitus in elementa dissolvit (d), verum in feruta utique (e) minora, pulveris similia, quæ in albo græco reperiatur (f)...

Fibræ carneæ devorati animalis piscium facibus accurate quæsitæ supererant, ut agnoscere posses (g). Sed neque in Papini lebe ossa solvuntur, neque eorum fibræ destruuntur, etsi gelatina educitur, ut friabilia fiant (h).

§. XXVI. *Succi extractio.*

Id unicum esse ventriculi officium, HECQUETUS (a) volebat, ut succum ex vegetabilibus & carnibus natum dissolvat & extrahat.

In ventriculo certe musculofo avium mirum est, quam ex carnia scruta, & quam siccas granorum reliquias videas.

(a) VALISNERIUS, CHARAS, VIRIDET.

(b) p. 313.

(c) PEYER p. 120. 170.

(d) PITTCARNE *Elem.* L. I. c. 5. de modo quo cibi p. 72. 83. qui etiam in chylo fibrillas vidit superesse, tum BOERI *Epist.* p. 245. seqq. QUESNAI III. p. 16.

(e) BARRY *triplex digest.* p. 19.

(f) BRUNNER de *pancr.* p. 78. de *duoden.* p. 110. POZZI *Comm. Epist.* p. 75.

(g) LEEUWENHOECK *anat. & contempl.* p. 61.

(h) KEIL *quantit. sang.*

(a) De *digest.* p. 5. 83. QUESNAI *Ess.* T. III, p. 19.

Sed etiam in tertio ventriculo (b) animalium ruminantium herbæ exsuccæ sunt, & in lepore (c) cibus ad œsophagum succulentus, ad pylorum ficcus est.

Ipse polypus, animalium devoratorum, quæ in pulvem (d) quidem abierunt, tamen pelliculas succo cassas (e) & tenuissimas de ore reddit: sic araneæ (f), & alia insecta solo suæ prædæ succo vivunt.

In homine copia adfusi humoris tanta est; ut nunquam ficcum in ejus ventriculo cibum superfuisse viderim. Succum tamen de cibo extrahi, & resorberi, alias ostendemus (g).

§. XXVII. *Corruptio varia. I. Acefcentia.*

Cibi in locum calidum, hætenus tamen clausum (a), recipiuntur; ut in sano homine neque per œsophagum, neque per anum flatus exeant. Primum est ut acefcant; quæ enim vel ex vegetabili regno, vel ex animali cibi loco sumimus, his hæc pene communis est corruptio.

Eam in animalium ruminantium ventriculo tertio (b), & in quarto potissimum (c), adeo vehementem cernas, ut lac in vitulis coactum sit, & tunicas ejus sacci pleno acore inficiat, qui post multos menses sufficiat lacti cogendo, & eo fine ad casei opificium adhibeatur.

Sed etiam in avibus acoris tanta vis est, ut ventriculi gallinæ interna membrana (d) pro fermento esse possit; si nunc acidis horæis fructibus (e) utantur, si granis: & aquam decoctam cum variorum animalium ventriculis signa edere acoris (f) testem habemus.

In humano ventriculo lac pariter cogitur, ut etiam in caseum densetur (g).

(b) PEYER *Merycol.* p. 183. 128.

(c) IDEM *ibid.* p. 151.

(d) TREMBLEY p. 117. 119. add. SCHÆFFER *arm polyp.* p. 32.

(e) BAKER *du polype* p. 78. 107. 108. add. p. 120. TREMBLEY p. 119. 120.

(f) TREMBLEY *ibid.*

(g) *Señ. V.*

(a) p. 278.

(b) VIEUSSENS *des liq.* p. 278. PEYER p. 102. & in secundo ventriculo capellarum VIEUSSENS p. 279. 280.

(c) PEYER p. 102. 128. VIRID. *bon Chyle* p. 232. DUVERNEY II. p. 347. FABRIC. *de ventric. var.* p. 110. 120. FABER ad HERNAND. p. 624.

(d) REAUMUR *Mém. de 1752.* p. 306. *Oeconom. Abhandl.* T. I. p. 890.

(e) Ex rosæ gratum acidum FLOYER *pharmaco hasan.* p. 53.

(f) VIRIDET *prim. coct.*

(g) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 163.

Demum in ipsis canum ventriculis nauseosissimum acidum (*h*) a lacte fætorem sæpe percepi; & in felibus succum ejus facci cum lacte mistum acidum Vir Cl. reperit (*i*).

Neque adeo mirum est, passeret acidum de ventriculo halare (*k*); aut acerrimum in ventriculo avium digerentium odorem esse (*l*); & in struthionis ventriculo contenta laere virescere (*m*); & rupicaprarum pilas (*n*) odore fermenti imprægnari; aut in homine gas (*n**) acidum (*o*) de ventriculo erupisse; & ab usu chalybis vaporem adscendere (*p*), qualis prodit ex martis limatura, cum oleo vitrioli effervescente; & vomitus acidus, ructus acidus (*q*), aliaque acoris in ventriculo dominantis indicia reperiri, quæ dudum excitavimus (*r*).

Paulo minus exspectatur carni in acorem degeneratio. Et tamen etiam ea cum natura convenit. Vidi musculos cadaverum [Leidæ potissimum, ubi diutissime servabantur] virere cum odore manifesto acido; neque quisquam ignorat, jus carni acescere, & in succis gelatinosis acidum fermentatum ipsa in corruptione se conspicuum efferre (*s*).

Accuratius tamen per sua experimenta Cl. Vir *Johannes PRINGLE* (*t*) evicit, carni eam esse naturam, ut acescant, etiam cum pane acorem (*u*) quarta fere quintave hora (*w*) concipiant; odoremque vinosum & acidum saporem (*x*); etiam postquam putredo inceperat, se ostendere; intusa carne etiam celerius (*y*); neque eum acorem a saliva putrida coerceri, quin cum carne & pane eadem fermentet, & quin acor putredinem superet (*z*). In piscibus (*a*) similia obtinere. Imo cum crassamento sanguinis putrido panem tamen in fermentationem abire (*b*), &

(*h*) FOELIX *Exp.* 7. 12.

(*i*) Ostendit MATTEI p. 15.

(*k*) p. 147.

(*l*) CORNEL. *Consent.* p. 210. 219.

(*m*) PERRAULT p. 203.

(*n*) HARDER *apiar. obs.* 14.

(*n**) Germana vox a *jäst*, antique fervor.

(*o*) STÖRK *ann. med.* I. p. 126.

(*p*) WILLIS *de ferment.* p. 25. PECHLIN *purg. VIRIDET bon Chyle* p. 69. 266.

(*q*) ALBIN. *de apotherapeus.* p. 13. *Obs. med. Lond.* n. 6.

(*r*) p. 147.

(*s*) QUESNAY *Essay sur Pæcon. anim.* II. p. 97.

(*t*) *Appendix ad l. de morbis militum.*

(*u*) p. 396. 397. 398. 407.

(*w*) p. 407.

(*z*) p. 398.

(*y*) p. 415.

(*z*) p. 401. 396.

(*a*) p. 402.

(*b*) p. 398.

cum eodem fanguine corrupto lac acorem generare, qui putredinem vincat (c), Sic etiam faccharum cum corde ovillo fermentat & calet, & vini fere saporem adtingit (d).

Quare etiam cum victu carneo vomitus acidi (e); & acoris in ipsis fæcibus signa supersunt, & in omnibus etiam carnivororum animalium pisciumque ventriculis vestigia acidæ naturæ inventa sunt (g); Et ex ipsa putrefacta carne spiritus subacidus distillando obtinetur (h).

Nunc si acor, etiam putredini superandæ idoneus, in ventriculo nascitur, nihil est, quod in erosione signis nobis absconum videatur, quorum testimonia sunt in tabulis medicis; ut margaritæ in ventriculo galinæ emollitæ (i): digitalium ferreorum & orichalceorum adrosorum (k), qua fundum ventriculi contingebant; nummorum ad medium consumptorum (l); ut denique pene integri dissoluti essent (m), non sine fulcis & ærugine (n).

In struthione vitrum minimis foraminibus pertusum excitati certe acoris documento (o) fuit, & ligna aspera & fulcata (p); & nummi turcici (q) ad minimam molem consumiti (r), ut omnino metalla a ventriculi liquore erodi constaret (s).

In cane etiam tesseram dimidio leviolem (t), tamen cubicam, & erosum ebur ligneis clavis integris (u), & testas ovorum in minima dissolutas (w) legimus.

In homine denique cultri exempla sunt, deglutiti, & mire mutati (x), adro-

(c) p. 406.

(d) Journ. æcon. 1757. M. Oct.

(e) ILSEMANN colica saturn.

(f) IDEM ibid. conf. p.

(g) VIRIDET prim. coct. c. 10. 11. 12.

(h) NAVIER sur l'amoliff. des os. p. 34. seq.

(i) SPERLING Instit. Phys. p. 974.

(k) P. CASTELLI Epist. medic. V. p. 146. in capone NIGRISOL, apud VALISNER. T. I. p. 242.

(l) SCHNIZER in cista HONUNG p. 159. in gallina.

(m) BECKER cultrivor. in gallo calecutico.

(n) In struthione WARREN Phil. transf. n. 394.

(o) VALISNER p. 243. in esperienze.

(p) VALISNER.

(q) Alii PERRAULT p. 203. PARISINI.

(r) Id. p. 253. In REDIANO struthione tamen octavo mense nondum erant detrita literæ Esper. p. 59.

(s) VALISNER. p. 242.

(t) BIRCH T. IV. p. 304.

(u) MARTIN Mém. de l'Acad. 1732. n. 3.

(w) WALÆUS p. 763.

(x) CROLL apud SCHURIG Chylolog. p. 323.

fi (y) diminutæ laminæ & manubrii (z) : inque stulto homine ferri exesi, laminæ cultri perforatæ, clavorum erosorum (a) : in alio corrofi aciei apicis (b). Nummi etiam cuprei post quatrimum reddit (c) deletis figuris, iidemque post longiorem moram, alio egesti pene toti confumti (d) : demum bractea integra ferri stanno obducti (e) evanuit, ut confumtam fuisse adpareret. Etiam in œsophago noduli (f), qui per octo septimanas ibi hæferat, magna pars confumta fuit & viridis. Et ex denario cupreo devorato per multum tempus fapor in ore venenatus (g) adscendit.

§. XXVIII. II. *Fermentatio.*

Quæ acescunt, ea sibi permiffa cum aere & calore fermentant, intestino nempe motu agitantur, quem & aer atmosphæricus generat, & etiam magis aer (a) internus expeditus. Saccharum, ut modo diximus, etiam cum carne fermentatur, vinosumque odorem concipit (b); & cum tosta carne panis vinosum & acidum saporem & odorem post fermentationem induit (c).

In animalibus herbivoris, odorem vehementem acidum Clar, Viri perceperunt (d), etiam in rupicaprarum pilis (e) & in leporis ventriculo (f). Spuma in ventriculo (g) variorum animalium visa est, etiam in maniaci (h) hominis stomacho, ut contineri non posset.

In chamæleontis ventriculo muscarum capita (i) leve indicium fermentationis dederunt. Ita etiam intestini parte ligata, contenta materies spumescit (k).

- (y) In HUBNERI *cultrivoro* tantum denigrata.
- (z) In *cultriv. halens.*
- (a) *Phil. transf.* n. 317.
- (b) PURMANN *Chir. cur.* p. 348.
- (c) STORCH *Kinderkrankh.* T. IV. p. 467. Niger alius BLANCAARD *Jaarregister Cent.* V. n. 33.
- (d) AMAT. L. II. c. 69. KERKRING n. 1.
- (e) MEKERN *append.* c. 12.
- (f) *Hamburg. Magaz.* T. XVI.
- (g) *Phil. transf.* n. 246.
- (a) p. 297.
- (b) p. 317.
- (c) PRINGLE p. 396. 398.
- (d) FLOYER *præternat. stat.* p. 30. WEDEL *morb. inf.* p. 119.
- (e) HARDER l. c.
- (f) PEYER *Merycol.* p. 152.
- (g) A cicuta sumta HARDER *obs.* In ruminantibus PEYER p. 181. etiam in cane WALEUS l. c. p. 763.
- (h) MURHART *ferment. microcosm.* p. 14.
- (i) PARIS.
- (k) VERHEYEN T. II. p. 83. 84.

Plena demum fermentatio in ventriculo cervi erupit, calidus nempe vapor, bullulæ, liquor graveolens (*l*), & similia a ruminantibus (*m*) non absunt. Vinosus odor & acetosus de ventriculo bovis ruminantis (*n*) prodiit, ipsiusque hominis (*o*).

Aeris generatio huc pertinet, quæ in ventriculo evidentissima est, ejusdem, quam nuper diximus, spumæ indicio, & distentionis a cerevisiæ potu, a pisces, aliisque cibis multo aere turgidis (*p*), & ructuum, & crepantis a nimia expansione ventriculi boum equorumve (*q*) Hinc hypochondriaci, & qui debili sunt ventriculo, hora quarta fere & quinta a prandio, flatibus potissimum vexantur, iis nempe horis, quibus panis cum carne nunc manifesto fervet (*r*).

Vapor qui de cibo ventriculo recepto adscendit sæpe inflammabilis est, non unice in iis miseris, quibus a nimio potu spiritus vini fumus

(*l*) HARDER *obs.* 12. p. 41.

(*m*) PEYER *mercol.* p. 152.

(*n*) C. FABER. HERNAND. p. 633.

(*o*) BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 278. Nupera experimenta CL. MACBRIDE in *essays*, in compendium contracta submitto. Digestio est vera fermentatio p. 59. Ea facit, ut motus in cibo intestinus nascatur. Partes solidæ misturæ in summum enatant (etiam p. 17.) cum spuma, & vapor subacria exhalat, & particulae solidæ subsident p. 6. Panis cum aqua non fermentat (etiam PRINGLE p. 397 sed cum saliva (etiam p. 13.) t. 2. Farina potius moderatur fermentationem PRINGLE p. 408. MACBRIDE. p. 41. Massa farinacea, dentibus subacta, & cum saliva intrita, in vesica acescit ROUPPE *morb. navig.* p. 94. Avenacea farina cum aqua debiliter fermentatur PRINGLE l. c. Inter farinacea triticum sero fervet p. 88. Nimius acor citri fermentationem supprimit p. 40. Caro cum farinaceis vivide fervet p. 58. Cum succo limonum, & saliva caro continuo fermentatur, & solidæ partes adscendunt ante secundam horam, ante decimam vero omnis motus cessat p. 41. Multo magis fervet caro ovilla cum aqua & pane, quam solus panis, & abit in liquorem spirituosum p. 54. &c. Putrida materies admista facit fermentationem MACBRIDE p. 55. & panis, ovilla caro & aqua fermentationem subierunt, postquam ejusmodi materies putrida accessit IDEM t. 1. Mistura alimentaria aërem generat p. 38, & aer fixus de cibo extrahitur p. 39. & in homine effugit, quando partes solidæ ad summam superficiem adscendunt, & peros emergunt p. 17. Caro non facile aërem fixum dimittit MACBRIDE p. 37. neque vegetabilia sola, mista facilius *ibid.* Ovilla plus dat aëris, quam bubula p. 40. Vapor, qui per fermentationem ciborum exhalat, est potissimum aer fixus ciborum p. 23. Ex frumento per fermentationem parato, vapor adscendit non acidus p. 138. Neque tingit succos cæruleos *ibid.* Post fermentationem mistura alimentaria iterum aërem absorbet p. 147. Caro cum aqua in calore fervata aerem absorbet p. 36. Neque cibi bene frangerentur, nisi aer se expediret, iterumque resorberetur p. 29. Magna pars ejus aëris prius fixa est, quam

(*p*) p. 201.

(*q*) Ex usu trifolii *ibid.*

(*r*) PRINGLE p. 407.

(s) inflammabilis (t), & flamma (u) demum de ventriculo erupit, tanta cum violentia, ut tota cadavera combusta (w) legas, potissimum in celebri exemplo comitissæ Cornelix Zangarini Bandi (x), quam, præter solam manum, flamma post epotum vini spiritum de ventriculo erumpens in cineres redegit: cum tamen, ut aliquoties in facinorosis hominibus vidimus, ægre & multo igne & tempore, corpora humana exuri queant.

Sed absque ulla de spiritu vinoso suspicione olim, consule T. GRACCHO, ad forum Decii, de bovis ore flamma exiit, & ex bovis ventriculo vaporem fætidum prodiisse, qui flammam admissam conceperit, nupta habemus testimonia (y); & flammam denique ex ejusdem animalis ventriculo prodiisse, cum a lano aperiretur (z). Olim etiam a 1597. Pisis, cum RUSCHIUS (a) feminæ ventriculum aperiret, ab admota candela flamma ex flavo virens erupit.

Porro *Andrea* VULPARI (b) experimentum narratur, non semper pari successu repetendum, in quo cani vivo ventriculo ligatur, aperitur: ita candela ad uncix distantiam admota flamma de ventriculo (c) exit.

Ne vero fidem deroges, faciunt & inflammabiles alvi crepitus (d), & flamma, quæ de tubo exiit, quem Philosophus carne plenum buteoni dederat devorandum (e), & sputum inflammabile hominis maniaci. (f).

(s) ADOLPHI *de eruptat. flamm.* p. 77.

(t) EDITOR op. DEMOCRITI CHRISTIANI *de morb. & med. vit. anim.* p. 111.

(u) BARTHOL. *Cent. I. hist.* 70. *Cent. III. hist.* 56. *de luce anim.* p. 154. 155. ADOLPHI S. PAULI *digress. de febr. mal.* EDITOR DEMOCRITI & ipse DEMOCRITUS p. 50. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 4. 5. obs.* 17. GMELIN *Sibir. Reise.* T. III. p. 357. ex aliorum relatione. In femina nuper mortua BIERLING *thesaur.*

(w) BARTHOL. *Journ. de Trevoux.* p. 1934. *Phil. transf.* n. 476. p. 443. 463. Huc puto pertinere duas feminas dictas in SHEBERARE *præfice.* T. II. p. 67. & BLANC *Jaar-reg.* C. VI. n. 88.

(x) MAFFEI *de fulmin. Lett.* X. p. 98. *Phil. transf.* n. 476. *Gentlem. Mag.* T. XVI. BIANCHINI in proprio libello *parere &c.*

(y) *Hist. de l'Acad.* 1751. *obs.* 4.

(z) JANUS PLANCUS *Memor. di fific.* I. p. 206.

(a) BIANCHINI *parere sulla Comitissa Zangarini.*

(b) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs.* 77. BIANCHINI *Parere* p. XLVI. *Phil. transf.* n. 476. p. 458.

(c) RAVESTEIN p. 75. 76.

(d) TACHEN *morb. princip.* p. 40. LISTER *humor.* p. 76.

(e) REAUMUR *Mém.* 1752. p. 480.

(f) MAYON *oper.* p. 355.

Hæc omnia tamen rara sunt & morboſa, & in homine ſano vix principium (*g*) fermentationis locum invenit, quam in cibis vegetabilibus continuo multa vis adfluentis liquidi humani opprimat; & in carnivoris putredo conſequatur (*h*), & ipſa quidem imperfecta. Certe, qui cibi ex ventriculo exeunt, neque fermentationis ſigna, neque omnino acoris edunt: Caſeus enim in ventriculo, ex lacte coactus, nunquam in duodenō adparet: neque odor ullus acidus eo loco ſupereſt. Neque enim ex vera fermentatione ſalubris dulciſque chylus unquam naſceretur, neque muſcilagiноſa nutritii ſucci natura poſſet conſervari (*i*).

Si fermentatio in ventriculo non perficitur, neque plenus calor oritur, quem alioquin ſat magnum ex ea cauſa novimus fieri, ut maltæ exemplo (*i**).

§. XXIV. III. *Putredo.*

Cum omnes humores animalium ad naturam putredinoſam vergant (*a*), & acidæ naturæ exigua veſtigia (*b*) retineant, facile intelligitur, cibi acidam degenerationem ita debere ſuperari, ut in putredinoſam indolem vergat.

Ejus ad putredinem inclinationis plurima in ventriculo veſtigia reperiuntur: ipſe fætor eorum, quæ ventriculo continentur, in carnivoris eſt de putredi noſo genere.

Peſſime olet aquilæ anima (*c*), & leonis, & cibus in ventriculo avium potius ſtercoris (*d*) pædorem habet. In piſce cane ventriculus plenus fuit gelatina putridiſſima, in quam cibus computruerat (*e*). In ventriculo ſerpentis fætidiffimus halitus eſt (*f*) abſque acoris veſtigio.

(*g*) QUESNAY *Eſſ.* III. p. 12. 13. BOHN. p. 134. Addit, alcohol. ex contentis ventriculi non poſſe parari BOERHAAVE *præleſt.* T. I. p. 279. Oriri de bove TEXTOR *de ſaliv.* p. 38.

(*h*) Fermentatio eſt primus gradus ducens ad putrefactionem MACQUER *Chym. prat.* T. II. p. 321. LISTER *humor.*

(*i*) Credit in vino ſupereſſe LORRY *des alim.* p. 81. Sed quæ in animalibus alunt, blandæ ſunt omnia, & inſipida, ab omni natura vinoſa aliena.

(*i**) Malta fermentans generat gradus coloris R. 30. le BEGUE *du ſublimé* p. 311. Neque tamen hæc conſtanter ita ſe habent. Contenta ventriculi cuniculi, neque cum acidis, neque cum lixivioſis efferbuerunt, neque ſuccos cæruleos tinxerunt, cum herbis aleretur. Et eadem ſucci de eodem ventriculo ſumpti indoles fuit. Et quæ homo ab emetico revomebat, perinde neque acidi ſigna dederunt, neque alcali. Sed etiam caro ovilla elixa cum braſſica, ſaliva & aqua loco clauſo adeo non efferbuit, ut putreſceret BLAND *coſt. alim. in ventric.*

(*a*) L. V. p. 84.

(*b*) Ibid. p. 93. ſeqq.

(*c*) WILLUGHBY *ornithol* p. 27.

(*d*) MOEBIUS *inſtit.* p. 188. TILING *vas. brev.* p. 361.

(*e*) DAMPIER *travels* T. III. p. 87.

(*f*) GEUDER *ferment.* p. 71.

Hyænæ ventriculus olidissimo cibo plenus (*g*). Qui canes ob sumunt opium cibum non digerebant; iis fætidissima fuit anima (*h*). Ex ventriculo canis vivi fætor stercoreus (*i*).

Sic in homine, quæ in ventriculo ob obicem aliquem manserant, ea foetida fuerunt (*k*); & qui omnia post 24. horas revomebat, putrida quidem reddebat (*l*).

Sed ipsa pariter vegetabilia diuturniorem per macerationem putrescunt. Aqua, in qua scœnum infusum fuit, foetorem equini stercoreis induit, ut manifestam analogiam habeas (*m*).

In ventriculo primo, secundo, tertio vituli, inque primo & secundo ventriculo capellæ (cujus reticulum non numeratur pro ventriculo), tinctura malvæ sæpe viridescit (*n*); & destillati cibi alcalina elementa reddunt: odorque inest putredinosus (*o*),

Perantiqua hinc est opinio, quæ cibos in ventriculo docet putrescere. Eam HIPPOCRATES (*p*), EMPEDOCLES, PLISTONICUS, DIONYSIUS ÆGEUS (*q*) & DIOCLES tenuerunt. Inter nuperos *Martinus* LISTER (*r*) & Cl. KNIGHT (*s*).

Utique enim mutationes, quæ in cibus a viribus coëtricibus ventriculi, potissimum humani, nascuntur, propiores sunt putrefactioni, quam fermentationi (*t*). In buteone fatuus fuit carnis in ventriculo tabescentis odor, qualis putredinem præcedit (*u*): tum in cane (*w*). Quæ ita interpretor, ut priori tempore acor in cibus nascatur, posteriori huic acori putredinis initia superveniant: omnino ut etiam in iisdem cibus fieri contingeret, si sibi permitterentur; cum præterea adfusi humores humani omnes plus habeant de natura putrescibili.

(*g*) VESLING *Epist.* VI.

(*h*) SPRÖGEL p. 35.

(*i*) TILING *vas. brev.* p. 362.

(*k*) De HAEN. *de morb. nov.*

(*l*) H. v. HEERS p. 250. PLANQUE *Bibl. T.* III. p. 499.

(*m*) JOBLLOT I. p. 39.

(*n*) VIEUSSENS *trait. des liq.* p. 276.

(*o*) PEYER *merycol.* p. 140.

(*p*) Cibus in junioribus facile putrescit (ἀκροσάπες) HIPPOC. περί τροφῆς.

(*q*) CELS *præf.* p. 6. Conf. le CLERC *Hist. de med.* p. 38.

(*r*) *De humor. c.* 3. *aq. med. Angl. Ed.* 2. p. 86.

(*s*) *Vindicat.* p. 12. 26.

(*t*) BOERHAAVE *Elem. Chem. T. II.* p. 292.

(*u*) REAUMUR l. c. p. 471.

(*w*) FOELIX *Exper.* 7.

Sed neque plena in hominis ventriculo putredo obtinet, etsi obtinet forte in cibis diutius retentis (x); inque animalibus sincere carnivoris.

In buteone ipso non putrescebant cibi in ventriculo (y) retenti, etsi non cocti utique fætent (z); & succus ventriculi solus cum cibis in calore utique in olidam naturam transit, uti dicemus (a).

Deinde certum est, massam ciborum, qui de ventriculo exeunt (b), ut absque eminente aciditate, ita absque perfecta putredine esse: Neque enim aut alcalinas dotes ullas declarat (c); aut fervet cum acidis, aut absque magna acoris (d) portione est, etiam postquam intestinorum actio accessit; neque demum fætet, dum est in tenui intestino. Et tamen fætor ante naturam alcalinam nascitur (e). Vera enim putredo, uti nunc certe confectum est, utique naturam alcalinam producit, etiam in humoribus humanis, & in fæcibus animalium (f). Uti vicissim plena & absoluta putredo salem alcalinum destruit (g), effetamque & inertem massam relinquit. Credam facile ipsos olidos vapores esse ad phlogiston per vim putredinis evolutum, quod aut cum fixo sale (h), aut cum acore (i), in alcalinam volatilem naturam abire aptum est, & nunc per ipsum fætorem disperiit, massamque salis expertem relinquit; neque plantæ ullæ salem alcalinum fixum combustæ dant, nisi quibus sal essentialis acidus inest (k), sal autem fixus ex acido generatur.

Ex putredine gastrica calor vix ullus oritur, etsi enim magnæ pilæ congestæ fœni (l) pilorumve (m), sponte incalescunt, & ignem con-

(x) p. 322.

(y) REAUMUR *Mem. de* 1752. p. 453. 471. 473. 485.

(z) p. 485. 486. 487.

(a) Conf. p. 335.

(b) BOERHAAV. *Elem. Chem.* c. 93. 94.

(c) In L. XXIV.

(d) GABER *miscell. Taurin.* T. I. p. 84.

(e) HOME *agricult.* p. 83. DOSSIE *introd.* p. 66. p. 286. GABER *ibid.* p. 77. seqq.

(f) Sal volatilis in stercore columbarum sponte generatur HOME *ibid.*

(g) Caro putrida, cum igne subiecto ejus elementa destillarent, minus dedit salis volatilis, quam recens NAVIER l. c. p. 40.

(h) HOMBERG *Mém. de l'Acad. quest. med.* 9.

(i) Conf. WALLER *Chem.* p. 281. 389. Ex nitro cum carbone distillato sol alcalinus volatilis habetur *Mém. de* 1717. p. p. 334.

(k) K. *Swenska Acad. handling* 1760. p. 155.

(l) HJÆRNE *Act. labor.* p. 36.

(m) THEVENOT *Voyage* T. II. L. I. c. 7.

cupiunt, & panni a propria corruptione incensi, in speciem falis vel carbonis abeunt (*n*), non tamen finit humor perpetuo adfusus quidquam in ventriculo simile prævalere. Calor ex carne & farina avenacea cum saliva putrescere natus, non superavit tres gradus (*o*).

§. XXX. IV. *Rancescentia.*

In adipe & in oleis acor (*a*) quidem est plurimus: non tamen acefcunt corrupta, & in ventriculo diu quidem cruda manent. Quo plus butyri cibis admiscueris eo tardius exit, etiam tertio demum die (*b*). Omenti pars quadragesimo demum die per inferiora descendit (*c*); & adeps post quatuordecim menses.

Alias pinguedo per vomitum coacta rejicitur febi (*e*) similis, acidi puto prævalentis humoris vi indurata. Fulca materies inflammabilis, de chocolata corrupta vomitu rejecta (*f*) legitur.

Plerumque tamen in liquamen sensim contabescit, ingratis (*g*) faporis (*h*), odorisque, & flammam concepturum (*i*); & eo pertinent sputa ardentia (*k*), & vomitus inflammabiles (*l*), quos veteres dicebant *biliofos*. Corruptos cibos esse, quæ vulgo ita vomuntur, HELMONTIUS ostendit (*m*). Quare Cl. cæterum virorum, potissimum trans alpes, large in morbis acutis data olea; aut spermatis ceti in pictoris obstructionibus usum, ego quidem nunquam ausus sum imitari, qui etiam balsama naturalia, adeo manifesto acidiora, rancescere, & asperæ arteriæ infedisse, pene strangulante cum acrimonia, nimis sum expertus. No-

(*n*) *Hist de l'Acad* 1725.

(*o*) PRINGLE p. 400.

(*a*) L. I. p. 31. 32.

(*b*) *Eph. Nat. Cur. Vol. 10. obs. 4.*

(*c*) *Alex. BENED. L. XIX. c. 5.*

(*d*) TULP. L. III. c. 18.

(*e*) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 253. HOFMAN de remed. benign. abus.*

(*f*) HOFMAN *Med. Conf. Cent. II. Dec. II. c. 4.*

(*g*) Amara est cum falsedine gelatina, in quam ossa vel vim ventriculi animalis carnivoris redacta sunt REAUMUR p. 480.

(*h*) In buteone, REAUMUR p. 480.

(*i*) BOERHAAV. T. I. p. 254. *Elem Chem. T. II. p. 113.*

(*k*) p. 320.

(*l*) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 3. obs. 154.*

(*m*) *Pylor. rector. n. 13. 25.*

biscum Cl. & expertissimus TISSOTUS (*n*). Cæterum & parcior pinguedinis usus, & adfusa maxima vis aquæ humanæ, facit; ut hæc degeneratio paulo rarior sit, quam acida. Non infrequenter tamen ex vitellis ovi, nimia copia adsumptis, supervenit, quo non alius cibus difficilius coquitur (*o*), idem vero oleo plenissimus (*p*) est.

§. XXXI. *Commistio ciborum in massam similem informem.*

Nunquam album (*a*) chylum in ventriculo vidi sed a peracta digestionem cineream, aut flavam, pultaceam (*b*), mucidam uniformem massam, in qua nullam partem ciborum distinguebam, neque olera neque panem, neque carnes, neque vinum (*c*). In ruminantibus viridis est (*d*). Perinde mucida sub pyloro ciborum massa est (*e*), & per intestina tenuia.

Adparet adeo vires ventriculi ex figurato, celluloso pane, fibrosa carne, pastacea farina, succosis fructibus horæis, albo lacte, vino rubro, in unam uniformem, æqualiter mollem massam pultaceam consentire, in qua figura quidem & fabrica peculiaris deleta, dotes nimix, odoris, saporis, coloris, propriæ species abolitæ, durities subacta, & uniformis mucosa, mediocriter odorata, fatua natura ex omnibus temperata fit. Etiam quadrupeda (*f*), aves (*g*), pisces (*h*) & serpentes (*i*), in similem mucum tota animalia dissolvunt.

Oportet autem ventriculum non nimis cito a sumto cibo aperire: id enim si factum fuerit, poterit cibus non mutatus, & panis cum sua laminosa fabrica, ibi reperiri, & spiritus vini odor, & olerum folia colorque superesse. In intestino quidem nihil simile unquam reperi, quod in

(*n*) *Febr. bilios. Laufann.* p. 54.

(*o*) LINN. *Skonska resa.*

(*p*) SPIELMANN *Inst. Chem.* p. 77.

(*a*) Affirmat, se in canibus vidisse VERHEYEN L. II. p. 211. & in humano ventriculo, cum vulnere pertusus esset.

(*b*) FOELIX *Exp.* 8. VALÆUS p. 764. Conf. PEYER *obs.* 18.

(*c*) A vino rubro nigricantem PLEMPPIUS vidit, *fundam. med.* p. 124. In lupo nigra massa SENAC *Ejff.* p. 121.

(*d*) PEYER p. 184. DUVERNEY II. p. 482.

(*e*) WEPFER *cicut.* p. 119.

(*f*) p. 311. 312.

(*g*) p. 312. 313.

(*h*) p. 312. 313.

(*i*) p. 313.

ea cibus non veniat, nisi a perfecta coctione. In morbis tamen etiam per intestina propria ciborum figura, colorque propius superest: tum in vulnere intestini.

Nihil autem magis inopinatum in ventriculo nascitur, quam lapillus: & tamen is partus est ex frequentioribus. Non retrogradum volo calculum (*l*) biliarium, neque ex absorbentibus terreis natum cretaceum calculum (*m*), fæcesque pene putrefactas in ægrorum animalium ventriculis (*n*). Sed calculum terreum & sublixiviosum (*n*^{*}), in analysi daturum, ut calculus vesicæ, terræ multum (*o*), salis volatilis pauxillum (*p*), & multum generantem aeris.

Frequens est phænomenon in multis animalibus, equo (*r*), bove (*s*), ibice (*t*), etiam in columba (*u*) aliisque. In occidentali bezoar possis moram accusare, in marsupio peculiari (*w*), in quo bezoar reperiri scribunt. Sed in homine nihil est simile. In ventriculo lapilli reperiuntur, ubi nullus moræ locus videtur, copia etiam magna (*x*), & pondere non modico.

Videas ex sedimento quidem tartari vini simili nasci, quod ipsum vomitu redditum est (*y*).

Videtur vel ex potu, particulis terreis pleno, sedimentum decedere, ut alias ostendetur (*z*), vel eam ipsam terram ossiculorum, aliarumque partium animalium per vim acidam erofarum, extrahi, uti ex ossibus etiam & crystallos & terram ope aceti eduximus (*z*^{*}).

(*l*) *Journ. de Trev.* p. 1110. HEISTER. *annal. jul.* 1726. M. Aug.

(*m*) ESCHENBACH *rarior. anat. med.* n. 9.

(*n*) PLANQUE II. p. 42.

(*n*^{*}) *Phil. transf.* n. 475. n. 7. ex equo.

(*o*) In LOWERIA ad $\frac{11}{12}$. SLARE & KOENIG.

(*p*) KOENIG in Laweriæ historia ad $\frac{1}{22}$.

(*r*) *Mus. Closter.* p. 19. &c.

[*s*] *Aët. Suec.* 1725. p. 79.

[*t*] *Galer. di Minerv.* I. p. 18. C. a COSTA.

(*u*) Strangulans animal lapillus *Gener. hist. of birds* T. II. p. 217.

(*w*) *Petr. de OSMA* apud MONARDEZ L. III. p. 39. quem habet a COSTA *hist. natur.* L. IV. c. 40. 41.

[*x*] Ad quatuor l. KOENIG. Duas volas replentes HOFER: alia exempla vide in *Journ. des Savans* 1690 init. apud SCHNEIDER *catarrh* T. III. p. 240. CARDAN *contradict.* L. II. tr. 5. 175. Uncialis calculus *Phil. transf.* n. 250.

[*y*] PANAROL. *Pentec.* I. obs. 3.

(*z*) L. XXVII.

[*z*^{*}] *Form. des os.* p. 193.

S E C T I O V.

C A U S Æ C O C T I O N I S C I B O R U M.

§. I. *Liquor macerans.*

PEne omnia, quæ certa fide scimus, in priori sectione dicta sunt. Superest, ut per singula ostendamus, inter causas, quas exposuimus, mutationis ciborum, quam quæque partem ejus mutationis producat.

Et primum utile videtur fore, ut eas causas primas contemplemur, absque quibus nulla omnino in ullo animali ciborum coctio locum habet. Earum enim in novis phænomenis cibi digesti, producendis maxime erit dignitas.

Nullum ergo animal quadrupes; neque avis, neque piscis, neque insectum est, absque plurimo humore, qui ad novum cibum in ventriculo adfunditur: absque spontanea mutatione in acorem, aut in putredinem, quæ ex natura cibi pendet: neque absque aere aut atmosphærico, aut interno, qui se expandat elasticus.

Plurimi pisces, & angues; & aves aliquæ (*a*), sunt ventriculo membranaceo, qui etiam distensus, inque nodum tumens, deglutita animalia cum plumis & ossibus concoquit. Tritus ergo a ciborum coctione abesse potest (*b*), & tamen cibus coqui. Neque mora (*c*) in coquendo multo major est tritu carentibus, quam in animalibus musculofo stomacho instructis. Galeus intra paucas horas (*d*) ad cutem usque feminam consumsit. Afellus (*e*) Cabeljaw intra sextam horam pisces devoratos concoquit. Post dimidium (*f*) diei caput deglutiti piscis consumtum erat. Celeriter Lucius (*g*) prædam digerit. Sic buteo intra 24. horas, car-

[*a*] Ut famelicus, ille cuculus, cujus ventriculus totum abdomen replet, & undique cellulosa tela adnectitur. HERRISANT. *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 420. 421.

[*b*] BERGER p. 137.

[*c*] Lente lucium digerere, & per aliquot dies. RICHTER *ichthyothéol.* p. 192.

[*d*] TOWNE in RAI *Epist.*

[*e*] ANDERSON p. 79. magnos etiam cancos devorat.

[*f*] RICHTER *Ichthyothéol.* p. 341.

[*g*] LEOPOLD p. 621.

carnem perfecte coxerat (*b*): & (*i*) canis intra 24. horas os, quantum ejus fieri potest, resolvit.

Hic succus iis in animalibus fere solius ventriculi est progenies, aut certe ab appendicibus cæcis pylori suffunditur (*k*), subsalsus uterque, ille tenuior, hic acrior (*l*).

Gastricum humorem aquæ (*m*), quæ pauxillum salis lixiviosi dissolutum teneat, vires (*n*) habere videtur. Ejusmodi autem liquores potenter resolvunt, & per nupera LEVRETI (*o*), experimenta etiam caseum in sua elementa diluunt, & crustam sanguinis inflammatoriam colliquant.

Videtur ejus succi copia aliqua & abundantia requiri. Hinc in œsophago lentius carnes coquuntur in ventriculo celerius, ubi major ejus ubertas (*p*). Recte inter causas coquendorum ciborum primo loco recensetur, quod solus nunquam desit, etiamsi & saliva (*q*) abest, & appendices pyloricæ nullæ sunt (*r*).

Appendicum mucus & ipse subsalsus est (*s*), & etiam in calidis animalibus, maxime de ruminantium classe, immensa in ventriculo, potissimum quarto, mucis vis est.

Ejusmodi mucus non unice villosam tunicam tuetur, & a nervis subjectis ciborum aut potus avertit acrimoniam; sed etiam in coctione cibi suas egregias partes ornat. Mucus enim soluto gummi (*t*) proximus est. Sed ejusmodi gummi cum oleo fluido, & cum balsamis misceri potest, ut cum aqua in albam emulsionem abeat. Diximus autem, non aliam partem coctionis difficiliorem ea esse, qua olea solvuntur (*u*).

(*h*) REAUMUR *Mém. de l'Acad.* 1752. p. 469. 470.

(*i*) ANDRY *alim. du Careme* p. 13.

(*k*) p. 302.

(*l*) Ibid.

(*m*) p. 142. 143. Acrior quam saliva DEIDIER *humor.* p. 50.

(*n*) Vires hujus phlegmatis extollit KUNKEL *obs. chym.* p. 62. Esse verum fermentum L. a CAPOA *dell'incertit. delli medicam.* p. 56. 57. VIEUSSENS *remot. & prox.* p. 145. 146. Partem facit liquidi solventis BOHN *menstr. anim.* p. 484. KERGER *ferment.* p. 198. 199.

(*o*) In nupera *art d'accoucher* p. 319.

(*p*) p. 313.

(*q*) In piscibus.

(*r*) p. 313.

(*s*) p. 302.

(*t*) LEWIS *mat. med.* p. 297.

(*u*) p. 211. 324.

Neque oportet liquorem ventriculi contemnere, quod mittis, quod nullo pungente sapore sit conspicuus. Nam etiam viperarum venenum, adeo funeste efficax, dulce est (*w*), & albumen ovi difficillimam solutu myrrham liquefacit (*x*). Denique cum sola aqua tritum lignum in teredine perforatur (*y*).

In animalibus perfectioribus saliva accedit: magna quidem copia (*z*), in qua aquæ vis exiguo iterum salis lixiviosi (*a*) momento quasi acuitur. Ostendimus dudum, absque ea appetitum & cibi coctionem languere. Vires habebit gastrici liquoris.

Merito adeo salivam inter præcipuos (*c*) liquores digestivos Cl. Viri receperunt, ut tamen, & recte, pancreaticum succum (*d*), & liquorem ventriculi (*e*), & intestinorum (*f*) conjungerent.

Quomodo hæc aqua operetur, non repetimus (*g*), nisi quod vis illa salina in solvendo oleo, & in ipsis etiam glutinis (*h*) minima elementa conjungentis resolutione adjumento sit.

Neque repeto, ab his adfusis mitibus liquoribus degenerationem acidam & putredinosam nimiam inhiberi.

§. II. Corruptionis Spontanæ vires.

Etsi nunc multum in ventriculo ad coquendos cibos succus potest: etsi acoris signa minime rara (*a*) sunt, non ideo oportet fermenti no-

(*w*) REDI &c.

(*x*) MACQUER *Chem. prat.* T. II. p. 483.

(*y*) ADANSON p. 266.

(*z*) p. 58. 59. 60.

(*a*) p. 55.

(*c*) BOERHAAVE, BOHN. *menslr. anim.* p. 474. COKBURNE *Oecon. anim.* p. 10. VERHEYEN L. II. p. 257. 258. GASTALDI *de saliva* apud TRIVULT 1715. Juill. TEXTOR l. c. p. 58. PRINGLE l. c. p. 413. HOFMAN *de saliva* & in *Physiol.* BAGLIV p. 393. etiam MATTEI p. 7. DUCCINI p. 47. DUNCAN *chem. natur.* iste cum spiritu animali sulphureo, & cum liquore ventriculi.

(*d*) BOHN.

(*e*) BOHN. DUNCAN. DUCCINI.

(*f*) BOHN.

(*g*) p. 311.

(*h*) L. I. S. 1.

(*a*) p. 315. seqq. Exempla acidi humoris animalis, qui durissima corpora solvat. Succus vesperæ cujusdam ichneumonis sabulum in pastam resolvit BONNET *contemplation de la nature* II. p. 245. Insecta pour de bois habent liquorem acrem, qui chartas, ligna, lapides, metalla dissolvit THIBAUT p. 113.

mine (b) uti, quod cibos in naturam animalem salubrem convertat, & etiam minus id fermentum decet cum acido (c) succo, aut cum aqua forti comparare (d).

Nam neque in spititu (e) nerveo, neque in saliva (f), neque in succo pancreatico (g) acor manifestus ullus est.

Frustra etiam quisquam, imitatus liquores acres chemicos, liquorem corrodentem invenerit, qui carnem in pulvem resolvat (h); eoque fine olei vitrioli (i), acrimonia uti voluerit, aut spiritu nitri cum cornu cervini spiritu, & saliva, chylum ex carne coquere (k). Non succedere reperit VERHEYENIUS, cum ab ea tamen opinione non esset remotus (l).

Ipsa dudum HELMONTIUS tamen docuit, acorem fermenti ventriculi esse humanum, peculiarem, ab omni fossili, aut vegetabili acore (m) diversum, fermentationem cibi etiam aliam esse ab ea, quæ spiritum vini generat (n), neque in vasis nostris acorem nullum habitare (o). Nempe per ea adparet, quæ præmisimus, acorem degenerationem quidem esse ciborum, valde frequentem (p), sed degenerationem tamen, quæ non ducat ad naturam humanam, ut quæ sit alcalinæ proprior (q). Acor etiam fibras animalium potius indurat & conservat, ut incisores solent aqua aluminosa aut aceto ad suos labores carnes conservare, quas lento opere demum rimantur; idem oleum ita non resolvit, ut vehementer cogat, & tamen multa pars nostri alimenti est pinguitudo, quam in sano homine nunquam videas cum sua conservata specie de corpore decedere.

(b) HELMONT. *sextupl. digest.* n. 2. 3. 4. 11. 12. 13. *calor. effic. non digerit.* p. 167. PASCAL p. 283. P. CASTELL. l. c. MAJOR de *ærumn. gigant.* *Tr. des malad. de l'estomac.* p. 194. 195. REGIUS *Phil. nat.* p. 245. TARGIRUS p. 127. SENGUARD. *Phil. transf.* n. 292. SYLV. *diff.* l. n. 12. &c. VIRIDET CRAANEN, etiam FANTON.

(c) P. CASTELL. *ibid.* HELMONT. *sextupl. digest.* n. XI. XIV. PEYER *merycol.* L. II. 3. SYLVIVS, CRAANEN : potissimum VIRIDET c. 10. 11. 12. SAVIOLUS.

(d) *Tr. des mal. de l'estomac.* l. c. CRAANEN de *homine* p. 31.

(e) SYLV. *diff.* II. n. 6. 24. Conf. L. X. nostr. p. 375. PASCAL.

(f) p. 36. *Prax. med.* T. V. ap. p. 713.

(g) *Diff.* X. n. 37. 40. Ostendetur L. XXII.

(h) BIRCH T. I. p. 83.

(i) BOYLE de *util. philos. Exper.* p. 118. &c. *fluid. firmit.* p. 244.

(k) LEIGH. *Phil. transf.* n. 162.

(l) L. II. p. 266.

(m) *Sextupl. digest.* n. 14.

(n) *Spirit. vit.* p. 157.

(o) HELMONT. *pleur. fur.* n. 14. 15. 16. 17. 18.

(p) p. 315. seq.

(q) L. V. p. 84.

Denique acoris tempora in ventriculo brevia esse, & cito putredinem supervenire, experimento constat (r).

Vide, si placet, & alios contradicentes (s).

§. III. *Putrescentia.*

Putredinis major vis est. Ea enim utique omnia corpora animalia & vegetabilia in pulvem (a) reducit: glutine, ut videtur, elementorum dissoluto (b): sive ipse aer id gluten sit, sive ab aere se expediente destruantur. Ostendimus tamen etiam eam degenerationem non plenam in ciborum coctione (c) admitti posse.

Aere expansionem jam proposuimus. Ad eam alii coctionem reducunt (d). Multum vero usi sunt (e) PAPINIANO lebate (f), vasis nempe duobus sibi congruentibus, clausis, ut aer effugere nequeat; in quibus ossa cum aqua reposita, brevi tempore in gelatinam emolliantur (g), & friabilia fiant (h), & succus inde glutinosus exeat (i), atque cartilagine in gelatinam abeant (k). Calor autem aquæ tantus est, ut gutta intra quatuor (l), & intra tria (m), minuta secunda exhalando dissipetur, & stannum atque plumbum fundantur (n).

Quare recte repositum est, ventriculum cum machina PAPINI (o) non bene comparari, cujus fervor calorem nostri ventriculi immensum

(r) p. 321.

(s) VALISNERI *Galer. di Minerv.* T. VI. p. 86. GEORGI *de homine* p. 77. seq. HECQUET *de la digest.* Le FRANÇOIS *reflex. crit.* p. 310. 311. L. a CAPOA l.c. p. 52. seq.

(a) L. V. p. 89.

(b) Conf. KNIGHT. *vindic.* p. 6. 7. 12. 26.

(c) p. 323.

(d) KNIGHT. DRAKE *Anthropol.* p. 84. & certe pro parte VARIGNON. VERDRIES. LISTER *hum.* c. 9. p. 96. MORGAGN. *princ. Medic.*

(e) DRAKE p. 86.

(f) PAPIN. *Part d'amollir les os toto tr. & c.* 3. BOYLE *exper. phys. mechan. cont.* in art. 19. WOLF *Absichten der Theile* p. 32. 33.

(g) *Cap. II. Exper.* 6. 8. 9. *Cap. III. Exper.* 1. 6. In piscibus *Cap. II. Exper.* 13. 14. 15. *Cap. III. Exper.* 9.

(h) *Cap. III. Exper.* 3. 5. [de ebore quod nunquam emollitum fuit p. 109. *Contin. Exper.* 6. de ossibus.

(i) *Cap. III. Exper.* 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. *Contin. Exper.* 5. 6. 7.

(k) *Cap. III. Exp.* 3.

(l) *Cap. II. Exper.* 6. 9. 11. *Cap. III. Exper.* 7. 8. *Conten. Exper.* 7.

(m) *Cap. III. Exper.* 1. 3. 4.

(n) MUSCHENBROECK *Eff. de Physiq.* p. 434. NEUMAN *Oper.* T. I. p. 282.

(o) KEUGER *Physiol.* 104.

superet. Cum enim metalla fundat ; necesse est calorem vaporum in iis lebetibus excitatorum superare ebullientis aquæ calorem , qui tamen est ad ventriculi humani calorem ut 214. ad 96.

§. IV. Tritus.

Quæ animalia iis viribus folis cibum coquunt , quas nunc enarravimus , ea solas carnes pascuntur. Cum autem plurima alia animalia feminibus duro cortice tectis , etiam nucleis osseo putamine defensis vivant , non sufficeret ejusmodi vis diluens , neque etiam longissimo tempore tutela harum nucum superaretur.

Retinuit ergo natura macerationis vim , & aeris , inque ingluvie (*a*) vires istas ad præparandos duros eos cibos præmisit. Sed addidit eadem potentissimam vim tritus , qui dura legumina per ingluviem , succumque bulbi glandulosi (*b*) emollita , in pastam farinaceam conterit. In nonnullis infectis eum tritum auxit , additis in ventriculo dentibus.

Quare cum tritu ipsa metalla resolvantur , cum solo mechanico (*d*) procul dubio tritu artifex in anate cibi digestionem sit imitatus , eo minus est mirum , potuisse olim ERASISTRATUM , magnum virum (*e*) , & nuper ARCHIBALDUM PITCAIRN (*f*) jatromathematicum , & ejus sequaces (*g*) , a tritu ciborum in ventriculo mutationes repetere : alios moderatiores certe tritum (*h*) ad chylosin tamquam adjumentum adhibere.

(*a*) p. 110. seq.

(*b*) p. 138.

(*c*) In cancro *Hanov. Seltenh.* I. p. 514. PEYER *mercol.* p. 12. MURALT. *Vadem.* p. 585. WILLIS *anim. brut. tab.* 3. f. 1. In cancello quinque dentes SWAMMERDAM *bibl.* p. 202. in purpura duodecim *Phil. transf.* Vol. 50. P. 2. p. 587. In locusta RONDELET p. 136.

(*d*) VAUCANSON apud KELLMAR *hom. machin. natur.* p. 18. NICOLAI *von der Einbildungskraft præf.* p. 20. Adfine experimentum exstat LANGII , qui cibos madefactos. Pressos , in vesica bubula in massam chyli similem resolvit VERDRIES *de ventric.* p. 87.

(*e*) CELSUS *præf.*

(*f*) In *Diff. de modo quo cibo conf.*

(*g*) HECQUET *de la digestion* ; etiam FAGON apud le FEVRE *Physiol.* p. 50.

(*h*) RABOURS *Theff.* ann. 1737. Ergo tritus chylosin juvat. BOERHAAVE &c.

Neque adeo difficile fuerit de hac quæstione consentire. NATURA tritum quidam nullum adhibuit in piscibus & in serpentibus (*i*) mere carnivoris. Vim maximam, ventriculi in avibus adhibuit, quibus neque dentes sunt, quibus femina commolant, neque diaphragma quod in ventriculum nitatur, & quæ tamen duro victu utantur (*k*).

Pure ergo granivoris ventriculum durum dedit (*l*) Præcipit eadem ingluviem macerationi unice destinatam, tanto majorem, quanto durior cibus est (*m*) Dedit etiam fortem ventriculum quibusdam omnivoris, ut anatino generi, insecta quidem, sed pariter grana pascenti; avibus scarabæis durisque insectis vescentibus, alaudæ (*n*), passeri (*o*), caryocatactæ (*p*), arquatæ (*q*). Plerisque vero omnivoris, quibus ex granis feminibusque cibus fit, ventriculum fecit debiliorem, ut graculo (*r*), monedulæ cornubicæ (*s*), turdo (*t*), merulæ torquatæ (*u*): aliis etiam membranaceum, ut nycticoraci (*w*), picæ (*y*), pico (*z*), meropi (*a*).

Mere piscivoris & carnivoris omnino debilis est ventriculus: fabrica quidem priorum ventriculo similis, similibusque tendinibus, sed musculo-losa carne non robustiori, quam est in quadrupedibus.

Fabrica carnivororum animalium quadrupedum pene eadem est, quæ avium. & tritus mediocris cum multo humore macerante conjungitur (*b*): tamen ob dentes, ob diaphragma, & robustos abdominis musculos,

(*i*) p. 270.

(*k*) p. 116. 117.

(*l*) Ibid.

(*m*) p. 111.

(*n*) Ibid. p. 116.

(*o*) Ibid.

(*p*) Ibid.

(*q*) Ibid.

(*r*) p. 115.

(*s*) Ibid.

(*t*) Ibid.

(*u*) Ibid.

(*w*) p. 114.

(*y*) Ibid.

(*z*) Ibid.

(*a*) Ibid.

(*b*) Vocat ventriculos mediæ fabricæ ILL. REAUMUR *Mém. de 1752. p. 487.*

plus aliquantum habet de tritu. Granahordei cocta buteo non digerit (*c*), neque panem (*d*): homo utrumque cibi genus coquit. Natura enim hominem magnæ varietati ciborum destinavit, viresque dedit ad omnes accommodatas. Facile vero credas, hominem Europæum ventriculo esse debiliori, quam quidem ex NATURÆ dono esse posset. Ostendimus, gentes sibi permissas, & artibus destitutas, majorem copiam ciborum ferre & coquere (*e*), & crudos subigere (*f*).

Recte fecerunt, qui tritus vires, ex hypothese in immensum auctas, ad suam mediocritatem reduxerunt (*f*^{*}).

Non bene, qui omnem tritum a digestionem removerunt, quod absque eo piscium (*g*) ventriculus cibum coquat: quod in nonnullis exemplis, absque tritu animalia vixerint, ut in struthione, cui clavus transfixus parietes oppositas ventriculi a contactu prohibebat (*h*); quod homines cum devoratis cultris in ventriculo sedentibus diu supervixerint (*i*), & etiam integram valetudinem iis excisis recuperaverint: quod hydropici absque viribus musculorum abdominis recte appetant (*k*); & ob alia ejus generis argumenta.

Nam si pisces absque tritu cibum coquunt, acriorem iis succum ventriculi esse necesse est: qui spinas piscium & devoratorum animalium ossa etiam absque mora dissolvat (*l*), quale quid supra vires ventriculi humani est. Uti vicissim debiliior avium granivorarum succus est, cum caro in tubis ab iis devoratis non mutata fuerit (*m*).

Neque homo cultrivorus, eadem, qua sanus homo, facilitate cibum coxerit, etsi a succo macerante tamen aliqua pars resoluta est, idemque fluido forte potissimum alimento vixit. Hydropicis diaphragma superest (*n*), & certe ob pressionem sublatam ventriculi perpendicularis

(*c*) REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 477. 478. 479. 301. *Journ. des Savans* 1753. Juill.

(*d*) p. 477. 478.

(*e*) p. 221. 222.

(*f*) Ibid.

(*f*^{*}) ASTRUC. HARSTOEKER *extr. crit.* p. 11. argumento baccarum.

(*g*) LISTER *conchyl.* p. 150. seqq.

(*h*) VALISNER *notom. d'un struzzo* p. 242. 243.

(*i*) p. 318.

(*k*) VIEUSSSENS *tr. des liq.* p. 267.

[*l*] p. 312. 313.

(*m*) REAUMUR *Mém. de* 1752. p. 303.

(*n*) HECQUET. *digest.* p. 161.

prava fuit digestio (*o*). Denique succus ventriculi cum calore cibum non digerit (*p*), & suæ putrilagini permittit, ut omnino ad rectam ciborum coctionem tritum requiri constet. Uti ergo natura in ventriculo nostro vires macerantes & terentes conjunxit, ita in causarum catalogo utramque oportet conjungere.

§. V. *Calor.*

Sunt etiam alia quædam coctionis adjumenta, absque quibus cibi digeri queat, sed quæ addita reliquis causis, tamen coctionem ciborum adjuvent. Non dubium est, quin calor, qualis in ventriculo modicus (*a*) est, & incubantis gallinæ calori similis, plurimum possit in solvendo glutine, gelatina diluenda, adipe emolliendo, macerante vi aquæ augenda, initiis fermentationis & putredinis introducendis.

Certe insecta fere absque cibo diu supersunt, dum cælum friget, & polypus æstate vorax, intra duodecimam horam digerit (*b*), hieme aut ferius, aut omnino ne adpetit quidem. Chamæleon hieme cibos vix coquit, & per anum crudeos dejicit (*c*): ita neque testudo hieme edit (*d*), & pancreata piscium hieme fere strigosa sunt (*e*).

Ita factum est, ex collectis & comparatis forte phænomenis ventriculi & artis coquinariæ, ut dudum methaphora invaluerit, quæ ciborum salubrem mutationem per coctionem (*f*) interpretatur. Neque longe abfuit, quin a calore (*g*) utique cibos solvi docerent, quam opinionem GALENUS (*h*) uberius ornavit.

(*o*) MANGET *bibl.* p. 77.

(*p*) REAUMUR l. c. p. 485. 486.

(*a*) p. 295.

(*b*) p. 169. 170.

(*c*) VALISNER II. 402. 403.

(*d*) CALDESI p. 29.

(*e*) LISTER *Exerc. anat.* II. p. 28.

(*f*) Πεψις HIPPOCR.

(*g*) HIPPOCR. apud CELS. *pref.* L. I. PLATO, calore cibos liquefieri: & POSSIDONIUS apud SENECAM: & CICERO *nat. deor.* L. II. p. 602.

(*h*) *De usu part.* L. IV. c. 8. *Facult. nat.* L. III. c. 8. Tum tota schola. Inter recentiores GALATHEAU. SCHOOK *de ferment.* c. 23. & C. DUCCINI p. 69. qui viscera carbonem vocant, ventriculum tamquam lebetem calefacturos.

Nuperi calori quidem non omnia, partem tamen officii ventriculi tribuerunt, ut ejus vim vel cum putredine (*i*) combinarent, vel cum aeris actione (*k*), vel cum saliva (*l*) pancreatica & bile.

Verum prior FERNELIUS (*m*) cibos a calore negavit coqui. Deinde HELMONTIUS (*n*) memores nos esse jussit facilitatis & celeritatis, qua pisces frigidissimi (*o*), suum tamen cibum coquant, aselli (*p*), lucii (*q*) aliique (*r*). Facile etiam foret ostensu, calorem cum cibis acorem, deinde putrefactionem (*s*) producturum, non dulcem chylum.

Nos, cum PORTIO (*t*) BOERHAAVIO, aliisque diversas causas, quas natura in coquendis cibis conjunxit, & ipsi conjungimus.

§. VI. *Causa non vera.*

Vermes (*a*), qui morbi sunt genus, ab hac theoria totos removemus.

Sic ciborum reliquias: adeo non coquendi causas, ut coctionem inhi-beant. Nunquam enim recte appetimus, neque digerimus, nisi quando ventriculum penitus evacuavimus. Quare ne inter auxilia (*b*) quidem coc-tionis eas reliquias admittimus. De spiritibus diximus.

§. VII. *Aliae ventriculi functiones.*

Primaria est, alimenti partem de ventriculo resumere.

Ostendimus in ore (*a*) partem utilis succi de cibis in minimas venu-las hauriri.

(*i*) LISTER.

(*k*) DRAKE MORGAN. *princ. med.*

(*l*) C. DEMOCRITUS *vit. anim. morb. & med.*

(*m*) *Abdit rer. caus.* p. 267.

(*n*) *Calor efficaciter non digerit sed excitativ. &c.*

(*o*) *Ibid.* n. 11.

(*p*) FABER *de homine* p. 201.

(*q*) L. a CAPOA *Risess.* T. IV. P. 2. p. 233.

(*r*) HECQUET *digest.* p. 253.

(*s*) p. 312. 313.

(*t*) *In Opusc.*

(*a*) VERCELLONUS ATKINS *navy surgeon.* p. 6. 7.

(*b*) VERHEYEN L. II. p. 257. 258. 259. CASTELL. l. c. p. 149.

(*a*) L. XVIII. p. 62. 63.

De ventriculo minime dubites, quin simili officio fungi aptus sit. Nam & venas in cavum suum patulas, quarum non aliud officium esse possit, & tunicam villosam similem villosæ intestinorum, & lymphaticas venas habet, bibulum vasorum genus; & succus coloratus etiam in cadavere in venulas sorbetur; inque polypis succus cibi rubri (*b*) [in exemplo] in toto animal se diffundit.

Ostenfum est, vim venenorum tunc potissimum operari, quando in ventriculo hærent, etiam belladonnæ (*c*), opii (*d*), cicutæ (*e*), œnantthes succo viroso (*e**).

Demum multi homines; cum omnia vomerent, diu tamen vitam tolerarunt, etiam satis integra cum valetudine (*a*), etiam ad octo annos (*b*), & ad viginti (*c*), & ad 26. (*d*).

Vixit etiam melancholicus homo, cui scirrhus (*e*) pene integre pylorum clauferat, & mesenterium simili scirrhus erat obstructum: tum alius, cui lapis (*f*) pylorum obturaverat, ut nihil permearet (*f**).

Credas, ad moram cibo injiciendam, & augendam superficiem reformatam, rugas & valvulas in variorum animalium ventriculis facta esse adeo perpetuas, ut a nullius, quantum reperi, animalis ventriculo absint. In primo (*g*) & tertio ventriculo (*h*), & quarto (*i*) ruminantium præsto sunt.

(*b*) TREMBLEY p. 126. 127. 131. 132. BAKER p. 129.

(*c*) RISUS sardonius, furor. *Journ. de med.* 1759. M. Aug.

(*d*) L. XVIII. p. 606. 607.

(*e*) WEPFER p. c. 8. ut desinerent symptomata, quam primum de ventriculo exierat:

(*e**) *Journ. de medec.* 1763. Mars.

(*a*) Du HAMEL *corp. anim.* L. II. c. 2. Cum omnia vomeret æger, mors post multos annos PECHLIN *Cent. I. obs.* 48.

(*b*) LOESECKE *obs.* p. 37. post dysenteriam.

(*c*) PLANQUE T. III. p. 499.

(*d*) *Journ. de med.* 1760. M. Aug. cum homo solum lac fumeret.

(*e*) HOECHSTETTER p. 240.

(*f*) SCHNEIDER *Catarrh.* T. III. p. 240.

(*f**) Conf. p. 383. 284.

(*g*) PEYER p. 103.

(*h*) ID. ic. 9. 10. PERRAULT t. 14. f. 4. VIEUSS. p. 273. 275. *Comm. Petr.* l. c. DE VERNEY T. II. p. 437. In ovis huanaco FEUILLET.

(*i*) PERRAULT *ibid.* f. 5. VIEUSS. p. 274. 275. DUVERN. T. II. p. 438.

In elephanti etiam ventriculo reticulatæ sunt valvulæ (*k*), & in urso (*l*), inque leone (*m*), cuniculo (*n*), suo (*o*), phoca (*p*), testudine (*q*).

Inter aves, in tarda (*r*). Inter pisces, in mugile (*s*), galeo (*t*), squadra (*u*). Inter insecta, in gryllotalpa (*w*).

Huc demum referas faccos minores quidem, tamen reticulatis quasi muris cinctos, ventriculi secundi (*x*), potissimum in camelo (*y*) amplos, qui ob eam forte fabricam sua aquæ penu contentus desertus Arabiæ tutus oberrat, toto ætate absque potu duraturus, ut a custode Dromedarii perfici percepi (*z*). Minime negaverim, etiam cibos eo loco retineri, & inter mobiles laminae conteri (*a*).

Moram autem cibus injiciendam præcipuum faciendarum valvularum finem fuisse, satis facile ostenditur. Non esse nempe ad facilitatem extensionis, ostendunt valvulæ tertii ventriculi ruminantium, & facci cameli, quos nulla extensio aboleat.

Neque ob augendam adeo faciem ventriculi exhalantem demonstrat duritas, ut in gryllotalpa.

Merito ergo partem aliquam tenuis humoris in ventriculo resorberi olim visum est (*b*).

Est autem tenue (*c*) & decolor, quod resorbetur, & spirituosum, & aqueum, neque major pars nutrientis in cibo materiei in ventriculi venas hauritur. Sæpe enim ex atrophia perierunt, quibus pylorus obstructus

(*k*) PARIS.

(*i*) Ibid.

(*m*) UNICA BARTH. *Cent. IV. Hist.* 1002.

(*n*) GREW p. 10.

(*o*) p. 14.

(*p*) RONDELET p. 261.

(*q*) PARIS.

(*r*) HARDER. *exercit.* p. 217.

(*s*) RONDELET p. 261.

(*t*) KLEIN *pisc. miss.* IV. n. 62.

(*u*) REDI *anim. viv.*

(*w*) PEYER *ruminant.* p. 8.

(*x*) PEYER *Merycolog.* ic. 6. p. 125. PERRAULT l. c. t. 14. f. 1.

(*y*) PARIS. *anat. anim.* P. I. p. 76. *Comm. Acad. Petr.* T. X. p. 341.

(*z*) Conf. p. 177. Arabes siti pressos inciso ventriculo camelorum sitim solari LABAT *Afr. Occid.* T. I p. 299.

(*a*) DUVERNEY T. II. p. 444.

(*b*) GUIDOT. *prolegom. de urin.* p. 37.

(*c*) IDEM.

erat (*d*), aut hepar ventriculum elisit (*e*), aut qui omnia revomebant (*f*). Cum enim nulla lactea vasa in ventriculo reperiantur, chylus ver usi i non gignitur.

§. V I I I. *Num alia ventriculo officia sint.*

Olim animæ sensilem sedem HELMONTIUS (*a*) in cardia posuit; ob dolorem forte, qui ea in sede intolerabilis est: ob deliquium animi singulare, quod ante vomitum, denique etiam a rafa tantum digitis cute ibi percipitur.

Nuper alia laude celebrior *Job. WOODWARD* (*b*), ex proprio ingenio medicus, sedem sensus, & originem animi adfectuum & cogitationum (*c*) in ventriculo posuit.

Omnia, ex Cl. Viri opinione, & bona & mala æger in ventriculo oriri (*d*) percipit: inde adeo omnes animi adfectus nascuntur (*e*) ut prius ibi quam in capite percipiantur (*f*), & a terrore quasi apertionis & clausionis sensus in stomacho sequatur (*g*). Qui musicam amaret, & ex ea vehementer adficietur, sensum, tanquam purgantis medicamenti eo loco (*h*) experiebatur.

Phænomena a Cl. Viro enarrata non refuto, neque non video, ventriculum a tristitia (*i*) pati, appetitum minui; vim coquentem a magna ira deleri, periculoso experimento: a nausea, mere morali de causa, ventriculum subverti.

Ea omnia ostendunt, tenerum sensum numerosissimorum in cardia nervorum esse. Cæterum ea non tollunt, quæ alias diximus, ut ostenderemus, præcipuam animæ sedem in capite esse (*k*).

(*d*) VITI *dialogh.* IV. p. 109. *Zod. Gall.* I. RICH *epidem.* II. p. 149. a scirrhis. *Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. obs.* 16. ab impactis nucleis.

(*e*) BECK. *de palpit. cord.* p. 34.

(*f*) SCHENK *Exerc.* p. 310.

(*g*) *Morbor. sedes in sensu.* p. 450. n. 11. *Jus duumvivat.*

(*h*) *Cases of physik.*

(*c*) p. 35.

(*d*) p. 31.

(*e*) p. 288. 292.

(*f*) p. 34.

(*g*) p. 5.

(*h*) p. 33.

(*i*) HARTLEY p. 189. qui tremores a cardia ad fauces, uvulam oculos, apicem nasi adscendere addit.

(*k*) L. X. p. 392. 393.

LIBER XX.

VELAMENTA ABDOMINIS.

SECTIO I.

MEMBRANÆ.

§. I.

ANTE ventriculum oportuisset hæc describi, nisi displicuisset, id cibi receptaculum ab œsophago separare.

Περιτοναϊος (a) membrana, vulgo *peritonæum*, dicitur membrana, quæ abdominis viscera, certe chylopojetica, continet. Pleuræ in univ-
ersum similis, ex brevi & robusta cellulosa tela stipata, crassior ad lum-
bos, ad musculum transversum tenuior, alba, parum vasculosa, nisi subtilior
injectio accesserit, dilatibilis insigniter a pastu, in graviditate, hydrope,
hernia, viscerum situ mutato; tamen ut subito aliquo conatu, a descendente
septo transverso (b), ab incurvatione qua abdomen contra pelvim (c)
complicatur, non adeo raro rumpatur, & herniæ veri nominis fiant.
Per morbos, ut alia corporis humani velamenta (c*), crassescit Senu
parco est, nullove (d); nervi enim qui peritonæo incumbunt, ad mu-
sculos abdominis videntur pertinere. Adfirmat quidem sentire Cl. van-
den Bos (e). Sed cum externa facies ventriculi, & intestinorum, vel
ipso fatente, non doleat (f), sibi ipsi respondet Vir Cl. nam ea facies

(a) POLLUX p. 260.

(b) In vehemendi dolore colico, ut ventriculus in ilia elaberetur *Aët. Budissin.* p. 80.
81. Vide *Histoir. de l'Acad.* 1752. n. 5.

(c) Nota est mors Reginae Daniæ, cum gravida dilapsam sibi flabellum relegeret,
herniam umbilici passæ.

(c*) TULP. L. IV. c. 44. *Mém. de l'Acad.* 1707. p. 504. LEIGH. *lancashir.* II. p. 73.
ad digitum *Journ. de Médec.* T. II. n. 5. ad quinque pollices *Phil. transf.* n. 460. Car-
tilagineum PARE L. XXIII. c. 36.

(d) In nostr. *oper. minor.* In paracentesi TOSETT *Lett.* IV. p. 18. In herniæ operatione.
CALDAN. *Exper.* p. 312.

(e) *Viv. corp. hum. solid. Exp.* 9.

(f) Ibid. JAUSSEMAND *Diff.*

peritonæum est. Sed ipsi RADNICZKYO (*g*) de sensu peritonæi non satis liquebat, cui de tendinum sensu abunde liquebat. Et fatetur LORRYUS, non sentire (*h*). Sed neque irritabile est (*i*), etiam adversariis fatentibus: neque fibras habet (*k*).

Natura peritonæo ea est, ut pars, quæ intestina & viscera respicit, glabra levisque (*k**) fit, eademque densior: inde sensim laxetur extrorsum, ut cuti sit propius, & demum in textum cellulosum degeneret (*l*): omnino ut & cutis, & pleura.

Non ideo duæ peritonæi membranæ sunt, quem errorem *Jacobus DOUGLAS* (*n*) vir olim candidissimus refutavit, deinde, *J. Benignus WINSLOW* (*o*), olim ab omnibus scholis receptum. Laminas (*p*) (intelligo veras, dissimiles separabiles. Nam in magnis animalibus in laminas dividi non nego (*p**).

Quæ lamina exterior dicta est peritonæi, in anulo spermatico celebrata, mera tela cellulosa est (*q*), exteriori faciei peritonæi circumjecta, inde varias in corporis partes continuata.

Quæ *duplicatura peritonæi* non bene dicitur (*r*), & inquam effusa aqua *saccatum* hydropem facit (*s*), eadem est cellulosa tela, exterius

(*g*) *Seçt. IV. Exp. 4. 5.* Incertus etiam fluctuat JAUSSE RAND p. 12.

(*h*) LORRY *Journ. de med.* 1756. M. Novemb.

(*i*) Ibid.

(*k*) VESALIUS p. 591.

(*k**) DOUGLAS p. 33. WINSLOW n. 25.

(*l*) Extus asperum est COLUMBUS p. 235. SPIGEL p. 214.

(*n*) Circa tempora qua revixit studium emendandæ sectionis calculi nempe circa an 1719.

(*o*) Duas faciebat ipse WINSLOW apud DOUGLAS p. 19. Emendavit Vir ILL. in *expos. anat.* P. IV. p. 25. & prius an. 1718. cum decem ab inde annos anno 1728. numeret ad MORÁNDOM *de calcul.* *Seçt.* p. 314. 315. Verum olim VESALIUS vidit L. V. C. II. & RUYSCH *Thef.* VII. p. 27. & inter nuperos DIONIS p. 172. A WINSLOWO omnes, ut BOUDOU ad PALEN p. 65. RENEALME *des hernies* p. 134. &c.

(*p*) J. SYLVII *diffect. corp.* p. 70. b. LAURENT. p. 285. RIOLAN. p. 94. 95. adhuc DUVERNEY T. I. p. 148. 91. *ibid.*

(*p**) Elephantio MOULINS p. 18. Tres in bove FANTON. Ed. II. p. 62. ad p. 41. In morbis abdominis C. A. a BERGEN *pia. mater.* TACCONI *rar. bern.*

(*q*) Non membrana LIEUTAUD p. 281.

(*r*) Male ita dici CHESELD. p. 68. Vidit AICHOLZ in *confil. med.* SCHULZII apud MORGAGN. *sed. caus.* II. p. 110. 111.

(*s*) COLLINS p. 166. PAW. *obs.* 5. BARTHOLIN. *Cent.* IV. *Hist.* 25. BOGDAN. *obs.* XI. HARDER *apiar. observ.* 93. TULP. L. IV. c. 44. *Zod. Gall. ann.* 11. *Mens. Mart.* JOB. van MEKREN. n. 49. *Bresl. Saml.* 1718. p. 13. 1725. M. Apr. *Mém. de l'Acad.* 1707. p. 514.

peritonæo circumposita : qui morbus diutius toleratur (*t*) cum viscera non corrumpat. Pro gravida ejusmodi feminam C. DRELINCOURTUS habuit (*u*).

§. II. *Humor peritonæi.*

Nunquam in corpore humano siccum reperitur, & humet undique viscida, pingui, olente aquula (*a*), quæ in pelvi frequenter collecta, rubella est aut fusca & ad ignem, aut meracum acorem, coagulatur, ut experiendo comperi. Subcalina est eadem & penetrabilis, quæ morbos artus in vivi bovis ventris dati potenter resolvat, ancylosin (*a**) paralyfinque (*b*). In ictericis flavum vidi & tingentem digitos : in aliis vaporem subtilem pro humore vero, qui percusso peritonæo erumperet. Is liquor ex arteriis generatur vaporis specie (*c*); non quidem de confpicuis peritonæi poris, quos nonnulli nimis manifestos fecerunt (*d*), Ex minimis guttulis confluit (*e*) quæ de presso peritonæo exeunt (*f*). Similis vapor exspirat ex omnium viscerum abdominis superficie, hepate (*g*), vesicula fellis (*h*), liene (*i*), intestinis (*k*), pancreate (*l*), mesenterio (*m*), ventriculo (*n*), omento (*o*). Ex arteriis omnino ge-

LEIGH *Exerc.* V. p. 131. 132. *Phil. transf.* n. 207. 259. 348. RESPINGER *Act. Helv.* T. I. ann. 1751. BLAIE. *Misc.* p. 36. 295. *Journ. de Méd.* 1761-Jul. 1759. May. Pintarum fere 95. MORGAGN. *Sed. caus.* II. p. 112. & libr. totidem STALP. C. II. n. 28. Quadraginta mensurarum la METTRIE *obs.* 10. Steatoma in ambitu peritonei MEKEL *Mém.* T. IX.

(*t*) Quadraginta quatuor annis, cum aquæ essent pintæ 51. *Eff. of a Societ. at Lond.* I. n. 2. 2. Librarum 125 diu gestatus ejusmodi hydrops BUDDÆUS I. *cas.* 29. 85. Adfinis huic est hydrops membranæ cellulosæ intestini recti CRATONIS *Consil.* L. III. n. 31.

(*u*) *Phil. transf.* n. 106. Peritonæum crassissimum erat.

(*a*) KAAUW n. 539.

(*a**) SHWARZ *dodec.* 1. *obs.* 9. in guttur bovis artus insertus DESPORTS p. 258.

(*b*) Historia CÆSARIS BORGIE huc pertinet. Paralysis brachii sanata eo remedio BOKELL L. II. n. 55.

(*c*) KAAUW. n. 539. 541. 542.

(*d*) FANTON *diff. anat.* p. 61. 62. in hepatis membrana JENTY *course of anat* T. II. p. 2. PEYER *meth. anat.* p. 49.

(*e*) KAAUW n. 540. 541. WINSLOW n. 26.

(*f*) KAAUW n. 557. DUVERNEY *posih.* T. II. p. 149.

(*g*) KAAUW n. 540. 542.

(*h*) Ibid. g.

(*i*) n. 540. 542. 562.

(*k*) Id. ibid.

(*l*) Ibid.

(*m*) Id. ibid.

(*n*) Id. ibid.

(*o*) Id. ibid.

neratur (*p*). Nam aqua in arterias abdominis data per omnem viscerum abdominalium superficiem similiter exsudat (*q*).

Ex glandulis separari vulgo docebatur, quas varii Cl. Viri etiam se vidisse (*r*) persuasi sunt, cum hydatides (*s*) viderent, aut tubercula sebacea (*t*) adipis concreti, aut nonnullas glandulas lymphatici generis peritonæo insidentes. Dudum ostensum est, non veras esse (*u*) glandulas.

In nonnullis piscibus, ut in delphino (*w*), legimus aquam marinam per proprium foramen in abdomen venire.

Ut de arteriis exhalat, sic in venas sani corporis resumitur. Injecta enim in vivi animalis abdominis aqua (*x*) ad uncias duas (*y*), & sex (*z*), brevi tempore evanuit resumta. Sed etiam vinum in abdomen canis impulsus post horas 48. totum disparuerat (*a*) & aqua laurocerasi celeriter de abdominis cavea resorbta est (*b*).

Deinde *Abrahamus KAAUW* in venam portarum ejusve ramos aquam injecit; eam pariter de omni externa superficie hepatis (*b**), lienis (*c*), pancreatis (*d*), ventriculi (*e*), intestini (*f*), mesenterii (*g*), vesicæ (*h*), vidit effluere. Videtur ea resorbtio per vasa lymphatica fieri (*i*). Hydrops,

(*p*) KAAUW n. 544.

(*q*) IDEM n. 555. 556.

(*r*) MANGET bibl. p. 820. BLAIR miscell. p. 40. BECKET ohf. 34. COWPER ad BIDLOI tab. 74. f. 5. FANTON. anat. I. p. 41. SAVIARD p. 495. In leone COLLINS p. 164.

(*s*) LUTHER de peritonæo n. XI. Phil. transf. n. 460. LEIGH I.

(*t*) FANTON opusc. filol. T. III. p. 293. T. IV. p. 79. ROEDERER disp. progr. Journ. de médec. II. n. 5. HAEN rat. med. T. VI. p. 81. Globulos in peritonæo septi transversi MORGAGNUS habet caus. & sed. I. p. 142.

(*u*) HEISTER compend. not. 6. Non esse naturalia tubercula LIEUTAUD p. 261. HENSING. n. 10.

(*w*) Phil. transf. n. 239.

(*x*) NUCK Sialograph. C. II. p. 27. J. L. PETIT traité des malad. des os T. I. p. 535.

(*y*) TANARON II. p. 139.

(*z*) KRAZENSTEIN theor. diabet. Exp. 1.

(*a*) WARRIK Phil. transf. Vol. 49. p. 2.

(*b*) B. LANGRISH physc. exper. Exp. 3.

(*b**) KAAUW n. 619. GUNZ de hepate n. 8.

(*c*) Ibid.

(*d*) Ibid.

(*e*) n. 617.

(*f*) n. 618.

(*g*) Ibid.

(*h*) n. 621.

(*i*) n. 630. 631.

ut certissimum est, fit ab impedita resorptione hujus liquoris, cujus nonnunquam enormes moles congregantur (*k*).

Etiam alio modo via libera ex tunica intestinorum (*l*), & ventriculi (*m*), in cavum abdominis patet, sed de quo non possis adfirmare, num ad arterias pertineat, num ad venas, num ad inorganicos poros. Nempe aqua in aliquem eorum membranaceorum saccorum immissa, per tunicam externam defluit (*n*).

Cæterum facile adparet, eum humorem libertatem viscerum abdominalium & inter se & a peritonæo conservare, ut cum summa facilitate, tamen absque frictione moveri possint. Nimis auctus idem potest peritonæum laxare (*p*), & creditur ad hernias disponere; demumque in hydropem abit collectus, nec in venas refusus.

Qua copia in statu secundum naturam secernatur, dictu difficile est: ad uncias certe collecta aquula in sani hominis abdomine reperitur (*q*). In homine, cui sponte abdomen sub umbilico ruptum erat, ad quinque & sex libras de die effluebat (*r*).

Idem humor exsudans morbose inspissatur, in albuminis (*s*) glutinis (*t*), purisve speciem (*u*), & fibrosam gelatinam, quæ viscerum superficie tegit, & verum nonnunquam pus, ut ipse vidi, & alii Cl. viri (*x*).

Ex eo vario humore nascuntur (*y*) vitiosæ adhæssiones, quæ adeo frequenter viscera abdominis aut inter se invicem connectunt, aut ad peritonæum, ut vix in longo morbo abdomen incidatur, quin ejusmodi vincula subsint.

(*k*) Ad 130. mensuras FAVELET *Journ. des Savans* 1724. M. May Intra 17 meses per paracentesim iteratam eductæ aquæ libræ 684. *Obss. of a societ. at Lond.* I. n. 15.

(*l*) KAAUW n. 563.

(*m*) Ibid.

(*n*) Ut facile per umbilicum exstillet. *Nov. Eph. Nat. Cur.* Vol. I. obs. 94. aut per alia loca *Journ.* 1757. M. Aug. Hydrops ascites eo modo sanatus BECKET p. 215.

(*p*) ARNAULD of hernias. p. 128. DEIDIER *splanchol.* I. p. 65.

(*q*) KAAUW n. 543.

(*r*) *Journ. de med.* 1752. M. Aug. ut denique 800 libr. effluerint.

(*s*) PANAROL. *Pentec.* IV. obs. 20. In hepate & liene.

(*t*) DUVERNEY l. infra cit.

(*u*) LIEUTAUD *precis* p. 66. ORTESCHI *diar. venet.* I. p. 166.

(*w*) DUVERNEY *Mém. de* 1703. p. 157.

(*x*) HOMMEL ibid. MOEBIUS SAND. *abscess ventric.* BLAS. obs. P. I. n. 10. ROEDERER *progr ann.* 1758. *Nov. Eph. Nat. Cur.* T. II. obs. 93. HEUERMAN *Oper.* T. II. p. 253.

(*y*) *Act. Mar. Balth.* I. c.

Ita ventriculus ad diaphragma adhæsit (z), & ad hepar (a), ad pancreas (b), ad lienem (c), ad mesocolon (d), ad intestina (e), ad epigastrium aut peritonæum (f). Hepar ad hypochondrium (f*), & peritonæum (g), ad diaphragma (h), ad intestina (i), ad duodenum (k) ad lienem (l), ad omentum (m), ad pancreas (n), ad ventriculum (n*). Intestina ad peritonæum (o), & inter se mutuo (p), cum omen-

(z) *Ess. of a Societ. at Edimb.* T. II. n. 25. SENAC. *Mém. de* 1729. p. 159.

(a) HOMMEL apud WENKER *de vulner. ventric.* Nov. Lit. Lips. T. VI. p. 81. CHIFFLET obs. 27. SPRINGSFELD part. coal. n. 13. DAMIAN. SINOP. parerg p. 28. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 151.*

(b) SAND. *abscess. ventriculi.*

(c) D. SINOP. p. 28.

(d) HOMMEL.

(e) Ad colon HEUERMANN T. IV. p. 37. BLAS l. c. SINOP. p. 28. *Phil. transf.* n. 142. *Med. Mus.* II. n. 3.

(f) BLAS obs. II. P. IV. Nov. Lit. l. c. MOEBIUS *Phil. transf.* n. 207. HOADLEY *ob respirat.* p. 72. pro re frequenti, BARTOLETTI p. 246. Sæpe ad latus adnasci GLISSON *rachit.* p. 371.

(f*) Id vitium Angli vocant *liver grown.* WAINEWRIGTH p. 11.

(g) HOMMEL ib. *Act. Mar. Balth.* 1700. p. 271. ROEDERER *Progr.* p. 4. SPRINGSFELD. WOLF obs. 22. p. 72. undique. Eo in statu nullum adfuisse hepar de ORTELIO dicitur, & apud ZACUTUM. Tota convexa superficie MANGET *bibl.* p. 252. SANTORIN. *ist. d'un feto* p. 34.

(h) *Phil. transf.* L. P. II. p. 550. ROEDERER, HUMELL HORST *Epist.* p. 453. in hydropica. CEELL *nex infol.* p. 18. CRAANEN P. 211. BARTOLETTI *reps.* p. 246. Pene totum ALBERTI *med. leg.* III. c. 39. Toti septo adnatum MORG. *sed. caus. morb.* II. p. 105. 145. Nexus ad diaphragma infoliti ibid. p. 16.

(i) BARTHOL. *Cent. III. Hist.* 6. *Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. l. c. Vol. V. obs. 65.* ROEDERER l. c. Ad colon HEUERMANN IV. p. 37.

(k) SINOP.

(l) BARTOL. l. c. *Act. Mar. Balth.* GHISI obs. *sulle lettere del GHISI* p. 19. pro re non rara DIEMERBROECK p. 79.

(m) De HAEN *rat. med.* T. V. p. 11. SPRINGSFELD.

(n) SINOP. l. c.

(n*) ORTESCHI l. c. a tumoribus purulentis.

(o) *Phil. transf.* n. 333. *Journal de Med.* T. II. n. 5. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 134.* SCHENK. *exerc.* p. 256. In hydropo MOEBIUS. In marasmo HILD. *Cent. IV. obs. 40.* & in longo morbo HEUERMAN IV. p. 37. Ad costas spurias BAGLIV, *fibr. mort.* p. 313. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. n. 134.* MOYLE *mém. Paris ope Journ. de méd.* MOEBIUS obs. 3. Consumto omento SAVIARD. obs. 69.

(p) *Act. Mar. Balth.* ann. 1699. p. 16. *K. Svensk. Wetensk. Acad. Handl.* 1752. Trin. I. In hydropica *Phil. transf.* Vol. L. P. II. STORK annus. I. p. 152. 153. GAEN *rat. med.* T. VII. p. 121. Per hydatides BONTIUS L. III. obs. 7. omento consumto. DAMIAN SINOP. p. 28. vilis connatis. Sic MORG. *sed caus.* p. 140. per externam tunicam p. 28. 29. qui addit

tō (q), cum ovario (r), & utero (s). Duodenum connexum vesiculæ (t) felleæ, & reni (u); intestinum scroto (u†). Appendicula cæci intestini ad musculos abdominis (u*). Colon ad uterum (w): ad renem (x); ad vesiculam fellis (y). Rectum intestinum utero (z). Omentum ad peritonæum (a); ad latera pelvis (b), ad intestina (c), ad colon (c*), ad uterum (d).

Vesicula fellea ad peritonæum (e).

Lien convexus cum peritonæo (f), etiam in trienni puella, cum rene (g), cum diaphragmate (h).

Demum viscera abdominis omnia inter se connata (i), hepar, ventriculum, jejunum, ileum, ipse in purulento vidi.

In universum a vulnere intestinum inverso & dilatato ostio (k), vil-

frequenter fieri. *Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. obs. 10.* HEUERMANN l. c. CIRESIUS in *col. picton.* p. 232. Cartilaginea pene substantia conjuncta MORG. T. II. p. 132. Paris, ope. N. A. N. C. T. II. n. 93. puto & HEUERMANN *oper.* II. p. 253.

(q) ROEDERER *progr. Eph. Nat. Cur. l. c. Vol. VI. VIII.* SANTORIN.

(r) SANTORIN. p. 217. COWPER *tab. 34.* ad f. 4. 5. BLAS L. I. *obs. 12. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. l. c.* DUVERNOY *Comm. Petrop. T. V. p. 271.* SCHRADER *Dec. I. obs. 1.* CHESELDEN p. 166. In hydrope.

(s) HAEN T. VI. p. 169.

(t) SCHMIEDEL *de pericardio &c.* p. 26.

(u) SCHRADER *Dec. I. obs. 5.* de HAEN T. VI. p. 169.

(u†) ARNAULD *ruptures* p. 273. 314. *Journ. de Med.* 1754. Janv.

(u*) DAM. SINOP. l. c.

(w) SENAC *eff. de physiq.* p. 572.

(x) SCHRADER.

(y) SANTORIN *istor. d'un feto.*

(z) CRELL in *hydropica.*

(a) RUYSCH *obs. chir.* 18. 63. CRELL *nex. viscer. insol.* p. 18. CHESELD. p. 150. *Mém. de 1707.* p. 40. COLUMBUS p. 265. *Bresl. Saml.* 1726. M. May. de HAEN T. VI. p. 79. 80. La METTRIE p. 263. Le DRAN *obs. 64.* post inflammationem. Totum in tabido BARTHOL. *respirat.* p. 290.

(b) CRELL *ibid.*

(c) ROEDERER *progr.* p. 4. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs. 65.* 134. Le DRAN *ib. Mus. Med. ib.*

(c*) GOHL *de polyp.* p. 17. LUDWIG *de situ p. n. viscer. infr. ventr.* p. VI.

(d) SANTORIN *istor. d'un feto.*

(e) PETIT *Mém. de l'Acad. de Chirurg.* T. I. p. 286. 288. cum fistula.

(f) ROEDERER SANTORIN. *feto* p. 34.

(g) DIEMERBROECK p. 79.

(h) IDEM. Totus septo adnatus MORG. *sed. caus.* I. p. 162.

(i) BUCHWALD *obs. quadrig. obs. 1* BARTHOL. *Cent. III. Hist.* 6. BUCHNER *misc.* 1729. p. 775. in subito mortuo. JUCH a fasciatione in *Dis.* RÖDERER *progr. ann.* 1758. etiam in purulento *Phil. trans.* T. L. P. II. p. 150. seq. A scabie reperiussa *Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. obs.* 109.

(k) *Oper. minor. Exp.* 372. 378.

losa sua membrana ad peritonæum adglutinetur & adhæret (*l*). Eodem modo etiam omentum (*m*), & hepatis lobus (*n*).

§. III. *Peritonæi ambitus.*

Ut hæc recte innotescant, necesse est peritonæum per omnes suos limites persequi.

Ut difficile videatur; & persequi peritonæum, & de omnibus partibus ambeuntibus separare, tamen non soli *Jacobo DOUGLAS* (*a*) solertissimo viro, sed omnino olim *Nicolao MASSÆ* (*b*) & *GALENO* (*c*) successit. In fetu & nuper nato infante non valde difficile est, in qua ætate vincula cellulosa nondum penitus invaluerunt. Etiam putredine adjuvamus, in corpore, cujus vasa quidem anatomica arte repleta fuerint, ipsum corpus per mensem sibi commissum (*d*). Mihi hæc administratio neque in pleura, neque in peritonæo nimis difficilis visa est, nisi quod in adulto homine a transversorum (*e*) musculorum abdominis tendinibus peritonæum ægrius separatur (*f*), ut tamen cum diligentia & studio ea difficultas etiam tunc separari possit. Piri formam, deorsum gracilem, exemptum habet (*g*), ut superius compressum, deinde latius, sine inferiori angusto sit.

Ergo sublinat primum septi transversi faciem cavam totam, atque in venæ cavæ foramine, & aortæ via, & oesophagi, pleuram (*h*) attingit.

Satis laxè cum septo (*i*) adhæret, laxissime sub sternone, qua multa est pinguedo. Solis fibris tendineis & carneis, ab ima costa & a processu transverso primæ vertebæ lumborum venientibus, accuratius inna-

(*l*) *WEPFER* *cicut.* p. 204. *BRUNNER* *de pancr.* p. 58. *BOHN* *lethal. vuln.* p. 26. *SAVIARD* *obs.* 59. *FAUDACQ* *des plaies à feu* p. 573. *Ad. Mar. Balth.* 1699. p. 16.

(*m*) *BRUNNER.*

(*n*) *Ibid.*

(*a*) *Descriptio of the periton.* p. 4. seq.

(*b*) *Introd.* p. 13. b sæpe integrum peritonæum se excoriasse.

(*c*) *Admin. anat.* L. IV. c. 4.

(*d*) *HENSING.* *de periton.* n. 52.

(*e*) *GALEN.* *ORIBAS.* p. 104. *VESAL.* p. 591.

(*f*) In hydropicis facilius.

(*g*) *HENSING* *de periton.* n. 1. *DOUGLAS* p. 8.

(*h*) *STENONIS myolog. sp.* p. 100. Conf. *HENSING.* n. 6. *MORAND.* *de la taille* p. 316.

(*i*) Tendini vehementer adhærere *DOUGLAS* p. 6. Id mihi non visum.

scitur. Sedes est inter carnes anteriores sterno innexas (*k*), & alia inter fibras lumbales externas [*l*], atque costalium intimas & dorso proximas, in quibus solum cum pleura peritonæum, absque fibris carneis, interseptum pectoris & abdominis perficit (*l*^{*}).

Sub ima nunc ala diaphragmatis, posterius peritonæum diaphragma deferit, & ante appendices, & psoam, vertebraeque lumborum (*m*); tum ante capsulas renales, antequam renes, & ante vasa magna ita descendit, ut ea quatuor viscera sint pone hanc membranam, & ejus intervntu ab abdominalibus visceribus separentur.

Inde porro ante ossa ilium & musculos iliacos, descendit, & in pelvim venit ante intestinum rectum, cujus pars dimidia, & inferius etiam major, extra peritonæi saccum est, [nam de posteriori parte ejus facci sermo est], Et in feminis quidem subliniens utrinque levatores ani (*p*), & coccygeos musculos, os sacrum, obturatores musculos, & nervos magnos, & vicina ossa ilium, venit ad intestinum rectum, ad vaginæ usque partem transversam [*q*]. Inde adscendit, pone vaginam iterum, cellulosæ telæ ope connexum, contra se ipsum, & in medio quidem vaginæ partem descendentem, tunc uterum ita subliniit, ut penitus adhærescat, sitque ei pro extimo velamento. Dum vero ab intestino recto ad uterum tendit, circularem cum priori continuam plicam fingit, qua rectum intestinum velans peritonæum cum uterino conjungitur [*r*]. Duplex alias est plica, altera corpori uteri propior, cervici altera (*s*): alias simplex.

Infra eam plicam cavea est, cujus limites descripsimus, inter rectum intestinum & vaginæ principium deorsum producta.

Sed idem peritonæum ad latera etiam uteri, inter eum & ossa pelvis lateralia, perinde elevatur.

(*k*) *Id. diaphr. ad UU.*

(*i*) *Ibid.*

(*l*^{*}) *Ad R. ibidem.*

(*m*) *DOUGLAS.*

(*o*) *Comm. in prælect. BOERHAAV. T. III. p. 26.*

(*p*) *DOUGLAS, p. 30.*

(*q*) *Duas tertias vaginæ partes HENSING n. 46.*

(*r*) *DOUGLAS p. 38. WINSLOW n. 206.*

(*s*) *Sunt cervicis ligamenta lateralia SANTORIN. p. 219. Conf. BIDLOO tab. 30. 31. WINSLOW n. 601.*

Ubi ad summum uterum venit, descendit iterum contra se ipsum, ut cellulosus textus intervalla paginæ anterioris & posterioris repleat, & secundum uterum iterum deorsum it, ut tamen supra ortum vaginæ, ad pollicem sub fundo, saccum suum terminet, aliquanto altius quam in parte posteriori vesicæ.

Ita ex utero, peritonæo obducto, & ex duplici peritonæo ad marginem uteri adnexo, mobile leprum pelvis efficitur, quod in partem posteriorem eam dividit (*t*), & anteriorem. Quæ pars peritonæi hic ab utero libera est, ea facit ligamentum latum (*u*).

Inde ab anteriori uteri fine peritonæum surgit ad vesicam urinariam, eamque contingit ad duos, supra ureteris insertionem digitos (*w*), porroque pone vesicam adscendit, cui est pro membrana externa.

A summa vesica modice, si plena fuerit, tum in fetu, iterum descendit, ut ad os pubis perveniat (*x*), atque vestiat vesicæ partem, minorem quam quidem posterius. Idem, si eadem inanis fuerit, adscendit ab ea ad os pubis.

Inde porro ab osse pubis, & a continuo osse ilium, sursum producit anterior nunc pars sacci peritonæi, & rectorum musculorum vaginam posteriorem, transversorumque musculorum faciem averfam obducit, donec cum peritonæi parte diaphragma velante absoluto nunc sacco continuetur.

Finis ergo superior simplex, ovalis; inferior triplex, cæco sacco terminatur, postremo profundissime pone uterum producto: medio inter uterum & vesicam; anteriori brevissimo hanc inter & os pubis.

In viris eadem fere fabrica locum habet. Tantum, cum uterus eo in sexu nullus sit, & peritonæum a pariete posteriori pelvis pariter ad intestinum rectum eat, idem in viris ab eo intestino ad vesicam tendens plicas facit semilunares (*y*): idque receptaculum adit supra ureteres (*z*),

(*t*) *Comm. in Præl Boerh.* T. III. p. 261. T. V. P. II. p. 16. 17. Conf. VESAL. L. V. 24. HENNING n. 42.

(*u*) HENSING n. 47. J. VESAL. *ibid.* L. V. f. 24. o o.

(*w*) Conf. HENSING n. 46.

(*x*) *Comment. in BOERHAAV. prælect.* T. III. p. 261.

(*y*) DOUGLAS p. 38. Ligamenta lateralia WEITBRECHT *syndesm.* p. 226. Tab. X. f. 37. P.

(*z*) HENSING n. 45.

qui sunt in celluloso textu peritonæo undique circumposito : & supra ductus deferentis gyros, & feminales (a) vesiculas, quæ pariter peritonæo subjiciuntur, ejus sacco non comprehensæ. Intestinum rectum quasi per foramen ibi videtur de abdomine emitti, etsi vere non est in abdomine, & cæcus sacculus est id inter intestinum & vesicam (b).

§. IV. *Productiones peritonæi minores sive ligamenta.*

Illi in universum sunt peritonæi limites : magna tamen pars indicta superest. Nempe ex ejus sacci circumferentia in internam ejus cavæam numerosæ appendices exeunt, de quibus omnia imi ventris viscera suspenduntur. Earum, quæ minores sunt, ejusmodi est communis fabrica. Peritonæum quidem non est duplex : sed in quacunque parte, in qua ligamentum producitur, secedit de ambitu & dexter, in exemplo, & sinister finis peritonæi, qui, si absque ligamento foret, in unam laminam continuarentur (a) Ii fines se super proximum viscus diffundunt, ut amplissima quasi appendice totum comprehendant, eique sint pro membrana extima; usquedum absoluto circa id viscus itinere ex adverso iterum, quæ secesserant, coeant laminæ. Ita intelligitur, intervallum nasci inter duas laminas, in quo nulla vera lamina sit peritonæi. Per id intervallum vasa solent in viscera subire. Quare viscera & vasa majora sunt extra peritonæum (b).

Una cellulosa tela, quæ exterior peritonæo circumponitur, inque ligamento duabus laminis se interjecit, ea nunc se super visceris superficiem diffundit, estque velamenti cum extima superficie visceris vinculum.

Hujus generis sunt ligamenta hepatis ventriculi, lienis ovarii.

§. V. *Ligamenta hepatis.*

Quando pauca, tria sunt hujus visceris ligamenta. Prægrande (a) primum, alias dexterius quam medius (b) axis corporis humani alias in

(a) DOUGLAS p. 37.

(b) Breviter ista, nam fufius redibunt L. XXVI. XXVII. & XXVIII.

(a) DUVERNEY *posth.* II. p. 150. Conf. KAAUW n. 571. seq. DOUGLAS p. 34. 35. NAVIER *réponse au libelle* de M. AUBERT p. 36. seq. BARTHOLIN *analeth.* p. 184.

(b) C. BARTHOL *spec.* p. 8.

(a) Vinculum magnum ORIBAS. p. 116.

(b) VESAL. p. 621. L. V. f. 2. 6.

medio, ex peritonæo obliniente vaginam muscutorum rectorum (*b**), ab umbilico (*c*) usque, tum sursum ex fede appendiculæ ensiformis, & porro a diaphragmate ad marginem usque hepatis posteriorem & transitum venæ cavæ, a dextra carne adnascitur. Idem ea ratione, quam diximus, duplex, retrorsum oblique & dextrorsum it, atque in hepatis convexam partem se inmittit, non in medium & sæpe ad fescuncem dexterius, ab ejusdem venæ cavæ (*d*) transitu in usque fulcum transversum (*e*) & per eum vel ad sinistri rami venæ portarum finem sinistrum, vel antè aliquanto definit, in ejus rami cum vena umbilicali confluentem. Prima parte & anteriori angustum (*f*), versus diaphragma latum (*f**), posterius denuo angustum (*g*) est. Lamina dextra a sinistra posterius distat, antè contiguæ sunt (*h*). Vidi sinistram laminam a dextra carne diaphragmatis accessisse ad dextram. Pars superior diaphragmatica hætenus potest pro ligamento haberi, inferior neutiquam.

Imo margini hujus membranæ vena umbilicalis se addit, media inter duas laminas (*i*) comprehensa, cum circumfuso adipe (*k*), & in fossam transversam properat.

Hoc princeps ligamentum defuisse, idoneus est auctor (*k**).

Porro a peritonæo, velante carnem imam dextram transversæ septi, super renem, in crassissimam dextram sedem hepatis, & nonnunquam in peritonæum costas velans (*k***), posterius, ad dextra transeuntis venæ cavæ, brevius ligamentum dimittitur (*l*). Ab eo ligamento suspenso-

(*b**) WINSLOW p. 262. non ab ipsa vagina recte WEITBRECHT l. c. p. 222.

(*c*) MORG *Epist. anat.* l. n. 3. BERTRANDI *de hepate* p. 38. HENSING. n. 36. WEITBRECHT p. 221.

(*d*) HENSING. n. 37 DOUGLAS p. 39. &c.

(*e*) DOUGLAS p. 39. n. 5. p. 8. Conf. WINSLOW n. 261. HENSING n. 38. A fovea vesiculæ felleæ LUDWIG.

(*f*) MORG. l. c. n. 3. BERTRANDI p. 38. n. 36. HENSING n. 36.

(*f**) DOUGLAS p. 40. HENSING n. 36. EUSTACH. T. 9. T. 19. f. 4. MARTINS p. 61.

(*g*) Ibid. Triangulare C. STEPH. p. 183.

(*h*) BERTÉ *Tab.* I.

(*i*) MORG. *ibid.* WINSLOW n. 266. BERTRANDI.

(*k*) Consentit MORG.

(*k**) GUNZ *K. Wetensk. Acad. Handl.* 1750.

(*k***) MORGAGN. *ibid.* WINSLOW n. 260. ad tertiam & quartam costam spuriam HENSING n. 35.

(*l*) EUSTACH. *de renih.* c. 13. &c. *tab.* 10. f. 4. HALICOT. *dies II. Lect.* IV. p. 55. MORGAGNI *Epist.* l. n. 6. p. 8. BIANCHI t. 1;

rium (*m*) quod modo diximus, aliquanto breviori peritonæi propagine continuatur (*n*), neque tamen perpetuo. Aliquando cellulofum & fibrosum fuit (*o*).

In extremum finistrum (*p*) lobum, tum in gibbam partem, tum etiam in marginem acutum, a fine alæ finistræ ad ima septi transversæ, similis angusta lamina dimittitur, anterior (*q*), in homine adulto & dexterior œsophago; in fetu sæpe, & in adulto nonnunquam. (*q**) finistrior, ut trans œsophagum (*r*) incedat. Vidi duo fuisse sinistra ligamenta, cum lobus sinister trans gulam se continuasset; superius breve in concavum hepar longe ad cavæ venæ transitum: aliud inferius priori, & cum eo continuatum, ab ala sinistra & a vicina carne ad marginem hepatis.

A suspensorio ligamento ad finistrum, continua non raro (*s*) appendix peritonæi descendit, ligamenti similis.

Secundum dextrum ligamentum (*t*) antè vidi, & secundum finistrum in lobo ultra ventriculum protenfo (*u*), a priori diversum.

Alterius generis est, quod *coronarium* dicitur *ligamentum*. Nempe in dextro & posteriori lobo hepatis ad dextra lobuli ovalis fedes (*w*) est, vertice dextra spectante & nonnunquam usque ad marginem posteriorem obtusum protensa, in qua in homine adulto, & in fene, cellulosa tela (*w**) adeo brevi hepar ad peritonæum congluti-

(*m*) p. 350. 351.

(*n*) Conf. MORG. l. c. n. 9 p. 13. BERTRANDI si rectè intelligo. HENSING n. 38.

(*o*) WEITBRECHT p. 223. De ejusmodi fibroso ligamento PAU *obs.* 16.

(*p*) Ligamentum alterum VESAL. p. 621. L. V. f. 12. O. f. 20. &c. Sed cur teres vocat? Habet etiam COLUMBUS p. 105. 11. EUSTACH. *tab.* 10. f. 4. PLATER p. 124. BAUHIN. p. 150. SMETIUS *miscell.* p. 540. HABICOT *Dier.* 11. *Leç.* IV. p. 55. RHOD *mantiss.* n. 21. pro re peculiar. EYSSON *obs. rar.* p. 14. visum anno 1658. VERHEYEN p. 90.

(*q*) MORG. l. n. 6. p. 8.

(*q**) Inter lienis apicem & ventriculum id ligamentum subire DOUGLAS p. 39.

(*r*) Trans œsophagum BERTRAND p. 39. WEITBRECHT p. 223.

(*s*) WEITBRECHT p. 222. 223.

(*t*) Habet MORGAGNUS p. 8.

(*u*) RUYSCH *Thef.* V. n. 33. cum vinculum suum circa cartilaginem ensiformem ponat. Secundum finistrum WINSLOW n. 261. Anadhaelio lobi anterioris FANTONI p. 105.

(*w*) WINSLOW n. 264. EUSTACH. t. 10. f. 4.

(*w**) Tenera DUVERNEY *post.* II. p. 216.

natur (x), ut ea in ætate separari nequeant. In fetu nondum cohæferunt (y), & facile separantur. Peritonæum ea sede nullum est, neque hepatis membrana (z); sed tamquam perforaretur ab ea nuda sede, peritonæum ab ambitu undique super hepar se diffundit.

Capfulæ etiam renali dextræ cellulosæ telæ ope conjungitur.

Plica peritonæi alia, a pancreatis sede ad sinistra venæ cavæ, ponit vasa hepatica ad hepar educitur, & est portæ omenti alter posterior paries. Altera vero, quæ ad dextra venæ cavæ, a rene (a) dextro ad hepar se elevat, minus certum ligamenti nomen fert.

Omentum minus, alias dicendum, cum appendice sua sustentante (b) vasa biliaria, hætenus etiam hepar cum colo, duodeno, & pyloro & arcu ventriculi minori unit, & demum in ligamentum oesophagi finistrum terminatur, quod ex fossa ductus venosi in oesophagum pone finistrum ventriculi ligamentum abit (c).

Denique circa venæ cavæ foramen undique peritonæum a diaphragmate diffusum supra hepar se expandit, idque quasi in vaginam suam recipit (d).

Ita hepar, maximum, ponderosum, scirrhisque obnoxium viscus, tamen cum sua mobilitate, qua septo transverso obedit (e), firmiter sustentatur, ut rarius, quam alia viscera abdominis loco moveatur, etsi in omni inspiratione descendit, & adscendit in expiratione. Semper autem plenum esse abdomen, & intervallum a septo transverso ad hepar nullum, credo evictum esse.

(x) HIPPOC. *περι φλεβων* VESAL. p. 621. RIOLAN. p. 122. FALLOP. *Inst.* p. 7. ut intelligo. COLUMB. p. 163. T. BARTHOL. *anat.* p. 82. DOUGLAS *perit.* n. 38. MANGET *bibl.* p. 252. BARBAUT p. 146. BIRCH T. IV. p. 273. HENSING. n. 36. BERTRAND *Tab. I.* WINSLOW n. 263. SENAC p. 162. DISDIER *splanchnol.* p. 163. Vulgo vocant ligamentum coroparium BIANCHI p. 17.

(y) In pueris minus HEUERMANN T. III. p. 722. Ab infante abest RAMSPEK *Spec. anat. botan.* p. 23.

(z) BERTRANDI p. 39.

(a) Habet EUSTACH. *de ren.* l. c.

(b) BERTRANDI p. 39. 40.

(c) EUSTACH. an BERTRANDI n. 37. p. 39.

(d) KAAUW n. 574.

(e) Conf. BOURDON p. 76. WAINEWRIGHT *on the liver* p. 10.

Ab animalibus ligamenta humana absunt, in cane certe (*f*), forte quod iis animalibus diaphragma potius humiliter sit quam hepar, & in id septum hoc viscus pondere suo incumbat.

§. VI. *Ligamenta ventriculi, lienis, renum, ovariorum.*

Qua sede oesophagus per diaphragma transit, ea peritonæum & ad dextram sedem & ad sinistram, undique se gulæ circumjicit (*a*), in ventriculum abiturum, ut extensum possit pro ligamento haberi.

Dextrum quidem vinculum (*b*) oesophagi ad partem maxime averfam gulæ, qua primum ex diaphragmate prodit, a diaphragmate advenit, ut porro ex ductus venosi fossa continuatum, in ostiorum ventriculi intervallum transeat, & ad arcum minorem, qua fibræ ventriculi musculosæ latiuscule nudæ sunt, soloque celluloso textu tectæ, se super utrumque planum ventriculi diffundat: Natura postremi in eo ligamento finis solida est; in ductus venosi sinu in laxitatem abit, ob quam omenti (*c*), minoris nomen ei est impositum. Posterius hoc ligamentum est, quam sinistrum hepatis, & ab eo diversum.

Sinistra sedes gulæ similiter a diaphragmate peritonæum ita accipit, ut pars postrema solida sit, & membranacea, & in angulo gulæ cum diaphragmate, & gulam, & lienem; a cujus apice venit, & peritonæum id septum velans, conjungat; inde in omentum majus degeneret, quod porro a liene in arcum majorem ventriculi tendit. Inter hoc & sinistrum ligamentum hepatis apex lienis in juniore homine reconditur.

Idem, quod diximus, ligamentum possit dici verticale (*d*) lienis: quod soli apici posteriori adhærescat (*e*).

Alia peritonæi plica (*f*), etiam sinisterior, longe a septo in faciem di-

(*f*) VESAL. *rad. chin.* p. 116. MONRO *comparat. anat.* p. 23. de suspensorio.

(*a*) KAAUW n. 571.

(*b*) Habet CELSUS L. IV. c. 1. EUSTACH. *tab.* 9. f. 1.

(*c*) Conf. HENSING n. 30. Paulo aliter hæc KAAUW n. 578. 579.

(*d*) Habet CELSUS *ibid.* EUSTACH. *ibid.* ad HENSING n. 42.

(*e*) EUSTACH. *tab.* 10. f. 6.

(*f*) WINSLOW n. 333. pro re incerta. KAAUW n. 572. 573. Neque tamen satis constat, eos Cl. Viros non velle verticale ligamentum. Fibras a diaphragmate ad lienem descendere VESALIUS p. 628.

mediati lienis posteriorem, posterius quam vasa magna & omentum advenit. Ad ejus latus ea faciecula lienis capsulæ renali adhæret (g).

Plica aliqua peritonæi a liene ad renis (h), & capsulæ renalis peritonæum, sub eo ligamento transit.

Cæterum lien mesocoli transversæ parti sinisterrimæ, tamquam in nidum excavatæ, insidet, superque id firmamentum movetur.

A rene ad colon transit plica peritonæi, & alia a rene ad duodenum, etiam ad diaphragma (h*) in sinistro latere.

Ad colon passim peritonæum ita in lumbis elevatur, ut pro ligamento habeas.

Ligamentum peculiare (i) ovarii est appendix peritonæi, quod a vasis magnis iliatis advenit, adhæret ad ovarium, idque tamquam in capsula continet, & porro trans idem, & trans totam tubæ longitudinem, in ligamentum uteri latum continuatur: quod a nobis non dudum expositum est.

§. VII. Mesenteria. I. Mesocolon iliacum & sinistrum.

Quæ sequuntur de mesenterio, omento, & colo, & in cadavere ostensu difficilia sunt, & etiam verbis ægre exponuntur.

Diximus peritonæum in pelvem (k) ante intestinum rectum incedere, ut aliquanto plus, quam anteriorem faciem ejus intestini velet. Idem, ut idem intestinum adscendit de pelvi, ita magis atque magis inter lumbales musculos, vasaque iliaca, & inter intestinum laxius producit, sursum & antrorsum, trans Psoam musculum, transque renem sinistrum; & amplissimas inprimis, quasi ad ligamentum efficiendum, de mediis vasis iliatis, aut etiam dexterius ante arteriæ aortæ divisionem, & de musculo Psoa sinistro, laminas suas emittit, quæ ad flexum iliacum coli perveniunt, & circa id intestinum ita se conjiciunt, ut sint ei pro tunica externa, seque medio in intestino comprehendant continuæ. MESOCOLON di-

(g) Conf. EUSTACH. f. 9.

(h) KAAUW n. 573.

(h*) VESAL. p. 629.

(i) HENSING n. 48. Ic. nostr. uteri.

(k) p. 348.

xeris ILIACUM (*k**). In ejus pagina inferiori cæcum est, circa divisionem aortæ (*k***), quasi foramen.

Sed idem peritonæi processus fursum, versus sinistrum (*l*) renem, insigniter diminuitur, ut alias brevis omnino sit, quæ libera fuerit, mesocoli continuatio: alias omnino nulla (*m*), colonque lumbis hæreat. Semper tamen peritonæo comprehensum, in media denique ea longitudine, laxius intestinum quasi vinculo stringitur. Eadem pars mesocoli pauca pinguedine adspersitur. Ita ab ossè ilium sinistro pergit ad lienem usque, & hætenus *mesocolon sinistrum* dicitur.

Lamina ejus mesocoli sinistra perbrevis est, dextra latior de vertebri cum trunco arteriæ mesentericæ inferioris emergit.

§. VIII. *Mesocolon transversum.*

Facilis res est, si in universum consideretur.

Quando mesocolon sinistrum lienem nunc adtigit, inflectitur ibi ad angulum pene rectum, & sub ventriculo, atque pone eundem, deinde sub hepate, etiam pone hepar, ad dextrum renem pervenit; ductu in universum transverso (*a*), ut tamen frequentissime devium, media parte deorsum vergat, etiam ad pelvim usque (*b*), & aliter aberret (*b**). Septi (*c*) modo abdomen bipertit, ut supra mesocolon hepar, lien, ventriculus, duodenum; infra mesocolon intestina sint reliqua, cum suo mesenterio.

Firmatur autem ad peritonæum, eminente plica (*d*), sub liene, quæ pro eo viscere recipiendo excavata, ad decimam undecimanve costam adhærescit.

(*k**) Tab. arter. mesent. in fasc. Icon. anat. III. R.

(*k***) HENSING n. 28.

(*l*) Habet EUSTACHIUS Tab. XI. f. 2. Tab. nostr. a 9. ad 15.

(*m*) Conf. HENSING n. 19. qui medio loco latius, supra & infra angustum, describit. Sic WINSLOW n. 205.

(*a*) EUSTACH. l. c. SPIEGEL L. VIII. tab. 6. F. F. tab. nostr. art. mesenter. a 15. ad O.

(*b*) Conf. LUDWIG l. c. p. X. XI.

(*b**) Supra ventriculum IDEM p. VII.

(*c*) FANTON. diff. anat. p. 166. WINSLOW n. 204.

(*d*) Icon. nostr. art. coel. I. & in cone I. omenti, & HENRICI de omento p. XVIII. & in icone Ligament gauche du Colon WINSLOW n. 205. HENSING n. 19.

Etiam in dextro latere longiori plica ad peritonæum rene dextro dexterius adfigitur.

Sed multo difficilior res est, quoties duas laminas figillatim oportet exponi, ex quibus id transversum peritonæum componitur, superiorem imprimis. Et oportet tamen, neque enim aliter unquam aut pancreatis situs, aut duodeni, recte intelligitur.

Ea ergo superior lamina oritur in dextro latere a renis (e) fede, & venæ cavæ, pone hepar, dexterius quam duodenum, ex peritonæo lumbari.

Saccus ejus cæcus dexter est in eo angulo, in quo membrana externa duodeni a peritonæo renali, super hoc intestinum & sub hepate nata, cum membrana exteriori coli continuatur.

Porro eadem lamina superior oritur a membrana extima duodeni per lineam oblique descendente secundum duodenum, sex fere lineis dexterius quam pylori valvula, qua fede arteria gastroepiploica ab hepatica oritur; adhæret autem orienti duodeno in linea, ut modo dixi, obliqua, a superiori accessione, trans id intestinum, ad inferiorem usque mesocoli transversæ laminæ, qua fede ea infra pancreas incipit oriri. Ab ea fede porro provenit eadem lamina superior a membrana externa pancreatis, quæ ante eam glandulam vix separabilis descendit, ex ipsa corporum vertebrarum supremarum lumbalium facie anteriori. Ea fede tenerrima est hæc mesocoli lamina, finemque finistrum sui facit in ligamentum, quod diximus, lienis suspensorium.

Lamina *inferior transversæ mesocoli* (f) robustior est, & simplicior. Incipit a ligamento hepatico renali, & a renis dextri fede pone hepar & vasa hepatica, parietemque ibi facit posteriori portæ omenti. Hinc ad regionem lienis extensa facit ligamenti sustentantis lienis paginam inferiorem.

In medio mesocolo transverso duodenum exit de superiori parte abdominis, quasi per foramen mesocoli. Proprio ut loquamur, lamina mesocoli superior supra duodenum pergit, ad sinistras; & inter eam, laminamque inferiorem sub duodeno ortam, id intestinum continetur, ut totum porro pancreas, pone vasorum magnorum mesenterii transitum, ad sinistra inter eas laminas pergat. Emitterit autem inferior lamina duodenum per propriam semilunarem incisuram.

(e) CLAUSSEN *de duodeno* T. I. f. & p. 14. *Ic. nostr. Oment. II. a 5.*

(f) EUSTACHIUS solam habet, omissa superiori l. c.

Est autem hic locus pernecessariæ adnotationi. Nempe scriptores, pene ad unum omnes, ad omentum connumerant id omne membranaceum quod supra pancreas ortum ad colon venit, nosque laminam superiorem transversam mesocoli vocamus.

Is error a GALENO (*g*) manavit, qui omentum a spina dixit oriri: neque VESALIUS (*h*) ejus contagium vitavit, qui fusc laminam posteriorem omenti descripsit, hæsitque ea vox in tota schola anatomica (*i*), usque ad nuperrimos scriptores, qui pancreas aiunt duplicatura omenti contineri (*k*). Emendavi in iconibus arteriæ celiacæ & mesentericæ. Verum etsi solus fere nobiscum sentit D. de MARCHETTIS (*l*), ipsam tamen naturam pro nobis pugnare persuademur. Si enim membrana trans pancreas adveniens est omenti portio, mesocolon non duplex erit ea tota fede, quæ dexterior est vasorum mesentericorum majorum transitu: neque respondebit ei, quam iidem Cl. Viri dant mesenterii ex duplici peritonæo origini (*m*).

Deinde, etsi tenera est ea membrana, de qua quærimus, multum tamen differt a teneritate omenti, ab ejus per vascula in lobos divisione, ab adipis secundum vasa sequentis distributione, quæ omento peculiaris est. Nostrum mesocolon & majora vasa sua *duplicatura* includit, & conglobatas glandulas, & renuit in lobos inflari. Demum cuique omento, ut anteriorem, ita posteriorem laminam adsignabimus, ut hac accessione non sit opus.

§. IX. *Mesocolon dextrum* (*a*).

Brevior hæc est mesocoli regio (*b*), quæ a costæ ultimæ apice, & ab hepatis fede, & a plica renali dextra descendit, ante renem, quadratumque muscolum, ad iliacum usque internum (*c*), secundum renem dex-

(*g*) *De usu part.* L. IV. c. XI.

(*h*) p. 604. quæ bona est descriptio.

(*i*) Vide citatos *ament. ic. tab. I.*

(*k*) BOERHAAVE I. R. M. n. 100. KAAUW n. 583.

(*l*) *Compend. anat.* p. 23.

(*m*) DOUGLAS, WINSLOW, HENSING.

(*a*) GALEN. *arteriar. dissect.* c. 1.

(*b*) VESAL. L. V. f. 24. EUSTACH. l. c. *ic. anat. tab. art. mesent.* a N. ad 12.

(*c*) HENSING n. 22.

trum colonque ejus lateris sustinet. Brevis in medio pariter & nonnumquam nulla (*d*) & stricta. Eadem cæcum intestinum continet, cumque mesenterio finisterris adveniente, cumque peritonæo iliacum musculus vestiente in mediis vasis iliacis continuatur (*e*). Ex imo globo cæci propria & eminens plica abit ad peritonæum, in sede vasorum iliacorum (*e**). Hic finis mesocoli.

Proprium denique mesenteriolum longe triangulare, curvum, huic continuum, quod modo diximus, mesocolo appendiculam vermiformem sustentat. A mesocolo ligamentulum etiam oritur, quod arteriam mesocolicam fundat.

§. X. II. *Mesenterium.*

Unica & continua cum mesocolo membrana est, nequidem (*a*) ea nota diversa, quod crassis intestinis mesocolon, mesenterium tenuibus ferviat. Ostendimus enim, duodeno pene toti mesocolon esse pro membrana externa (*b*).

Lamina nempe dextra mesocoli sinistri secundum totam longitudinem suam cum mesenterii lamina sinistra continuatur (*b**): ad transitum usque intestini; jejuni, de superiori regione abdominis descendens.

Tunc mesocolon transversum lamina sua inferiori, & mesocolon dextrum lamina sua sinistra, mesenterio pariter continuantur, a mediis vasis iliacis ad exitum usque vasorum magnorum mesentericorum, & ad originem vasorum colicorum mediorum, ad sinistra venæ portarum.

Tota ea longitudine, inter sinistrum mesocolon, dextrumque, sub transverso, a sede orientis arteriæ mesentericæ (*c*), ad colicam arteriam (*c**), a prima (*c***) vertebra lumborum ad tertiam (*d*) oblique dextrorsum (*d**) descendit a lumborum vertebris, earumque corporibus peritonæum, qua magna vasa sunt. Ab ea origine elevatur, & in pro-

(*d*) Ad D. ic. nostr. HENNINGER de mesenter. n. 11. Semble s'effacer WINSLOW n. 203.

(*e*) EUSTACH. l. c. WINSLOW n. 202. HENSING ibid.

(*e**) Videtur le ligament droit du colon WINSLOW n. 204. & HENSING n. 22.

(*a*) Μεσαριον RUFUS appellat. L. I. p. 35.

(*b*) p. 357.

(*b**) EUSTACH. l. c.

(*c*) VESAL L. V. f. 10. 12. WALTHER intest. angust. n. 8.

(*c**) FALLOP ibid.

(*c***) IDEM p. 174 b.

(*d*) KAAUW n. 593. Etiam quintam HENSING n. 20. connumerat mesocolo.

(*d**) HENSING n. 20. Sic fere WINSLOW n. 198.

cessum omnium amplissimum abit; repetito plicatum (*e*) & replicatum, cujus ultimæ plicæ intestini tenuis longissimum syrma continent, super ejus convexitatem in se ipsas redituræ (*f*). Longitudinem mesenterii dimensus HENNINGERUS absque intestinis septem ulnarum reperit, cum iisdem ulnarum decem (*g*), mesocoli ulnas duas cum tribus quartis.

Dum & a dextra & a sinistra parte corporum vertebrarum peritonæum adfurgit, duæ laminæ nascuntur, dextra & sinistra, ut in mesocolo.

§. XI. *Mesenterii fabrica.*

Eadem est, quæ in universum peritonæo; natura nempe ex cellulosa tela stipata, absque fibris; vasculis numerosis picta sed exiguis, nullis nervis conspicuis. Hinc absque sensu est, ut omnino convulsiones ab acriori spiritu nitri superfuso in cane vivo natas, ipse experimenti auctor *Amatus LORRY* (*b*) nervis intestinalibus per tenue velamentum tactis tribuerit.

Motum mesenterio proprium, quo se versus umbilicum erigat (*c*), si ab aliquo etiam experimento ea opinio nata est, tribus flatibus intestina replentibus, qui utique, & perinde etiam humor in vasa intestinalia injectus, ejusmodi motum cient.

Cum dextram inter sinistramque in ortu paginam, aut inter anteriorem & posteriorem laminam, ut fere in progressu est, intervallum sit, magnis vasis sanguineis intestinorum, deinde nervis, vasisque lacteis, & glandulis conglobatis recipiendis destinatum, id quidem intervallum cellulosa tela a peritonæi tela cellulosa continuata (*d*) repletur, quæ, quasi septi modo, vasorum anteriores trunculos a posterioribus distinguit. Id cellulosum macrum in aliquibus, sæpe tamen adipe (*e*) repletur, in mesenterio potissimum; nam in mesocolo sola fere vasa comitantem habent pinguedinem, & in ipso

(*e*) WINSLOW n. 199. EUSTACH. *tab.cit* FABRIC. p. 183.

(*f*) WINSLOW n. 201. KAAUW n. 595. FABRIC. p. 142.

(*g*) n. 10.

(*b*) *Journ. de Medec.* 1756 M. Novemb.

(*c*) *Idée de l'homme physique & moral* p. 206. & ante eum J. Dan. GOMLIO *Act. Berol.* Dec. II. Vol. IV. p. 78.

(*d*) HENSING p. 28. KAAUW n. 603.

(*e*) WHARTON p. 27. Neque alia est substantia propria mesenterii WHARTON p. 28. mesenterium etiam in macilento pingue MORGAGN. *sed caus. morb.* II. p. 15.

transverso illo intersepto magna spatia (f) mere membranacea & tenuia intercipiuntur.

In adipe circa vasorum intestinalium divisiones (g) plurimæ glandulæ sedent, ovatæ, compressæ, molles, tenera (h) membrana obductæ, conglobati generis, cellulosæ & ipsæ (h*); in mesenterio quidem potissimum, tamen etiam in mesocolo transverso, inque aliis mesocolis (i), etiam pone rectum intestinum. Iis glandulis cum thymo commune est, succo lacteolo (k) in fetu abundare, vasculisque innumerabilibus, deinde ea ætate succulentas esse; & in senibus demum diminui (l), & fere evanescere (m).

Non alibi in corpore humano frequentior scirrhus locus est (n), & steatomatibus, etiam lapideis (o) concretionibus, ut omnino dudum earum tumor, & scirrhus pro causa peculiaris atrophie infantilis habiti sint (p).

(f) Conf. tab. art. mesocol. in Fascic. III.

(g) VESAL. 617.

(h) WINSLOW n. 218.

(h*) L. II. p. 182.

(i) EULER de mesenter. n. 18. EUSTACH. tab. 11. f. 2.

(k) WARTON p. 30.

(l) In pinguibus adipe obrui, ut non appareant Cornelius CONSENTINUS p. 233. BARBAUT p. 139.

(m) RUYSCH advers. L. II. n. 7. p. 23.

(n) L. II. p. 192.

(o) Scirrhus enormis librarum decem, & cystides oleosæ, melleæ, sebaceæ PARE L. XXIII. c. 36. In centro mesenterii gypsum pene durum ELLER Mém. de l'Acad. de Berlin XI. p. 26. add. SYNOP p. 49. In atrophie mesenterium totum lapidosum PANAROL Pentec. V. obs. 19. & lapilli, ut credebat, in venis mesaraicis SCHNEIDER catarrh. L. III. p. 237. Glandulæ mesenterii tumidissimæ, intus tartaro fetæ LOBSTEIN de nerv. access. p. 41. In mesenterio atrophici glandulæ lymphæ, etiam gypso, plenæ DROUIN Journ. sav. ann. 1690. n. 25. In mesenterio strumæ 70. INGRASS. tum. p. 229. Mesenterium scirrhosum SALZMAN p. 68. Officula in mesenterio A. BALTH. ann. 1699.

(p) L. II. p. 192. Phthisis ex glandulis mesenterii scirrhosis HORST ad MARCELLUM p. 677. In tabido puero steatoma mesenterii pugni mole GOELIKE affect. mesent. n. 36. In atrophie glandulæ mesentericæ tumidæ caseoso chylo plenæ DIEMERBROEK p. 70. In tabida glandulæ mesenterii maximæ KERKRING obs. 18. Post febrem lentam sæpe mesenterii glandulæ argilla plenæ POMP. SACCHUS. Scirrhus mesenterii in atrophie Nouv. de la Repub. des Lettr. M. Julii. N. Litt. Mar. Balih. 1705. p. 75. A cibo crudo scirrhi mesenterii morb. uratisl. hist. 1702. p. 129. Atrophie ex glandulis mesenterii tumidis COLLINS p. 396. In atrophie infantuli cum colicis doloribus scirrhus mesenterii grandis exulceratus HEBENSTREIT in diss. propr. In rachitica glandulæ mesenterii indurata LANGGUTH puell. rachit. Sed & ipse adeps mesenterii morbis est obnoxius PARE L. XXII. p. 707. Tumores mesenterii innumerabiles omitto. Ecce unicum Saccus 10. gallons capax cum plurimis hydatidibus minoribus. Ea aqua inter duplices laminas mesenterii effusa hepar & ventriculum in thoracem egerat, venas coagerat in varices abire & rumpi MOYLE chir. mem. p. 38. Tumor mesenterii cum hydatidibus, etiam cartilagineis partibus, triginta libr. pondere HAEN IX. c. 1. Mesenterium amplissimum, ponderosum, sursum & deorsum extensum, adipe duro plenum BADER obs. 20.

Haller Physiolog. Tom. VI.

Z z

In Germania inferiori id malum frequentissimum est, cum aliarum glandularum conglobati generis simili induratione commune. A scorbuto (p^*), & scrophulis etiam durefcit (p^{**}).

In brutis animalibus, ut in cane (q), phoca (r), fele zibethica (s); leone (t), lynce (u), echino (w), chamæleonte (x), non quidem unica in centro mesenterii glandula est, sed agmen aliquot glandularum, quas ASELLIUS, errore satis incommodo, post GUINTERUM, J. SYLVIVM (x^*): & COLUMBUM (y), *Pancreas* dixit (z), verumque pancreas pro corpore anonymo habuit, quod cani proprium foret (z^*).

Etsi enim possunt circa arteriæ mesentericæ truncum in acervum glandulæ coire, non tamen aut unica (a) est glandula, aut ob eum acervum non perinde sparsæ illæ in homine reperiuntur, ut in simia (b) etiam, & rangifero. (c) Ex brutis animalibus GALENUS (d), descripsit: VESALIUS (e) utramque fabricam miscuit; rectiora docuit EUSTACHIUS (f), & post ASELLIUM *Johannes* VESLING (g), vir multiplici laude clarus.

§. VII. Peritonæi processus secundarii. Omenta.

Omenta peculiariter dicuntur eæ membranæ, quæ non ex peritonæo lumbis incumbente, sed ex membranis producuntur, ex peritonæo natis, hepatis, ventriculi, lienis, coli intestini.

(p^*) SAVIARD *obs. ult.* FAUDACE *reflex.* p. 54.

(p^{**}) BLAS *obs.* 12. P. I.

(q) ASELL. *ubique.*

(r) SCHELHAMMER *anat. phoc. Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 7. 8. append.* p. 21 Plurimas tamen dicit SEVERINUS p. 31.

(s) DRELINCOURT apud BLAS p. 76.

(t) PARISIN. *Mémoire. pour servir. à l'hist. des anim.* P. I. p. 8.

(u) Ibid. p. 133.

(w) BLAS l. c. p. 65.

(x) PARIS. *ibid.* p. 30. Ista quidem, quæ in ranis lien solet dici.

(x^*) *Isag.* L. III. c. 5.

(y) Glandulas mesenterii pancreas dici p. 270.

(z) F. 1. 2. L. L.

(z^*) F. 2. Q.

(a) Ita BOHN p. 157. Attronhicus puer ex scirrho glandulæ in centro mesenterii pregrandi GOELIEKE *observ. anat. Chir.* 2.

(b) DRELINCOURT apud BLAS p. 110.

(c) STENON. *Act. Hafn.* 1671. p. 276.

(d) *Uf. part.* L. V. c. 22.

(e) p. 617. Minores in vasorum divisionibus fitas dixit, & contra L. V. f. 11. unicam magnam in centro mesenterii pinxit.

(f) *Tab.* 10. f. 2. *tab.* 11. f. 1. 2.

(g) *Opusc. Posth.* p. 66. tum J. WARTON p. 31. GLISSON *de hepat.* p. 440. 441.

Omnibus omentis commune est, caveam, marsupio similem, cæcam, amplo plerumque aditu intercipere, dum membrana faccum efficiens in se ipsam revoluta innascitur. Præterea tenerrimas esse, ut nulla membranarum humanarum, retina oculi excepta, æque sit tenera. Et tamen suum robur habent, ut & flatum in saccos suos receptum contineant, & diu sæpe integræ supersint (*a*); & tinctum piscium gluten de vasis exsudans in marsupio omenti colicogastrici sæpe viderim, tamquam in utre, resedisse. Olei vis inter membranas omenti reperta (*a**). In hydrope aquam (*b*) non infrequenter omentum continet, & hyatides (*c*). Sed tunc ejus membranæ crassescunt (*d*).

Nunc si retinet humores immixtos flatumque, non perforatur adeo poris (*f*) conspicuis, quos puto natos esse in laceratione tenerrimæ membranæ inter crassos adipis globos aeri cedentis (*g*).

Porro ut teneræ sunt membranæ omenti, tamen id habent commune, duplicem (*b*) esse membranam, quæ utrumvis folium componit, & ex duabus perteneris membranulis componi, cellulosa tela revinctis, in quam vasa recipiuntur. Incisione exigua facta & adactō flatu eas membranas separavi (*i*): etiam per inflatum mesocolon.

Omnia etiam omenta insigniter vasculosa (*k*) sunt, ramosque habent majores per valleculas collicorum incedentes, in quos ipsos inflando omentum intumescit, dum minores rami per colliculos in pulcherrima retia abeunt. Ab iis vasis in adiposas strias via est, quam hydrargyrus legere aptus est (*k**).

(*a*) Integrum eximi & instar marsupii replei posse ORIBASIIUS p. 106. Etiam RUYSCH *Thef. II. tab. 5. add.* HENRICI *de omento præf.*

(*a**) COLLINS p. 182.

(*b*) RIOLAN. p. 97. SÆUBERLICH *progr. de HAEN rat. med. IV. p. 89.* Videtur FABRICIUS vidisse *de omento* p. 99. qui flatuum hypochondriacorum sedem ibi posuit.

(*c*) Ad quatuor uncias *Mém. de Chir. T. III p. 404.*

(*d*) De HAEN, l. c. Digitum crassum omentum SÆUBERLICH.

(*f*) GLISSON p. 97. Auctor italicus *Giorn. de Letter T. XXII. p. 345.*

(*g*) HEUCHER *ars magna anat. p. 30.* RUYSCH *Thef. II. aff. 3. n. 15. Thef. VI. n. 33. Procem. n. 5* WINSLOW *Mém. de l'Acad. 1715. p. 37. Expos. n. 362.*

(*h*) WINSLOW n. 355. KAAUW n. 586. 587. 588. ROEDERER *thes. dec. HENSING de cment. not. 3.* LIEUTAUD p. 262. *lc. nostr. oment. T. I. not. n.*

(*i*) Etiam HENSING.

(*k*) RUYSCH *Thef. II. tab. 5.* SPIGEL L. VIII. *tab. 3.* Et si enim Cl Viri solum omentum colicogastricum pingunt, eadem perinde vera sunt de omnibus omentis.

(*k**) VIEUSSSENS *obs. d'anat. & de med. pratiq. p. 66.*

Ea vasa (*l*) adeps sequitur, in fetu quidem parvis glebis, & distantibus, dum spatia inter majuscula vasa intercepta macilenta sunt. Sed cum ætate, in aliis tamen magis minori copia, majori in aliis adeps in omento congeritur, totumque occupat, ut pastæ molli simile, impressiones intestinorum recipiat, adeo sæpe crassum, ut etiam digiti viderim crassitie.

Glandulas in nullo omentorum vidi, præter eas, quæ arcum majorem, ventriculi sequuntur & quæ minorem (*m*^{*}); easque quæ ad portas hepatis adsident; sed & eæ ad omenta pertinent. Quas Cl. Viri (*n*) recensent, eas puto vel morbosas fuisse, ut in peritonæo, vel ad glandulas mesocoli pertinere, quod olim omenti lamina audivit.

Lymphatica vasa, qui ipsi forte Biumi sunt canaliculi, possunt circa glandulas conglobatas fuisse (*o*).

§. XIII. *Trium omentorum communia porta.*

Diximus a peritonæo renali dextro mesocolon oriri prope hepar (*a*): addimus nunc membranam extremam hepatis (*b*) de fissura transversâ, & de vesicula fellis ad duodenum ire, vasaque hepatis fundare (*b*^{*}). Inter has duas membranas, illam posteriorem, venamque cavam, hanc anteriorem, & venam portarum cum ista conjunctam, sub hepate dexterrimo, cujus lobulus caudatus sive dexter (*c*) hic duodenum contingit, ostium (*d*) est, ab ipsa natura paratum, etsi nonnunquam vitio excæcatur, ut ipse bis vidi (*e*). In id ostium impulsus aer (*f*) marsupium omenti mino-

(*l*) GLISSON *ventric. & int.* p. 101. WINSLOW *Expos.* T. IV. n. 351. 355. Striæ adiposæ SBARAGLI *vigil.* p. 60. FANTON p. 82.

(*m*^{*}) p. 135.

(*n*) VERDRIES *us. pingued.* 14. VESLING. p. 23. 24. DUVERNEY. 172.

(*o*) MUNNIKS *de re anat.* p. 26.

(*a*) p. 352.

(*b*) L. XXIII.

(*b*) Etiam L. XXIII.

(*c*) Conf. WINSLOW n. 235.

(*d*) WINSLOW *Mém. de 1715.* & *Expos.* T. IV. n. 360. LIEUTAUD p. 263. HENSINGE HENRICI p. XIV. XV.

(*e*) Etiam HEISTERO *defuit compend.* n. 7. & Cl. LIEUTAUD p. 264. 289. & J. Adamo KULMUS *tab. anat.* p. 94. qui addit frequenter cæcum esse.

(*f*) WINSLOW n. 360. & *Mém. de 1715.*

ris, tunc continui pone ventriculum majoris, & continuati ante colon colici denique faccum distendit, & peramplam, postquam flatus accessit, caveam replet. Figura ei portæ lunata (*g*) est, a lobulo hepatis, quem circumscribit.

Inventor est J. *Benignus* WINSLOW (*b*), nisi DUVERNEYO ea laus debetur, qui omnino per similem descriptionem dedit (*b**), si quidem, ex ILL. ARCHIATORUM COMITIS testimonio, nihil ejus vir posthumis codicibus accessit.

Cæterum non necesse est hanc portam quærere, ut omentum infles; sufficit omnino, si tubulum utcunque pone vasa hepatica submittas, ad anteriora hujus ostii, inter hepar ipsum & membranas hepaticoduodenales.

§. X I V. *Omentum minus hepaticogastricum.*

Membranæ (*a*) lubricæ ad hepatis fissura dextra, vesicula fellis; & fissura transversa dexterrima, trans duodenum ad ipsum colon eunt, & continuantur cum alia simili membrana, quæ ex transversa fissura hepatis (*b*) ad sinistra nunc funiculi vasorum hepaticorum, & ex fossa ductus (*b**) venosi, & denique diaphragmate oritur; qua sede fortior est, nomineque dignior ligamenti: tenera eadem, qua ex ductus venosi fossa prodit.

Tranfit eadem trans duodeni partem, uti diximus, deinde trans lobulum (*c*) minorem hepatis, tum ante pancreas, inque colon (*d*), & ab arteriæ gastroepiploicæ dextræ, supra pylorum emersione, porro in totum arcum (*e*) minorem ventriculi, & denique in gulam, qua ligamenti nomen recipit (*e**).

(*g*) WINSLOW l. c. *Ic. nostr.* II.

(*h*) *Mém de* 1715. p. 234.

(*h**) p. 170.

(*a*) p. 364. LIEUTAUD WINSLOW.

(*b*) HENSING n. 30.

(*b**) Etiam GUNZ *de hep.* n. 7. Nimis parvum GARENGEOT *splanchnolog.* t. 6. f. 2.

(*c*) WINSLOW *Mém. & expos.* n. 356. Adparet in burlula f. nostr. I. II.

(*d*) p. 364.

(*e*) WINSLOW *Mém.* p. 235. HENSING l. c. KAAUW n. 590. LIEUTAUD p. 264.

(*e**) p. 354.

Macilentius est & vasa habet minora (*f*).

Impulsus per ostium flatus subit inter membranas hepaticocolicas, nunc dictas, & inter pancreatis particulam, ad finem usque dextræ partis laminæ superioris transversi mesocoli, glandulasque lumbales; deinde inter mesocoli laminam superiorem pancreaticam, & ventriculum, ad cæcum finem sinistrum usque, in septum transversum. Ab eo flatu media quidem & tenerior pars hujus omenti in rosulam, conumque, surgit de hepatis lobulo & tuberibusque rotundis eminet (*g*). Una flatus inter ventriculum, & colon in cæcum magni omenti colicogastrici (*h*) descendit, idque perinde elevat.

Plurimi veterum non ignorarunt omentum hepati innasci (*i*), ejusque lobulum complecti, de hoc minori omento locuti EUSTACHIUS iconem dedit (*k*), & in catopardo PARISINI. In finia omentum adligatur hepatis lobo (*l*).

Lobulus hepatis duplici omento cingitur (*m*) RIOLAN. Lobus hepatis in omenti crumena absconditur (*n*) LOESEL. Lobus exiguus in omenti cavitate totus reconditur, & longe tenuiori membrana tegitur SPIGEL (*o*). Ala superior omenti cavo hepati adnascatur (*p*). Et inferior & superior omenti tabula innascitur hepati (*q*). Lobus SPIGELII obvolvitur omento (*r*). In cane tabula anterior omenti hepati innittitur (*s*). Lobulus hepatis duplicatura omenti continetur HEUCHER (*t*). A J. Benigno WINSLOWO rectius tamen hoc omentum declaratum fuit (*u*) nisi & hic eum visum DUVERNEYUS antevertit (*x*).

(*f*) WINSLOW n. 357.

(*g*) WINSLOW GARENGOT *tab.* 6. f. 2. cujus icon nimis parva est, Icon. nostr. I. II.

(*h*) WINSLOW *Mém.* p. 235. *Exposit.* n. 358. 359. FANTON p. 83.

(*i*) ORIBAS p. 106. VESAL. p. 604.

(*k*) *Tab.* 10. f. 1.

(*l*) J. SYLVIUS *var. corp. diff.* p. 71. b.

(*m*) RIOLAN. *enchirid.* p. 126. & *anthrop.* p. 97. Est omenti pars tertia EJUSD. hepatica.

(*n*) LOESEL *de renib.* p. 65.

(*o*) p. 24.

(*p*) LINDEN *physiol. reform.* p. 58.

(*q*) HIGHMOR p. 16.

(*r*) GLISSON c. 15. BARTHOLIN. *specim. anat.* p. 35. MURALT. p. 604.

etiam MARCHETT. p. 14. FABRIC. *oment.* p. 91, nisi quod iste SPIGELIUM non nominat.

(*s*) BLAS *miscell.* p. 196.

(*t*) *Oper.* p. 755.

(*u*) *In memoir. de l'Acad.* 1715.

(*x*) *Posth.* T. II. p. 170, 171.

§. X V. *Omentum majus colicogastricum.*

Hoc solum veteribus vulgo innotuit, & absque molimine inciso abdomine se oculis offert.

Multoties amplius priori marsupium (*a*) efficit, quod infra ventriculum, & transversum colon, ante intestina tenuia descendit, varia longitudine, ut in pueris brevius, longius sit in adultis; & cis umbilicum viderim finire, & ad umbilicum (*b*), & infra eum (*c*), & ad pelvis (*d*) initium, siquidem etiam in hernias descendit (*d**), & in pelvim (*d***) denique, ut utero (*e*) adhærescere, & HIPPOCRATICO effato (*f*) locum dare potuerit. Plerumque finistrorsum retrahitur, & in eo latere longius est (*g*). Interponit se ubique peritonæo, & intestinis, interque horum plicas se dimittit, ut etiam posteriori loco poni viderim, quam intestina (*b*).

Tenue in fetu, in adulto homine varie obesum, semi libram pendet (*i*) & ultra: sed idem congesto per vitam sedentariam adipe digitum, & pollicem crassum visum est, & pependisse libras quinque (*k*), multo etiam crassius, ponderosius, quando oleum (*k**), & steatoma (*l*)

[*a*] VESAL. L. V. f. 4. 5. WINSLOW n. 353.

[*b*] BIDLOO tab. 33. RUYSCH obs. n. 63.

[*c*] EUSTACH. tab. 9. JENTY tab. I. f. 4.

[*d*] HIGMOR c. 16. COLLINS p. 180. BARTHOLIN. Cent. I. Hist. 32. RHOD mantiss. n. 16.

[*d**] In scrotum descendere GALEN. admin. anat. L. VI. c. 5. Vidit VESALIUS p. 495. In bubonocèle frequenter adparet LAVATER enteroperist. n. 8. Sed hæc nimis sunt vulgaria.

[*d***] SEVERIN. p. 61. BARTHOLIN p. 61. SPIGEL. Rarum esse VESAL. rad. chir. p. 111.

[*e*] SANTORIN. istor d'un feto n. 34. BARTHOL. p. 61. LUDWIG I. c.

[*f*] Aphorism. V. n. 46. Se sterilitatem eo modo natam vidisse FABRICIUS, & a compressa tuba VALISNERI Oper. T. II. p. 258. & ab omento duro PANAROL. III. 6. Non credit HOFMANN de oment. p. 13. Utique perobesas feminas peperisse vidi.

[*g*] VESAL. p. 613. T. BARTHOL. in CASP. Inst. anat. p. 41. LUDWIG de situ visc. abd. p. n. p. V. BOURDON f. 43. MONTABOURG de hern. p. 742.

[*h*] BARTHOLIN. Cent. I. Hist. 32. In simia BLAS anat. p. 254. In elephanto PARIS.

[*i*] DIONIS. 178. Unciæ duodecim cum semisse BARTHOLIN. Cent. I. Hist. 14. Omenti majoris pondus lib. I. SAUVAGES nosol. I. p. 499.

[*k*] VESAL. p. 613. Trilibre ZOD Gall. T. II. p. 39. Librarum triginta BOERHAAV. præl. T. III p. 100. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 175. Multarum librarum SMETIUS miscell. L. X. p. 580.

[*k**] In omento vasa habebant appendices, oleo coacto plenas, quod videbatur fluidum fuisse MANGET bibl. I. p. 62.

[*l*] Omentum crassum vesiculis sebaceis plenum LOESTEN de nerv. access. p. 41. Steato,

in eo nascuntur, aut carnosæ (*m*) concrementa, aut demum cancroſi & ulcerati ſcirrhi (*m†*), cujuſmodi in caſu pollicem craſſum vidi. Etiam ſerum in omento macilentorum hominum invenitur (*m**), & hydatides (*n*). ut in aliis cellulofis telis, hic naſcuntur, & denique oſſea (*o*) & lapidea (*p*) coagula nonnumquam adparuerunt. Totum in ſcroto dureſcit (*o**).

Viciſſim in hydropicis quaſi conſumitur (*u*), & alias in longis morbis pene evaneſcit.

Hæc in univerſum. Peculiaris omenti hepaticogaſtrici fabrica eſt ejusmodi. Laminam habet anteriorem, eique continuam poſteriorem. Anterior oritur a gula, continuata cum ligamento ſiniſtro œſophagi (*w*); porro ex arcu magnò ventriculi toto (*x*) [duplici membrana], ad pylorum uſque (*y*), aut paulo ſiniſterius, qua nempe primum arteria gaſtroepiploica ad ventriculum accedit.

Ad duodenum nunquam (*z*) pervenit, certe in meis numeroſiſſimis exemplis (*a*).

Inde inferitur in totum quidem lienem (*b*), ejusque finem, cum vaſis magnis, ante ligamentum (*c*): ejusque viſceris fit membrana exti-

ma maximum *Eff. of Edimb.* T. IV. p. 30. Tumor omenti ſteatomæſus 22 librarum in hydropica STORK *ann.med.* I. p. 149. Steatomaticum omentum quinque pollices craſſum IDEM p. 130. Tubercula adipis indurati craſſa in omento utroque, & appendiculis, inque meſenterio & meſocolo de HAEN Tom. V. p. 40. 41. Parvum omentum erat 5. lib. $\frac{1}{2}$. *ibid.*

(*m*) Carnoſum omentum C. BARTHOLIN *anat.* p. 67. Plenum glandulis ſcirrhoſis BLAIR p. 40 & COWPER ad BIDLOO t. 34. f. 5. Glandulæ omenti ſcirrhoſæ HORST *Epist.* p. 454. BURCHART *de gland. ſcirrh.*

(*m†*) SCHUSTER *obſ.* p. 54.

(*m**) MALPICH. *oment.* p. 38. MORGAG. *adverſ.* II p. 16.

(*n*) VERDRIES *uſ. ping.* p. 14 VESLING. p. 23. 24.

(*o*) Omenti tumor ſebaceus squamis oſſeis diſtinctus FANTON. *epist.* ad MANGET II.

(*o**) POTT *ruptur.* p. 80. Etiam cancreſcit *ibid.*

(*p*) In omento hydropicæ tumor mobilis calculoſus MONGIN *ſur la petrificat. de l'Epiploon.* Analyſis dedit quæ os.

(*u*) Semper corrumpi COLBATCH *theor. of acids aſſert.* BONT. *obſ.* 7. L. III. *Phil. tranſ.* n. 333. p. 457. In partu difficili fuſum SOLINGEN *Embryulc* p. 22.

(*w*) p. 354.

(*x*) SPIGEL *tab.* 6. f. 2. ARISTOT. *part. animal.* L. IV. c. 2. WINSLOW n. 353. RUYSCH. *Theſ.* II. *tab.* 5.

(*y*) Not. *k.* ad f. 1. *oment.* & t. 2. ad E. K. Etiam RUYSCH l. c.

(*z*) Not. *e.* ad f. 2. omenti. HENRICI p. XVIII. VESAL p. 604. FABRICIUS p. 91.

(*a*) Inde deducit MONRO l. c. T. I. G. E. DUVERNEY p. 169. KAAUW n. 583.

(*b*) VESAL. p. 604. LIEUTAUD. p. 264. KAAUW n. 581. WINSLOW n. 253.

(*c*) p. 354.

ma; adhæret etiam in ligamentum sustentatorium lienis [*d*], & etiam trans id ligamentum in peritonæum (*e*).

Qua vero colon transversum attingit, ibi ante id intestinum descendit, ad finem suum cæcum usque, qui ante intestina natat. Is ubicunque fuerit, redit in se ipsam hæc lamina, non tamen connata, sed spatio inani, vapore solo pleno, distincta a lamina posteriori, se ipso nempe, quando descendebat, laminamque nunc facit posteriorem & contra suam originem ascendit: atque inseritur in colon transversum (*f*), a liene ad finem cæcum finistrum. Nempe in imo, vel anteriori, fine sinus lienis, mesocoli lamina superior a pancreatis fine ad inferiorem laminam ejusdem mesocoli accedit: omentum vero redux, & ascendens, linea propria obliqua trans laminam superiorem mesocoli, in sede ligamenti sustentantis, ad imum lienis finem accedit, porroque cum omenti in lienem insertionem continuatur. Etiam hic duæ omenti tenerrimæ laminæ a duplicato mesocolo oriuntur. Eo loco inter lienem & ligamentum suspensorium, & mesocolon, cæcus finis est omenti (*g*) sinister.

Inde trans colon, antè procedit, ibi cum colico omento continuatum, & adhæret ad laminam superiorem mesocoli in linea propria, quæ tendit ad accessionem vasorum gastroepiploicorum, in directione arteriæ colicæ mediæ (*h*).

In colon intestinum laminam ventricularem non redire Cl. Viri scripserunt (*i*), neque dubium est anteriorem laminam posteriori continuari: in mesocoli vero membranam omentum se immittere dubitari nequit. Flatus enim duplicis mesocoli intervallo inmissus cogit omentum in duo foliola discedere.

Ita fines cæci hujus epiploi sunt in parte fluctuante abdominali: in lienis cum œsophagi & cum diaphragmate conjunctione, & inter lienem atque mesocolon & ligamentum lienem sustentans: in angulo demum, quem omentum cum mesocolo (*k*) transverso intercipit.

(*d*) In *tabula omenti* I.

(*e*) Costæ spuriae aliquando adnasci GALEN. *admin.* L. VI. n. 5.

(*f*) SPIGEL. L. VIII. *tab.* 6. *tab.* 4. f. 1.

(*g*) Cavam eo loco appendicem omenti inter lienem & colon HENRICI posuit p. XVIII. & in icone. Habet etiam LUDWIG n. 6.

(*h*) F. 1. *Nostri omenti* HENRICI p. XV.

(*i*) HENSING n. 32. & iisdem verbis HENRICIUS.

(*k*) In principio hujus paginæ.

Patet idem secundum totum ventriculum & secundum colon transversum, in caveam illam imaginabilem, cum omento hepaticogastrico continuatam, quæ est inter mesocolon, duodeni initia, ventriculum, œsophagi latus dextrum, septum transversum, hepar, lienem, & lumborum, vertebrae, qua aorta & vena cava earum corporibus incumbunt, multis cum lumbalibus glandulis (*l*).

Rarissimum fuerit, si a solo colo (*m*), absque adhæsione ad ventriculum, hoc omentum provenit, aut a solo ventriculo (*n*), neque ad omentum minus continuatum fuisse vidi (*o*).

Inflatum per portam omenti, aliove loco, in grandia tubera adfurgit (*p*).

§. XVI. *Omentum colicum.*

Huic grandi omento, qua ante colon transversum dexterrimo suo limite adscendit, continuatur cava appendix (*a*), conica, variæ longitudinis, quam ad cæcum (*b*) usque intestinum productam viderim. Ea fit a sola membrana interna coli, sed duobus sibi parallelis locis de intestino adfurgente, ut inter utramque laminam aer intercipiatur, flandoque conus in tubercula extuberans formetur, qualis est in reliquis omentis fabrica. A solo ventriculo oriri, rara fabrica est, quam non oportuisset ad omnia cadavera transferri (*c*).

Cl. LIEUTAUD omnino (*d*) hoc omentum intellexit, quando epiploon ad duos digitos a vermiformi appendicula oriri, & inde ad colon transversum procedere dixit, in eo a me diversus, quod partem majorem altera lamina a colo, altera a mesenterio dixerit oriri. Eodem au-

(*l*) Not. q. ad tab. 1. omenti.

(*m*) HENSING n. 931. HENRICI p. XVII.

(*n*) HENSING ibid. HENRICI ibid.

(*o*) Ut HENRICI ibid.

(*p*) Octo numerat DUVERNEY p. 171. Pinxi tab. 1. Omenti: tum HENRICI & GARENGEOT.

(*a*) Tab. 1. omenti R. R.

(*b*) GUNZ de hepate n. 3. In simia ibi adhæret BLAS anat. anim. p. 110.

(*c*) HENRICI descr. oment. p. XVI. XIX. Fig. Q. Defendit nostros limites ILL. LUDWIG de situ viscer. abdom. p. VI. VII. & ad cæcum usque omentum adhæsisse GUNZIUS testis est de hepate n. 8.

(*d*) p. 263.

tem mecum tempore potuit vidisse, cum privilegia libri Viri ILL. sint anni 1741. etsi liber anno 1742. prodiit; ego vero anno 1742. ineunte tabulam jam ex pluribus selectam sculptam habuerim, quam eodem anno edidi. Reperi in adversariis 12. Nov. 1740. primum a me in theatro Göttingensi demonstratum, inde in omnibus infantum cadaveribus ostensum esse.

Alias appendices omenti in parte maxima convexa ventriculi numerat Cl. LIEUTAUD [e], dignas nomine omenti minoris, mihi ignotas.

Cæterum quadrupeda omnia omentum habent, simiæ [e*], canes [f], urfi [g], coati [h], leones [i], trigides [k], catopardi [l], lynces [m], zibeticum animal [n], hystrices [o], marmotæ [p], talpæ [q], elephantes [r], equi [s], gazellæ [t], cervi [u], rupicaprae [w], ut vix credam hystrici americanæ deesse [x]. Etiam aquatica id omentum habent, ut phocæna [y], phoca [z].

Quæ vero membranæ in avibus [a], serpentibus [b], quadrupedibus frigidis [c], omenta dicuntur [d], eæ sunt utique adipis [e] receptacula. Piscibus etiam ea natura est [f].

(e) P. 264.

(e*) Subtus etiam intestina continet, tum in animalibus celeribus BLAS p. 110.

(f) Amplum, per totum abdomen extensum MONRO compar. anat. p. 11.

(g) Valde pingue Comm. Nor. 1734. n. 78.

(h) Amplissimum & pinguissimum Mém. de Berlin T. XII p. 181.

(i) Grande ad lienem adnatum PARIS.

(k) Magnum omnia intestina continens PARISINI BLAS p. 121.

(l) Intestina continens PARISINI.

(m) Perinde IDEM.

(n) Amplum itidem intestina continens BARTHOL. C. IV. Hist. I.

(o) Non liberum PARISINI.

(p) Præpingue Phil. transf. n. 395. PARISINI.

(q) Magnum HARDER ap. obs. 24.

(r) Amplissimum & tenue STUKELEY tab. 4. f. 1.

(s) Breve SNAPE.

(t) Etiam in hoc animale intestina continet PARISINI.

(u) PARISINI.

(w) Magnum HARDER obs. 14.

(x) SARRAZIN Mém. de l'Acad. 1727.

(y) TYSON p. 19. RONDELET d. 449.

(z) SEVERIN. p. 31. absque adipe.

(a) Omentum nullum ova gignentibus PLIN. L. XI. p. 630.

(b) SEVERIN zootom. p. 366.

(c) Ranæ, lacerto.

(d) Aquaticis avibus COITER p. 132. Cormoran PARIS. plateæ PARIS. In anseris adeps intestina tegit FANTON. diff. anat. p. 73. Parvum omentum struthiocameli RANBY Phil. transf.

(e) PARIS. in chamæleone. Sic in ranis & lacertis.

(f) Conf. SCHÆFFER pisc. bavar. p. 32. Super intestina mollis alba unguinosa materies effusa PLANCUS Com. Bonon. L. III. p. 332.

§. XVII. *Mesocoli cavea. Appendices epiploicæ.*

Ut harum apendicum, totiusque mesocoli & omenti, natura melius perspiciatur, oportet & per omenti portam aerem impellere, & exiguo vulnere mesocoli laminam superiorem incidere, qua duodenum, quasi triangulari capsula, in mesocolo continetur, eo loco inter laminam superiorem & inferiorem per id vulnus perinde aerem inflare.

Ita apparebit, pulchro spectaculo, duplex circa hepar & duodenum vesica, mesocolon nempe in ampullam surgens, dimotis a suo contactu laminis, & in omenti ampliori cavea comprehensum.

Apparebit limes laminæ mesocoli superioris, ex quo omentum proderit, & utraque nunc ampulla separatur; ab omento nempe mesocolon distinguitur; neque is lobus cedit nisi violento flatui, ut tamen mihi aliquando acciderit rupta omenti adhæsione, flatum ex mesocolo in omentum transiisse.

Sequetur porro idem aer totum colum transversum, elevabit, [non quidem semper], de pancreate laminam mesocoli superiorem, ut inter duas mesocoli laminas, in ejus membranæ cavo pancreas poni adpareat. Elevabit porro ligamentum lienis susensorium, & ostendet aliud ab omento ibi cavum esse. Sequetur denique totum colon ad rectum intestinum usque, & faciet, ut totum a continua ampulla sustineatur.

Una, non semper quidem, sæpe tamen, surgent inflata *omenta parva* (a) vel *appendices epiploicæ*; capsulæ (b) nempe cellulosæ pingues (c), quæ de universo intestino colo, etiam de recti (d) parte, sæpissime gemellæ prodeunt, cæcoque fine aerem continent inflatum: manifesto argumento, eas a membrana coli extima duplicata (e), ut a mesocolo oriri. Conicæ sunt eadem, in fine suo libero crassiores (f), etiam bifidæ, & pulchrum spectaculum præbent, quando totum colon iis undique riget (g). Inventor est VESALIUS (h); habent

(a) WINSLOW.

(b) IDEM.

(c) RUYSCH tab. 5. BIDLOO tab. 39. f. 5. In pygmæo reperiuntur TYSON p. 32.

(d) FABRIC. GLISSON, WINSLOW.

(e) IDEM n. 365.

(f) IDEM n. 366.

(g) p. 612. Una inflari posse HENSING n. 25. add. WINSLOW n. 367. Omenti majoris scirrhi & steatomata vulgari fere sunt notitiæ. In appendicibus epiploicis etiam scirrhusa natura visa est BADER *obs.* 19.

(h) p. 612.

etiam FABRICIUS (*i*), SPIGELIUS (*k*); RIOLANUS (*l*), *J. Antonides* van der LINDEN (*m*), GLISSONIUS (*n*), BARTHOLINUS (*o*), WILLISIUS (*p*), KYPERUS (*q*); renovabit RUYSEHIUS (*r*), inde MANGETUS (*s*), & alii.

Optime una adparet, quod diximus, a solo colo natum omentum colicum.

§. XVIII. *Cellulosa peritonæo circumposita* (*a*) &c.

Aliqua ad historiam peritonæi addenda supersunt. Processum quidem alias uberius describam, quem in fetu verissimum emittit, ut nunc ex meis observationibus (*a**), & ex consensu ILL. Virorum *Petri* CAMPER (*b*), & *Guilielmi* HUNTER (*c*) video, perpetuum. Testes enim in ea tenera hominis ætate ad lumbos (*c**) sedent, ut in avibus, estque in ipsa peritonæi cavea (*d*) inquilinus: adest una parata pro teste vagina (*e*), ex vera membrana peritonæi facta, pene cylindrica, digitalis, superne in caveam peritonæi patula (*e**), ad os pubis adnexa inferius in scrotum ducens.

In eam vaginam descendit sensim testis, plerumque circa partus tempora. Postquam eo descendit, meatus quem vaginam dixi, in proprio

[*i*] *De intest.* p. 152.

[*k*] p. 229.

[*l*] p. 110.

[*m*] *Physiol. reform.* p. 56.

[*n*] p. 188.

[*o*] *Centur. I. obs.* 92.

[*p*] *Excrecentiæ carneæ, ramosæ, colo & recto adnatæ convuls.* p. 129.

[*q*] p. 107.

[*r*] *Mus. rar.* p. 158.

[*s*] *Theatr.* p. 244.

[*a*] Aliqua jam dixi L. I. p. 16.

[*a**] *Opusc. patholog. obs.* 28. Primum vidis in gemellis, qui ante partum perierant. 27. Oct. 1747. Descripsi in progr. *de hern. congenit.* 1749.

(*b*) *Waarneem. van. de hollandse maatschappij* &c. VI. p. 248. 250. 251. f. 1. 2. 3.

[*c*] HUNTER *Med. Comment.* p. 81. f. 2. 3.

[*c**] *Id.* p. 80.

[*d*] *Idem* p. 81.

[*e*] Meatus CAMPER: processus HUNTERI.

[*e**] Cellulosa, gelatinosa tela testum HUNTER p. 79.

loco constringitur & clauditur (*f*), ejusque sola inferior pars supereft, quæ *vaginalis* testis tunica audit, & fenfim ad funiculum adhærefcit; in peritonæo, cæterum integro, ea vaginæ occlusæ fedes quasi cicatricem (*g*) refert.

Non ita ad umbilicum peritonæum apertum eft, fed omnino antèrius fibi impofita habet vafa fetui propria, venam umbilicalem, urachum, arterias umbilicales, & venas ejus nominis. Ea vafa cellulofis filis per totam fuam longitudinem ad folidam peritonæi membranam adnectuntur (*h*).

Neque verum foramen eft, quo inteftinum rectum de peritonæo enittitur. Id inteftinum de breviori femper lamina mefenterii fuftinetur (*i*), & demum antèrius peritonæum folum inpoſitum habet, denique ne antèrius quidem, ut totum inteftinum peritonæo longius in cellulofò ſpätio fit, per quod anum adit.

Vera foramina peritonæi funt, ut quidem ejusmodi membranæ foramina admittunt (*k*) in oſophagi aditu, & venæ cavæ ad hepar adventu, ejusdemque de hepatis tubulo, exitu; tum in lamina inferiori mefocoli, jejuni inteſtini ex ſpätio, inter mefocoli membranas, in ſpätium peritonæi inteſtina comprehendens exeuntis adhæſio.

Aorta (*l*), vena (*m*), cava ſub hepate (*n*), iliaca vafa, renalia vafa, ureteres, veſica urinaria, funt extra peritonæum: omnia etiam vafa cæliaca, meſenterica, meſocolica, & alia ejusmodi vere extra peritonæum funt, inque circumpoſito cellulofò textu (*o*) decurrunt.

De eo textu nuper eft ſollicite magis quæſitum.

In univerſum pinguiſſimus eft locus circa renes, qua adeps imaginabiles caveas triangulares reni compoſitas, & ad cavum peritonæi pertinentes & antèrius injectus, & poſterius ſubſtratus, adgeſtus explet totumque sæpe renem occultat (*p*).

(*f*) CAMPER p. 254. 255. HUNTER p. 82. 88. 89.

(*g*) HUNTER p. 82.

(*h*) SCHULZE *vaſ. umbil.* n. 10.

(*i*) p. 350.

(*k*) p. 357.

(*l*) KAAUW n. 592.

(*m*) Vafa magna C. BARTHOLIN. *method. demonſtr. anat.*

(*n*) KAAUW n. 617.

(*o*) IDEM n. 604. 605.

(*p*) Conf. KAAUW n. 570. HENSING n. 4. 16. WINSLOW n. 30.

Multus est etiam pone intestinum rectum adeps; multus circa umbilicum (*q*), & in itinere venæ umbilicalis. Parcus versus abdominalium muscutorum superiores tendines, versus urinariam vesicam: versus uterum, & ovaria nullus, neque versus tendines muscutorum transversorum.

Processus etiam hujus cellulositatis passim nuperi scriptores describunt. Nempe quasi farcimen ex ejusmodi tela factum venam cavam & aortam sequitur, per lumbos, perque pelvis oram, usque in femora. Sequitur alia appendix aortæ (*r*) sursum in thoracem euntis iter, cum pleuræ cellulositate & mediastini posteriori cavea continua (*s*), inque caput cum carotide, in brachia suis cum arteriis, in aortam denique ad cor usque porrecta. Sequitur œsophagum (*t*) alia stria, per thoracem, in collum, adque summum occiput continua.

Ad umbilico & ad abdomen, & ad lumbos universos, & sursum pone sternum in thoracem & mediastini anteriorem textum alia hujus cellulosæ telæ propago venit: alia in fetu funiculum subit, & vasa eo contenta sustinet.

Aliud memorabile farcimen, exit sub transitu vasorum feminalium, inque scrotum (*u*) descendit. Exit cum ligamentis teretibus (*w*) aliud in pubem, aque sede iliaca in femur, fasciæque latæ adipem. Maximum aliud cum intestino recto in spatia ano (*x*) circumfusa prodit: aliud cum magnis vasis in adipem natium & postici femoris (*y*): aliud cum arteria obturatrice (*z*) per foramen ovale, in anticum femur, & cum vasis femoralibus in femem (*a*) aliud cum uretere ad vesicam usque, circa eam & vesiculas feminales, prostatesque circumfusus; cum urethra porro penem (*b*) exterius secuturum.

Et quæ alia, nemo absque tædio enumeret.

(*q*) WALTHER *de obes. & vorat.* p. 8.

(*r*) HENSING n. 6. 15.

(*s*) MORAND *de la taille* p. 316.

(*t*) HENSING n. 6.

(*u*) IDEM n. 5. Sed alias dicetur L. XXVII.

(*w*) IDEM *ibid.* WINSLOW n. 31.

(*x*) HENSING n. 14. WINSLOW n. 32.

(*y*) IDEM n. 4. 5.

(*z*) BUTTNER *de periton.* n. 7. p. 13. GUNZ *hern.* p. 20.

(*a*) BUTTNER HENSING n. 5. VERDIER II. p. 32. GUNZ *hern.* p. 20. WINSLOW n. 31.

(*b*) HENSING n. 5. 14. WINSLOW n. 32.

Uno verbo, ut omnes inter se cellulosa telæ, ita quæ peritonæo circumponuntur, cum iisdem per totum corpus cavernulis communicant (c).

Hactenus non ignorasse juvabit, quod per ea cellulosa spatia, si, quando vera membrana peritonæi laxata fuerit, possint herniæ nasci; nempe contenta abdominis extrudi, ut intestina, ventriculus, vesica urinaria, uterus, potissimum quidem in scrotum, spatia scroti locum in feminis tenentia, spatia arteriarum femoralium transitui vicina, foramen ovale pubis, cellulosa totam vaginæ circumfusam, umbilici sedem.

Etiam ulcera ejusmodi itinera tenent, & mesenterii abscessus, cujus glandulæ consumptæ erant, cum obturatore interno ad genua ivit (d). In pleuritico cuniculi alti secundum peritonæum (e) descenderunt. Cum ulcere femoris pure plenum abdomen (e*).

§. XIX. *Harum partium vasa.*

Obiter tantum hæc indicabo, quæ numero pene sint infinito, neque truncos magnos habeant.

In peritonæo, antè ab arteria mammaria (a), ab epigastrica (b), ab abdominali (c), ab hepatica (d), a phrenica (e); ad latera a lumbaribus, ab intercostalibus ab abdominali, ab iliolumbali (f), a renalibus ab iliacis. Posterius a circumpositis truncis phrenicis, appendicibus capsularibus (g), hepaticis splenicis, gastricis, renalibus, mesentericis, ileocolicis, colicis sinistris, mesocolici (h), spermaticis (i), lumbaribus, intercostalibus, hypogastricis, hæmorrhoidæ internis. Omnia hæc vasa inosculantur interesse, & spermatica cum mesentericis uniuntur.

Lymphatica circumposita peritonæo non recuso (k), etsi non vidi.

(c) L. I. p. 12. &c.

(d) HENRICI *abcess. mesent.*

(e) SCHENK *Exerc. anat.* II. L. I. p. 172.

(a) *Icon, anat. Fasc.* VI. tab. 1. art. brach. n. 28. 29. 30.

(b) n. 42. 44. 45. 48. 36. SPIGEL L. VIII. tab. 1.

(c) Annon. HENSINGIUS n. 11.

(d) *Fascic.* IV. n. 34. 35. *Fasc.* VIII. p. 32.

(e) *Fascic.* VIII. p. 35.

(e*) MOEB. *obs.* 3.

(f) Annon. huc HENSING n. 11.

(g) *Art. mesent.* p. 48.

(h) *Ibid.* p. 48. 49.

(i) *Ibid.* p. 49.

(k) NUCX *adenogr.* p. 98.

Mesenterii & mesocoli vasa propria distinguere oportet ab intestinalibus. Illa perexigua, multa, brevia, hæc amplissima sunt. Mesenterii arteriæ venæque fere sunt ab intestinalibus; mesocoli vascula, ut perampli, a facris, ab iliolumbali, lumbalibus, spermaticis, mesocolis, epiploicis sinistris (*l*), dextris (*m*), splenicis (*n*) pancreaticis (*o*), colica anteriori, quæ est mesentericæ propago, colica dextra, ileocolica, uretericis, spermaticis, capsularibus (*p*), mesocolica, hepaticis, duodenalibus, intercostalibus imis (*q*).

Recta sunt vasa mesenterii & mesocoli, neque habent illos pulchros intestinalium arcus.

§. XX. *Vasa omentorum.*

Majora ista, ubique truncis longis oriuntur, etsi non maximis.

In omento colicogastrico anterior lamina dextra vasa habet a gastroepiploica dextra (*a*), quorum aliquis, major, ramus, *epiploica dextra* (*b*) nomine longe ad sinistra excurrit; ut cum sinistra epiploica inosculetur. Sinistra sunt a gastricis posticis (*b**), gastroepiploicis sinistris, aque ipsa etiam *epiploica sinistra* (*c*), quæ in dextræ occursum it. Lienalia etiam ramos eo remittunt & brevia.

Vasa laminæ posterioris sunt & ipsa ex utrisque gastroepiploicis, & imprimis ab epiploica dextra (*d*), a sinistra (*e*), a splenica aliqua; etiam a colicis (*f*), duodenalibus (*f**), adiposis (*f***).

(*l*) *Fasc.* VIII. p. 34. *Fasc.* II. *Art. cæl.* II. not. g. *Fasc.* III. *tab. art. mesent.* p. 48.

(*m*) *Tab. cæl.* I. not. r. *Tab. mesent.* p. 48.

(*n*) *Tab. cæl.* II. not. b.

(*o*) *Fascic.* VI. p. 36. *tab. art. mesent.* p. 44 48.

(*p*) *Tab. art. mesent. &c.* p. 48.

(*q*) *Ibid.*

(*a*) *Tab cæl* I.

(*b*) *Tab. cæl.* I. not. r & q. HENRICI n. 16. c.

(*b**) *Not. f. art. caliac.* II.

(*c*) *Not. g. tab. cæl.* II. HENRICI n. 16. Z.

(*d*) *Fascic.* VIII. p. 34. HENRICI O.

(*e*) *Ibid.*

(*f*) DUVERNEY *posth.* II. p. 171.

(*f**) IDEM *ibid.*

(*f***) IDEM *ibid.*

Omenti hepaticogastrici vasa sunt a coronaria magna (*f*†), & parva (*g*), & ab hepatica.

Omenti colici, a colicis, ab epiploica dextra (*h*), duodenali (*i*).

Appendicum epiploidum vasa a colicis vicinis.

Venæ omenti, ut continuo fufius, dicetur, minores quidem arterias cognomines comitantur: majores ad portarum venam conveniunt: inque truncum quidem plenicum ob omenti colicogastrici sinistra parte, & ab hepaticogastrico omento, cujus etiam venæ alias absque alio interposito trunco continuo in truncum venæ portarum abeunt. In mesentericum truncum veniunt venæ pleræque omenti colicogastrici, venæ omenti colici, venæ appendicum epiploicarum. Omnes amant inter se plurimis anastomosibus uniri (*k*): epiploicæ dextræ cum sinistris, gastroepiploicæ dextræ cum sinistris, cum utrisque gastricæ. Tota enim vasa in retia abeunt, quæ lobulos omenti ambeunt.

Sanguis omenti lente movetur, cum de resecto absque vinculo epiploo sæpe nullus manaverit (*k**).

Omentalia vasa perinde perspirant, ut vasa peritonæi. Vidi omentum gastrocolicum cæruleo glutine piscium plenum, quod per arterias injeceram, vidit similia Cl. KAAUW (*l*).

Deinde ex arteriis omentalibus, secundum totam longitudinem, injectus liquor sudat in cellulas adiposas, quæ omentum sequuntur; rem sæpe & hic vidi & alibi. Addit autem ALBINUS (*m*), id fieri per vascula minima, quæ ipse distincte viderit.

Minima quidem retia adiposa, fluida vidi, pellucida, lymphaticorum similia, sed vere tamen adiposa.

§. XXI. *Vasa lymphatica & nervi omenti.*

Neutra classis nota est. Nervos aliquos colicogastricum a truncis gas-

(*f*†) Coronariæ HENRICI n. 7.

(*g*) Not. m. tab. caliac. I.

(*h*) Fascic. VIII. p. 34. HENRICI n. 16.

(*i*) HENRICI ib.

(*k*) RUYSCH l. c.

(*k**) Journal de méd. XII. p. 149.

(*l*) n. 562.

(*m*) Apud HENRICI n. 17. adde KAAUW n. 796. & 797.

stroepiploicis dextris (*a*) & sinistris (*b*) habet. Hepaticogastricum a plexu (*c*) posteriori octavi paris per ductum venosum ad hepar veniente, a quo perambulatur: De reliquis omentis nihil certi habetur. Parvos esse nervos vel ex sensu exiguo æstimes, qui est in omenti excisione, aut in ejusdem tractatione, quæ in herniis. inque vulneribus adeo frequens est.

Peritonæo nervi quidem grandes incumbunt, in ejus tamen naturam aut minimi subeunt, aut nulli cum sensu destitui videatur (*d*).

Mesenterium & ipsum manifesti sensus (*e*) est expers. Si nervos aliquos habet, ab intestinalibus habet, quos per suarum laminarum intervallum dimittit.

Vasa lymphatica in omento esse non repugnat, cum glandulæ conglobati generis & in omenti hepaticogastrici (*f*) ad ventriculum adhæsiōne sint: & in omenti colicogastrici (*g*) a ventriculo origine. Habentur etiam eorum aliqua indicia apud Cl. BIRUMI (*h*), nonnullosque veterum (*i*). Denique, si sunt resorbentia vasa (*k*), & ad resorbendum abdominalem humorem de facie omentorum eo respiciente, & ad humorem cavea omenti magni contentum, eadem requirentur.

S E C T I O I I.

U T I L I T A S H A R U M P A R T I U M.

§. I. *Peritonæi.*

Late regnantia per varias animalium classes organa, magni esse usus. sæpe, neque puto abs re, repetii. Nunc peritonæum reperio, in quadrupedibus, etiam frigidis, avibus & piscibus. Facile etiam ad-

(*a*) L. X. p. 296.

(*b*) p. 336.

(*c*) Ibid.

(*d*) L. XIX. p. 161.

(*e*) p. 340. 341.

(*f*) p. 360.

(*g*) Ibid.

(*h*) Canaletti. l. c.

(*i*) MUNIKS *de la anat* p. 26.

(*k*) Ibid. in *addend.* ad Tom. I. quibus nunc suam auctoritatem addidit Guil. HUNTER in *medicis commentariis*.

paret vel rudi experimento violati hujus velamenti, quanta sit ejus necessitas. Extemplo enim, uti vulnus accepit, etiam ibi non vulneratum quidem, sed munimentis sibi circumjectis (a*) incisus debilitatum fuit, continuo, vi maxima, erumpunt per vulnus proxima quæque viscera hepar, omentum, ventriculus, intestina, renes, tanto impetu, ut vix ullo modo reponere possis, aut in situ servare reposita. Prima ergo utilitas peritonæi est, continere suo in situ viscera plenissimi abdominis, ut pressionem circumpositarum virium muscularium patiantur quidem, neque ideo de suo situ decedant. Ipsum cor & pectus hujus pressionis beneficia percipiunt; paracenteseos ob hydropem susceptæ argumento, in qua subito subtracta abdominis aqua (a), a peritonæo languido & inertiale defensum diaphragma, & una thoracis viscera, funesto eventu deorsum languida relabuntur.

Porro vapore suo interjecto viscera & inter se ipsa, & cum peritonæo, alias continuo adhæsura, solum libera servat. Quare eo vapore inspissato, aut in pus converso, aut siccato, ut per inflammationem siccari credas, omnia inter se confervent (b). Hinc a vulnere eæ fere partes ad peritonæum adhærescunt, quæ sub vulnere (c) sunt; eas enim inflammari necesse est. Idem ros necessariam materiam confert ad temperandum (d) sanguinem adipe gravem, adque imprægnandum eundem alcalino volatili elemento.

Iterum internis suis ligamentis & processibus peritonæum omnia viscera suo loco continet, ne vagari possint, & in alienas sedes de sua vicinia abeant.

Et æquum est creditu, si in solis vasis fundarentur mobilia abdominis viscera, de septo transverso suspensa (e), tot in saltibus, nixuque maximo, per vitæ humanæ conditiones necessario, ruptum iri nimis debilia

(a*) A furunculo, destructis musculis abdominis, elapsa cum peritonæo intestina, omentum, & pars hepatis Cl. CRANZ *tr. de instr.* c. 2.

(a) LAURENCE *hydrops.* p. 125.

(b) p. 345. Omento consumto intestina adnata *Phil. trans.* n. 333. BONTIUS L. III. *obs.* 7.

(c) *Mém. de l'Acad.* 1705. p. 40. seq. BRUNNER *de pancr.* passim BOHN *lethal. vuln.* p. 26. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs.* 134. MOYLE *mémoires.* Duodenum peritonæo adnatum WEPFER p. 204. & gracilia intestina SAVIARD *obs.* 59. & hepar septo transverso WEPFER l. c.

(d) KAAUW n. 623.

(e) DRELINCOURT *canic.* 7.

vincula, cum certa morte. Qualia natura fecit, lente quidem cedunt tracta, & permittunt, ut colon, aut lien, aut ren in pelvim descendat. Verum hæc cum sensim fiant, & absque violentia, non tantum habent periculi.

§. II. *Mesenterii utilitas.*

Solebat nobis BOERHAAVIUS (a) adfirmare, nullum dari animal, cujus intestina non sint libera. Et habent certe mesenteria sua quadrupeda utriusque generis, calida & frigida (a*), & aves (b) & pisces. Videtur enim & vasorum ad multiplex fere semper intestinorum fyрма iter sustentante membrana egere, & intestinorum vis contractilis non perinde fore libera in officio suo, si intestinum altero fine firmaretur, qua ex parte adeo contrahi nequiret.

Vicissim laxa, aut destructo, mesenterio intestina absque ulla certa sede per abdomen vagarentur pendula (c).

Idem membranam externam intestinis largitur, glandulasque continet, ad iter chyli utiles.

Vasa locat, spatiumque dat, ut in circulos, puto necessarios, etiam repetito possint uniri.

§. III. *Omenti utilitas.*

Diximus, quibus in animalibus omentum reperiatur; nempe fere in quadrupedibus, avium certe crassus ventriculus tenerum & amplum velamentum vix admittit. Quæ tamen animalia omento destituuntur, iis adipis massa pro omento est; & avibus nempe aquaticis (d) aliisque, & piscibus (d*). Aliqua etiam quadrupeda præter omentum gastrocolicum, alias duas strias adiposas secundum abdomen utrinque extensas habent, ut sint tria quasi omenta: gliri (e), muri montana (f) [marmotæ],

(a) Apud HAYMAN III. p. 585.

(a*) Etiam in chamæleonte viscera omne suspenduntur de membrana a cartilagine xiphoide in abdomen demissa SPON *Voyage en Grèce, en Dalmatie &c.*

(b) d. 371.

(c) Exemplum habet RUYSCH *advers. II. n. 4.*

(d) COITER p. 132.

(d*) Secundum intestinum SCHÆFFER *pisc. bavar. p. 92.*

(e) BUFFON T. VIII. p. 232.

(f) Ibid. Quatuor PARIS. Renalem pinguedinem dicit SCHEUCHZER *Phil. transf. n. 395.*

cercopitheco (*g*). Ita factum est, ut ad omentum a cavæ trunco venæ veniant, quod GALENO (*h*) dictum a nuperis repetitur, de homine minus verum (*i*). Iphis demum erucis maxima copia adipis per abdomen disponitur, quam Cl. LYONNET (*k*) pulcherrime descripsit & depinxit; & cochleis adeps ventriculo adnascitur (*l*). Videtur autem ex prioribus, omentum in canē (*m*), & in animalibus raptu (*n*) viventibus, potius majus, & per totum abdomen distributum esse.

Princeps utilitas nunc, & quæ sponte se offert, est utique, mobilium perpetuo intestinorum, mobilium viscerum hepatis, lienisque & ventriculi, ad peritonæum motum frictione liberare, dum omentum se ipsum interponit (*o*) vicinis visceribus, & dum halitu pingui & ipsa obungit & peritonæum.

Validum enim motum esse transversæ septi, & in omni conatu validissimum (*o**), neque debilem per intestina regnare, alias ostendimus (*o***).

Quare deletō omento, intestina (*p*) peritonæo adnascuntur, & viscera omnia inter se confervent (*q*); & intestinorum volumina sibi ipsis coalescunt (*r*):

Dum etiam intestina alternè aut tument, aut constringuntur, compressilis; & mollissimus adeps & replet minus distentum abdomen, & extensis intestinis cedit. Etiam duplicis omenti intervallum in ejusmodi casu deletum fuit, ut oppositæ laminæ coalescerent (*r**).

Verum, cum sanguis de omnibus veris in animalibus quadrupedibus omentis in venam portarum confluat, creditum est, dudumque publice propositum; omenti sanguinem vinosum adipe resorbto repleri, atque ad

(*g*) Du HAMEL *Hist. Acad. Scient.* p. 253.

(*h*) *Uf. part.* L. VI. c. 14.

(*i*) PARIS. ic. & apud PERRAULT.

(*k*) *De eruca salicis* Conf. L. I. p. 44.

(*l*) LISTER *cochl.* T. I. f. 1. K. K. Vocat omentum.

(*m*) *Comparat. anat.* p. 11.

(*n*) p. 371.

(*o*) PETIT *Mém. de l'Acad.* 1725.

(*o**) L. VIII. p. 361. seqq.

(*o***) L. XXIV.

(*p*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. VI. obs. 134.

(*q*) BARTHOL. *Cent.* III. *Hist.* 6. Deletō omento intestina & inter se mutuo connata & ad peritonæum BADER *obs.* 16.

(*r*) COWPER ad tab. 3. BONTIUS *Hist. Med. Ind.* L. III. obs. 7. qui villos connatos vidit. Add. *Phil. transf.* n. 302.

(*r**) SINOP. *parerg.* p. 28.

hepar confluere, ut sit præcipuum futuræ bilis elementum (*s*); quod ostendemus flammam alere, quando ab aqua separatum est.

Plurima argumenta hujus causæ producta sunt. Omentum perpetuo motu respirationis concuti (*t*): adipe turgere fluido, qui in nonnullis animalibus manifesto in venas possit repelli (*u*): variabili esse mole, ut ex pingui obesitate, per hydropem, in araneosam macilentiam redeat, pinguissimique equi (*w*) vix nunc ossa tecta habeant: tenuia in laboriosis hominibus omenta in sedentariis crassescere: eum adipem videri in venas refumi: diarrhoeas adiposas (*x*) longis morbis supervenire, refusi nempe in venas olei: in fetu omentum macrum esse, sed bilem una inspidam.

Olim etiam dictum est, omento resecto ciborum coctionem plurimum fuisse diminutam: successisse perpetuum ventriculi frigus (*y*), & ad mortem usque, per biennium integrum (*z*) tormina, digestionem difficilem, demum hydropem; inque alio homine prostratum appetitum & atrophiam supervenisse, cujus eventus funestus fuerit (*b*).

Addunt, & merito, mesenterii & mesocoli pinguitudinem eodem fine ad hepar conveyi (*c*).

Et tamen sunt, quæ possis objicere, & quorum similia jam eo fine prolata lego. Negant, neque obscuri viri, deleta omenti, certe colicogastrici, magna parte digestionem fuisse diminutam (*d*) & si aliquid passus est ventriculus, malunt mechanice passum esse, a detracto in herniis & in vulneribus omento, unde laceratus ventriculus doluerit (*e*).

(*s*) FAUVRY *anat. raisonn.* WINSLOW IV. n. 388. &c. LIEUTAUD p. 255.

(*t*) COLLINS p. 190. Omentum per vulnus septi transversi in pectus actum SAMFSON *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 3. *obs.* 171.

(*u*) MALPIGH *de oment.* p. 42.

(*w*) *Wath. horses* dici KING *Phil. transf.* n. 18.

(*x*) RAVELLY *dysent* Habent etiam ex alvo adipem TULP. *obs.* L. III. n. 18. HILD. *obs. Chir.* L. IV. n. 47. STALPART. *Van der WIEL Cent.* I. *obs.* 61. Conf. L. I. p. 42.

(*y*) GALEN. *us. part.* L. IV. c. 9.

(*z*) GENGA *anat. Chir.* p. 66.

(*b*) BIANCHI *hist. hepat.* II. p. 1138.

(*c*) MORGAGN. *Advers. anat.* III. *anim.* 2.

(*d*) RIOLAN *anthrop.* p. 99. *enchir.* p. 101. FOREST *obs. chir.* 7. L. VI. VOGEL *von Brühen* p. 194. Ed. II. BECKET *obs.* 41.

(*e*) Intolerabiles inde in ventriculi fundo dolores POTT *en ruptures* p. 64.

Adipem, pergunt, circa renes plurimum esse, & in omentis spuris avium, aut quadrupedum (*f*), unde nihil ad hepar veniat: multum infectis esse, quibus nullum sit hepar.

Equis (*g*) a concussio per magnos motus omento adipem non in venas redire, sed in abdominis caveam quasi fusum (*h*) elabi, & intestinis circumfundi.

Adipis in venas repulsi, exemplum in ranis dubium esse: mihi certe nunquam successit.

Et si hæc videntur fiduciam nostram aliquantum frangere, certum est tamen adipem in venas resummi (*i*), neque finis esset obesitatis, nisi resumeretur. Nunc si de omento, deque mesenterio in venas resorbetur, in hepar utique fertur. Eo si venit, & si bilis super modum adiposa est, cur non pars ejus omentalis adipis ad bilem constituendam infumatur, ego equidem non video.

Quod resectum Epiploon minus ventriculum lædat, ideo fit, quod unici omenti inter multa, & colicogastrici, particula amittatur; pars maxima & totum mesenterium supersit. Si præter hepatis satellitium in aliis animalibus adipis penus est, non dissimulavimus, alias esse adipis abdominalis, & omenti utilitates.

Omentum, perinde & mesenterium, etiam humorem abdominalem forbere, ex morbis probabile fit. His enim visceribus obstructis, enatisque in omento (*k*), vel in mesenterio (*l*), steatomatibus, hydrops frequens supervenit.

(*f*) p. 381.

(*g*) L. p. 42.

(*h*) RUYSCH *Thef.* II. aff. 3. n. 15. etiam in homine *Fränk. Anmerk.* T. III. p. 209.

(*i*) L. I. p. 41. seq.

(*k*) De HAEN *rat. medend.* L. V. p. 40. 41. *Ess. of a Socieç. at Edimb.* IV. n. 30. &c. Calculus in historia MONGINI.

(*l*) Mesenterii steatoma TULP. L. II. c. 33. Ex hydatibus mesenterii TULP. ib. c. 34.

LIBER XXI.

SECTIO I.

LIEN (a).

§. *Quibus in animalibus reperiatur*

MULTUM a constantia ventriculi lien abest. Sola in quadrupede classe animalium calidorum veri nominis lien (*b*) reperitur, & in ea quidem classe tota, etiam in amphibia illa tribu cetorum (*b*), tursionis exemplo (*c*). Exfanguia non habent (*c**).

Avibus (*d*), quadrupedibus oviparis (*e*), piscibus (*f*) lien est, sed minor, aut aliquid certe simile lienis, ventriculo adnatum, in aquila (*f**): ossifraga (*f***), accipitre (*g*), gallopavo (*g**), perdice (*g***), columba (*g*†), pica (*g*††), struthione (*h*), phasianio (*i*), ansere (*k*) ardea (*l*).

(a) Aut Lienis CELSUS IV. c. 19. V. c. 18. Σπλην & σπληνιος POLLUCI p. 259.

(b) RONDELET p. 72.

(c) Globulosus BARTHOLIN C. II. *hist.* 25. Sed ejus loco 10. 12. in omento glandulas habet TYSON p. 19. An lienes succenturiati? Ex analogia tamen, probabile videtur, verum inesse lienem.

(c*) PLINIUS.

(d) Habent PARISINI T. II. p. 142. COLLINS p. 412. Nullum esse HARDER *apiar.* p. 61. Nullum reperiebat COITER p. 132. Quæ vesica carent, iis lien parvus ARISTOT. *part. anim.* L. VII. c. 1. Oviparis exiguus, nonnullis, ut ægocephalo, nullus IDEM.

(e) Serpentibus parvus ARIST. *hist. anim.* L. II. c. 17 & lacertis c. 15. & quadrupedibus oviparis *part. anim.* L. III. c. 7.

(f) In universum HILL. vocat triangulum *review* p. 114. Habet MONRO *compar. anat.* p. 127. RICHTER *ichthyolog.* p. 202. RONDELET p. 72.

(f*) PARIS. III. p. 295.

(f**) Rotundus COITER apud ALDROV. T. I. p. 127.

(g) Parvus rotundus BLAS *anat. anim.* p. 131.

(g*) CHARLET *mantiss.* p. 84.

(g**) ENT. *ibid* p. 7.

(g†) Minus, ut jam ARISTOTELES docuerat, apud ENT *apolog. circul.*

(g††) *Ibid.*

(h) Aliquid spleni simile Phil. *collect.* 1682. Parvus lien Phil. *transf.* n. 386.

(i) STUKELEY.

(k) Cordiformis ALDROV. *Ornithol.* L. XIX. p. 107.

(l) COLLINS *tab.* 22.

Inter ovipara in vipera (*m*) est, & in serpente (*n*), testudine (*o*), marina (*o**), rana (*p*), lacerta (*q*), chamæleonte (*r*), crocodilo (*r**).

Inter pisces in raja (*s*), rana piscatrice (*t*), squatina (*u*), torpedine (*x*), gado (*y*), asello (*z*), farda (*a*), barbo (*a**), passeris fluviali (*a*†), anguilla (*a*††), xiphiæ (*c*), lucio (*c**), perca & lucio-perca (*d*), cernua (*e*), trachino (*f*), cyprino, siluro (*g*), acipenser (*h*), salmone (*i*), trocta (*k*), muræna (*l*).

In avibus equidem non undique cum liene vero consentit. Rubrum est, oblongum, in centro mesenterii positum, cis finem sinistrum, paulo crassius, quidem corpusculum, sed ventriculo vix quidquam nexum,

(*m*) VESLING apud SEVERINUM p. 234. & *Ep.* 4. COITER p. 126. REDI *anim. viv.* p. 93.

(*n*) BLAS *anat. anim.* p. 333.

(*o*) STUKELEY p. 4 phaseoli figura. Parvus CALDESI p. 61. Habet ENT. BLASIIUS p. 338.

(*o**) REDI *anim. viv.* p. 93.

(*p*) STUKELEY JACOBÆUS *Mus.* c. 3. MURALT *vademec.* p. 592. RONDELET L. II. p. 219.

(*q*) PLINIUS L. XI. c. 30. VALISNER. *oper.* II. p. 432. JACOBÆUS p. 109. COITER p. 12.

In Salamandra JACOB. p. 121.

(*r*) SWAMMERDAM p. 418. *Phil. transf.* n. 27. VALISNERI. COLLINS p. 412. Aliquid simile PECHLIN. *obs.* p. 386. Nullus ARIST. *hist.* L. II. C. 11. PEIRESC. in *vita* p. 346.

(*r**) VESLING *Epist.* V. HAMMEN de crocodilo BORRICHIIUS p. 276. PARISINI *Mém. de Mathém. & de Physique.*

(*s*) STUKELEY, COLLINS t. 28.

(*t*) ENT. p. 261.

(*u*) COLLINS t. 29. p. 417. ENT.

(*x*) LORENZINI p. 55.

(*y*) GRONOV. *Act. lit. Upsal.* 1742. p. 93.

(*z*) SCHONEVELD p. 20.

(*a*) ENT. l. c.

(*a**) IDEM.

(*a*†) Ibid.

(*a*††) Ibid.

(*c*) SCHELHAMMER *anat. Xiphiæ.* HARTMAN humano dicit supparem.

(*c**) ENT. p. 261 ALDROVAND. *paralipomen* p. 89.

(*d*) KLEIN *miss.* V. p. 34. Triangulus.

(*e*) Rotundus ibid. ENT. In minori oblongius.

(*f*) GRONOV. l. c. p. 99.

(*g*) Viscus triangulare rubrum ex GRONOV. *mus.* p. 7.

(*h*) COLLINS p. 467.

(*i*) GRONOV. *Act. lit. Upsal.* ann. 1741. *mus. ichthyol.* p. 10. Atro cruori similis ROBERG *piscat. Salm.* p. 11.

(*k*) Triquetrus, acinosus, infra ventriculum positus. Habet etiam aliquos piscium lienes HASSELQUIST p. 329.

(*l*) SEVERIN *Zootom.* p. 369.

hepatis inter lobum finistrum & intestinum anterius, quod a ventriculo advenit, & posterius, quod proxime cæcis augebitur appendicibus additis, adeo parvum, ut nullam ad ventriculum aut hepar rationem habeat, granum non pendens in avicula, analogum omnino corpusculo lieniformi quadrupedum oviparorum.

In piscibus sanguinem colorem, sed totum situm habet veri lienis quadrupedum, etiam figuram (*m*) in iis quos vidi, hinc ventriculo adtensus, inde hepatis & intestino, longus, anterius planus, gracilisque. In frigidis quadrupedibus pro liene habetur ea quæ in centro mesenterii rubra glandula est (*n*), magnis vasis imposita, ut pancreas solet ASELLII (*o*).

§. II. Numerus.

Jam in castore (*a*) & in hystrice (*b*) duo lienēs dicti fuerunt, ut tamen ipsi (*c*) auctores varietatem accusarent, & ab aliis in castore simplex dictus sit (*d*).

Inde in piscibus anguilla (*e*), mullo (*f*), aliisque (*g*) duo dicti sunt.

In homine etiam sæpiusculi vidi, in omento, sub liene veriori, glandulam olivæ figura, lividam, multo minorem, cætera similem veri lieni, quæ nescio quam inter glandulas lymphatici generis, & inter lienem analogiam faceret. Vidi a vase de lienalibus decedenti suspensum viderunt plurimi ante me Viri ILL. (*h*).

(*m*) Triangularem fere esse & nigricare HILL. *review*. p. 114. puto in marinis piscibus.

(*n*) ROESEL T. V. & XIX.

(*o*) Pancreas vocat in vipera CHARAS *tab. 1. F. tab. 22. tab. 3. F. p. 43.*

(*a*) PARIS.

(*b*) IDEM.

(*c*) De hystrice.

(*d*) SARAZIN. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51.

(*e*) COLLINS p. 36.

(*f*) IBID.

(*g*) COLLINS t. 37. f. 6. In pisce plaice f. 5. turbot 3. Kingston *tab. 27.*

(*h*) Duo lienēs BLAS P. IV. *obs. 12. miscell.* p. 298. 300. C. BAUHINUS *theatr. anat.* C. HOFMAN *de liene* c. 10. CABROL. *obs. 15.* PANAROL. *Pentec.* I. c. 3. BOSCUS p. 13. CHESELDEN POSTHIUS ad COLLIN. p. 506. GEMMA *cosmocrit.* p. 205. HAR-

Similis lien secundarius in cane visus est (*i*), & in aliis animalibus (*k*), inque mare ipse vidi. Sed etiam tres lienes Clar. Viri dixerunt (*l*).

Numerosi denique, quatuor (*m*), quinque, ad duodecim (*n*) in tursione visi sunt; numerosi etiam nonnunquam in homine (*o*).

Contra nullum fuisse in animalibus (*o**), & in homine, aliqua exstant testimonia (*p*). In purulenta hydropica (*q*), & in icterico homine (*r*) defuit; a morbo forte confusus.

§. III. *Figura.*

Omnia in liene inconstantia sunt, figura (*a*) vel maxime, tum in diversis animalibus, tum in ipso eodem homine.

Homini quidem brevior lien (*b*) est, quam plerisque, non omnibus tamen quadrupedibus (*b**), estque segmentum de corpore elliptoide exsec-

DER *Exerc.* p. 275. *apiar.* p. 200. BARTHOLIN. *Epist.* 62. *Cent. I. hist.* 80. *Cent. I.* DRELINCOURT apud MANGET *Theatr.* p. 411. *Zod. Gall.* II. p. 153. BOURDON p. 88. MAN ad disp. *de trip.* Heitersbach. I. VERHEYEN p. 85. LIEUTAUD *Eff.* p. 309. STUKELEY p. 5. SCHAAAR-SCHMIDT *Berl. Relat.* 1738. n. 4. 5. MORGAGNI *adv.* III. p. 75. *Sed. & caus.* II. p. 84. 105. FABRIC. *progr.* 1759. Pene omnes majorem dixerunt & minorem.

(*i*) FANTON. p. 117. *Phil. transf.* n. 122.

(*k*) ARISTOT. *gener. anim.* L. IV. c. 4.

(*l*) FALLOP. *obs.* p. 179. FABRICIUS *progr. ann.* 1750. CHESELDEN *Phil. transf.* n. 337. *anat.* p. 167. DRELINCOURT, PACCHION *Opusc.* III. p. 89. des NOURS. Unus magnus, duo parvi VERHEYEN p. 85.

(*m*) FANTON. p. 117. CHESELDEN l. c.

(*n*) TYSON p. 19.

(*o*) Glandulas nigricantes circa lienem, spuriosve lienes habet M. HOFMAN apud TILING *anat. lien* p. 204. Duæ, tres, quatuor glandulæ, sive lienes secundarii in omento, DUVERNEY II. p. 245. Quinque lienes PATIN. *Epist.* 117. Numero incerto plures tamen WINSLOW IV. n. 334. Sæpe dari succenturiatos lienes BERTRANDI *de hepate* p. 12. Lienes tres minores MEDICUS *Warnem.* p. 81.

(*o**) ARISTOT. l. c. & *hist.* L. III. c. 7.

(*p*) HOLLER *morb. intern.* p. 584. C. BAUHIN in edit. ROUSSETIANÆ *hysterotomotocia* p. 238. ubi tamen credas, connatorum viscerum confusam massam incisori imposuisse.

(*q*) POHLIUS *progr.*

(*r*) ZACUT *prax. admir. obs.* 137.

(*a*) SYLV. *Disp.* V. n. 7.

(*b*) VESALIUS p. 626. negat, lienem in homine longum esse add. f. 19. L. V. Bene EUSTACH. T. XI. f. 8. 9. Vidit STUKELEY p. 7. t. 4. f. 1. Neque ARISTOTELI humana fabrica nota fuit, neque RURO, cum longum & multifidum faciant, ille *hist. anim.* L. III. c. 12. L. I. c. 17. Hic in medio angustiore & vestigij humani similem *part.* L. II. p. 59.

(*b**) Rotundum rupicaprae & cervi lienem excipimus.

tum, ut sectio axis habeat longitudinem, sitque ad eundem sensum convexa, in quo superficies ovi. Porro universus ambitus quidem pene ovalis est, cum duobus verticibus, axique longo, brevique. Solidum vero corpus, cujus pars lien est, ita est dissectum, ut lien habeat triquetrum quid: faciem nempe majorem, modice convexam (*c*), ut eadem secundum medium se efferat, ad latera minuatur, inque aciem terminetur. Altera facies lienis in universum excavata (*d*) est, sed ut in ea duæ sint semi facieculæ (*e*), per lineam axi parallelam divisæ, aliquantum cavæ, ut major altera sit, altera minor (*f*), quas linea depressa pinguis dividit (*g*), cum qua vasa adveniunt (*h*) & omentum. Apex uterque obtusus est; alter superior, vel posterior, crassior est & obtusior (*i*); inferior alter anterior est & tenuior.

Verum etsi hæc ita se habent, multis tamen modis etiam in homine figura variatur. Rotundum lienem clari viri viderunt (*k*), & triangulum (*l*).

Frequenter imprimis ora incisa est (*m*), modice, ut ferrata dici possit; deinde profundius etiam (*n*) in varios lobos (*o*), ut denique appendices (*p*) videatur educere, unam pluresve, aut bifidus esse (*q*), aut trilobus (*q**), quadrifidus (*q†*) etiam quinquelobus (*r*) & septilobus.

(*c*) VESAL p. 626. WINSLOW n. 330. EUSTACH. f. 8.

(*d*) EUSTACH f. 9. VESAL.

(*e*) Leves impressiones vocat VESALIUS l. c.

(*f*) WINSLOW n. 334. 331. EUSTACH. f. 9. VESAL. f. 19. n. 2.

(*g*) ALBA HOFMAN l. c. WINSLOW n. 331. Habet VESAL. f. 19. 20.

(*h*) EUSTACH. f. 9.

(*i*) IDEM f. 8. 9. ut inferius quasi acutum addat verticem. CASSER tab. 9. L. VIII. Pingitur a D. JENTY t. 1. f. 3.

(*k*) I. B. FANTON ad obs. 13.

(*l*) Ibid.

(*m*) FANTON. l. c. WINSLOW n. 334. DUVERNEY II. p. 246. In icone CASSER L. V. tab. 1. Lien magnus ferræ similis GRAND Phil. transf. n. 58.

(*n*) HIGMOR disquis. p. 60.

(*o*) DUVERNEY posthum. II. p. 246. Duæ fissuræ LOESECKE obs. ex hon. n. 7.

(*p*) BARTHOLIN Cent. II. hist. 76.

(*q*) SCHNEIDER de liene Thes. 31. TILING de liene p. 221. HORST Epist. p. 447. LOESEL ren. p. 62. PANAROL Pentec. IV. obs. XI.

(*q**) BARTHOL Hist. 81. Cent. III. PAW obs. 13. Journ. de Médec. 1758. M. Maj.

(*q†*) HEUERMAN Physiol. T. IV. p. 37.

(*r*) BARTHOLIN. anat. p. 109. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 2. HARDER apiar. p. 216.

bus (r^*), lobisque digitatis (s). Tuberculata superficies (t) est, & nonnunquam costarum vestigiis (u) inscribitur.

Sed etiam in homine, uti magnitudinem, ita figuram mutare animadversum est (w).

In animalibus maxima est varietas; multis quidem quadrupedibus longus est & angustus, canis, lupo, feli (x), sui, trigidi (y), lynxi (z), catopardo (a), civettæ (b), etiam lutræ (c), castori (d) hystrici (e), porcello indico (f), muri montano (g), erinaceo (h), elephanto (i).

Longior humano & tamen latus est bovi, ovi (l), camelo (m), alci (n).

Vomeris forma est in equo (o); cordiformis simiæ (p); pene quadratus rupicapræ (q); ovalis dorcadi (r), cervo (s), rotundus vespertilioni (t).

In aliis classibus omitto figuras, sæpe valde singulares, ut in galeo pisce, in quo prælongam habet appendicem (u).

(r^*) FEHR. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 2.*

(s) ELLER *de liene* p. 10.

(t) HOFMAN *de lien. C. I. VESAL. l. c.*

(u) LINDEN *Physiol.* p. 68.

(w) LA SONE *Mém. de l'Acad. 1754. p. 193.* Adde DISDIER *Splanchnolog. I. p. 178.*

(x) BESLER *gazophyl.* Cum pede comparat.

(y) PARIS. & in icone leonæ. Eidem maximus septem librarum lien est *Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 5.* Lunatum esse leoni STUKELEY p. 8.

(z) PARISINI.

(a) IDEM.

(b) IDEM.

(c) IDEM.

(d) IDEM.

(e) IDEM.

(f) ENT.

(g) PARIS.

(h) PARIS.

(i) PARIS. GILL. *elephant. descrip.* p. 505. Cur lunatum pingit STUKELEY p. 8.

(l) STUKELEY t. 4. f. 4. Bifulcis rotundum esse excepto bove ARIST. *Part. anim. L.*

III. c. 12.

(m) PARIS.

(n) IDEM.

(o) ENT. Lunatum STUKELEY p. 8.

(p) PARIS.

(q) STUKELEY. Rotundus PARISINIS.

(r) PARIS.

(s) IDEM.

(t) ENT.

(u) CHARLETON *mantiff.* p. 84. PARIS.

§. IV. *Situs.*

Sed neque certior (*a*) situs est, neque in homine, neque in animalibus.

Et primum jam monuimus (*b*), homini quidem aliter & aliter lienem poni, ut ventriculus vel inanis fuerit, vel plenus. Oportet vero eam adnotationem hic repetere.

Perpetuus quidem, in sano homine & recte facto, lienis situs est, ut in laterali & in posteriori parte sinistri hypochondrii sit, caveaque abdominis superioris, & innitatur ligamento (*c*) suo mesocolico, in quo nidum habet impressum: deinde de omento (*d*), & de ligamento phrenico (*e*), in parte cava firmatur hætenus; ab illo ad ventriculum, etiam ad oesophagum & septum transversum; ab isto ad id ipsum septum in semifaciacula posteriori. Convexa parte costis respondet, iisque continetur (*f*), ut in cadavere aperto non adpareat (*g*), nisi productus. Respondet costæ decimæ & undecimæ.

Verum, cum lien valde mobilis sit, & unice fere ad ventriculum adnectatur, fit ut ab ejus facci positione plurimum lienis situs pendeat. In ventriculo adeo pleno, transversus (*b*) pene lienis situs est; ut convexa quidem superficie sua diaphragmati costisque respondeat; concava altera & inferiori, quidem anterieus intestino colo, reni posterius (*b**), superiori ventriculo & capsulæ renali adaptetur: verticem vero obtusum posteriorem, acutum anteriorem habeat, quorum ille se secundum ventriculum anterieus in abdomine paulum ostendit, iste ad capsulam renalem redit.

Ut ventriculus inanitur, ita hæc omnia mutantur. Nam magis & magis obliquus fit lien, ut anterior apex simul inferiori sit loco: semi-

(*a*) Variabilis LINDEN *physiol.* p. 71. La SONE *Mém. de* 1754. p. 193.

(*b*) L. XIX. p. 121.

(*c*) L. XX. p. 356.

(*d*) p. 368. 369.

(*e*) p. 354. 355.

(*f*) CÆLSUS L. IV. c. 1.

(*g*) Conf. EUSTACH. *tab.* 9.

(*h*) WINSLOW *Expos.* T. IV. n. 330. seq. GARENGEOT *Splanchnolog.* T. II. p. 19. f. 2. T. I. p. 304. La SONE *Mém. de* 1754. p. 193. PETIT in PALFYN II. p. 125. HEISTER *fl. de petit.* p. 122. Icon tamen GARENGEOTI non bona est.

(*h**) Reni arcte adnatus T. BARTHOL. *Hist.* 81. Cent. III. nonnihil PLATER *tab.* p. 155. WINSLOW n. 331. CHESELD t. 22. utcunque.

(*i*) Conf. CHESELD t. 21, *Fasc. anat.* I. *tab.* omenti II.

faciëcula inferior nunc posterior fiat, superior anterior sit, & vertex posterior sit superior, quo ad denique hunc situm perfectum occupet (*k*).

Rarum id tamen est, & etiam cum vacuo ventriculo, in pueris, etiam in juvenibus, lienem transversum vidi, ut tantum paulum obtuso vertice adscenderet (*l*).

Altera causa moti lienis est diaphragma, a quo, una cum ventriculo, totus in singulis inspirationibus deorsum (*m*) & antrorsum pellitur; aque contraria vi muscutorum abdominis repulsus vicissim retrorsum fursusque redit. Tanta vis est in eo motu, ut vomitus lienem funesto conatu ruperit (*m*^{*}) & verbera lineis ad latus adlidentis adstantes exaudere potuerint, cum induratus esset (*m*[†]).

Deinde, cum lien solis de ligamentis suspendatur, & tamen sæpe crassior fiat graviorque, non rarum est ipsi, cum extensis suis vinculis descendere, sub linea alba (*m*^{††}), in hypogastrium (*n*), in inguen (*n*^{*}) ubi herniam fecit (*o*); in pelvim denique (*p*). Vidi sinistrum vesicæ adcubuisse in puero annotino. A diaphragmate ad pelvim produci vidit ILL ALBINUS (*q*); quod quidem ita se habere vidi, ut oblique lien per totum abdomen ab hypochondrio ad usque ilia alterius lateris per tegumenta ventris tangeretur.

Omitto, una cum reliquis inversis visceribus in dextro latere visum esse (*r*), aut demum in thoracem commigrasse (*s*).

Hæc ad pathologiam utilia esse possunt: ad physiologiam autem memoria dignum est, lienem quidem in quadrupedibus constanter sinistro

(*k*) Ita pingit VESALIUS L. V. f. f. 20. EUSTACH. t. 10. f. 10. f. 1. CASSER L. VI. T. I. & ante WINSLOWIUM vulgo hoc modo describebatur.

(*l*) Ita fere HEUERMANN *physiol.* T. III. t. 3.

(*m*) *Oper. min.* T. I. p. 299. L. VIII. p. 361. 362. DRELINCOURT *canicid.* VII.

(*m*^{*}) ALBERTI *med. leg.* L. V. c. 45.

(*m*[†]) TULP. L. II. c. 28.

(*m*^{††}) VELSE *ingress. int.* p. 6.

(*n*) RIOLAN *enchirid. pathol.* p. 137. DUVERNEY II. p. 248.

(*n*^{*}) MATTEI p. 271. Ad os ilium MORG. *sed. & caus.* II. p. 225.

(*o*) FAUDACQ p. 473

(*p*) SCHRADER *obs.* Dec. III. n. 4. SCHLICHTING *traumatogr.* p. 21. in VERBRUGGE p. 39. ALBIN. apud MESLON *de liene* p. 1. G. v. SWIETEN p. 248.

(*q*) SCHLICHTING *ibid.*

(*r*) HEUERMAN *physiolog.* T. III. p. 455. Olim ARISTOT *hist.* L. I. c. 17. & in *isag. anat.* & PLINIUS L. XI. p. 630 lienem prodigiose situm mutare. In cuniculo SPIGEL p.

217.

(*s*) BECKER *obs.* I. post L. *de morte sine aqua* DRELINCOURT *de lienosis.*

in latere reperiri (*t*), & cum ventriculo longe neſti (*u*): Non ita vero in aliis animalium claſſibus ſe habere (*w*), ſi omnino veri nominis is lien eſt. In eorum nonnullis etiam dextrum latus tenet (*x*).

In lucio prope anum fedet (*y*).

§. V. *Magnitudo.*

Nihilo hæc quidem conſtantior eſt, quam priores lienis qualites (*a*). Et primo quidem perpetuo molem mutat, ut ventriculus plenus erit, aut viciffim inanis (*b*). Non poteſt enim non comprimi a pleno ſtomacho, & contra coctas urgeri; cumque ſit molliſſimus, & ſanguine pleniffimus (*c*), venamque habeat, quo ſanguis ſe recipiat, peramplam, & laxiſſimam (*d*), non poteſt, non ſanguis de liene verſus hepar premi, atque lienis moles diminui. Viciffim, quando ventriculus inanis eſt, tunc quidem laxum in viſcus ſanguis arteriarum lienalium tanto facilius ſe diffundit (*e*), quanto plus de priori pleni ventriculi preſſione nunc dentum fuit. Addit ILL. Inciſor. & Clinicus (*f*), ideo in hominibus derepente mortuis lienem ſe minorem reperire, majorem vero in iis, in quibus diuturnus languor mortem præceſſit, etiam experimento in ca-

(*t*) ARISTOT. l. c.

(*u*) Ei adjacere STUKELEY p. 32. In quadrupedibus: porcello indico, cuniculo, echino veſpertilione, muſtela, bove, ove, apud ENT.

(*w*) In avibus, ut in perdice ENT. & in cardueli & aliis minutis aviculis coram video. Neque in quadrupedibus oviparis, ut in teſtudine. Neque in piſcibus, raja, ſarda, paſſere, aſello, rana piſcatrice.

(*x*) In teſtudine, rana piſcatrice.

(*y*) ALDROV. paralip. p. 89.

(*a*) RIOLAN. *enchirid.* p. 133. ACREL *om friſka ſor* p. 192. SYLV. *Diff.* V.

(*b*) LIEUTAUD *hiſt. de 1738. Effais* p. 311. *phyſiolog.* p. 145. BORDEU *ſur les glandes* p. 432. Cum magno ventriculo lien minimus *Mém. de 1752.* p. 231.

(*c*) Lien 14. uncias recens pendet, ſiccus drachmam unam STUKELEY p. 7.

(*d*) Cujus robur ſit ad venæ iliacæ robur uti 10. 35. WINTBINGHAM *enquiry Exp.* 37. ad arteriæ ſociæ robur ut 1000. 4812. & ut 1000. 4336. *Exp.* 95. Cum venæ iliacæ robur ad arteriæ ſodalis robur, ſit tanto majori in ratione, quam eſt inter vaſa ſplenis, quanto 836. majus eſt quam 181.

(*e*) LIEUTAUD *phyſiolog.* p. 145. Lien recipit ſanguinis *exundantias* DUVERNEY l. c. Facile lienem inflari la SONE l. c. Compreſſis venis inflatur ad penis modum *Comm. Acad. Petrop.* T. IV. p. 156. Brevi mire intumeſcit ILL. ANON. *de febr. intermitt.* p. 130. In bibone intumeſcens BARTHOL. *Hiſt.* 43. *Cent.* I.

(*f*) LIEUTAUD p. 311.

nibus (*h*) factō. Olim HIPPOCRATES eodem die (*i*) lienem magnum, & iterum parvum fieri adnotavit. Tumor lienis per secessum diminutus (*k*).

Sed ex variis causis magis perpetuis lienis volumen sæpe insigniter augetur, rarius vero minuitur. Homini in universum magnus (*k*^{*}) est, & duplo pro portione quam bovi major (*l*), major etiam animalibus voracibus (*m*), leoni (*m*^{*}), porco (*m*†), castori, civettæ (*m*††). Sed in fetu parvus est (*n*), cum sit ad lienem hominis adulti uti 7. 104. seu fere 1. 55. (*o*) fetus vero universum corpus sit ad corpus hominis adulti, uti 8. lib. ad 160. lib. sive uti 1. 20. Solent lienis pondus in sano homine inter sex uncias & semisse (*o*^{*}), & decem (*p*), duodecim (*q*), & quatuordecim (*r*), demum sedecim (*s*) uncias definire. Verum longe supra id pondus sæpe, neque scirrhus, neque morbidus, intumescit.

Vidi in homine sano pedis magnitudine, uti nuper dixi, abdomine non breviorē. Duplo legitimo volumine majorem vidi excitari (*s*^{*}), & triplo (*s*^{**}). In puero magnus & mollis (*s*†^{*}). Grandis ut ventriculum antè teget (*s*†), & ut intestina comprimeret, vomitumque faceret perpetuum (*s*††). In sana femina maximus (*t*). In scorbutico sanus tamen lien lib. unius cum unc. 5½. (*u*). Hepati æqualem

(*h*) Ibid.

(*i*) *Affect. intern.* FORS edit. p. 110.

(*k*) BIUMI *scrutin.* p. 217.

(*k*^{*}) BIRCH T. IV. p. 537.

(*l*) STUKELEY p. 7.

(*m*) IDEM p. 40

(*m*^{*}) Librarum septem *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs. 1.*

(*m*†) Quinque lib. & semisse *Comm. Nor. 1740. heb. 16. Librarum septem PEYER obs. 41. Rarum utrumque.*

(*m*††) STUKELEY l. c.

(*n*) WELSCH *tab.* 53.

(*o*) SAUVAGES *embryol.* p. 11.

(*o*^{*}) SAUVAGES *pathol.* l. p. 496. cum hepar esset 45. unc. & corpus universum unc. 1140.

(*p*) CHESELD. p. 169.

(*q*) BARTHOL. *Hist.* V. Cent. I.

(*s*) HEUERMAN III. p. 687. SPIELMANN *chem.* p. 171.

(*s*^{*}) *Journ. de Méd.* 1758. M. Maj.

(*s*^{**}) Cum diarrhœa flava MORG. *sed. & caus.* II. p. 256.

(*s*†^{*}) Id. p. 187.

(*s*†) VESAL. p. 627.

(*s*††) BARTHOL. *Hist.* 47. Cent. IV.

(*t*) COLLADO *advers.* p. 73.

(*u*) MEAD. *monit.* p. 223.

in fano homine [*w*] non raro Clār. Viri viderunt. Ita intumescere , ut & dextrum latus & pubem occupet *Alexandri* BENEDICTI est adnotatio [*y*]. In puella 22. mensium atrophica pendebat 9. uncias, sanus tamen [*y**]. Librarum trium lien peculiari funiculo ad ventriculum adnexus [*y*†]. In bimulo puero [*z*] vidi semipedalem, parem adulto, sanum tamen. In puero decem annorum bilibris [*a*] lien fuit, & in quadrienni, subito occiso, cui lien ruptus esset, iterum bilibris [*b*] : in puero vero decem annorum trilibris [*c*]. Tum in homine per vomitum subito occiso [*d*]. Librarum octo cætera sanus in milite [*e*]. Grandis, durus & in hypogastrico [*e**].

In morbis nullus incrementi modus est, scorbuto [*f*], morbo scrophuloso [*g*], hypochondriaco [*h*], ictero [*i*], cachexia [*k*], hydropo [*l*], tabe [*l**]. Post febres intermittentes [*m*], & alias malignio-

(*w*) HORSTIUS *Epist.* p. 477. Etiam FRANKEN. *de hep.* p. 7. 48.

(*y*) L. VIII. p. 482. adde Exempla BEVERWYCK *schat der ongezondh.* p. 105. RAIMOND *malad. danger. à guérir* II. p. 297. CRAUS *de luf. natur.*

(*y**) *Nouv. de la Rép. des Lettr.* 1687. M. Jul.

(*y*†) MORG. *ibid.* II. p. 136.

(*z*) KERKRING *obsf.* 65.

(*a*) BECKET *curat. & obsf.* p. 78.

(*b*) SCHEID *hist. lien rupt.*

(*c*) LANCIS. *post. tr. de mort. subit. obsf.* 3.

(*d*) Fränk. *Anmerk.* III. p. 539.

(*e*) LANZON *anim.* X. p. 54.

(*e**) *Eph. Nat. Cur.* I. ann. 4. 5. *obsf.* 30.

(*f*) BLAS P. I. *obsf.* 14. MEAD. I. c. PYRARD T. III. p. 37. Locis palustribus lien major est SPIGEL p. 240. & in Frisia LIND. *de scorbuto* p. 68. Lienosi milites, qui sub terra cuniculos egerant MAPPUS *de liene.*

(*g*) Decuplo major COCCHI *bagn. di pisf.* P. 238.

(*h*) VESALIUS *rad. chin.* p. 249. 250. In maniaca quadruplo major VEISE *Progr.* V. p. 11. Lien & hepar grandia, cum crederet ægra se puerum gerere FORT *opusc. & fragm.* p. 185.

(*i*) GAL. *di MINERV.* T. VIII. p. 229. 230.

(*k*) KULMUS p. 101.

(*l*) BECKET *obsf.* 34. PROEPER MARTIANUS, MOTTE *obsf.* 124. ut diaphragma repelleret PETZOLD. *obsf.* 65. 77. BARBEIRAC *med. form.* p. 22. 23. ACREL. p. 192. Plerumque hepate majorem esse *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 4. 5. obsf.* 148. Add. COLLADO p. 75. KALTSCHMIDT *de liene indurato* C. B. p. 141.

(*l**) VATER *de lienis prolapsf.*

(*m*) *Febre. interm.* p. 130. A diaria febre tredecim librarum lien HARWIG *obsf.* 48. A febribus multiplicibus & longis sæpe magnus est. MORG. *scd. causf.* II. *Ep.* 31.

(*n*) A tertianis malignis CLEGHORNE *minorca* p. 165. Post febres acutas FANTON. *obsf.* 27. Cum ulcere funesto tibiæ lien lib. 3. & semis. Lien lib. 5. unc. 4. STUKELEY & lib. 5. unc. semis BECKET p. 276.

res [*u*] febres cum vomitu sanguinis [*o*], aut alioquin post morbum perpetuum [*p*], pariter major visus est.

Ita lego lienem repertum esse librarum duarum triumve [*p*^{*}], librarum quatuor [*q*]; librarum quatuor cum semisse [*q*^{*}]; librarum quatuor amplissimum pendulum, qui totum hypochondrium occupasset [*r*]. Librarum quinque & durus in hydropico [*r*^{*}] fuit. Librarum quinque & unc. duarum [*s*]. Librarum 5. unc. quatuor in scorbutico [*s*^{*}]. L. sex cum semisse [*s*[†]]. Librarum septem [*t*], & octo cum novem uncis [*u*]. Librarum duodecim [*w*]. Librarum quindecim [*x*]. Librarum 18. [*y*]. Librarum viginti [*z*]. Librarum 23. [*a*]. Librarum 33. [*b*]. Librarum 43. [*c*]. Horum magnorum lienum plerique fuerunt cum scirrho [*d*] interno, steatomate [*e*], cum hydatibus [*f*] aut cum aqua in ipsum lienem effusa conjuncti [*f*^{*}].

(*o*) MUTZEL *obs.* p. 28. HORST. TILING *digress.* p. 182. *Phil. transf.* n. 209.

(*p*) BARTHOL. C. IV. *hist.* 47 compressis intestinis.

(*p*^{*}) Plenus sanguine putrido, cum hæmoptoe *Phil. transf.* n. 209.

(*q*) BLAS L. I. *obs.* 22. *Nov. Eph. Nat. Cur.* t. 1. n. 70. In ictero WOLF *obs.* 22.

(*q*^{*}) *Fränk. Anmerk.* T. III. p. 530. BECKET *traits* p. 6. corrupto sanguine plenus.

(*r*) BLAS *obs.* 14.

(*r*^{*}) STORCK *ann.* 1. p. 132.

(*s*) CHESELDEN p. 165. SCHLICHTING in VERBRUGE p. 39.

(*s*^{*}) MEAD. *monit.* p. 223. cum hepar esset lib. 4. unc. 4.

(*s*[†]) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann.* 4. 5. *obs.* 30.

(*t*) PACCHIONI *opusc.*

(*u*) KOENIG *regn. anim.* p. 120.

(*w*) HELWIG l. c.

(*x*) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann.* 4. 5. *obs.* 148.

(*y*) DUVERNEY T. II. p. 245. cum vomitu.

(*z*) COLUMB. p. 265. MARC. DON. p. 615.

(*a*) COLLADO.

(*b*) BOSCUS p. 14.

(*c*) FLAMERDINGH *de tum. lienis.*

(*d*) In ictero VALISN. *oper.* T. III. p. 197. 198. In hæmorrhoidario VESAL. in hydrope la MOTTE l. c. FABRIC. *programm.* 1759. GAL. *minerve.* l. c. KERKRING *obs.* 33. cum difficili spiritu. Durus ad pelvim usque protensus STORCK *ann.* 1. p. 113. Ambitu 13. pollicum ut ad ile finistrum descenderet RICHERZ *ad observ.* 2. Ad pubis os descenderat HILD. l. c. n. 53. Quatuor librarum cum scirrho BLAS L. I. *obs.* 22. Durissimus WOLF *obs.* 42. Lapideus, ut etiam sensus esset lapidis ROLFINK *diff. anat.* p. 181. & in hydrope TILING p. 409. ut ejus verbera exaudires TULP. L. II. c. 28. In althmatico PETZOLD. *obs.* 58. Lienis in magnitudine varietates plurimæ. Lien librarum 2. p. 81. & $\frac{2}{4}$ p. 75. & 3. lib. MEDICUS l. c. p. 70. Lien 3. lib. unc. II. in dysenterico PRINGLE p. 264. Lien $3\frac{1}{2}$ lib. cum calculis felleis *Journ. de Médecine* ann. 1757. m. Nov. Lien 4. lib. in febre intermittente MONRO *diseas of hospit.* p. 198. In febribus intermittentibus lien est ea, quæ dicitur, placenta IDEM *ibid.* Sin in Surinam, vel lien, vel hepar post febrem intumescit TERMIN. *malad.* p. 85. In porcello Cassovienfi lien durus, tensus, sanguine plenus ADOLPHI de eo morbo.

(*e*) BARTHOL. *Hist.* 80. Cent. I. ROEDERER *programm.* p. 4. WENKER *vuln. ventric.*

(*f*) In sacculos mutatus, cum triplo & quadruplo major esset *Eph. Nat. Cur. Vol. IX.* n. 68. Librarum trium cum hydatidibus in membrana comprehensis CHESELD. p. 163.

(*f*^{*}) *Hist. de l'Acad.* 1753. p. 133. ut contineret pintas sedecin.

Frequentissimus autem schirrhus est, ex antiqua adnotatione ARÆTÆI (*f***). Vidi durissimum lienem ex albo & rubro ad marmoris modum varium. Etiam calculi ibi reperti sunt (*ft*). Et membrana externa (*g*) sæpe crassescit, ut lineæ crassitie visa sit, aut plena scirrhis, etiam cartilaginea (*h*), & ossea (*i*) & fere lapidea (*k*). Vidi utrumque; & huc refero striam cartilaginofam in dorso lienis (*l*) visam, & cicatricem (*m*). Alias in ea membrana morbosæ glandulæ nascuntur, quibus lien obducitur (*n*). Alias granis fabulosis adspersitur (*o*), vel adipe durissimo (*p*).

Est tamen ubi contrario vitio lien sanguine quasi putrido plenus fuit (*q*); quo pertinent casus lienis rupti (*r*): & una mollissimi, ut a febribus (*s*), & in hominibus atrabilariis (*t*). A febre acuta lien putre-

(*f***) *Caus. diuturn.* I. c. 14. GALEN. *meth. med.* L. XIII.

(*ft*) Arenarius 35. grana pendens ROEDERER *prog. ann.* 1758. p. 4. Lapidibus plenus lien FONTAN. *anal.* p. 90.

(*g*) MEIBOM de *obs. rar. in cadav.* C. BAUHIN. p. 141. BARTHOL. I. c. HELWIG *obs.* 98. *Hist. de l'Acad. des Scienc.* 1753. p. 133. LUDWIG de *viis bil. cystic.* sano cum viscere. Frequens esse BOSCHUS p. 13.

(*h*) MAUCHART *lumbric. in duct. pancreat.* SCHENK *Exerc.* p. 435. *Mém. de l'Acad.* 1722. p. 161. FANTON. *Obs.* XI.

(*i*) SPIGEL p. 240. QUELMALZ de *liene.* MORG. I. c. p. 145.

(*k*) PECHLIN *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs.* 31. Crusta cartilaginea obductus HOFMAN *morb. lien n.* 5.

(*l*) WEISS. *Specim.* I.

(*m*) IDEM *Comm. Nor.* 1740. p. 35.

(*n*) MANGET *bibl. p.* 372. *theatr. p.* 552.

(*o*) Corpora duo cartilaginea WEPFER *apopl.* p. 321. Officulum adnatum SINOP p. 69.

(*p*) VESAL. I. c.

(*q*) ALBERTI *Med. Leg. T. V. v.* 45. H. c. HEERS *obs.* 25 BECKET *tracts* p. 6. Lienis sphacelus SINOP. p. 69. CUENOTTE *disp.* In virgine *Phil. transf.* n. 194. Frequenter quasi gangræosa materie repleti EUVERNEY *post. T. II. p.* 248. & piceum vidit SIMSON p. 154. Lien duarum librarum. plenus sanguine coacto *Frank. Annmerk.* III. p. 427. Lien præmagnus & mollis MORGAGN. *sed. & caus.* II. p. 187. Lien 4 $\frac{1}{2}$ lib. corrupto sanguine plenus BECKET *tracts* p. 6. & similis casus cum esset 2. 3 lib. *Phil. transf.* n. 209.

(*r*) *Comm. Nor.* 1736. *hebd.* 16. SCHEID. in propria *diff.* I. c. ALBERTI I. c.

(*s*) CLEGHORNE p. 165. STORK *ann.* I. p. 31. In iis casibus quatuor & quinque lib. pondus adigit CLEGHORN.

(*t*) WALTHER de *atra bile* CHIFFLET *obs.* 37.

(*u*) LOSS L. III. *obs.* 45.

factus, absumentus, & in ejus sede materia picea nigra [u]. Lienis loco materies putrida (x). In chronicis morbis id frequens est (x*).

Rarum est grandem lienem supputari (y). Reperio tamen, qui septem pintas puris continuerit. Ulcerosus a percussa scabie (z). Non facile id malum percipi posse ARETÆUS. Rarissimum esse TILINGIUS.

Rarius est, nimis parvum reperiri; fuit tamen, duabus unciiis non major in homine, cui amplissimus erat ventriculus [a]. In vetula cum hepate scirrroso parvus (b). In scorbutico non major pomo borsdorffiano (c) [quod est inter minima]. In diuturno morbo lien parvus, durus (d): & parvus putridus, cartilagineus (e). Splen parvus cum ventriculo consumto (f), ejusve visceris longo morbo [g]. Parvus cum concrementis in aorta & in bronchiis [h]. Parvus in hydrope [i]. In ictero [k]. Uncialis [l] cum hepate vastissimo, aut scirrroso [m], & purulento [n]. In melancholico parvus (o) In morione minimus (p). Intelligitur comprimi posse & elidi, denique consumi (q).

(x) H. de HEERS *obs.* 25.

(x*) LOESECKE *obs.* p. 31.

(y) *Hist. de l'Acad.* 1753. l. c. SCHOBINGER ad HILDANUM. G. v. SWIETEN T. III. p. 154. de HAEN *diffic.* p. 81. 82. De historia *Eph. Nat. Cur.* C. VIII. *obs.* 67. non pronuncio, uti neque de inflammatione lienis apud SACCUM *conf.* 91.

(z) *Bresl. Saml.* 1725. p. 228.

(a) LIEUTAUD *Mém. de* 1752. l. c.

(b) FABRIC. *progr. ann.* 1759.

(c) MANN l. c.

(d) HEUERMAN *physiol.* T. IV. p. 37.

(e) TARGIONI *off.* p. 92.

(f) RICHERZ *obs.* 3.

(g) GUARINONI *conf.* 388.

(h) ROEDERER l. c.

(i) VESAL. p. 627.

(k) *Ibid.*

(l) SALMUTH C. I. *obs.* 21. BARTHOL. *Cent. I. Hist.* 45. Cum hepate scirrroso VESAL. *Chin.* p. 252.

(m) FABRIC *progr. ann.* 1759.

(n) BLAS L. I. *obs.* 11. callosus. In eodem casu sanus LOTICH. L. IV. c. 3. *obs.* 3.

(o) *Comm. nor.* 1740. *heb.* 21. CHIFLET *obs.* 38. STORK *ann.* I. p. 115. Parvus in co morbo SYLV. *Diff.* 5.

(p) KLAUNIG *obs.* 10.

(q) Ut globuli tantum superessent BLAS L. I. *obs.* 25. A febre acuta LUSE. L. III. n. 45.

§. VI. *Color Mollities.*

In homine sano lien (*a*) spongiæ quamdā habet naturam, quæ plurimo sanguine ebria sit, ut cedat sub digitis, facillime vero violetur, & rumpatur, etiam ab exiguo ictu (*b*), aut a lapsu (*c*), etiam integra per tegumenta, quæ mortis subitæ non infrequens causa est. Aut denique ex interna causa (*d*), absque violentia aliena, lien dissiluit, pariter funesto eventu, a saltu (*e*), a gravidæ feminæ vomitu (*f*).

Color ipsi in fetu rubicundior (*g*) est, tum in avibus, piscibus, quadrupedibus frigidis & carnivoris calidis (*h*). Adulto in homine lividus est, cæruleo quodam colore ad rubedinem sanguineam admisto, qualis est niagnarum venarum in cadavere color. Est tamen, ubi & tunc floride rubet (*i*). In scirrho albo & livido maculosum, quasi marmoreum vidi, uti modo dictum est. Pondus ad aquam est ut 1. 660. ad 1000. (*i**).

§. VII. *Membrana externa lienis.*

Nihil est valde, cur de hoc velamento disputetur. In homine certe unicum (*a*) est, firmum, simplex, filis conspicuis destitutum (*b*), pertinaciter lienī nexum, telæ ope cellulosæ, a peritonæo continuatum (*c*), eique simile.

(*a*) ORIBAS. p. 120. SYLV. c.¹

(*b*) BOHN *offic. medic. dupl.* p. 591. *Comm. nor.* 1735. *hebd.* 16. SCHAARSCHMID *Berlin. Nachricht.* 1738. n. 4. GOEKEL *Cent. II. Conf.* 20. VALENTIN. *Chir. med.* p. 902. *Pand. II.* p. 408. ALBERTI *Med. Leg. T. II. cas.* 16. & procul dubio FONTAN. ad VESAL. p. 21. LOBSTEIN *de nerv. access.* p. 40.

(*c*) SCHELD *de liene rupt.* p. 26. POHI *de prostat. calcul. affect.*

(*d*) VESAL. p. 628. HOFMAN apud TROPANEGGER *præf. K. Suensk. Wetensk. Acad. Handl.* 1742. p. 261. A quartana neglecta SENAC *febr. interm.* p. 130.

(*e*) SCHAARSCHMID *Berlin. Nachricht.* 1740. n. 26.

(*f*) ALBERTI *med. leg. T. V. c.* 45. *Comm. nor.* 1740. *hist.* 30. ut videtur.

(*g*) MOTH. ad WORM *Epist.* p. 575. COLLINS p. 412. FIZES *de liene* p. 107. STUKELEY p. 8.

(*h*) Leone STUKELEY p. 8. & aliis.

(*i*) FEHR. *Eph. Nat. Cur.* SPIGEL l. c.

(*i**) MUSCHENBR. *introd.* p. 556.

(*a*) WINSLOW n. 336. timide tamen; firmius la SONE p. 194. VERDIER. II. p. 111. GARENGEOT.

(*b*) Fibras radiatas musculares vocat STUKELEY p. 7. Aliquid simile nonnunquam in homine vidit la SONE *Mém. de* 1754. p. 194. plicas forte, non rarissimas.

(*c*) Recte KAAUW *perspir.* n. 573. Cur ab omento deducunt DISDIER TANARON *Pratig. de Chir. T. I.* p. 63.

In vitulo utique duo (*d*) sunt involucra, quæ etiam cultro separare possis. Ab eo animale ad humanum lienem sunt translata (*e*).

Poros in hydropici lienali involucro vidit. Vir ILL. (*f*), & certum est perspirare, quæ conjectura BOYLEI (*g*) experimentis confirmatur, a KAAUVIO factis (*h*), & a nobis iteratis. Nam & arteriosus ros & venosus de ea membrana sudat, quando ejus visceris vasa aqua, aut piscium glutine repleta fuerunt.

§. VIII. *Arteriæ lienis* [*a*].

Pleraque in descriptione arteriæ coeliacæ dicta sunt (*a**). Multa est varietas (*b*) truncorum, quibus numerosioribus, aut paucioribus, arteria lienalis, per rotunda, sibi que parata foramina (*c*) lienis interiora subit, multo ubique omento quasi sustentata, dum ab imo liene ad summum se circumflectit. Magnus est utique truncus, etsi non tantus, ac quidem vulgo legimus. Diameter in puero trienni mihi fuit quatuordecim centesimarum, in octodecimestri 13. in trimetri 12. Hepatica tamen aliquanto in junioribus major (*d*) in adultis potius minor (*d**) est, ut certe vidi.

Magna tamen hic lienis est prærogativa (*e*), cum hepar ejus visceris sit quintuplum, & arteriam habeat paulo majorem. Mesentericæ, cui splenicam æqualem fecerunt (*f*), lumen quadruplo (*g*) fere majus, ut lumina splenicæ & majus lumina coeliacæ in ratione 24². ad 22². 24². ad 19². 17². ad 13². Paulo minor ejus ad venam suam est portio,

(*d*) MALPIGH. *de liene* p. 102. Edit. *Angl.*

(*e*) FANTON. p. 117. FIZES p. 105. DISDIER *splanchnolog.* STUKELEY p. 8.

(*f*) FANTON. *obs. ult.*

(*g*) Plus perspirare quam cutem *de porositat corp.* p. 18.

(*h*) n. 562. n. 10.

(*a*) Ante COLUMBUM C. STEPHANUS p. 142. & VESALIUS habet p. 628.

(*a**) L. XIX. p. 146. seqq.

(*b*) Varietates vide *Fascic.* VIII. p. 34.

(*c*) CASSER L. VIII. t. 9. f. 1. STUKELEY t. 8.

(*d*) p. 149.

(*d**) *Fascic.* II. tab. *coeliac.* II.

(*e*) Multas in liene arterias esse HARVEI *generat.* p. 240.

(*f*) BOREEL. *mot. anim.* L. II. *prop.* 198.

(*g*) Rationes in adversariis habeo 156. ad 576 : 121. 361 : 156. 729 : 100. 400 &c.

fere 156. ad 676. Serpentinam (*b*) advenire dictum est, potissimum quando arteriæ cera sunt repletæ (*b**).

Robur fatis insigne est, & multo quam in aorta majus, in ratione 1312. ad 1000. (*i*), si de aorta prope ramorum emulgentium originem sermo fuerit, aut 148. ad 100 (*k*), si de aorta ad iliacas. Ad venam suam, ut ostendimus, robur habet ut 4812. ad 1000 (*l*), & ut 4336. ad 1000 (*m*).

Tulit impulsas in vero sex atmosphæras cum $\frac{2}{10}$, quam pressionem ad 41. lib. uncias octo Vir. Cl. æstimat (*n*).

Præter hunc præcipuum truncum lien vix quidquam accipit, neque enim ramuli fere nominari merentur, quos arteria phrenica sinistra (*o*), lumbalis prima (*p*), & spermatica sinistra ad ligamenta lienis & ejus proximam superficiem mittunt. Aliquando sed raro, secundus truncus minor a cæliaca ad splenem venit, prius ex cæliaca natus, quam splenica vulgaris (*p**).

Pulsatio lienis videtur ad arteriam ejus pertinere (*q*).

§. I X. *Vena splenica* (*a*).

Unica, grandis, in universum arteriæ socia vena (*b*), est alter præ-

(*h*) ARANT. c. 35. CASSER. L. VIII. tab. 9. f. 1 BIDLOO t. 36. f. 1. STUKELEY tab. 1. COWPER *Phil. transf.* n. 280. (in adulto homine etiam magis). WINTRINGHAM *enquir.* RUYSCH. *Ep* IV. t. 5. f. 2.

(*h**) Absque flexu vidit MORG. *sed. caus. morb.* II. p. 200.

(*i*) WINTRINGHAM *ibid.* *Exp.* 36.

(*k*) *Id.* *Exp.* 48.

(*l*) *Id.* *Exp.* 37.

(*m*) *Id.* *Exp.* 34.

(*n*) *Id.* *Exp.* 34.

(*o*) *Fascic. Ic.* III. p. 54. Vicissim aliæ a lienalibus in septum transversum excurrunt. RUYSCH. *Epist.* IX. p. 11.

(*p*) *Fasc.* I. c.

(*p**) *Tab. arter. cæliac.* II. f. & not. *k*. Hæc est forte arteria lieni propria BERGERI, quam rejicit SCHELHAMMER *physiolog.* p. CCXIX.

(*q*) Dicta TULPIO L. II. c. 28. STUKELEY p. 43. LINDEN *physiol.* p. 98. Ad 30. pedes exaudiri TULP.

(*a*) EUSTACH. T. XXVII. f. 2. 4.

(*b*) IDEM I. c.

cipuus est truncus venæ portarum, paulo quam mesenterica minor (*b**), & cum ea conjungitur in ora pancreatis, paulo sinisterius quam valvula pylori.

Diametrum reperi 15. centes. in puero trimestri, 19. cent in octodecimemestri, 26. in trieni, & 33. in septenni.

Paulum ex ortu a vena portarum descendit (*c*), cæterum transversa est, & pone (*d*) pancreas, & sub arteria fodali, in fulco pancreati (*d**) posteriori, supra mesocolon, ex conjunctione sua, sinistrorsum tendit rectior, & minus serpentina (*e*), quam arteria ejusdem nominis.

Edit. nonnunquam venam hæmorrhoidalem (*f*), etsi ea aliquanto frequentius ex mesenterica nascitur. Rarius eam truncus vena portarum dedit, secundum sinistram limitem lobuli. Aliquando etiam splenica duodenalem aliquam ex origine sua generat.

Dat perpetuo, non longe ab origine sua, ad ventriculum euntem venam *coronariam sinistram* (*g*), magnam, quæ pone pancreas ad oesophagum venit, cujus alter ramus, circa finem oesophagi, pene in circulum conlectitur (*h*); alter per curvaturam minorem excurrit (*i*); dextræ coronariæ se immixturus (*k*).

Porro ramos dat ex ordine numerosos *pancreaticos* (*k**); & *gastricas posticas* (*l*) venas, similes arteriis fodalibus, in planum ventriculi posterius, inque faccum cæcum: denique *gastroepiploicas* (*m*) numerosas; quæ ab ultimo cæco sacco ventriculi sinistrorsum per omentum, cum suis arteriis stomachum adeunt, & deorsum pariter epiploicas emittunt.

(*b**) Major NICOLAI *direct. vas.* p. 99. Sed minor est in BERTRANDI mensuris in ratione 309. & 316. ad 327. p. 25. rectius omnino. Reperio diametros fuisse 26. & 18.

(*c*) EUSTACH.

(*d*) IDEM.

(*d**) BERTRANDI p. 13.

(*e*) CASSER L. VIII. *tab.* 9. f. 1.

(*f*) WEPFER *Phil. transf.* n. 280. LOESEL *ren.* p. 62. EUSTACH. t. 27. f. 4. SPIGEL L. VI. *tab.* 1. MARCHETTI. PAREUS II. c. 21. Sæpe WINSLOW n. 253. Constanter WALTHER *ven. port.* p. X.

(*g*) EUSTACH. utrinque STUKELEY *tab.* 2. 7. sed nimis parvam.

(*h*) EUSTACH. f. 2. STUKELEY VESAL. L. V. f. 12. L. III.

(*i*) EUSTACH. f. 2. 4 STUKELEY *tab.* 2. 7. WINSLOW n. 254. VESALIUS LEONCENA.

(*k*) EUSTACH. f. 4.

(*k**) Habet EUSTACH. STUKELEY *tab.* 7. WINSLOW n. 256. VESAL.

(*l*) Habet EUSTACH. STUKELEY *tab.* 2. 7. VESAL. L. III. K. L. V. f. 2. 5.

(*m*) Semper unam EUSTACH. STUKELEY.

Earum, quæ infima, dexterior, major, dextrorsum contra curvaturam majorem ventriculi reddit, sursum ventriculo (*n*), deorsum epiplooo impensa (*o*), & plerumque circulum cum Gastroepiploica dextra abfolvit (*p*).

Inter eas princeps aliqua, *Epiploica sinistra*, vel ex lienalibus etiam nata, per omentum gastrocolicum dextrorsum ducta, cum dextris vasis in retia unitur.

Supremæ vero gastricarum finiftrarum, ex lienalibus fere naturum, etiam ex ipso liene (*r*), omnino ut arteriæ, *brevia* (*r**) vasa audiunt, eæque sunt, quarum ramos atram bilem vehere dictum est (*s*).

Truncus lienalis pufculis ramis, ut arteria socia, lienem adit, in foramina ejus visceris demerfis (*s**).

Duas splenicæ fuisse rarum est (*t*).

Surculi exigui venosi, olim recte dicti sunt; phrenicas venas cum lienalibus connectere (*u*).

Etiam a renalibus venis furculos ad lienem venisse legitur (*w*). Intelligo ex vicinia utrumque locum habere potuisse: aliasque ab intercostalibus, capsularibus, & renalibus, & lumbalibus adcedere potuisse.

Ut laxa (*w**) est vena lienalis, ita facillime ex arteria in venam quiscunque inmissus liquor (*x*), aut hydrargyrus (*y*) transit, etiam cera, potius facilius, quam aliis in visceribus (*z*). Magna autem & conspicua arteriæ splenicæ cum vena anastomosis (*a*) equidem fabulosa est.

(*n*) CASSER L. VIII. tab. 4. f. 2. STUKELEY tab. 2. 7. WINSLOW n. 258.

(*o*) CASSER ibid. STUKELEY tab. 2. 7.

(*p*) WINSLOW n. 257. Conf. L. XIX. p. 148.

(*q*) STUKELEY tab. 2. WINSLOW n. 260. VESAL. Z. WALTER p. X.

(*r*) RUYSCH ibid.

(*r**) EUSTACH. f. utraque STUKELEY ex rene tab. 7. WINSLOW n. 261. RUYSCH *Epist.* IV. tab. 4. f. 1.

(*s*) L. XIX. p. 155.

(*s**) STUKELEY tab. 7. 8. WINSLOW n. 261. add. RUYSCH. f. 1. T. 4.

(*t*) BLAS *obs.* P. IV. p. 13. ALBRECHT *obs.* 8.

(*u*) HABICOT d. I. *Lect.* II.

(*w*) SYLV. *Isag.* p. 70. JENTY t. 2. f. 2.

(*w**) p. 403.

(*x*) RUYSCH *Thef.* III. n. 13. PERRAULT *Eff.* T. III. p. 232.

(*y*) VIEUSSSENS *observat. d'anatom. & de medec. pratiq.* p. 107. 109.

(*z*) Facillime transire in lienem COWPER *Phil. transf.* n. 280. etiam STUKELEY p. 10. 17.

(*a*) CASSER L. VIII. tab. 2. f. 1. 4. SPIGEL p. 240. DIEMERBROECK p. 81. BARTHOLINUS tab. 15.

Ligata portarum vena, lien turgēt (*b*).

Valvulis in homine destituitur, nam in animalibus dicitur habere (*b*^{*}).

Ab ejus venæ historia ergo removeere oportet, valvulas primo, quas nullas habet (*c*): deinde ramos ingentes colicos (*d*), quos vetusti aliqui anatomici, ut puto, a mesentericis vasis ad splenica traduxerunt, quorum furculi exigui sunt; porro mesocolicæ venæ ortum ex vena lienali propria visum (*e*): & mirum naturæ institutum, quo dicitur vena splenica in suum cavum arteriam sodalem recipere (*f*), ut in quoque ramo venoso, arteriosus pallelus contineatur: Sed denique etiam foramina (*g*) illa admitti nequeunt, quibus in vitulo, & in rupicapra ea vena sanguinem dicitur in cellulosa spatia lienis, absque medio ramorum commercio, emittere: neque enim aut in homine, aut in ipso vitulo ea fabrica vere obtinet, etsi mollissimæ venæ rami possunt foraminibus similes in truncum insertiones habere. Sed neque satis novi cellulas, prope extremam splenicam venam in homine dictas COWPERO (*h*).

§. X. Sanguis lienalis.

Cum veteres atram bilem (*a*) in liene nasci & habitare fere scripserint, non inutile fuerit, sanguinem inspexisse, qui liene continetur. Fluidum eum semper reperi (*b*), ut nunquam viderim coactum, qualis quidem frequenter in vasis vivi animalis reperitur; neque exemptus in

(*b*) ORTLOB *cholepojes negot.* n. 10.

(*b*^{*}) Tres SNAPE, aliquas HIGHMOR. tab. 6. p. 61. Habet etiam ENT. p. 102. TILLING *vaf. brev.* 144. p. 117. Negabat jam D. de MARCHETT. p. 29.

(*c*) L. II. p. 144.

(*d*) VESAL. L. III. S. L. V. f. 4. 7. f. 5. C. STUKELEY t. 2. 7.

(*e*) STUKELEY t. 7.

(*f*) STUKELEY tab. 3. in vitulo; tab. 4. f. 1. 3. in homine.

(*g*) HIGHMOR. L. I. P. III. c. 3. tab. 7. f. 1. ENT. SALZMAN *obff* ENT. I. c. STUKELEY tab. 3. f. 3. tab. 4. f. 1. 2 SBARAGLI *ment. & ocul. vigil* p. 142. Monet in vitulo solo locum habere, aut in animalibus, quibus arteria, & vena, unico trunco lienem subit LA SONE l. c. p. 251. In ove & elephante DUVERNOY *Comm. nov. Acad. Petr.* T. IV. p. 158. In equo & ove ENT. p. 104. &c.

(*h*) *Phil. transf.* n. 280.

(*a*) Etiam super scriptum est, in liene stagnare sanguinem, & unguenti nigri similis fiat, quæ sit atrabillis veterum *Mém. de l'Acad. de Chirurg.* l. p. 139. Dudum ostendit GLISSONIUS, non esse melancholicum p. 445.

(*b*) FIZES l. c. SENAC l. c. ROLOF *de liene* p. 56. BOHN *circul.* p. 258.

homine factò cogitur (*c*), colore vero potius tristiori (*e*), quam alibi soleat (*f*).

Deinde accuratius Cl. ROLOF carus noster olim auditor, eum sanguinem analysi chemicæ (*g*) subjecit, cumque sanguine aliarum venarum comparavit. Reperit, & aquæ plus habere in ratione $\frac{34}{32}$. ad $\frac{26}{32}$, & præterea, quæ mea (*h*) conjectura fuerat, falis volatilis aliquanto plus, olei vero empyreumatici minus, a quo credas sanguinis viscidam naturam augeri. Minus enim nigræ massæ in fundo vasis superfuit, in ratione 3. ad 6. Cl. quidem HEUERMANNUS ex vena lienali minorem copiam & aquæ & olei eduxit, quam ex cavæ sanguine (*h**), sed eam credam unicam fuisse analysin. Neque unico experimento sententiam nostram confirmavit ROLOFFIUS, VIR CANDIDUS ET EGREGIUS, sed multis omnino, quæ in variis animalibus, & in eorum quoque iterato, similiter ceciderunt: ut inter *data* recipi possint, quibus porro theoriam superstruas.

Etiam ILL. MEKELIUS fluidum in liene & vena portarum sanguinem reperit, cum in tota vena cava coactus esset (*h*†).

De liene pendente uncias duodecim destillarunt spiritus urinosi uncia 8. olei empyreumatici tantum drachmæ duæ (*i*).

Lien sanguine valde plenus est, ut vel ex colore videas. Libram in sano splene contineri Cl. STUKELEY (*k*), sed ex conjectura. Per experimentum IDEM lienem humanum ficcatum a 14. unciis ad drachmam, caprillum ad drachmam semis, porcelli guineensis lienem ad grana duo rediisse vidit (*l*), ut fluidæ partis magna sit portio.

(*c*) FIZES ROLOF. BOHN *circul.* p. 258.

(*e*) Non bene coccineum dicit FIZES p. 110. III. BOHN *duumvir hypoch* n. 7. & WALTHERUS *de lienis prolaps.* floridum spumantem.

(*f*) Recte ROLOF. *ibid.*

(*g*) *De lienis fabr.* n. 4. p. 57. 58.

(*h*) *Prim lin. physiol.* n. 428.

(*h**) $\frac{3}{8}$. aquæ cum paucò oleo empyreumatico, in venæ vero cavæ sanguine $\frac{7}{8}$. aquæ *Physiol.* T. III. p. 736.

(*h*†) *Mém. de l'Acad. de Berlin* 1748. p. 40. 41.

(*i*) SPIEMANN. *Chym.* p. 179. *compar.* cum L. V. p. 103.

(*k*) p. 63.

(*l*) p. 7.

§. XI. *Nervi.*

Nervos alias diximus, ex ganglio semilunari sinistro, plexusve potius sinisteriori parte (*a*), atque ex intermediis plexibus natos, & cum octavi paris plexu posteriori (*b*), conjunctos. Arteriæ lienalis comites (*c*) sunt; eadem pinguedine obvoluti, exigui utique (*d*), ut non possis Cl. Viros probare, qui magnos lienis nervos tribuerunt (*e*).

Hinc parum omnino (*f*) lien sentit (*g*), vel in vivis hominibus & animalibus. In ægris, abscessus in liene latentes ægre percipi, quod obfcurus ejus visceris sensus esset, olim ARETÆUS.

Cum lien crasso pure plenus reperiretur, præcesserat obtusus (*h*) dolor. In vulnere lienis nulla inflammatio (*i*). Ita neque irritabilis (*k*) est, nisi ex veneno chemico.

§. XII. *Vasa lymphatica.*

In vitulo facile est experimentum.

Inflatur sub membranam lienis aer, & continuo plurimi trunci lymphatici vasculosi & nodosi adparent, undique de tota superficie visceris nati, qui cum magnis vasorum sanguineorum truncis porro versus originem lumbalem (*a*) cisternæ chyli tendunt. Maceratione sola conspicuos reddebat MALPIGHIUS (*a**). Addit Cel. HUNTERUS, adjuvari experimentum, si ita arteriæ venæque repleveris, ut crepent, sic aquam vel liquorem impulsam in lymphatica penetrare (*b*). Sic olim F. RUYSCHIUS (*c*), ligata vena lienali, & contrectato viscere, vasa lymphatica demonst-

(*a*) L. X. P. 263.

(*b*) p. 236. WINSLOW III. *tr. des nerfs* n. 407.

(*c*) STUKELEY *tab.* 8. p. 23.

(*d*) GALEN. *util. part.* L. XIV. c. 13. VIEUSSSENS *tab.* 23. n. 64.

(*e*) STUKELEY p. 22. 23. 24. Multos ENT. p. 103. BELLIN. *de gustus organ.* p. 87.

(*f*) Sensibilem esse RAULIN *vapeurs* p. 355.

(*g*) BOERHAAVEI *prælect.* L. III. p. 60. 61.

(*h*) G. v. SWIETEN *Comm.* T. III. p. 154.

(*i*) MAUCHART *inspect. méd. leg.*

(*k*) Fecerunt RAULIN LORRU *Journ. de méd.* 1756. M. Decembr. Persæpe vidî non esse contractilem.

(*a*) L. II. p. 173. Ad plexum hepaticum ZELLER.

(*a**) *Conglob.* p. 3.

(*b*) *Degland.* p. 11.

(*c*) *De valv. lymph.* c. 3.

trabat. Per arterias replebat C. BARTHOLINUS (*d*) & NUCKIUS (*e*). Per venas inflabat COWPERUS (*f*), aut aqua replebat MONRO (*g*).

In animalibus dudum abunde innotuerunt, a primis hujus angiologiæ primoris, atque descripta reperiuntur, apud ipsum J. VESLINGIUM (*b*), & apud OLAUM RUDBEKIUM (*i*), tum apud alios Cl. Viros (*k*). In homine rara est memoria. Subinde unum alterumve se vidisse in posthumis CASSEBOHMIUS, & pauciora esse RUYSCHIUS fatetur, & NUKIUS (*l*): & J. B. WINSLOW (*m*). In sue externa sunt, & interna (*m**). Interna in homine non subeunt (*n*), aut parum (*o*), & superficiem fere sequuntur (*p*). Secundum totam arteriam splenicam, ad finem usque lienis glandulæ conglobatæ abundant, quas adeunt.

§. XIII. *Ductus excretorius.*

Analogia lienis cum hepate, aut rene, quæ viscera per ductum excretorium generatum humorem efferunt, fecit ut ab omni tempore a liene natum similem canalem quæsierint. Primus CÆCILIVS FOLIUS (*a*) parvum dixit, fodalem venæ lienalis. Eum repetiit Antonius de MARCHETTIS (*b*), & aquam per venam splenicam in lienem missam intestinum

(*d*) De *diaphragm.* S. IV. p. 91. Etiam hydrope juvatur: in sue *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 2. obs.* 190.

(*e*) p. 52.

(*f*) *Anthropolog.* ad tab. 36. f. 1. MORG. *adv.* II. n. 47.

(*g*) *Epist. de vas. lymphat.* p. 26. Etiam HUNTERI discipuli l. c.

(*h*) Tetigisse videtur *Epist. posthum.* n. 58.

(*i*) *Mess' aur.* f. nov. b.

(*k*) BARTHOLIN. *anat.* p. 113. IDEM l. c. C. filius *diaphragm.* l. c. LOSS. *lang. lymph.* n. 10. MALPIGH. *de liene* p. 102. *de gland. conglob.* p. 3. NUCK *adenograph.* p. 52. 143. FANTON p. 117. RUYSCH *de valv. lymph.* p. 12. f. 6. MORGAGN. *adv.* II. n. 47. DUVERNEY *posthum.* II. p. 548. in membrana externa KAAUW n. 631. 632. MONRO *vas. lymph.* p. 25. seq. HUNTER l. c.

(*l*) p. 144.

(*m*) n. 340. Difficillime ostendi DRFW' *de liene* n. XI. VIEUSSSENS *system. vasor* p. 115.

(*n*) FIZES p. 104. & fere MALPIGHIVS & VIEUSSSENS l. c.

(*o*) RUYSCH *ibid.*

(*p*) MALPIGHI l. c.

(*a*) *Epist. ad BARTHOL.* 62. *Cent. I.* p. 254.

(*b*) *Journ. des sçavans* ann. 1682. n. 15.

duodenum subire (c) addidit, ut is esset ejus ductus finis; sic ex pisce *Plaice* alterum lienem in cloacam tendere *Samuel COLLINS*. (d), & pariter in rectum intestinum a liene ductum deduxit *Emanuel KOENIG* (e).

Horum nihil a recentiori industria confirmatum est. Videtur jam *WIRSUNGII* tempore de ductu lienis excretorio sermones jactos fuisse, cum neget *Vir Cl.* (f) ductum suum lienem adire.

§. XIV. *Fabrica lienis interior.*

Primo loco ea dicemus, de quibus certa sensuum fide constat, deinde de iis, quæ ex conjectura, aut ex analogia adduntur.

Lien ergo humanus spongiæ similis est, adeo succulentus, ut clutis vasis & siccatis fere in nihilum abeat. Repletis autem vasis adparet, & arterias & venas (a) in lienem subire, & tenera cellulosa tela (b), ab omento continuata, & multo quam in hepate molliori, revinctas, in interna lienis de suis foraminibus progredi.

Ramos ibi edunt, nulla certa lege (c), ut tamen multo minus minorum ramorum sit, quam grandium; iique rami porro diminuti, denique in penicillos (d) abeant, ramulos nempe multos sibi vicinos.

Quo melius autem vasa replentur, eo major pars pulpæ lienalis in vascula abit (d*).

Tenerrima (e) cellulosa tela nunc hos minimos furculos (f) comitatur, neque est quod ultra videat incisor. Ipsos nervos ægre oculus persequitur (g). Venæ (h) incredibili mollitie sunt, ut facillime aerem aut

(c) *Des NOUES letr.* p. 19.

(d) *Tab.* 37. f. 5.

(e) *Reg. anim.* p. 138.

(f) *Ad RIOLANUM.* p. 812.

(a) Quæ arterias in homine non deferunt.

(b) *DISDIER splachnolog.* FIZES p. 107. *WINSLOW* n. 345. Similem *GLISSONIANÆ* capsulæ facit *ILL. LIEUTAUD* p. 309.

(c) *La SONE* l. c. p. 206.

(d) *RUYSCH Fpist.* IV. tab. 4. f. 3. *Thef.* VIII. tab. 1. f. 1. *ALBIN.* apud *MESLON* p. 13. *ELLER progr.* 6.

(d*) *DREW de vasf. lien.* n. 8. *ELLER.*

(e) *DUVERNEY* T. II. p. 246. *CASSEBOHM.* *la SONE* p. 197. *Tissu cotonneux* *WINSLOW* n. 333. 339.

(f) *MESLON* p. 14.

(g) *Habet STUKELEY* p. 23. 24. *la SONE* p. 206.

(h) In liene interno habet *ELLER.*

humorem impulsus in cellulofam telam dimittant; neque ægre quidem arteriæ (*h*^{*}). Idem aer per vulnus lienis iterum exit (*i*), aut per venam, si per vulnus subiit (*k*).

Alia cellulosa tela est, mista vasis (*k*^{*}), quæ exteriorē peritonæi faciem ubique vestit, & quæ ex communi corporis humanæ fabrica introrsum conversa, lienis carnem propriam cum velamento extimo connectit (*k*†),

Eadem in lienem demersæ fibræ cellulofam (*l*), naturam aliquanto firmiorem faciunt; quam tenuiora illa fila, arteriis circumnata. Hæ sunt fibræ & cellulæ, quas possis in liene humano (*m*) admittere, nisi, crassiori errore, aliqui clari Viri abrupta vasa pro fibris (*n*) habuerunt, aut cellulas, quæ destructa lienis parte inter vasa nascuntur. Primus SWAMMERDAMIUS (*n*^{*}) ab humano liene fibras & cellulas removit; inde RUYSCHIUS (*o*), etiam VIEUSSENIUS (*p*).

Impulsus nunc per vulnus potissimum membranæ externæ lienis (*q*), aer ea cellulosa spatiola perambulat, totumque lienem in spongiam convertit. Arteriis (*r*) etiam aut venis demum inflatis, totus lien cellulosa fit tela, spatiis distincta, quæ aer replevit. Facile vero adparet

(*h*^{*}) CASSER, COWPER l. c. Ægrius la SONE.

(*i*) PETSCHÉ ibid.

(*k*) La SONE p. 226.

(*k*^{*}) Quæ evulsa stigma rubrum relinquunt FANTON. *anat.* p. 117.

(*k*†) La SONE p. 195. FIZES p. 107.

(*l*) La SONE p. 195. In scirrhus cellulæ VALISNER. *Oper.* T. III. p. 197. 198.

(*m*) BARTHOL. *hist.* 63. Cent. I. WEPFER apud BARTHOL. *de pulmonib.* p. 28. FIZES p. 107.

(*n*) Conf. BLAS *miscell.* p. 207. VIEUSSENS *nouv. découvertes* p. 5. 6. 7. 8; sed iste vesiculas admittit. VATER *mus. propr.* p. 61. ex RUYSCHIO, & RUYSCH *Thef.* II. *aff.* II. n. 3. SCHAAF *de liene* DREW *de usu lien.* n. 9. MESLON. n. 13.

(*n*^{*}) Coroll. *ad diff. de respir.* n. 13. Etiam SCHELHAMMER *physiol.* p. CCXXIII.

(*o*) *Epist.* IV. p. 9. *Respons. ad vindic.* & BIDL. p. 12. *Thef.* VII. n. 11. *Thef.* IX. n. 18. *Thef.* X. n. 90. *Physiolog. Batav.* p. 118.

(*p*) *Nouvelles découvertes* l. c.

(*q*) SENAC. *Ess. de phys.* p. 180. JENTY *histor. compend.* p. CLXXIX. *Ess. of a Societ. at Edimb.* III. p. 12. la SONE p. 224. 225.

(*r*) Injecto in arteriam vel venam flatu VATER *de lienis prolaps.* p. 11. CASSER.

cellulas, quas natura minimas fecerit, nunc ab impulso aere mole fuisse auctas.

Non male adeo Cl. Viri senserunt, qui lienem ex vasis, & membranis vasa connectentibus dixerunt constare (t).

§. XV. Lien vitulinus.

In hoc animale, & quantum video in plussculis aliis herbivoris (a) quadrupedibus, manifestior, & facilior lienis est fabrica.

Nempe in his bestiis fibræ evidentissimæ & robustæ (b) & laminæ, ex membrana (c) lienis externa natæ, in viscis interiora penetrant, inque vasorum tunicas se inmittunt (d), & denique in pulposam naturam lienis undique se demergunt (e), sensim diminuta magnitudine. Ita efficiunt (f) cellulosum textum, multo quam in homine laxiorem, ut omnino facile sit, impulsa in venam lienis aqua, & pressio viscere, atque eluta pulpa (f*), quando nunc aqua pura redit, per venam, lienem inflare, inque similitudinem evidentissimam pulmonis (f†) convertere. Liberrima etiam hic ex eo textu in venam (g) via est, ut quæ brevissimis ramis, quasi per foramina (h), in cellulosum textum pateat. Cæterum eæ fibræ neque musculosæ (i) sunt, neque vasculosæ,

(t) NICHOLLS p. 19. LIEUTAUD p. 310. MESLON *de liene* p. 19. SCHAAF *de liene*.

(a) In ove LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 307. In elephante durissimæ PARIS. Etiam in carnivoris cellulæ sunt; sed his teneriores & fericæ, ut in urso *Comm. Lit. Nor.* 1734. hebdomada 38. in panthera PARIS.

(b) La SONE p. 197. Cum penis celluloso textu comparat MERY *prog. de la médec.* 1697. p. 38. tum DUVERNOY *Comm. Acad. Pet.* T. IV. p. 156. seq.

(c) LEEUWENHOECK l. c. ELLER p. 17. ENT. SBARAGLI *vigil.* p. 60. MALPIGHI *de liene* p. 104. STUKELEY p. 17. WARTON *adenogr.* p. 17. La SONE p. 197. RUYSCH *Epist.* IV. p. 8. STUKELEY l. c. p. 10. 18.

(d) STUKELEY p. 10. 18.

(e) La SONE p. 207.

(f) RUYSCH l. c. f. 3. BIDLOO *tab.* 36. f. 1.

(f*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 431. *Eff. of a Societ. at Edimb.* T. III. p. 125. RUYSCH p. 9. ELLER p. 18.

(f†) DUVERNEY II. p. 62. STUKELEY T. III. & in ove *tab.* 4. f. 4 JENTY.

(g) QUELMAIZ *de liene* n. 9. qui vult vasa foraminibus patula in liene adparere. ENT. in equo PERRAULT *Eff.* II. p. 237.

(h) VESAL. STUKELEY *tab.* 3. HIGHMOR. *disquis.* L. I. p. 3. c. 3. *tab.* 7. f. 1. MONRO l. c. WINSLOW n. 337. 347. DUVERNOY.

(i) Facit musculosas MALPIGHIIUS *posth.* p. 9. 58. DUVERNEY II. p. 242. STUKELEY p. 10. 18.

fed cellulosi generis, quas ligamentofas, ob firmitatem in majoribus animalibus aliqui dixerunt (*i**).

Eæ fibræ a VESALIO (*k*) in anatomicos (*l*) factos introductæ fuerunt, & ad humanam fabricam fere ab omnibus translata. Easdem rejecit RUYSCHIIUS (*l**) ut de hominis liene diximus.

Nuperiores etiam eas fibras, quæ in vitulo, dictæ sunt, pro meris vasis (*m*) habuerunt, quæ abruptis finibus cellulas aere repletas trahant (*n*): solaque violentia cellulas parari (*o*) monuerunt.

§. XVI. Acini lienis.

Ut in aliis visceribus, ita in liene MALPIGHIUS glandulas reperit. Nempe in multis omnino animalibus quadrupedibus, ut in cane (*a*), fele (*b*), vitulo (*c*), ove (*d*), capra (*e*), mure (*f*), talpa (*g*), erinaceo (*h*), fimio (*i*), imprimis in elephanto (*k*); porro in piscibus etiam, squalo (*l*), delphino (*m*), torpedine (*n*), acini rotundi in liene reperiuntur.

(*i**) Esse ligamentofas la SONE p. 200.

(*k*) p. 627.

(*l*) C. BAUHIN. *theatr. anatom.* p. 143. ROLFINK p. 1152. WARTON HIGHMOR *hyft. paß.* p. 84. 94. VERHEYEN p. 86. ENT. p. 103. GLISSON *hep.* p. 430.

(*l**) *Respons. ad vindic.* BIDLOI p. 12. *Epist. IV. Thes. VII.* n. 11. *Thes. IX.* n. 28. *Thes. X.* n. 90. tum SCHELHAMMER *physiol.* p. CCXXIII. & alii; & princeps SWAMMERDAM coll. 13. ad *differt. de respir.*

(*m*) ELLER p. 17. 18. add. MESLON. *de liene* p. 415.

(*n*) DEIDIER *anat. rais.* p. 364. FIZES p. 206. *Conf. Comm. nostr.* T. III. p. 57.

(*o*) FIZES *ibid.*

(*a*) PEYER *obs.* 12.

(*b*) IDEM *obs.* 17. & 7.

(*c*) MALPIGHIUS *de liene* p. 111. POZZI p. 67. WINSLOW n. 349. in hoc animale potissimum etiam CASSEBOHM in *posth.*

(*d*) MALPIGH. *ibid.*

(*e*) *Ibid.*

(*f*) GREW *cosmolog. sacr.* p. 20.

(*g*) PEYER *obs.* 19.

(*h*) MALPIGH. *posth.* p. 42.

(*i*) DUVERNEY II. p. 544.

(*k*) MULLINS p. 23.

(*l*) MALPIGH. p. 112.

(*m*) COLLINS p. 416.

(*n*) LORENZINI.

Denique Vir ILL. addit, & in hominis liene (o) acinos reperiri, ovales (p), consistentes, ne RUYSCHIO quidem dissimulatos (q), neque a WINSLOWO (r), FERRENIO (s), & HEUERMANNO (t), SENACO (u), FANTONO (w), aut LEEUWENHOECKIO (x) prætermis-
 sos.

Eos cavos esse, docuerunt Viri ILL. veros acinos simplices, racemosos (y), in morbis (z) variis præter naturam humoribus, etiam gypso (z*) plenos, & mole auctos (a).

Addebant non esse vasculosæ naturæ, cum ab arteriis in eas glandulas liquor non transeat (b), neque eos tingat, & demum ab *injectione* anatomica acini evanescant (b*); cæterum in cellularum lienalium areolis, in ipso centro federe (c), ab arteriis & venis racematim suspendi (d), & in eas glandulas secretum ab arteriis humorem (d*) deponi.

Et cum nuper RUYSCHIUS hoc glandularum systema refutasse crederetur, ita restitutum est a Cl. la SONE (e), ut caro lienis pulposis folliculis (f), per macerationem conspicuis, constare videatur; tamen ut sciretur, subinde nullos sibi occurrisse (g) acinos, cellulasque ipsas lienis ex pulpa villosa fieri (h).

(o) MALPIGH. p. 111. per morbos. Microscopio conspici WINSLOW n. 349.

(p) MALPIGH. p. m. p. 413.

(q) Conf. p. 413.

(r) n. 338. seq.

(s) *Mém. de* 1749. p. 494.

(t) *Physiolog.* p. 667.

(u) *Ess. de phys.* p. 180.

(w) p. 118. in homine.

(x) *Phil. transf.* n. 307. cum ic.

(y) MALPIGH. p. 111.

(z) ID. p. 112.

(z*) MERY *Hist. de l'Acad.* 1702. DOUGLAS *Phil. transf.* n. 349. In phthisico simio *Anc. Mém.* I. p. 404.

(a) Ibid.

(b) MALP. p. 110. Etiam la SONE p. 215. *Mém. de* 1754. VIEUSSENS mercurium bullarum quidem specie in liene adparere; sed a ruptis vasis id fieri *structure des vaiss.*

(b*) La SONE p. 228.

(c) MALPIGH. p. 112. Adde la SONE p. 224. 228. WINSLOW n. 348. SENAC. l. c.

(d) MALPIGH. p. 111. 112.

(d*) IDEM. p. 112. cum in eas bient.

(e) l. c. p. 207. 212. 214. 220. 221.

(f) Etiam in sanis hominibus p. 212.

(g) p. 207. 211.

(h) p. 239.

Post injectionem RUYSCHIANAM magnam partem pulpæ perire (*i*), monet IDEM Vir ILL. floccorum specie, & una glandulas destrui (*k*).

Additum est, ut puto ex conjectura, ex unoquoque nodulo lienalis acini exire duo vascula (*l*), alterum breve in cellulas lienis apertum—alterum quod fit arteria lymphatica.

Ad stipulatores numerosissimi (*m*) huic opinioni non defuerunt. Et potissimum Cl. ELLER non quidem MALPIGHIANAS glandulas, sed alias in bovis liene microscopio undique conspicuas, admittit, ex quibus radiorum modo vasa spergantur (*n*).

§. XVII. *Quæ contra ista dicantur*

RUYSCHIUS equidem particulas lienales figura acinorum simili adaptavit (*a*), tantum ut fabricam eorum aliam faceret (*b*). Nempe neque communi aliqua membrana (*c*) ejusmodi acinum involvi monuit, neque omnino cavum esse; sed arteriolarum [venarumque] esse glomerem, paulo magis cohærentem (*d*), qui tamen repletis ex arte arteriis colore injecti humoris tingatur, & sensim in aqua explicetur (*e*), ut in penicillum (*f*) abeat, qui acinus fuit. Per morbos veram omnino naturam non patefcere (*g*) monuit.

Eadem fere, quæ RUYSCHII (*b*) etiam ALBINI (*i*) est animadversio, ut in liene præter vasa & cellulofam fabricam nihil sit.

(*i*) p. 216. 226.

(*k*) p. 221.

(*l*) WINSLOW n. 349. SCHAARSCHMIDT *splanchnolog.* p. 53.

(*m*) TILING. *anat. lien.* CHESELDEN *Phil. transf.* BIANCHI *hiffor. hep.* p. 154.

(*n*) p. 17.

(*a*) *Epist.* IV. p. 7. *Thef.* I. *aff.* 3. n. 13. *Resp. ad vind. Bidl.* p. 12. *Thef.* II. *aff.* 3. n. 17. *Thef.* IV. n. 7. *Thef.* X. n. 90. In vitulo *Thef.* I. *aff.* 1. n. 2.

(*b*) Ab anno 1696.

(*c*) *Epist.* IV. *Thef.* X. n. 90.

(*d*) Tenaciora quam in bestiis vasa *Thef.* IV. n. 7.

(*e*) *Thef.* VII. *tab.* 1. f. 1.

(*f*) In homine *Epist.* IV. *tab.* 4. f. 4. *Thef.* I. *aff.* 3. n. 10. *Thef.* III. n. 72. *Thef.* VII. *tab.* 1. f. 1. *Cur. renov.* n. 65. In vitulo *Thef.* II. *aff.* 4. n. 4. *Thef.* V. n. 12. 72. *Thef. max.* n. 71.

(*g*) *Thef.* IX. n. 55. Conf. hujus nostri operis L. VII. p. 389.

(*h*) Ex RUYSCHIO SCHELHAMMER *analest.* FIZES p. 206. VATER *mus.* p. 61. &c. In iis acinulis arteriæ & venæ uniuntur & minimos ramulos edunt HEUERMAN T. III. p. 667.

(*i*) MESLON. n. 13.

Olim *J. Hieronymus* SBARAGLI (*k*) contra eas glandulas scripserat & R. VIEUSSENS (*l*). Nervorum esse plexus G. STUKELEY (*m*) maluerat, & fibras abscissas in vitulino liene Cl. ELLER (*n*), quas MALPIGHIIUS glandulas dixisset. In elephanto negat reperiri noster olim (*o*) præceptor, in equo SNAPE (*p*).

Quæ ego vidi, ea omnino propius ad sententiam RUYSCHIANAM accesserunt. Vascula pulposa vidi, nodulosque, sed uti perfectior erat injectio, ita vasorum majorem ad reliquum lienem portionem, & extremos fines in minutiora vascula exiisse reperio. Macerationem aliquando multorum mensium adhibui. Neque finit certe analogia glandulas simplices adoptare, ubi nulla fieret secretio, ubi nullus esset excretorius ductus. Neque artificia, quæ nuper ad lienis fabricam explicandam adhibita sunt, iis videntur potiora, quibus aut RUYSCHIUS usus sit, aut ALBINUS.

SECTIO II.

LIENIS UTILITAS

§. I.

IN meras hic conjecturas demergimur: obscuriores, quam fere alio in viscere. Solus enim fere lien neque ductum excretorium habet, in quem humorem secretum deponat: neque vim muscularem, quæ sanguinem aliumve humorem urgeat. Denique extremi fines vasorum nondum satis plane innotuerunt, neque ultima fabrica lienis, & difficile est machinæ exponere motus, cujus structuram ignoraveris. Cum tamen aliquam partem veri teneamus, eam primam proponemus. Calorem omittimus, quem lien ventriculo suffundit, alibi laudatum (*a*).

(*k*) *Vigil.* p. 152. a cellulis non differre.

(*l*) Vasorum esse glomeres *nouvelles decouvertes* p. 14.

(*m*) p. 24.

(*n*) p. 18.

(*o*) DUVERNOI l. c. p. 160.

(*p*) *Tab.* 7. f. 2.

(*a*) L. XIX. p. 295.

§. II. *Sanguinis in liene pro hepate præparatio.*

In omnibus, nisi plurimum fallor, animalibus, sanguis lienis in hepate venit, uti in omnibus pariter bilis in hepate nascitur. Nunc cum nullus peculiaris humor de liene exeat, nihil potest certe hepati (a) tribuere, nisi suum sanguinem, neque enim lymphæ de liene magis quam a pulmone, teste, aliisque visceribus redit.

Nunc si lienis utilitas est in sanguine, quem hepati submittit, superest, ut ostendatur, quid lien in eo ministerio peculiare habeat. Invenio in natura sanguinis habere, & in motu, inque motus demum temporibus.

Et primum sanguis venæ portarum multo ex omento (b) & ex mesenterio (c), reduce adipe gravidus (c*), lentorem experturus ex divisione arteriosa in hepate, exque ramorum luminibus multum lumen trunci superantibus (d) obstructionum & scirrhorum periculum insuperabile faceret (e); nisi eum sanguinem fluidiori aliquo sanguine NATURA contemperaret, & incitato motu urgeret.

In liene adeo sanguis fluidior est (f), quam fere ullo in viscere: estque præterea indole lixiviosa salina (g), oleum dissolvende uberiori imbutus. Adparet, lienem servire diluendo sanguini hepatico, impediendæ concretioni, solvendo, quantum sufficit, adipi.

Quæri nunc potest, ut eam peculiarem naturam sanguis in liene induat. Si in cellulas lienales vere sanguis effunderetur, haberemus causam stagnationis certam, sanguinem nempe in lacus aliquos diffusum, in quibus tamdiu quiesceret, usquedum a causa aliqua expediretur; omnino, uti in similibus cellulis adeps quiescit.

(a) BOERHAAVE prælect. T. III. p. 80. WINSLOW IV. n. 382. seqq.

(b) p. 384.

(c) Ibid.

(c*) Sanguis tenax in vasis hypochondriacis accumulatus TRONCHIN. colic. prælect. p. 102.

(d) L. VI. p. 76.

(e) SCHMIDT de usu lienis p. 116. Eo referas in icterico hepate grande, bilem coagulata, cum liene scirrhuso VALISNER. oper. T. III. p. 197. 198. Porro ad lienis cum hepate consensum. Lien grandis, cum grandi hepate MORGAGN. sed II. p. 205. In hypochondriaco PORTIUS opusc. & fragment. p. 185. cum aneurysmate BADER obs. 18. Lien parvus, cum magno hepate BADER obs. 21. Nov. Act. Nat. Cur. Vol. II. obs. 28. & steatomatice MORGAGN. sed. caus. II. p. 23. Lien durus, cum hepate duro BADER obs. 4. HOECHSTETTER dec. X. cas. 7. BADER obs. 4. Lien tumidus & durior, cum hepate maximo CAMER bxfstip.

(f) p. 405.

(g) Ibid.

Nondum ausim (*b*) in vivo homine sanguinis in cellulas effusionem admittere. Unicum, ad peculiare fines factum, effusi sanguinis exemplum in pene est; neque cera per arterias (*i*) lienales adeo facile in cellulas effunditur; ut quidem facillime in venas transit, non transitura, ut videtur, si patulum iter in apertas, laxas non resistentes cellulas haberet.

Superest, ut major inter ramos vasculosos lienis & truncum, quam aliis in visceribus sit ratio: Magna quidem est arteria lienis, cum hepaticas arterias pene æquet, viscus aditura quintuplo minus. Renales arterias cum lienalibus non comparamus, cum ex iis maxima fiat, & celerrima secretio, & ob eandem rationem venam portarum hepatis non imputamus, quæ sit secretioni bilis destinata.

Et tamen credas, nos non absque ratione majorem hic ramorum ad truncum rationem sumere (*k*) quam ea est, quæ alibi obtinet. Lien nempe, præter teneram in homine, & ægre conspicuam cellulositatem, totus vasis fit sanguineis (*l*). Neque adipem habet admixtum, neque radices ductuum excretoriorum, neque copiam eam cellularis naturæ, quæ est in aliis visceribus, neque musculares fibras, neque acinos glandulosos.

Nunc si major hic, quam alibi, luminis ramorum arteriosorum simul sumtorum ad totum viscus est ratio lentescet idem (*m*) Sed in venis potissimum lienis retinebitur quæ insolita ratione arteriis laxiores (*n*), facillime sanguinem accipiant, expediant difficilior.

Sed omnes humores humani, stagnando acrimoniam concipiunt (*o*) lixiviosam; ea magis cum in loco calente hic lienis sanguinis lentescat; cum præterea intestino colo proximus (*p*) insideat, cujus putridos habitus per poros inorganicos non recipere nequeat. Ut autem acrescit (*q*) idem sanguis, ita per similes causas, naturam coagulabilem deponit (*r*), fietque liquidior, colore vero minus intenso, cum putredinosus sanguis sponte sua in fuscedinem tristemque colorem transeat.

(*h*) MALPIGHIIUS p. 112. QUEMALZ *de liene* n. 7. &c.

(*i*) p. 409. *h*.

(*k*) Comparat KEILIIUS lienem cylindro diametri unciarum duarum, arteriam splenicam vero facit o. 5018. *Secret anim.* p. 45.

(*l*) p. 410.

(*m*) L. VI. l. c. &c. Retardando sanguini lienem destinatum esse KEILIIUS l. c. & *abridgm.* p. 80.

(*n*) p. 402.

(*o*) L. VII. p. 453. 454.

(*p*) *Prim. lin. phys.* n. 666. ROLOF p. 60.

(*q*) DREW n. 36. VELTHUYSEN c. 3.

(*r*) L. VI. p. 310. GABER *Miscell. Taurin.* p. 70.

Aliquid etiam ad fluiditatem majorem facit, quod nullus sit in liene ductus excretorius, qui humorem avehat, semper & necessario sanguine tenuiorem. Horum similia plurimi scriptores (s) protulerunt, ut tamen plerique alias hujus tenuitatis causas darent.

§. III. *Motus sanguinis lienalis.*

In quadrupedibus verior & insignior (a) lien est, & in ea classe oportet ejus utilitatem quærere, quam de homine adfirmare liceat.

Bilis major est necessitas, quando cibum oportet subigi. Commodissime ergo contingeret, si eo tempore plurima generaretur, quo ejus necessitas imminet. Generabitur autem uberius, si eo tempore major copia sanguinis ad hepar veniet; veniet autem major si lien, extra tempus coctionis, sanguinem uberius receperit, & sub id tempus abundius ad hepar remiserit.

Nunc simplicissimo artificio hic finis obtinetur. Lien ponitur inter faccum cæcum (b) ventriculi & diaphragma: non potest ventriculus grandescere, quin lien comprimatur, neque vicissim inaniri, quin laxetur lien. Quando ergo inanis est ventriculus, tum sanguis per grandem arteriam in laxum viscus, mollesque venas (c) magna copia irruit, idemque distendit, manetque copiosior in liene, quod lien nunc nulla a vi valde prematur, & per laxam venam sanguis lentius ad hepar redeat. Hactenus posset lien *diversorium* (d) dici *sanguinis*. Ne penitus tamen stagnet, septi transversi facit pressio (e), & sanguis qui succedit.

(s) Adtenuari in liene sanguinem COWPER *Introd. to the anthropolog.* DEUSING *sanguificat.* p. 112. TAUVRY *anat. raisonn.* c. 9. WINSLOW IV. BOERHAAVE n. 326. BOHN p. 257. BERGER p. 217. GEORGI *de homine* p. 133. FIZES *de liene* p. 125. 130. ELLER p. 23. 24. SENAC *Eff.* ed. 1735. p. 186. DREW n. 33. MEKELL. l. c. Calidiorem sanguinem, ob arteriarum copiam ad hepar mitti HARVEI.

(a) p. 386.

(b) p. 391.

(c) p. 401.

(d) SCHELHAMMER *physiol.* p. CCXXIV. STUKELEY p. 33. DUVERNEY l. c. p. 162.

(e) LEEUWENHOECK *Phil. transf.* n. 307. *Exp. nostr. de respir.* 44. 50. 51. 52. 55.

Quando vero ventriculus cibis, & imprimis aere distenditur, non potest finistrorsum moles increfcere, quin lienem urgeat contra diaphragma, ita ut inter oppositas potestates medius prematur, perpetuam stomachi, alternam diaphragmatis. Quassatur (*f*) adeo id viscus, & inanitur, ejusque sanguis per venas novis semper diaphragmatis proceffionibus ad hepar urgetur. Ita liberatur quidem lien suo sanguine (*g*): & una hepar plus sanguinis accipit, ex quo paulo post plus generatur bilis (*h*).

Hinc lienis scirrhi frequentes (*i*) in sedentariis artificibus, non in agilibus rusticis. Hinc major lien in domesticis animalibus (*i**), quam in feris. Hinc recte HIPPOCRATES, in lienis morbo jubet lignare, secare, & ambulare (*k*). Hinc lienosis venter prædurus, ob inertem bilem (*l*).

In vomitu vehementer quassatur. Ab eo lien minimus (*l**).

Qui eam vim conquassantem cellulis (*m*) tribuerunt musculosis, & lienem musculosum fecerunt, qui modo stringat vasa sanguinea, modo laxet (*n*) ad animæ nutum (*o*), & ut quâdam pulmonis vice fungatur, ii plus iis cellulis tribuerunt, quam NATURA.

§. IV. *Aliæ utilitates ut inveniri possint.*

Non hanc dices totam fuisse causam faciendi lienis: cum dentur præterea animalia, in quibus lien ventriculo non adfideat (*a*).

Nunquam facile speravero NATURÆ sapientiam me totam perspexisse. Possem reponere, non videri satis veros avium pisciumque lienes (*b*), qui utique ventriculo non accumbunt. Minutissima esse ea organa, nulla ad hepar portione, nos de liene dicere quadrupedum.

(*f*) SCHELHAMMER. Splenem in omnibus animalibus poni in sede ad conquassationem apta MËNRO compar. anat. p. 127.

(*g*) BORDEU *recherch.* p. 432.

(*h*) STUKELEY p. 32. cujus hoc. nî fallor, est inventum. LIEUTAUD *Mém. de 1735. hist. I. physiolog.* p. 146. *Essais* p. 312.

(*i*) p. 397.

(*i**) BUFFON T. VI. p. 27.

(*k*) *Aff. interm. text.* 33. LIEUTAUD l. c. QUELMALZ l. c. n. 23.

(*l*) ARISTOT. *part. anim.* L. III. c. 7.

(*l**) MORG. *Sed.* II. p. 23.

(*m*) COKBURNE *æcon.* apud MANGET *bibl.* p. 1130. MALPIGHI, HIGHMOR l. c. p. 94.

(*n*) WILLIS *de cerebr.* p. 196. *Ed.* 8.

(*o*) HIGHMOR *hypoch. adfect.* p. 99.

(*a*) Adjacere fere STUKELEY p. 32. de quadrupedibus locutus.

(*b*) p. 393.

Possset iterum a nobis posci, ut alias lienis utilitates expiscemur, duplici artificio, per morbos nempe, & per visceris excisionem. In morbis quidem lienis, functiones aliquas corporis humani iri vitiatum; esse adeo probabile, has ipsas functiones esse, quod lien corpori universo præstet.

Tentavi eam viam, neque perinde profeci. Inveni, lienem in universum sæpissime grandescere (c), frequenter, ut monui, scirrhus (d) tentari, neque a calculosis concretionibus alienum esse (d*), non infrequenter quasi putrido sanguine repleti (f).

Referas grandescenscentem lienem, & scirrhum, ad diminutam corporis exercitationem, demto de motu sanguinis lienalis altero instrumento, concussione nempe incitatae respirationis. Putridos lienes ad eandem retardationem referas, a qua etiam in sano homine, aliquid in lienis sanguine nimis alcalinum (g) fit.

Neque potui aliquam perennem rationem reperire, in qua lien esset & hepar. Grande reperio cum parvo liene (h), & cum magno (i): idem & cum magno liene scirrhusum (k), & cum parvo (l); & cum

(c*) p. 394.

(d) p. 397.

(d*) Magnum in liene concrementum osseo calculosum, septem digitos longum MORGAGN. *sed. caus. morb.* II. p. 67. 68. Alia calculorum in liene exempla II. p. 67. Vascularum lienis tunica cartilaginea *verhand. van de holl. maatsch.* T. III. p. 615. Arteria splenica latior & ossea fere tota MORGAGN. l. c. II. p. 144. In ea diverticulum osseum concreto sanguine plenum I. p. 16.

(f) p. 397.

(g) p. 416.

(h) BARTHOL. *Cent. I. hist.* 5. RIOLAN. p. 122. Lex erat ARISTOTELIS, cum liene parvo aut nullo, aut magnum hepar reperiri, aut omnino [duplex *hist.* L. III. c. 7. Cum morbis jecoris magni lienes frequentes VESAL. L. V.

(i) MEAD. *monit.* p. 223. *Zod. Med. Gall.* II. p. 151. Hepar ad lienem protensum magnum, lien maximus bifidus HORST *Epist.* p. 453. Sic fere MORG. *Sed. II.* p. 205. In hydropica hepar & lien præmagna BARBEIRAC l. c. In hypochondriaca immane hepar & prægrandis lien PORT. p. 185. In scorbuticis hepar & lien maximi, etiam ulcerosi PYRARD *Voyag.* P. III. p. 37. In eo casu cum gangræna lien 5 $\frac{1}{4}$. hepar 5. lib. 4. unc. MEAD. *monit.* p. 223. In subito mortuo hepar lib. 8 lien lib. 3. *Fränk Anmerk.* III. p. 530. In febre acuta hepar & lien magna FANTON. *obs.* 27.

(k) SALZMANN *obs.* p. 37. Icterus cum tumore lienis WOLF *obs.* 22. Hepar scirrhusum, bilis spissa, lien magnus PETZOLD *obs.* 77. in hydropico. PUIATI *morb. naron.* p. 218. Cum magno liene, sed molli VESAL. p. 628.

(l) FABRIC. *progr. ann.* 1759. CHIFFLET *obs.* 38.

morbofo (*m*), & cum fano (*n*), & iterum cum magno liene parvum jecur (*o*), & viciffim cum fcirrhofo magnum (*p*).

Sed etiam hydropes cum fano liene (*q*), cumque parvo (*r*) conjunguntur, etfi sæpe cum vitiofo (*r*^{*}): & hypochondriacus morbus cum parvo liene (*s*), & cum fano (*t*) adeo frequens eft, ut raro adfici Carl. Vir adfirmet (*u*), atque viciffim fcirrhus lienis abfque fufpicionem ejus mali (*w*) reperitur.

In univerfum nondum ex cadaverum morboforum incifionibus plenum fructum decerpimus: tum quod plerumque in præcipiti tempore tota res peragatur; adeoque fabricæ viscerum vera corruptio minus innotefcat: tum quod morbi poffint earum corruptionum & caufa effe & effectus (*x*). Ut in exemplo fub fiftamus. Potest fcirrhofus lien ad hydropem conferre, quod bilis minus acris ex eo vitio generetur: atque adeo ciborum coctio langueat: ut crudi & aquofi fucci nafcantur: Viciffim perfpiratio viscerum, quæ etiam lienis eft, a viscore illo gelatinoso impeditur, qui ex aquis hydropicis natus omnia abdominis viscera obungit. Ex eo vitio, ut dura cutis fit, ita potest in liene lymphaticus humor retineri, ftagnare, indurari. Et tamen perfuaderer, fi viri veri cupidi, in opportunitate nosodochiorum hepatis degenerationes cum lienis vitiis conjunctas longo labore rimarentur, denique majorem hic nobis lucem adfulsuram.

(*m*) Cum abfcessu hepatis lien corrupto fanguine plenus & magnus BECKET *traçs* p. 6. Sic lieni fimilis cum amplo hepate *Phil. transf.* n. 209. Hepar ulcerofum lien major COITER p. 120.

(*n*) FEHR *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obf. 2.* LEIGH. *Exerc. V.* p. 125.

(*o*) FRANKEN *de hepate* KALTSCHMIDT *de liene rar. magnit.* Cum craffo liene fanum jecur PETZOLD *obf.* 65. in hydropico. Sic fere MORG. I. II. p. 107. KERKRING *obf.* 65.

(*p*) VALISNER. III. p. 197. 198. CAMBRAI. *exstip. hepat. def.*

(*q*) FEHR. l. c. floridus & ruber BONTEKOE *thes.* p. 207. VATER *hepar. infons.*

(*r*) TISSOT *Epist.* ad HALL. p. 16.

(*r*^{*}) Etiam a liene hydropem fieri fcripsit CELSUS L. III. c. 21. Cum magno liene SCHNEIDER *de liene Thes.* 37.

(*s*) *Comm. Nor.* 1740. *hebd.* 21. CHIFFLET *obf.* 38.

(*t*) BECKET I. *de morte fubmers. sine aq. obf.* 2. ALBIN. *fam. canin.* n. XI. SYLV. *diff.* V. n. 7. 8. GLISSON *ventr. int.* p. 548. *ed. bat.* & PEYER *merycol.* p. 248. SCHEID. *de liene* n. 27.

(*u*) SCHMIEDEL *de pericard.* & c. p. 24.

(*w*) LITTRE *Hift. de l'Acad.* 1700. *hif.* 7. *Journ. de Trév.* 1717. m. Janv. STORK *ann.* 1. p. 132.

(*x*) Scirrhus hepatis & lienis non effe hydropis non caufas, fed effectus DIONIS. *Cours d'Operat.* p. 96.

§. V. *Lienis evulsio.*

Nescio cur de hoc liene evellendo magis, quam de ullo alio viscere, antiquitas cogitaverit, inque eo uno tentamine dudum incisores (a), etiam in humano (b) corpore, audaces fuerint?

Forte dolor est in causa, quem homines, in coli flexu lieni vicino a statu distendente passi, jam vetustis temporibus lieni imputarunt.

Credas iterum, si quæ est lienis in adjuvanda ciborum coctione potestas, eam coctionem evulso liene, iri diminutum, aut omnino perituum esse: ita quæ detrimenta animal passum sit, eorum esse summam æqualem veræ lienis utilitati.

Ne ita quidem tantum est profectum, quantum poterat sperari. Primo quidem innotuit, posse utique lienem ex homine (c), & ex quadrupede (d), eximi, ut vita, & fatis salubris supersit: evelli (e) tamen

(a) Exempto liene animalia vivere PLIN. L. XI. c. 30. Exsecto liene vivi posse *Talmudistæ* apud GINZBURGER *medic Talmud.* p. 11.

(b) Apud LEON FIORAVANTI *tesoro della vita umana* L. II. c. 8. Administravit in femina audacem sectionem ADRIANUS ZACCARELLA: & de omento separavit.

(c) FIORAVANTI l. c. in formosa femina. Lien per vulnus emergens feliciter resectus *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3. obs.* 195. & HOME *facts* P. III. & *Phil. transf.* n. 451. In homine, cui per hiatum spontaneum lien prodierat, innoxie eductus est FANTON ad MANGET *Epist.* I. & VI. Feliciter hypochondriacis excisum se vidisse C. BAUHIN *theatr.* p. 143.

(d) Seculo XVI. VESALIUS p. 820. & ipse & omnes fere in canibus Seculo præterito testes sunt BIRCH T. I. p. 426. 315. T. II. p. 173. 175. ut auctores experimento essent KINGIUS & CLARKIUS, & G. CHARLETON. Porro SCARBOROUGH *Phil. transf.* n. 28 *Eph. Nat. Cur. Dec. I. obs.* 118. ENT. *apolog. nov. ed.* p. 106. JOLYFFE apud BARTHOLINUM *Epist.* 51. & 92. *Cent.* 4. & apud BOYLE *utilit. phil. exp.* p. 109. HACQUARD apud BARTH *Cent.* III. *Ep.* 50. 64. *anat.* p. 558 qui ter lienem excidit. BORRICH *hermet. ægypt. sap.* p. 429. BARTHOLIM. *hepat. defunct.* p. 63. AGRICOLA apud DEUSING *de sanguific.* p. 119. J. MICHÆL apud MAJOREM *Chirurg. infus.* p. 586. & apud RIVINUM. Th. KERKRING *obs.* XI. GEU- DER *de ferment.* p. 190. J. C. BRUNNER *de pancreate* p. 8. J. BOHN *circul.* p. 248. *duumvir. hypoch.* n. 21. H. MEIBOM, qui sexies repetiit, apud SCHELHAMMER *physiol.* P. CCXXIV. DENIS *Conference* 3. DUNCAN *Chym. med. spec.* p. 296. 297. MALPIGHIIUS *de liene* c. 6. p. 114. G. BAGLIVI *Exerc.* IX. p. 677. Henricus BALSUS apud MECKERN *obs.* 43. BARBETTE *prax. med.* p. 83. qui & sexies lienem eximit. DECKER in BARBETTE p. 221. ZYPÆUS *compend.* p. 85. R. de GRAAF apud DIEMERBROECK p. 86. 87. & *succ. pancr.* p. 28 P. VERHEYEN p. 88. 89. DRELINCOURT apud SCHELHAMMER *de liene* RUYSCH *Centur. obs.* n. 66.

Seculo nostro ZAMBECCARI. *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 4. app.* p. 68. & apud MORG. *adv.* II. p. 54. Ant. VALISNERI *Giorn. de letter d'Ital.* T. XXII. p. 359. *Gal. di Minerv.* T. VI. p. 71. *Oper.* III. p. 128. IDEM & MORGAGNUS *Eph. Nat. Cur. Cent. III. obs.* 30. p. 55. MORGAGNUS *advers.* II. p. 54. *advers.* III. p. 36. BONAZZUOLUS apud J. POZ-

melius esse, forte quod protractæ arteriæ, dum in se elatere redeunt suo, melius se claudant. Neque, si aliqua animalia non diu (*f*) vitalia superfuerunt, id oportet ipsi visceris iacturæ tribuisse, supervixerunt enim plurima. Non ideo hanc operationem in homine administrare suaderem (*g*).

In universum per hæc experimenta conficitur, animalia vulnus absque vitæ iactura passa porro vixisse absque conspicuo incommodo (*h*), per annum (*i*), & ultra (*k*); etiam homines (*l*). Catellas porro perperisse (*m*), pingues fuisse canes (*n*), lætosque (*o*) & voraces (*p*); etiam plethoricos [*q*]. Addunt aliqui, salaciora fuisse animalia [*r*], & micturivisse frequentius [*s*].

Pauca omnino sunt, quæ reperimus, ad hepatis munia vitianda aut coctionis diminutionem pertinentia; borborygmus in nonnullis canibus [*t*]; hepar turgidum, quod ad sanguinem referas nunc tenaciorem [*u*]; etiam

ZIUM *Comm. Epist.* p. 72. FANTON. *diff. anat.* p. 126. J. B. BIANCHI *hist. hep.* II. p. 1138. J. F. ORTLOB *hist. part.* p. 124. & *præf.* ad TAUVRY. JUSTI VESTI *æcon. anim.* L. HEISTER *Eph. Nat. Cur. Cent.* III. IV. *obs.* 197. DEISCH in *diff. præfide* SCHULZIO hallæ ann. 1735. proposita. VATER apud VALENTINUM *Chirurg. med.* p. 312. *physiolog.* p. 670. MYLIUS & QUELMALZ l. c. n. 13. CHESELDEN l. c. p. 167. GILLAN. & READ. tum Georgius THOMSON apud STUKELEY p. 27. MEAD. *ibid.* p. 46. J. D. SCHLICHTING *traumatogr.* p. 76. in VERBRUGGE p. 36. FIZES *de liene* p. 137.

(*e*) VALISNERI l. c. add. BIRCH l. c. T. I. p. 426. T. II. p. 173.

(*f*) Moriebatur intra triduum MATTEI *anim.* p. 256. Post aliquot menses DIONIS. *Cours d'oper.* p. 128. Mortuus ex abscessu BIRCH T. I. p. 283. ex sanguine in abdomen effuso VERHEYEN p. 88.

(*g*) Dissuadetur in MAGAT *redviv.* p. 175. Ita CÆLIUS *Chron. L.* II. c. 4. dici de extirpatione, sed non fieri.

(*h*) Fere omnia paginæ prioris experimenta.

(*i*) SCHLICHTING. VERHEYEN l. c.

(*k*) BIRCH. T. I. p. 315. ENT. *apolog.* Quinque annis VALISNERI.

(*l*) FANTON. *Ep.* VI. ad MANGET. HOME. BECKER.

(*m*) SCHLICHTING l. c. VALISNERI *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs.* 118. ZAMBECCARI *Phil. transf.* n. 28. GRAAF.

(*n*) VALISNERI. CLARKE apud BIRCH T. II. p. 173.

(*o*) CLARKE *ibid.* ZAMBECCARI. MORGAGN. l. c.

(*p*) BOHN. MALPIGHI. DENIS. HEISTER. BIANCHI p. 26. PAREUS.

(*q*) GEUDER l. c.

(*r*) JOLYFFE apud BOYLE. PURCELL. in BLATMORE *essays.*

(*s*) MALPIGHI. BONN. DENIS. BRUNNER. VALISNERI. HEISTER. DEISCH. ORTLOB.

(*t*) BOHN.

(*u*) MALPIGHI. ORTLOB. HOFMAN *med. physiol.* p. 138. & imprimis POZZI DEIDIER.

obstructum, ulceratum, decolor (*u*^{*}); bilem colore alieno, fusco aut coffeæ (*w*) simili; eandem lentiolem, obscure virentem, coactam (*x*), caseosam, parcam, immeabilem, minus flavam (*y*), aqueam & pallidam in aliis (*z*); & putrida demum in ventriculo alimenta (*a*), atque appetitum dejectum (*b*). Nondum tamen inde audeas aliquid firmioris theoriæ superstruere. Nam bilis illa VALISNERIANA fusca tamen, & amara erat (*c*), & acerrima in POZZII & BONAZZUOLI experimentis (*d*), & hepar potius aridum in JUSTI VESTI & DUNCANI (*e*) canibus. Nihil valde mutatum vidit VERHEYENIUS in cane, quem post sex ab evulso liene menses necavit (*e*^{*}). Neque falaciorem cum insomnio fuisse hominem, cui excisus lien, testis est *Franciscus* HOME (*f*), & omnino sterilis fuit alter a Cl. BECKERO citatus (*g*).

In universum tamen credas, plus alias, minus in aliis, motum sanguinis per hepar passum esse: vitiatam inde bilem: & ciborum coctionem; unde cruditas, flatu, & urinæ augmentum, male cibum coquentibus familiare. Oportet autem hæc omnia numerosis, & absque hypothese susceptis periculis, aut confirmare, aut corrigere.

§. VI. *Hypotheses. Secretio lienalis.*

Succum aliquem etiam illustres. Viri in lienis glandulis parari (*a*) docent, qui sanguini venoso (*b*) addatur, ejusque vires utrumque intendat (*c*), aut bilem adfusus temperet (*d*).

(*u*^{*}) DEIDIER.

(*w*) VALISNERI. MORGAGNI.

(*x*) BOHN *duumvir.* n. 21. Ejusmodi fuit bilis VALISNER. III. p. 197. 198.

(*y*) ORTLOB cum siti & bilis vomitu.

(*z*) VATER *physiolog.* l. c.

(*a*) MEAD. apud STUKELEY p. 46.

(*b*) DUNCAN. Tarda digestio serpentibus. quibus nullus lien STUKELEY p. 41.

(*c*) l. c.

(*d*) l. c.

(*e*) l. c.

(*e*^{*}) l. c. p. 88.

(*f*) l. c.

(*g*) l. c.

(*a*) Quod magna vasa sanguinea & lymphatica in liene sint MORGAN. *princip.* l. p. 180.

(*b*) RRYSCH apud WESTHOVEN p. 42.

(*c*) FANTON. *diff.* VI.

(*d*) Salivalem vocat POZZIUS, & ei id muneris tribuit.

Id humoris alii per vasa lymphatica in receptaculum chyli reduxerunt (e), ut chylum diluat (f) aut ad hepar, ut ejus sanguinem (f*). adtenuet.

Alii omnino eum succum acidum fecerunt (g): sive per venas in cor (h) refundatur, fermento futurus (i) sanguini, sive per vas breve (k) in ventriculum emanet, aut alio modo chylum juvet subigere (l).

Hinc etiam lienem cum pasta maceratum fermentationem excitare (m).

Alii succum atrabilarium in lienem receptum (n) coqui, & ad hepar ferri maluerunt, per venam portarum, ut coctio sanguinis in eo viscere adjuvetur (n), & confectio ciborum (n†). Alii etiam per ipsos nervos tenuem ex liene succum forberi, qui sit vehiculum veri succi alibilis (o), vel omnino spiritus, qui in sanguinem effusi (p) fermenti sint loco (q), aut certe aliquo modo sanguinem perficiant.

Olim etiam *Franciscus ULMUS* in liene ex succo ventriculi sanguinem perfici scripsit, qui per aortam in ventriculum cordis sinistrum rapiatur, & inde in arterias detur cum aere mistus; quem haecenus sublevat G. STUKELEY, quod lienem spongiosum faciat, ex qua sponsia pro arbitrio sanguis in arterias, vel in venas premi possit (s).

(e) TARGIRUS p. 236.

(f) J. GEORG. a BERGEN.

(f*) DRELINCOURT c. 4.

(g) PERRAULT p. 238. TILING etiam VALISNERI *Consil.* p. 490. CRAANEN p. 659. 660. CRESSENZO p. 202. FLOYER *praternatural. state of humours* p. 12. 156. Subacidos viscidos vocat humores lienis.

(h) PERRAULT *Eff.* T. III. p. 239. TILING *vas. breve.* CRAANEN.

(i) SYLT. *diff.* V. n. 18.

(k) TILING tincturam nobilem acido falsam facit.

(l) BIUMI *canaletti* c. 18. p. 191.

(m) TILING *vas breve* p. 161. addit modestus cautusque; maxime, si acetum addideris.

(n) GALENUS. C. BAUHIN. p. 147. &c. Picea materie plenus lién SIMSON *diff.* p. 154.

(n*) LINDEN *phys.* p. 117. PRIMIROSE de *usu lienis.*

(n†) *Corncl.* CONSENTIN. p. 225. MAYOW. p. 352. Conf. p. 423.

(o) GLISSON de *hepate* p. 432. seq.

(p) CRESSENZO SYLV. *diff.* V. n. 18. *Prax.* l. c. 43. MAYOW p. 344. MALPIGHI c. 6. p. 117. BOERHAAVE n. 322.

(q) COLLINS p. 420.

(r) De liene p. 22. seq. & C. BAUHIN. REUSNER. VAROL. PARISANUS. C. BARTHO-LIN. &c. HOESCHSTETTER. p. 476. seq. Sanguinem in liene in naturam fluidiorem converti.

(s) p. 21.

Idem ait, lienem aliquem genitalibus sanguinem (*t*) dare, atque hætenus ad venerem (*u*) pertinere. In falace lien maximus (*w*).

Denique mucilaginem articulorum in liene parari, viri alioquin bene meriti fuit conjectura (*x*). Lympham per poros sudare, quæ vicina viscera obliniat & humectet (*y*) alterius Viri Cel.

Hæc omnia, partim omnino absque ulla demonstratione dicuntur, partim manifestis experimentis contraria sunt. Lien non est acidus (*z*). Vasa brevia nihil possunt a liene (*a*), in ventriculum fani hominis vehere; & longe minus aliquid in arteriam remittunt (*b*). Nervi lienī paucissimi (*c*), sunt & minimi, inter viscera nobis nota, ipseque GLISSONIUS suam conjecturam antiquavit (*c**). Succum ex arterioso sanguine in liene parari, & continuo in venosum ejusdem visceris cruorem reddi, videtur inutilis naturæ labor: cum, quæ in arteria sunt, alioquin in venam transeant. Nihil a liene ad vasa genitalia venit, & fecunda sunt animalia, quibus lien ademptus (*d*). Nulla in liene mucilago, via nulla, qua possit in articulos universi corporis ferri.

§. VII. *Aliæ hypotheses.*

Sedem esse animæ sensitivæ (*a*), [qui vix omnino sentiat].

Veneris in eo sedem esse, & primordium feminis (*b*); somni demum, dum sibi, non publico, operatur (*c*); faturnia regna lienis esse (*d*).

(*t*) p. 53. 54.

(*u*) VELTHUYSEN p. 32. seq.

(*w*) FONTAN. ad VESAL. *Epit.* p. 23.

(*x*) CLOPTON HAVERS *osteolog.* p. 211.

(*y*) RIVINUS *de genuino lienis usu.*

(*z*) L. XIX. p. 157. Sal marini similis in lienis bubuli infusione BOHN *duumvi hypoch.* n. 30.
Lien non est acidus, conf. SPIELMANN *chem.* p. 179. & p. nostr. 4. 5. Sanguis lienalis est fluidior
FIDES p. 111.

(*a*) L. XIX. p. 156.

(*b*) Ex lege circuitus.

(*c*) p. 404.

(*c**) *Ventr. int.* c. 8. n. 7. p. 163.

(*d*) p. 422.

(*a*) HELMONTIUS *Jus duumvir* n. 10.

(*b*) n. 41.

(*c*) n. 14.

(*d*) *Blas human.* n. 28.

Rifus in splene quamdam esse scaturiginem, ut ridere faciat, atque aucta lienis mole homines ad usque ineptiam ad risum incitari (*e*). Et sæpe eosdem homines & ridiculos esse & atrabilarios (*f*): & risum adimi, exempto (*g*) liene.

Chylum aquosolacteam de intestinis ad lienem adtrahi, coqui, eo id viscus ali, excrementa mitti ad sudorem, ad renes (*h*), quale quid ARISTOTELES (*i*) olim statuerat.

Demum desperabundi aliqui, & pro inutili habituri, cujus utilitatem ignorabant, esse inutilem & ignavum (*k*), esseque quoddam quasi ad æquilibrium hepatis (*l*) objectum pondus. Ea vetusta est theoria, quam hominibus a primordiis suis splene (*m*) carentibus & animalibus, absque magna noxa lienem (*n*) amittentibus, confirmare studebant (*o*).

Ut brevis sim, risus in liene sedes videtur ex effectu titillationis nata, quæ in plurimis mortalibus risum excitat, quando ilium cutis leviter sollicitatur, ut nulla tamen sinistri lateris super dextrum prærogativa sit.

Æquilibrium inter maximum avium hepar, & minutissimum lienem, nullum cogitari potest.

Inutilem aliquam partem corporis animalis esse, tam late per diversas species regnantem, indignum est dictu.

Etiam majorum, & usu quam maxime conspicuo præditorum viscerum jacturam, robusta animalia aliquando absque conspicuis symptomatibus tolerant, ut magnæ partis pulmonis, aut cerebri (*p*); non certe ideo inutilium.

(*e*) SERENUS SAMMONICUS Ed BURM. p. 275.

(*f*) BOERHAAVE *Praelect.* p. 73.

(*g*) PLIN. l. c. SERENUS.

(*h*) C. HOFMAN Vir eruditissimus, *de liene*. IDEM. *apolog.* II. c. 106.

(*i*) *Part. anim.* L. III. c. 7. Vaporem ex ventriculo adtrahere & concoquere.

(*k*) ERASISTRATUS, RUFUS II. p. 59.

(*l*) ARISTOT. *part. anim.* L. III. c. 3. *Æquilibre hepatis* ARET. *caus. diut.* l. c. p. 13.

(*m*) ARISTOTELES, ROUSSET *de partu Cæsar.* L. IV. c. 5. C. GEMMA, DRELINCOURT *de liene*. POHL *de absentia lienis*.

(*n*) p. 421.

(*o*) Conf. multas hypotheses DRELINCOURT c. 3.

(*p*) Etiam renis VESAL. p. 820. uteri GINZBURGER l. c. &c.

LIBER XXII.

PANCREAS.

§. I.

ANTIQUIS non ignorata fuit glandula, HIPPOCRATI (*a*) certe & ARISTOTELI (*b*), EUDEMO (*c*), RUFO (*d*), GALENO (*e*) adprime cognita, & sequacibus (*f*), donec a JACOBO SYLVIO fere error incepit, quem alibi refutavimus (*g*).

Plerisque in animalibus pancreas reperitur: in avibus fere duplex, ut in aquila (*g*^{*}), falcone (*g*^{**}), noctua (*g*^{***}), scope (*g*[†]), anate (*g*^{††}). Tum in quadrupedibus omnibus, & cetis (*h*), non perinde in omnibus piscibus (*i*), tamen in plusculis, galeo (*k*), hufone (*l*), passere (*m*), raja (*n*), torpedine (*o*), inque frigidi sanguinis quadrupedibus; ut in crocodilo (*p*), lacerta (*q*).

(*a*) *περὶ αἰσθητῶν* n. i. Ad glandulas intestinorum detorquet ALMELOVEEN *novant.* p. 174.

(*b*) *Isag. anat.* c. 13. p. 13.

(*c*) GAIENUS *de semine* L. II. p. 171.

(*d*) RUFUS p. 39.

(*e*) *De usu part.* L. V. c. 2.

(*f*) ORIBAS p. 108. 110.

(*g*) p. 362.

(*g*^{*}) WEPFER *cicut.* p. 173.

(*g*^{**}) MURAL *vademes.* p. 338. 339.

(*g*^{***}) Quadruplex dicitur *Eph. Nat. Enr. Dec. II. ann. 4. obs.* 34.

(*g*[†]) PARISINI.

(*g*^{††}) BLAS *anat. anim.* p. 262.

(*h*) Delphino RONDELET p. 449. *turfione* RAI *Phil. trans.* n. 76. Phoca *Nov. Comm. Pet.* II. p. 376. *Manati* *ibid.*

(*i*) In aliis nullum, in quibusdam duo GMELIN apud KLEIN *miss.* V. p. 35. Sed ea quidem pancreata, cum non viderim, non satis certo novi, num veri sint nominis.

(*k*) PARISINI, CHARLETON *mantiss.* p. 84. COLLINS *tab.* 32.

(*l*) MARSIGLI *Danub. T. VI. tab.* 9. folii vitis figura.

(*m*) Turbot COLLINS *tab.* 37. f. 3.

(*n*) IDEM *tab.* 27.

(*o*) LORENZIN. p. 24.

(*p*) Maximum & multifidum HASSELQUIST *risa* p. 295. 601. tum JES. SIAMENSES, VESLING *Ep.* V.

(*q*) HARDER *apiar.* p. 86. Longissimum vidit in viridi lacerto majori. In salamandra PARIS.

rana (*r*), testudine (*s*), serpente (*t*). Inter conchas in purpura (*u*) dictum est, nescio an recte. Ipsis infectis aliquid pancreati simile est (*a*).

Homini aliquanto, quam quadrupedibus, rotundius, brevius, capite crassiori, minus bicorni, quam cani (*b*), leoni (*c*), feli (*d*), lynxi (*e*), marti (*f*), urso (*g*), castori (*h*), hystrici (*i*), erinaceo (*k*), muri montano (*l*), talpæ (*m*), equo (*n*), gazellæ (*o*): cæterum, ut analogiam cum pancreate animalium facile invenias, quam puto ad proprios usus maximam EUSTACHIUS fecit (*p*), forte nimiam (*q*). Sæpe se duplex, ut in bestiis, vidisse ait BLASIUS, inferiori tamen lobo non perinde longo (*q**). Appendicem versus pylorum nominat RIDLEY (*r*). Duo pancreata COLLINS (*s*). *Petit pancreas* WINSLOW (*t*), aliique Galli. Sed res vix tanta est, ut nomen mereatur proprium (*u*): & plerumque pancreas crassum potius, non lunatum, neque ferrum equinum exprimens caput habet (*u**);

- (*r*) SWAMMERDAM p. 827. JACOBÆUS p. 48.
 (*s*) PARIS. SEVERIN. p. 372.
 (*t*) BLAS *anat. anim.* p. 333.
 (*u*) *Phil. transf. Vol. L. P. 2.* p. 588.
 (*a*) In pediculo SWAMMERDAM *bibl.* p. 76. in eruca p. 477. in bombyce MALPIGH. *posth.* p. 57.
 (*b*) GRAAF p. 11. BRUNNER ubique. COLLINS p. 403. add. BLAS *anat. can.* p. 203. 204. HIGHMOR. *tab.* 4. f. 1.
 (*c*) Cum ferro equino comparat COLLINS, cum liene BUFFON T. VIII. p. 55. adde BLAS p. 412.
 (*d*) COLLINS p. 403.
 (*e*) Anulum facere BUFFON T. IX. p. 247.
 (*f*) IDEM T. VIII. p. 347.
 (*g*) IDEM T. VIII. p. 270.
 (*h*) *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51. BUFFON T. VIII. p. 315.
 (*i*) PARIS.
 (*k*) BLAS p. 65. BUFFON T. VIII. p. 41.
 (*l*) Ibid. p. 233. PARIS.
 (*m*) BUFFON T. VII. p. 93.
 (*n*) SNAPE *tab.* 7. f. 3.
 (*o*) PARIS.
 (*p*) *Tab.* 10. f. 3.
 (*q*) MARTINE p. 55.
 (*q**) P. IV. *obs.* 14.
 (*r*) *Obs.* p. 220.
 (*s*) p. 399.
 (*t*) WINSLOW n. 324.
 (*u*) Etiam monet CLAUSEN *de duodeno* p. 18.
 (*u**) Ut in tabula GRAAFII.

cum ejus glandulæ pars transversa multo crassior & longior, quam in EUSTACHII icone, majorem ad caput rationem habeat.

Nempe pars dexterrima pancreatis replet (*w*) totum arcum finistrum duodeni, quem suo loco dicemus, proxime a pylori valvula incipientem, & a descendente & transversa altera sede ejus intestini comprehensum, ad exitum usque jejuni. Ea sede duodeno est pro mesenterio; pariter nempe vasa sanguinea adducit (*x*) & pariter quidem tum anteriora alia, alia posteriora: Cæterum ultra limitem duodeni productum, & anterius & posterius, ei intestino aliquantum incumbit, & quasi innascitur (*y*).

Inde pancreas sinistrorsum tendit, & gracilescit eundo (*z*); porroque pene ad finem suum latitudinem suam tenet (*a*); antrorsum vero migrat, ut conscendat vertebrarum corpora, inde sinistrorsum ad posteriora se recipit, & posteriori loco lienis partem finiam attingat, ad quem finitur, qua lamina mesocoli superior ad inferiorem adjungitur (*b*). Ante lienem aliqua parte producitur, ut lien capsulæ renali, pancreas lieni, pancreati ventriculus, huic hepar infideat. Tota ea sede pancreas cavea mesocoli continetur (*c*), inter laminam superiorem, & inferiorem, quas diximus convenire hinc ad dextra descendents duodeni, inde denuo ad lienem. Id mesocolon diximus a membrana externa pancreatis oriri: nempe mesocolon volumus magnæ parti pancreatis pro membrana externa (*d*) esse, quam non habet, nisi anteriorem superiorem, posterius ad vertebra nullam, nisi cellulofam.

Quando ventriculus inanis est, pancreas retro eum ponitur, ut etiam parte sua sinistra, quasi depressa, planitie ventriculi posteriori sub œsophago pulvinum præstet (*e*). Plenus ventriculus a pancreate discedit, & arcum minorem ei obversum habet.

Neque penitus triquetrum est (*f*), neque planum cum duabus superfi-

(*w*) EUSTACHIUS *tab.* 10. f. 3. *Fascic.* II. *tab.* art. *cæliac.* II. MONRO l. c. p. 67. CLAUSEN T. I. d.

(*x*) *Tab. cæliac.* II.

(*y*) Ibid. WINSLOW n. 320. In *fimio* COLLINS *tab.* 18.

(*z*) GRAAF ic.

(*a*) IDEM & *nostr.* *tab. cæliac.*

(*b*) p. 357.

(*c*) Ibid. & *tab. art. mesent.* d. HENSING. n. 29. WINSLOW n. 320.

(*d*) Ibid.

(*e*) EUSTACHIUS *ibid.*

(*f*) LIEUTAUD p. 307.

ciebus (*g*) Sub lobulo hepatis in dextro latere est, & pone idem in sinistra posteriori facie sua capsulæ renali sinistrae insidet, media aortæ: ad finem crassioris capitis ante vasa magna mesenterica procedit, eaque tegit, in media fere vertebrarum convexitate.

Longitudo per limites definitur, & pene eadem est, quæ ventriculi: ut EUSTACHIUS partem transversam, justo brevior (*h*) pinxerit.

Pondus etiam varium est, unciarum duarum cum semisse (*h**) trium (*i*) & quinque (*k*), ad sex usque (*l*).

Pondus ad aquam ut 1. 2029. ad 1. 000 (*n*).

§. II. *Fabrica.*

Ommino eadem ei est natura cum glandulis salivalibus. Notum nempè fit ex lobis, parum distinctis, qui & ipsi ex minoribus fiunt lobulis; iique minores lobuli & ipsi in acinos (*a*) discedunt, aqua inprimis injecta conspicuos, neque oculus finem invenit divisionis. Omnes acini, lobuli, & lobi, cellulosa tela macilenta, & fibrosa junguntur, tenaciori, ut majores lobi sunt; ut in universum pancreas duriusculum sit, tamen ut nonnunquam adipem recipiat. Ipse sapor idem qui glandularum salivalium est, ut etiam a vulgo (*b*) & a coquis eosdem ad usum adhibeatur. De fabrica acinorum alias (*c*) disquisitum est, quos ex vasculis construi (*d*), cum cellulosa tela suspicamur.

Si cellulæ in pancreate sunt (*e*), humorem credas in cellulosi textus cavernulis stagnasse.

(*g*) Superiorem, inferiorem WINSLOW n. 319.

(*h*) l. c.

(*h**) SAUVAGES *nosolog.* I. p. 499.

(*i*) CHESELDEN p. 195.

(*k*) WHARTON p. 72.

(*l*) HEUERMAN T. III. p. 812.

(*m*) SAUVAGES *embryol.*

(*n*) MUSSCHENBROECK *introd.* p. 556.

(*a*) WINSLOW n. 321. GRAAF ic.

(*b*) *Bocca saporita* CARP. *Isag.* p. 12. in MUNDINUM p. CXX. b.

(*c*) L. VII.

(*d*) RUYSCH *Thef.* IV. n. 94. VIEUSSSENS *nov. vasf. system.* p. 451.

(*e*) In crocodilo HASSELQUIST p. 291.

Frequentes (*f*) in pancreate, ut in parotide & aliis glandulis scirrhi sunt: neque rari abcessus (*f*^{*}), etiam crancrofi (*f*^{**}). Utrumque malum ipse vidi (*g*).

§. III. *Vasa Arteriæ.*

In non maximo viscere numerosissimi sunt trunci arteriosi, ut fere tædio narranti sint, & magis etiam legenti. Multas nempe, sed plerasque minores arterias habet.

Caput, five pars crassior & anteriorem habet circulum arteriosum [*(a)*]. & similem posteriorem (*b*), a quo ad pancreas & ad duodenum rami eunt.

Anterior fit ex ramo arteriæ duodenalis, sub valvula pylori nato; *Pancreatico*, se circa cavum arcum duodeni descendentis circumflectente (*c*); & ex contrario ramo arteriæ mesentericæ (*d*), transversim secundum duodeni imum finem circumducto; deinde in descendente duodeno cum priori in unum truncum coalescente. Etiam cum transverso pancreatis communicat (*e*).

Posterior arcus similem fere originem habet, superius ex arteria duodenali posteriori five superiori (*f*), inferius aut ab ejusdem rami mesen-

(*f*) Frequentes esse eos scirrhus BARTOLETTI p. 267. & sedem morborum diuturnorum FERNEL. *pathol.* L. VI. c. 6. Exempla habent PAW. *obs.* 14. MILITIA p. 74. BOHN *exper. fall.* n. 68. PETERMANN. *Dec.* II. *obs.* 6. CHESelden p. 66. RIDLEY *obs.* p. 157. 162. VATER *divert.* p. 28. KERKRING *obs.* 65. EYSEL *de gland.* p. 25. BUDDÆUS l. c. p. 35. NIETNER *de gland. natur.* p. 25. KERKRING *obs.* 65. CHARLETON *Exerc. patholog.* p. 126. DILTHEY *obs.* 8. *Journ. de Trev.* ann. 1707. Janvier BAGLIV. SALZMAN *de miro abscessu* G. v. SWIETEN T. III. p. 151. Pancreas tumidum pure plenum, ut corpus converti sine dolore non posset TULP. L. IV. c. 33. Pene cartilagineum pancreas: unde vomitus MORG. *Sed. caus. morb.* II. *Ep.* 30.

(*f*^{*}) PLANCUS *Acad. conjectur.* p. Cl. pondere 13. librarum STORK II. p. 248.

(*f*^{**}) Ut ventriculum adroderet HASENOEHRL p. 60. 61. Saniosum RIOLAN p. 110. Hepatis mole in THUANO.

(*g*) Steatomata FONTANUS ad VESAL *Epist.* p. 21.

(*a*) *Tab. art. cæliac.* II.

(*b*) Pars in *tab.* I.

(*c*) *Art. cæliac.* not. s. cum ramore. *tab. cæliac.* II. Duodenale WINSLOW III. n. 186. IV. n. 325.

(*d*) *Tab. Cæl.* I. s. *Tab.* II. *art.* d. & in ic. f. *tab. mesent.* p. 44. Etiam ex colica media p. 49. *Fasc.* VIII. p. 36. WINSLOW n. 325. III. n. 197.

(*e*) *Ic.* II. *Cæl.* 9.

(*f*) *Art. Cæliac. tab.* I. ad P. & M. not. p.

tericæ arteriæ altero furculo (*g*), aut ab alio ramo arteriæ mesentericæ. Eadem tota nonnunquam a mesenterica prodiit, aut & a cæliaca & a mesenterica ejusmodi duodeni prima adfuit (*h*). Accedunt ad eum circulum ramuli pyloricarum superiorum, inferiorum (*i*).

Eadem pancreatica inferior dat etiam plerumque arteriam *transversam* (*k*) pancreatis, posterius sinistrorsum per duas tertias glandulæ redeuntem. Eam etiam mesenterica generat (*l*). Exiguos ad mesocolon ramos spargit; & cum coronariæ, splenicæ, mesentericæ ramis pancreaticis coit.

Ad crassam eandem pancreatis partem etiam splenica (*m*) supremum ramum mittit, etiam ante divisionem ortum (*n*), vel ex mesenterica (*o*), vel ex aorta demum (*p*). Ea & descendit ante pancreas, & cum phrenica etiam convenit (*q*). Sed etiam hepatica (*r*) eo ramum dat, aut coronaria magna (*s*) proprium ramum deorsum mittit.

Primus etiam ramus mesentericæ in pancreas absumitur (*t*), aut plufculi pro uno sunt (*u*).

Iterum exigui ramuli eo veniunt a capsulari, a phrenica.

Pars reliqua pancreatis ramos identilem recipit ex trunco lienali (*w*), etiam ex ipso liene (*x*) & ex gastroepiploica sinistra (*y*).

Venæ ex truncis similibus nascuntur; gastrocolica (*z*), mesenterica, splenica (*a*), duodena (*b*), arteriarum in universum similes.

(*g*) *Tab. I. not. p. Tab. II. not. d. & in iconc Tab. II. f. & tab. art. mesent. p. 44. 45. Fasc. VIII. p. 36.*

(*h*) *Fasc. VIII. p. 33. 46.*

(*i*) *Tab. II. cæliac.*

(*k*) *Tab. Cæl. I. not. q. tab. 2. d. not. b. Fasc. VIII. p. 33. 34.*

(*l*) *Et colica sinistra Fasc. VIII. p. 36.*

(*m*) *Tab. art. cæl. I. not. I. tab. II. Y. c.*

(*n*) *Art. cæliac. tab. 2. e. not. c. Fasc. VIII. p. 32.*

(*o*) *Ibid.*

(*p*) *Ibid. 2^o art. mesent. Tab. p. 44. Fascic. VIII. p. 36. Cum splenicis & duodenis primis coit.*

(*q*) *Fasc. VIII. l. c. p. 32.*

(*r*) *Conf. Fasc. VIII. not. c. p. 32.*

(*s*) *Tab. art. mesent. p. 45. Fasc. VIII. p. 32.*

(*t*) *Art. mesent. Tab. p. 44.*

(*u*) *Ibid.*

(*w*) *Not. e^a ic. i.*

(*x*) *Cæliac. Tab. II. not. o.*

(*y*) *Tab. II. not. g.*

(*z*) *WINSLOW III. n. 245.*

(*a*) *RUYSCH Epist. IV. tab. 4. f. 2. E. E.*

(*b*) *LEONICEN p. 91.*

Non valde fanguineum viscus est vel coloris argumento. Nam albet.

Divisio vasorum est, ut in salivalibus glandulis, ut trunci per cellulofam tunicam incedant, rami majores lobos pariter majores, rami minores lobulos, minimi ramuli acinos adeant.

Num pancreas lymphatica vasa habeat? ignoro, & dubito (*c*). Quæ adeo frequenter (*d*) apud seculi prioris scriptores nominantur, ea fere ad spurium illud ASELLII (*e*) pancreas (*f*) pertinent.

Nervi non magni, nondum, ut puto, plene descripti, a plexu posteriori ventriculi (*g*), ab hepaticis (*h*), a splenicis (*i*).

Obtusi adeo sensus esse crediderim.

§. I V. *Ductus excretorius.*

Sed imprimis celebre vasis nomen est, quod pancreati proprium, ad duodenum succum in ea glandula secretum defert.

Antiquissimis temporibus notum fuisse invenio. Nam ex veteribus GALENUS glandulas humorem viscidum salivæ similem adfundentes, ad intestina sitas dixit (*a*), de quibus lis inter EUDEMUM & HEROPHILUM nata sit; & alibi, glandulas ad intestina positas ad servandam viscositatem (*b*) memorat. EUSTACHIO (*c*) nuper inventus (*d*) tribuitur, qui nimis est manifestus ductus choledochus (*e*).

Inde longo intervallo demum circa annum 1641. in animalibus ejus

(*c*) Negat J. MAURICIUS HOFMAN *Idea* p. 44.

(*d*) Habet PECQUET contra RIOLANUM p. 116. MARCHETT p. 40.

(*e*) VESLING. ASELLIUS, de CRUYCE apud BARTHOL. *anat.* p. 113.

(*f*) De iis monet GRAAFIUS p. 88. l. c. J. v. HORNE in *diff. de ductu chylif.* p. 278. Transeunt verum pancreas, nec inferuntur DRELINCOURT *canicid.* p. 16.

(*g*) Ex intercostalibus L. X. p. 262. Ex vagis p. 237.

(*h*) WINSLOW n. 406. L. X. p. 263.

(*i*) WINSLOW n. 408.

(*a*) *De semine* L. II.

(*b*) Ibid. & *de utilit. part.* L. XIV. c. II.

(*c*) *Tab.* XI.

(*d*) In *apologia* CAL. PETRIOLI p. 29.

(*e*) Conf. CL. GIRARDI p. 20. 21. cum ductus pancreaticus non per superficiem pancreatis integri decurrat, & in eo profunde lateat.

memoria renovata est. MAURITIUS quidem HOFMANNUS (*f*) Patavii eum ductum, in gallo indico visum, *J. Georgio WIRSUNG*, medico bavaro ostendit, adque HOFMANNUM a plurimis Germanis (*g*) novi inventi decus refertur; ut etiam solenni quotannis convivio ejus inventi gloria concelebretur.

Plerique tamen ad WIRSUNGUM ipsum referunt, qui paulo post, anno 1642. iconem sculptam hujus ductus ex homine dedit, quam *J. B. MORGAGNI*, viri summi, beneficio coram video: & quam aiat, in elogio, esse ad multa corpora humana factam, cum præterea Vir Cl. in numerosissimis animalibus novum ductum sit persecutus (*h*), in eo verus inventor. Nihil enim edidit HOFMANNUS. Neque tamen ex invidia (*i*) tanti inventi (*k*), neque a scoto medico (*l*); sed a Dalmata (*m*) quodam egregius juvenis paulo post glande plumbea trajectus occubuit (*n*). Anno 1644. *Fr. SYLVIVS* (*o*) ejus ductus iconem dedit, eumque nova hypothefi ornavit (*p*), uti porro ab ejus discipulo REGNERO de GRAAF ejus historia imprimis exulta fuit.

Late regnat autem hic canalis, tam late, quam ipsa glandula, estque numerosissimis incisionibus confirmatus: inter quadrupeda, in finio (*q*), pygmæo (*r*), elephante (*s*), equo (*t*) vitulo (*u*), ove (*w*).

(*f*) BARTHOLIN *anat. reform.* p. 113. Auctor & ipse est, ante WIRSUNGUM esse ab HOFMANNO detectum. Luculentus præterea testis est SCHENKIUS *exerc. anat.* p. 343, qui disertè scribit, ansam inquirendi WIRSUNGO dedisse curiositatem discipuli sui HOFMANNI.

(*g*) RIVINO: FRANK *bon nov. anat.* n. 21. WELSCHIO *tab.* p. 41. GOELICKIO *hist. anat.* p. 227. *J. M. HOFMAN* in *idea* p. 42. BAYERO *biograph. altorfin.* p. 98. ex BARTHOLINO: MERCLINO *de feliciori nunc medicina* p. 4.

(*h*) RIOLAN. p. 812.

(*i*) De WIRSUNGO quidem conquestus erat præceptor ejus VESLINGIUS, quod noluisset iconem novi ductus sibi demonstrare BARTHOLIN *præf. ad LYSERI cult.* Nihil tamen in vita VESLINGII est, tanto scelere dignum.

(*k*) GRAAF in *princip.* GOELICKE, BOERHAAVE *Prælect.* T. I. p. 54.

(*l*) LEONICENUS *metamorph. apoll. & asculap.* p. 83.

(*m*) MORGAGNUS *ibid.* p. 85.

(*n*) Anno 1643. M. August. d. 22. MORGAGNUS *Epist.* p. 83.

(*o*) Quæ est in Ima editione GRAAFII T. I. & apud PLEMPPIUM *fundam. med.* p. 13.

(*p*) LINDEN *physiol.* p. 117.

(*q*) PARIS.

(*r*) TYSON p. 32.

(*s*) Amplus MULLINS p. 23.

(*t*) SNAPE *tab.* 7. f. 3. HORNE *præf.*

(*u*) GRAAF HIGHMOR p. 72.

(*w*) HIGHMOR.

cervo [x], rupicapra [y], gazella [z], cane [z*], vulpe [a], felle [b], civetta [c], leone [d], tigride [e], catopardo [f], panthera [g], putorio [h], lutra [i], castore [k], urso [l], hystrice [m], lepore, cuniculo [n], mure [o], erinaceo [p], fciuro volante [q], porco [r], phoca [s], delphino [t], manati [u].

Inter quadrupeda frigida, in testudine (w), chamæleonte (x), crocodilo (y), salamandra (z), rana (a), serpente (b).

Inter aves in struthiocamelo (c), casuario (d), butauro (e), ar-

- (x) PARISINI.
- (y) PARIS.
- (z) IDEM.
- (z*) AMST. p. 21
- (a) PEYER p. 53.
- (b) SCHRADER *anim. carniv. digest.* p. 14. GRAAF WIRSUNG.
- (c) PARIS.
- (d) PARIS.
- (e) BLAS p. 121.
- (f) DUVERNOI *Comm. Acad. Petrop. Vol. I.* p. 342.
- (g) PARIS.
- (h) CALDESI *tab.* 5. f. 6.
- (i) IDEM *tab.* 5. f. 8. & in *Nov. Comm. Petrop. T. II.*
- (k) *Act. erud.* ann. 1684. p. 363. *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51.
- (l) *Comm. litt. nor.* ann. 1734. n. 38.
- (m) DUVERNEY II. p. 545. PARIS.
- (n) GRAAF p. 24. BLAS p. 63.
- (o) SCHRADER p. 23. WIRSUNG.
- (p) PEYER *obs.* p. 80.
- (q) *Act. petrop. T. V.* p. 233.
- (r) GRAAF WIRSUNG.
- (s) *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. 10. obs.* 98. HARTMAN in *anat. phocæ.*
- (t) FANTON p. 110.
- (u) *Comm. nov. Petrop. T. II.* p. 376.
- (w) CALDESI p. 51. PARIS.
- (x) VALISNERI *T. II.* p. 416.
- (y) PARIS. HASSELQUIST p. 601.
- (z) PARIS.
- (a) JACOBÆUS p. 78. WIRSUNG.
- (b) BLAS p. 333. BRUNNER *pancr.* p. 85.
- (c) *Hist. de l'Acad.* 1754. n. 6. VALISNERI *notom. d'un struzzo* p. 245.
- (d) PARIS.
- (e) GRAAF.

dea [*f*], grue [*g*], ave regia [*h*], scope [*i*], ibide [*k*], ciconia [*l*], pelicano [*m*], phœnicoptero [*n*], aquila [*o*], vulture nudi colli [*p*], falcone [*q*], pica [*r*], cornice [*s*], corvo [*t*], corvo marino [*u*], anfore [*w*], anate [*x*], tarabulo [*x**], arquata pavoncello [*y*], gallina [*z*], etiam ægyptia [*a*], gallo indico [*b*], phasianio [*c*], tarda [*d*], columba [*e*].

Inter pisces eum ductum dicitur habere torpedo [*f*], raja [*g*], squatina [*h*], galeus [*i*], harengus [*k*], rhombus [*l*]. Eorum aliquibus, aut omnibus forte, hic pancreaticus ductus fuerit appendix pylorico.

§. V. *Fabrica in homine.*

Cum in hos canales sæpe inquisiverim, ero paulo in dicendo fusior.

(*f*) COLLINS *tab.* 23. SCHRADER.

(*g*) CALDESI *tab.* 5. f. 3.

(*g*) PARIS.

(*i*) IDEM.

(*k*) IDEM.

(*l*) IDEM.

(*m*) IDEM.

(*n*) IDEM.

(*o*) IDEM *ic.* BORRICH.

(*p*) PARIS.

(*q*) PEYER p. 108.

(*r*) GRAAF.

(*s*) PEYER *obs.* 44.

(*t*) SCHRADER p. 27. PEYER p. 101. 106.

(*u*) PARIS. GRAAF.

(*w*) GRAAF *REDI tab.* 7.

(*x*) GRAAF.

(*x**) CALDESI *ibid.* f. 4.

(*y*) REDI *anim. viv. tab.* 7.

(*z*) GRAAF.

(*a*) PARIS.

(*b*) HOFMANN GRAAF.

(*c*) GRAAF.

(*d*) PARIS.

(*e*) GRAAF.

(*f*) LORENZINI p. 24.

(*g*) COLLINS p. 400. STENO *musc. gland.* p. 42.

(*h*) IDEM.

(*i*) CHARLETON.

(*k*) *Æconom. Nachricht.* T. IX. p. 117.

(*l*) COLLINS *tab.* 37. f. 3.

In universum, ut glandula, ita ductus, salivalium similis est, & potius aliquanto tenerior, membranaceus, compressus, albus (*a*), parum vasculosus; nisi injectio anatomica accesserit, diametro calami majoris, minorisve (*a**). Surculi primi ex minutissimis acinibus nascuntur, cumque aliis sui similibus in ramulos majores (*b*) venoso more confluunt, quales, cum longus sit ductus, plurimi ab utroque limite pancreatis in principem ductum confluunt, dum sensim a liene versus duodenum eundo diametro augetur. Eorum vero nullus memoria dignus est, nisi ille quidem (*c*), qui ex pancreatis parte, intestini duodeni transversam secundam partem sequente, nonnunquam grandior advenit, ad paucas cis ostium lineas: nam sæpe, ut ea portio non longa est, neque bicornem figuram pancreati impertit, ita & iste ramus minor est (*d*). Idem seorsim nonnunquam, & proxime ostium duodenale, in intestinum aperitur (*d**).

Ductus ipse anteriora aliquanto glandulæ suæ tenet, nusquam nudus, & trans vertebra, antè quam vasa mesenterica, transversus, sed cum alternis flexibus, accedit demum ad sedem descendente duodeni, a tribus a pyloro uncis ad sex (*e*). Ibi mutato ductu, deflectit, ut cum choledochō confluat; cumque eo ductu conjungitur in canalem majorem (*f*), intus tamen levem; mucosum, similemque intestini, qui per cellulosa telam secundam (*g*) aliquot lineis, deinde per tertiam, pergit oblique, demumque in ima & posteriori (*h*) parte flexus secundi & descendente intestini duodeni (*i*), in eminente (*k*), transversa (*l*), longe

(*a*) WINSLOW n. 322.

(*a**) CHESELDEN p. 166. Dígiti a morte capax PEYER *parerg.* p. 182.

(*b*) WINSLOW n. 322. GRAAF *tab.* 1. Excarnatus CHESELDEN *tab.* 25. BIDLOO *tab.* 36. f. 2. KERKRING *obs.* 75.

(*c*) PLEMP *fundam.* p. 130. cum ic. WHARTON p. 72. WINSLOW n. 324. ORTLOB. p. 120.

(*d*) GRAAF l. c. F. HIGHMOR. *tab.* 4. f. 2.

(*d**) WINSLOW n. 324.

(*e*) Prope pylorum in pygmæo TYSON p. 20. in tertium ventriculi faccum tursioni *Phil. transf.* n. 76. Celerius coire FABRIC. *progr.* ann. 1750.

(*f*) CHESELDEN t. 25.

(*g*) ORIBAS. p. 124. J. GIERING *Scél. Francf.* T. III. p. 370. CHESELD. *tab.* 25.

(*h*) In icone VIRSUNGI.

(*i*) EUSTACH. t. 10. f. 3.

(*k*) DUVERNEY *posth.* T. II. p. 256. RIDLEY *obs.* p. 197.

(*l*) WINSLOW n. 288. BACK p. 106. SANTORIN. c. 9. n. 8. MORGAGN *Epist.* I. n. 37.

caudata intestini ruga, rima (*m*) sua patet, oblonga (*n*), & altero in fine angustiori. Hæc est pelviformis dilatatio choledochi ductus, in quam aiunt pancreaticum ductum aperiri (*o*). Nam & ego vidi nucis juglandis capacem fuisse. Ductus autem pancreaticus est, superius brevior, infra longior, utique (*p*) latissimus, qua patet, absque sphinctere (*q*) & valvula (*r*), neque unquam deposito levore, qui ei propius est; cum ductus bilarius (*s*) totus reticulatus sit. Stilus etiam ex intestino rectius & facilius in pancreaticum, quam in bilarium ductum subit (*t*).

Aliquantum a regressu cibi ex intestino defenditur ipsa mobilitate mollis & eminentis colliculi, tum quod pressio, ab interioribus nata, tunicas intestini propius ad se invicem urgeat, & interceptum ductum comprimat (*u*). Inflato intestino non inflatur; neque potest fieri, quin in motu peristaltico, quando intestinum arctatur, ductus perinde claudatur (*x*). Quare laxo intestino, & neque distento, neque contracto, se evacuat. Vermes, qui in seipsis motus habeant principium, subiisse visi sunt (*y*). Adjuvat etiam motum legitimum succi pancreatici pressio incumbens hepatis, ventriculi, subjectæ aortæ, arteriæ mesentericæ; innatæ splenicæ.

Nunc quidem ductus uterque non communicat, nisi per confluentem, in quo etiam valvulam aliqui Cl. Viri posuerunt (*z*). Neque tamen ita accurata est custodia, quin frequenter satis bilis in ductum pancreaticum

(*m*) Recte BACK & WEPFER Papillam non bene & vocant & pingunt.

(*n*) WINSLOW n. 288.

(*o*) BERTRANDI p. 23. VATER de *bilis divert.* WALTHER *tab. caliac.*

(*p*) Habet GLISSON p. 146. 147. LYSER *cult.* p. 49. BIDLOO *tab.* 36. f. 2.

(*q*) WINSLOW adde MORGAGN. l. c.

(*r*) Multi dixerunt adesse valvulam, ut VIDUS p. 265. ORIBAS. p. 125. LEONICENUS p. 120. BARTHOLIN *Epist.* ad WORN p. 691. & *anat.* p. 150. LORENZ *singul. ad vesicul. fell.* p. 20. Duas membranulas propendentes facientes ne quid regurgitet, habet VESALIUS p. 624. & JASOLINUS p. 53. Frenulum adesse LIEUTAUD p. 273 & SANTORINUS p. 108. Valvulam MORGAGN. *Ep.* l. n. 31. Protuberantiam, non valvulam, olim FABER ad HERMANDEZ & DIEMERBROECKIUS.

(*s*) Contra hæc, facilius subire in choledochum LORENZ. BOHEMER *præf. ad Fascic. obs.* p. XIII. WINSLOW n. 322. 289. & fere vulgo.

(*t*) Canaliculum communem utrique non male WEPFER *cicut.* p. 120 & CHESELDEN *tab.* 25. Sic in elephante BILFINGER *varia* T. II. p. 196.

(*u*) ORIBAS.

(*x*) A fungis mors; ductus choledochus quasi a ligamento adstrictus. *Mém. de l'Acad. des Scienc.* 1749.

(*y*) MAUCHART de *lumbric. in duct. pancreat.*

(*z*) *Præm.* Polon. l. c. Sed nulla est, quod certo vidi.

transeat (a). Idem ductus cum ramis suis per pancreas disperfis (b) aliquando bile plenus fuit, ipso rem ita declarante auctore, qui *diverticulum* (c) bilis ramosum descripserat, cavernosum, quod per cysticum ductum replevisset & per choledochum, & in quo Vir Cl. cum pancreatico succo bilem credebat misceri, multisque ramis utrumque ductum conjungi.

Ita se plerumque in homine habet (d), ut & simplex ductus sit, & cum ductu choledocho communi osculo aperiatur. Simplex etiam in plufculis animalibus est, simio (e), bove (f), ove (g), elephante (h), lepore (i), cuniculo (k), sciuro volante (l), mure (m), etiam montano (n), hystrice (o), cane (p), fele (p*), catopardo (q), leone (a), tigride (b), phanthera (c), urfo (d) lutra (d*), civetta (e), porco (f), phoca (g).

(a) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3. obs. 165. MORGAGN. adv. III. p. 35. BARTHO-LIN. anat. p. 114. In elephante MULLINS p. 23. Huc CRAANENII observatio, flavum esse p. 672.

(b) Adgnoscat VATER *mus. propr.* p. 49. add. *Bresl. Saml.* ann. 1721. M. April Unicam esse observationem; neque satis fidam, jam in *progr. de diverticulo* p. 28. fasus erat vir egregius.

(c) *Progr.* ann. 1720. & in *hepat. infant.* tum in proprio libello p. 22. 23.

(d) GRAAF p. 16.

(e) PARIS II. p. 59.

(f) GRAAF HIGHMOR. *tab.* 4. f. 3.

(g) HIGHMOR l. c. f. 4.

(h) MULLINS p. 23. PARIS. P. III. p. 131.

(i) GRAAF.

(k) IDEM.

(l) DUVERNOY l. c.

(m) GRAAF SGHRADER p. 20.

(n) DUVERNEY *posth.* II. p. 545. PARIS. P. II. p. 41. 42.

(o) PARIS. P. III. p. 38.

(p) SGHRADER p. 23. nempe aliquando.

(p*) SGHRADER p. 23. 24. GRAAF.

(q) DUVERNOY l. c.

(a) PARIS.

(b) PARIS. P. III. p. 11. cum valvula.

(c) PARIS.

(d) *Comm. litt. nor.* l. c.

(d*) CALDESI *tab.* 5. f. 8.

(e) IDEM III. p. 20.

(f) GRAAF.

(g) HARTMANN *anat.* p. 49.

Inter aves in grifone (*h*), pelicano (*i*), struthione (*k*), casuario (*l*), corvo marino (*m*), ciconia (*n*). Inter frigida ovipara in vipera (*o*), testudine (*p*), rana (*q*), salamandra (*r*).

In piscibus, in lucio (*s*), anguilla, cyprino (*s**), mullo barbato (*t*), raja, squatina (*t**), galeo (*u*), harengo (*w*). Sed hic iterum dubius sum, num de vero pancreate fermo sit.

§. VI. *Duplex ductus pancreaticus.*

Varietas in hoc canale multiplex est. Et in homine quidem aliquoties duplicem vidi, ea quidem ratione, ut ductus princeps ramum minorem per illud quasi caput pancreatis, emitteret, seorsim, & alio loco intestino insertum, constanter minorem.

Alias vidi, hunc ramum minorem ductus principis, superius isti inferi & pyloro propius, ad pollicis distantiam, & in alio cadavere ad sesqui pollicem, cum major ille confecto more cum choledocho ductu uniretur (*a*).

Similiter Cl. Viri viderunt, secundum ductum, a capite illo pancreatis natum, seorsim insertum; ut duo essent ductus (*b*) pancreatici.

Alterum supra vulgarem insertum vidit Ill. TARGIONUS (*d*). Bre-

(*h*) PARIS III. p. 215.

(*i*) PARIS III. p. 197. Ibid.

(*k*) *Hist. de l'Acad. ann. 1754. n. 6. & in piss. des anim. ic. II. p. 140.*

(*l*) IDEM II. p. 164.

(*m*) IDEM I. p. 220.

(*n*) IDEM III. p. 70.

(*o*) GRAAF p. 17. Serpente BLAS p. 333.

(*p*) PARIS II. p. 185. CALDESI p. 51.

(*q*) JACOBÆUS p. 48. cum notabili ductu.

(*r*) PARIS III. p. 80.

(*s*) GRAAF p. 16.

(*s**) COLLINS *tab. 37. f. 3.*

(*t*) GRAAF p. 17.

(*t**) CHARLETON *mantiiff. p. 84.*

(*u*) PARIS

(*w*) *Oeconom. Abhandl. T. IX. p. 117.*

(*a*) Ita PAULI in *præf. ad J. v. HORNE microcosm. RETSCHE diff. n. 81. tantum ut minor ductus inferiori loco foret.*

(*b*) BLAS *obs. 14. Part. IV. ORTLOB apud HEUCHER ars mag. anat. p. 61. WINSLOW n. 324. HEUERMANN T. III. p. 820. VERDIER : puto etiam BOEHMER præf. ad fasc. obs. p. XIII.*

(*d*) *Obs. p. 139.*

vem solito loco, longiorem & paulo inferius apertum VIRSUNGUS (*e*), Duos pancreaticos ductus sibi parallelos, & pariter tamen uno ostio apertos (*f*) Cl. HEUERMANN.

Et in universum duplicis in homine ductus numerosa exempla existant (*g*).

In animalibus, quibus longa sunt pancreata, res adhuc frequentior est, ut duo (*h*) ductus sint, qui tamen aliquando ante insertionem uniantur (*i*); alias & frequenter, diversis ostiis ad intestina pateant.

Ita in cane vidi (*k*), & alii Cl. Viri in erinaceo (*l*), equo (*m*), rupicapra (*n*), panthera (*n**), catopardo (*n***), lutra (*o*).

In avibus (*p*), ut prælonga pancreata, ita fere perpetuo duo ductus sunt, ut in gallo calecutico (*q*), ægyptio (*r*), phasianio (*s*), tarda (*t*), anseri (*u*), arquata (*w*), pavoncello (*x*), butauro (*y*),

[*e*] Ad RIOLANUM in ejus oper. p. 812

[*f*] HEUERMANN l. c. Ita fere BARTHOLIN. Cent. I Hist. 32. GRAAF p. 17.

[*g*] MARCHETT. p. 40. RHODIUS mantiss. obs. 30. MOINICHEN Epist. 70. Cent. II. BARTHOL. BORRICH ad BARTOL. Epist. 51. Cent. IV. BLAS obs. 16. P. IV & P. III. obs. 4. COLLINS p. 399. Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 3. obs. 165. de GRAAF, SCHELHAMMER progr. anat. n. 22. RUYSCH in obs. post. de valvulis n. 12. SCHRADER Dec. II. n. 2. BUCHNER miscell. ann. 1727. p. 252. DRAKE anthropol. L. I. c. 15. p. 94. Frequens esse HENSING de periton. p. 4.

[*h*] De brutis universis MURALT p. 381.

[*i*] Bifurcus PEYER merycol. p. 54. BLAS anat. canis. p. 203. 204. HIGHMOR l. c. f. 7. In cane locus conjunctionis brevis est.

[*k*] BLAS obs. 14. p. IV. GRAAF p. 17. PEYER obs. p. 68. 76. WEPFER cicut. anat. p. 201

[*l*] PEYER obs. p. 80.

[*m*] Joh. V. HORNE l. c.

[*n*] PARIS. P. I. p. 210.

[*n**] PARIS. P. III. p. 20.

[*n***] DUVERNOI.

[*o*] MOEHRING Eph. Nat. Cur. Vol. V. obs. 44.

[*p*] In universum STENONIUS musc. & gland. p. 39.

[*q*] GRAAF p. 17.

[*r*] PARIS. III. p. 56.

[*s*] GRAAF.

[*t*] PARIS.

[*u*] GRAAF.

[*w*] CALDESI tab. I. f. 4. REDI.

[*x*] REDI tab. 7

[*y*] PARIS. III. p. 47. GRAAF.

ibid. (y^*), phœnicoptero (z), scope (a), ave regia (b), corvō aquatico (c), corvo terrestri (d).

Frequenter tamen & si duo sunt ductus, cis insertionem uniuntur (d^*); ut in prioribus (e) diximus.

In crocodilo duo sunt (f).

Demum triplex est ductus in gallis cortinis (g), columbis (h), piscis (i), aquila (k), ardea heron (l), pelicano onocrotalo (m). Exempla sunt etiam numerosiorum, etiam in humano genere ductuum (n), inque cane (o), & castore (p).

§. VII. *Conjunctio cum ductibus bilariis.*

Majoris in physiologia momenti hæc est consideratio; nempe plerumque equidem ductus pancreatici & bilarii conjunguntur, aut sibi sunt proximi, est tamen ubi longe distant.

In homine multo vulgatius est utrumque ductum conjungi (a), aliquando canale medio (a^*): non tamen valde rarum est, alio loco biliarium se in duodenum intestinum aperuisse, alio pancreaticum (b).

(y^*) IDEM ibid. p. 70.

(z) IDEM.

(a) IDEM II. p. 9.

(b) IID. P. III. p. 204. huic pancreata distincta sunt.

(c) IDEM.

(d) SCHRADER p. 29.

(d^*) WARTON p. 71.

(e) p. 441.

(f) PARIS. III. p. 169. 170.

(g) GRAAF p. 17.

(h) IDEM.

(i) IDEM.

(k) PARIS. II. p. 95. Sed CALDESI tab. 5. f. 6. duos facit.

(l) COLLINS tab. 23.

(m) REDI tab. 7. cum PARTSINI unicum faciant.

(n) VIEUSSENS l. c. p. 219. WINSLOW n. 325.

(o) SCHRADER l. c. p. 19.

(p) *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51.

(a) p. 440.

(a^*) BRUNNER de pancr.

(b) BARTHOLIN. *Epist.* 56. & 70. Cent. II. VESLING. *Epist.* 57. SCHRADER Dec. I. obs. 3. 7. PEYER obs. 1. 7. BRUNNER pancr. p. 117. BLAS P. III. obs. 4. SCHELHAMMER *progr. valedict.* n. 26. ALBINUS apud HAYMAN *Comm.* T. III. p. 409. RIDLEY l. c. *Bresl. Saml. Suppl.* IV. p. 61. ibid. ann. 1720. p. 374. RIDLEY. Duobus digitis super choledochum HUMMEL in *diff. de perfor. ventr. obs.* 8. Duobus digitis sub bilario BEHR de *pancreat.* p. 20.

Inter quadrupeda, quibus unicus plerumque pancreaticus ductus est, conjunctum habet cum bilario pancreaticum elephas (*c*), ovis (*d*); cervus (*d**), rupicapra (*e*), gazella (*e**), pygmæus (*f*), felis (*g*); etiam zibethica (*h*), tigris (*i*) [fubinde], leo (*i**), catopardus (*k*), vulpis (*l*), lutra (*m*), ursus (*n*), phoca (*o*).

Inter pisces harengus (*o**), galeus (*o***), torpedo (*o****), alii (*o*†): Si certe sunt veri ductus pancreatici.

Proximos, sed diversos tamen, habent, tigris in aliis corporibus (*p*), equus (*p**), marmota (*q*).

Inter aves corvus marinus (*r*), gallus indicus (*s*), casuarius (*t*), pelicanus (*u*), butaurus (*u*†), falco (*u**). Inter quadrupeda frigida ferpens (*w*) testudo (*w**), salamandra (*w***).

(*c*) MOULINS PARIS. III. p. 31.

(*d*) HIGHMOR.

(*d**) PARIS. III. p. 76.

(*e*) IDEM I. p. 210.

(*e**) IDEM I. p. 106.

(*g*) SCHRADER p. 14. PEYER *obs.* 21. GRAAF p. 18.

(*h*) BLAS *anim.* p. 260. *Amstel.* p. 21. PARIS. I. p. 167.

(*i*) BLAS p. 121. PARIS.

(*i**) PARIS. I. p. 18.

(*k*) DUVERNOI I. c.

(*l*) PEYER *obs.* 53.

(*m*) CALDESI *tab.* 5. f. 8.

(*n*) *Comm. Lit. Nor.* I. c.

(*o*) HARTMANN I. c. p. 9.

(*o**) *Oecon. Abhandl.* I. c. p. 117.

(*o***) CHARLETON *inantiq.* p. 84.

(*o****) LORENZINI.

(*o*†) GRAAF p. 18.

(*p*) PARIS. III. p. 10. 12. alias conjunctum, alias proximum.

(*p**) SNAPE *tab.* 5. f. 3.

(*q*) PARIS. III. p. 38.

(*r*) IDEM I. p. 218.

(*s*) IDEM *ic.* I.

(*t*) IDEM P. II. p. 164. & *in ic.*

(*u*) IDEM III. p. 197.

(*u*†) REDI *tab.* 23. f. 4.

(*u**) PEYER p. 108.

(*w*) BRUNNER p. 85.

(*w**) CALDESI p. p. 51.

(*w***) PARIS. III. p. 80.

Diversum a principe ductu biliarium habet finia (x), porcus (x^*), canis (y) (ad duas uncias iste), erinaceus (y^*), vulpecula ifatis (z), ciconia (a), corvus (a^*).

Longe demum distantes pancreatis ductus & fellis, & ad tres quartas ulnas in castore (b): longe in hystrice (c). In vacca spithama (c^*), longe in cuniculo & lepore (c^{**}). Sic in struthione (d).

Inter animalia, quæ duos habent ductus pancreaticos, ea plerumque vel alterum cum choledocho conjunctum habent (e), vel proximos etsi distinctos omnes. Ita in panthera (f) cane (g).

Inter aves in phoenicoptero (g^*), ibide (h), scope (i), grue (k), ave regia (l), gallina ægyptia (m), tarda (n), corvo (o), ardea (p), anate platyryncho (q), vanello (r), numenio (s), arquata (t).

(x) GRAAF p. 18. 21.

(x^*) IDEM ibid.

(y) CHESELDEN p. 166. HIGHMOR. tab. 4. f. 1. p. 72. BLAS anat. can. p. 195. PEYER obs. 11. SCHRADER p. 20.

(y^*) SCHRADER n. 24.

(y^*) Comm. Nov. Acad. Petrop. Vol. V. p. 361.

(a) PARIS. III. ic. p. & p. 70. non valde longe distantem.

(a^*) PEYER obs. p. 101. 106.

(b) Act. crud. ann. 1684. p. 363.

(c) Ad 18. uncias DUVERNEY II. p. 549. PARIS. II. p. 41. 42.

(c^*) HIGHMOR p. 42.

(c^{**}) GRAAF conf. p. 18. & 19.

(d) PARIS. II. in icone VALISNERI p. 245.

(e) In homine BÖEHMER l. c. SCHRADER Dec. I. n. 2. & bis ita vidi.

(f) PARIS. III. p. 20.

(g) In cane MURALT p. 38. PEYER obs. 76. merycol. p. 54. semper distinctos. Tum BRUNNER pancr. p. 51.

(g^*) IDEM III p. 70.

(h) IDEM II. p. 106.

(i) PARIS. II. p. 9. hi in eadem papilla.

(k) CALDESI tab. 5. f. 3.

(l) PARIS III. ic.

(m) IDEM III. ic.

(n) IDEM II. p. 106.

(o) SCHRADER p. 29.

(p) REDI tab. 1. f. 2. vocat garza bianca. SCHRADER digest. carnivor.

(q) IDEM f. 4.

(r) Pavoncello f. 3.

(s) f. 6.

(t) CALDESI f. 4. vocat Tarabuso.

Inter frigida quadrupeda in crocodilo (*t*^{*}).

Ita tres illi aquilæ (*u*), ductus pancreatici misti inter bilarios aperiantur, tum in ardea (*w*), & pelicano (*x*).

Unus trium unitur cum bilario, in pica (*y*). Duo in gallo calecutico (*z*), phasianio (*a*), columba (*b*), anate (*c*); omnino tres in columba (*d*).

Denique plerisque animalibus ductus pancreaticus in viciniam pylori, inque duodenum intestinum inferitur; longius tamen distant in avibus (*e*); longissime in cuniculis, leporibus (*f*), castore (*f*^{*}), hystrice (*g*), struthione (*h*).

§. VIII. *Succus pancreaticus.*

Non valde facile fuit, naturam hujus succi discere, cum & ductus pancreaticus plerumque vacuus (*a*) reperiatur, nunquam a me in homine aliter visus, & ab alieno humore alias occupetur, neque potuerit in vastis animalibus Cl. RAST, cum a me rogatus experimenta faceret, a bile separare, ut de ejus natura cognosceret. Fecit tamen utilis contentio, præterito seculo jam vergente, ut satis certa nunc de eo succo docti simus. Nam etiam eo processit sectæ servitura industria, ut in canalem difficili (*b*) loco positum calamus, vivo in cane, dare, inque appensam

(*t*^{*}) PARIS III. p. 268.

(*u*) IDEM II. ic. & p. 95. CALDESI *tab.* 5. f. 6. Convenire HARDER *apiar. obs.* 8.

(*w*) COLLINS *tab.* 22. duo proximi, tertius remotus.

(*x*) REDI *tab.* 7. f. 1. vocat *grotto*.

(*y*) GRAAF p. 18.

(*z*) p. 20.

(*a*) Ibid.

(*b*) Ibid.

(*c*) Ibid.

(*d*) Ibid.

(*e*) IDEM p. 19.

(*f*) Scsquipede IDEM.

(*f*^{*}) p. 444.

(*g*) In ileon DUVERNEY p. 549.

(*h*) Ibid.

(*a*) SYLVII *diff.* II. p. 14. WEFFER *cicut.* p. 120. DIEMERBROECK p. 43. 44.

(*b*) Difficile esse, & sæpe canes perire fatetur c. 3. & in primis historiis.

phialam generatam lympham colligere didicerint, amati PRÆCEPTORIS sui defensores GRAAFIUS (c) & SCHUYLIUS (d). Sponte nonnunquam, cum scirrhus laboraret, lympham plenus fuit (d*).

Salivæ (e) nempe, ut glandula, & canalis, ita humor pancreaticus similis est, colore subalbido (f), sapore subfalso (g), etiam insipido (h). Etiam in calculis nonnunquam repertis naturam salivalem prodidit (i). Globulos in eo, ut ubique; reperit ASCHIUS (k).

Copia non exigua est, tum in GRAAFII experimentis, tum in SCHUYLI. Ille (l) drachmas duas & semuncem, in cane intra octo horas collegit, & demum integram unciam. Ille duas (m), & tres omnino intra duas horas. Quæ in hominem translata, etiam ad minorem illam GRAAFII abundantiam, tamen in homine facile triplo, quam canis ponderosiori in viginti quatuor horis noncuplum, & uncias fecerint novem. Neque id nimium fuerit, cum salivæ copiam etiam majorem esse ostenderimus. Pancreas autem, si quinque est unciarum (n) & parotis (o) quæque drachmaram quatuor cum semisse, maxillaris (p) vero quæque drachmarum duarum cum semisse, facta sublinguali sesqui drachmæ, erit summa

(c) p. 39. ad 46.

(d) SCHUYLIUS p. 94.

(d*) FANTON. *obs.* 8.

(e) SYLVII *diff.* II. n. 20. BRUNNER p. 120. STAHL p. 370. BIANCHI p. 92. seq. LANG l. c.

(f) Etiam in purpura *Phil. trans.* Vol. 50. Part. 2. p. 588. In crocodilo flavescens HASSELQUIST p. 601.

(g) BRUNNER *de pancr.* c. 3. p. 19. 20. 32. PECHLIN *de purgant.* p. 511. J. LEONICENI *metamorphos. apoll. & æsculap.* p. 112. 113. NEEDHAM *form. fet.* c. 4. fin. BOHN. *PROG.* X. p. 140. WEPFER *de cicut.* p. 204. LAMY *disc. anat.* VERHEYEN L. II. p. 75. URATISLAV *MEDICI de exper.* p. 20. MORGAGNUS *adv.* III. p. 35. & ipse demum GRAAF. Subdulcis cum odore alcali volatilis cornu cervi. B. ROBINSON *operat. of medic.* p. 172. Alcalescere DEIDIER *de tumor.*

(h) VATER *physiolog.* p. 667. MURALT p. 46 ex ovibus & vitulis WHARTON p. 76. &c. Plerumque L. CAPUANUS *incert. de medicament.* p. 61 A LANG. *Physiol.* p. 95.

(i) COLLINS p. 407. In hottentotta RHYNE. *itin. cap. bon. spei* p. 341. Artoria ossea in pancreate MORG. *sed. caus.* I. p. 38.

(k) *Disp. de semin. &c. obs.* 50.

(l) p. 65.

(m) SCHURIG *de veteri medic.* p. 94.

(n) L. XVIII. p. 42.

(o) *Ibid.* p. 44.

(p) Ex conjectura.

salivalium glandularum drachmarum 17. quod ne dimidium quidem pondus (*q*) est pancreatis. Sed etiam ejus ductus lineam facile latus est, & alias latior (*r*).

Perpetuo cur non fluat, rationem non video (*s*), etsi facile dederim, incitari a motu diaphragmatis, ut in bile vidi (*t*). Fluentem Cl. Viri viderunt (*u*).

§. IX. *Hypotheses Sylviana.*

Etsi nunc hæc omnia deferbuerunt, neque ea hæresis nostro ævo metuenda videtur, nimis tamen frequens est ejus vergente jam seculo XVII. memoria: neque potest dissimulari, quam late sit dominata.

Cum nempe *Franciscus SYLVIVS*, vir minime vulgaris, spiritus, & glandularum succos acidos esse sibi persuasisset, & acidam salivam, non potuit fieri, quin etiam pancreaticum succum acidum (*a*) faceret, & spiritibus imprægnatum acidis (*b*).

Sed equidem ex acidis facibus bileque æruginosa, & flatibus ructibusque (*c*) corollaria sibi faventia deducebat. Magni autem hunc aco-rem faciebat. Nam & in intestino cum bile luctari (*d*); ita chylum separari a facibus, & præterea eosdem succos in sanguinem venire, atque iterato in corde (*e*) dextro configere, vitalemque focum ejus præcipui organi alere, non sine plausu docebat.

(*q*) Quatuor lib. cum semisse æstimat NICOLAI *mat. med.* p. 177. 139.

(*r*) Digitum in cachexia PEYER *pancr.* p. 182. 183.

(*s*) Negat in fetu fluere BUFFON *Hist. natur.* II. p. 456.

(*t*) *Exper. de respir. oper. min.* n. 55.

(*u*) Vidit BOHN l. c.

(*a*) *Method. med.* c. 8. n. 4. seq. *Prax. med.* L. I. C. XI.

(*b*) *Diff.* VIII. n. 42. 53. *Prax. med.* L. I. c. 53. p. 319.

(*c*) *Diff.* VIII. n. 44. X. n. 33. 34.

(*d*) SYLV. loc. cit. BONTEKOE l. p. 21. (tantum quodam modo) COWARD *de ferment.* Vol. p. 72. JENTY p. 260. BAGLIV. DEMOCRITUS CHRISTIANUS *vit. anim.* p. 46. BAYLE. Etiam DEIDIER, una cum bile, cum cibus acidis fervere, paulo tamen aliter de tum.

(*e*) *Diff.* VIII. n. 63. *Diff.* X. n. 55. 56. MAYOW *oper.* p. 340. SWAMMERD. *de respir.* Utramque effervescentiam SYLVIVM a discipulo suo HARTZINGIO habuisse, DEUSINGIUS objicit *Sylva caëdua jácens.*

Deinde, ut gratiofus erat SYLVIVS, inque florentiffima Academia præcipuus per triginta fere annos Doctör, ita non paucos reperit difcipulos, qui fua induftria præceptoris caufam fublevarent. Ergo prior FLORENTIVS [f] SCHUYL [g], ligato fupra ductum choledochum & pancreaticum intefino, eodem infra eundem ductum lino intercepto, vidit in vivo cane manifeftam lactam, fpumam, penetrabilemque vaporem, cum intefinum aperiretur. Porro compreffo ductu choledochi, inde laxato, reddito pugilum altero, intefinum intumuiſſe [h].

Denique, cum fuccum pancreaticum colligerent, perfuaferunt ſibi Cl. Viri, ſe acidum [i] reperiſſe, ſapore ſuo manifefturn, etiam ut fuccum heliotropii [k] tingeret: & argentea ſpecilla [m], & lac cogeret [n].

Paſſim adeo hæc opinio recepta fuit [o], & ipſam medicinam faciendam direxit, ut frigus febrile eſſet acidi ſucci pancreatici effectus; quem oporteat ſalibus alcalinis vincere [p]. Neque dudum DIPPELIUS, illo DEMOCRITI CHRISTIANI nomine notior auctör, acorem ſucci pancreatici pene ex oblivione revocavit, auſusque eſt pronuntiare, deſtillatum pancreas plurimum acorem dare, alcali nullum. Fieri autem febrem intermittentem a ſpafmo conſtringente oſtia ductus pancreati & bilarii, & identidem remittente. Remittente eo ſpafmo primum pancreaticum ſuc-

(f) De *veteri med.* p. 88. ſeqq. & ſimilem quidem vaporem, qualis e ſpiritu ſulphuris cum tartari liquore conſigente naſcitur. p. 90.

(g) *Laborem eſſe* SYLVII equidem objecit le VASSEUR SYLN. *conſut.*

(h) p. 93.

(i) Sæpe acidum, plerumque acidofalfum GRAAF p. 49. In nauta ſe acidum reperiſſe Andegavis p. 71. Subacidum BAYLE *corp. anim.* p. 260. Leviter ſubacidum DIEMERBROECK p. 43. In vacca acidofalfum. VERHEYEN p. 85. In puero morboſo acidum KERKRING *obſ.* 65. In cane ſcabioſo MATTEI *anim.* p. 37. & in cervo TAUVRV. p. 133. Nonnulla acidi veſtigia admittit VERHEYEN L. II. p. 75. Nonnunquam L. a CAPOAL. o.

(k) VIRIDET *prim. coct.* L. II. c. 3.

(m) ETTMULLER *med. hypp. chym.* VESLING *Ep.* 7. J. MAURIC. HOFMANN in HORN. p. 191.

(n) SCHUYL p. 94.

(o) J. TACK *chryſogon.* HARDER *prod. phyſiolog.* DIEMERBROECK. BAGLIV. p. 430. JENS. in *tyrocin.* p. 133. BONTEKOE l. p. 19. *van de ziekten en dood.* p. 174. HOBORKEE *phyſiolog.* HARTMAN *anthropolog.* p. 68 COWARD *de ferment.* DUGGINI *de humor.* DUNCAN. *chym. nat. ſpec.* p. 147.

(p) SYLV. *prax. med.* L. I. c. 27. p. 228. Sanguinem lentum reddere admixtum, Ita febrem facere BONTEKOE *ziekten* &c. Dudum quidem ſedem februm eo loco FERNELIUS poſuerat, & RIOLANUS & PLEMPIUS *fundament.* p. 130.

cum prorumpere , inde bilem , caloris causam (*q*) : oriri autem id malum a pancreate , quod tumens ventriculum comprimat. Si bilis defuerit , pancreaticum succum intestina erodere , dysenteriam facere (*r*).

Denique de omnibus experimentis dejecti SYLVII adseclæ eo se receperunt, ut latentem tamen subesse aciditatem & tacitam effervescentiam peragi (*s*) defenderent : lenem enim esse , & vix visibilem GRAAFIUS [*t*] fatebatur.

§. X. *Contra has hypotheses.*

Quæ a sensuum testimonio refutantur, ea non possunt diu regnare. Ipsa primo æmulatio Carolum DRELINCOURTIUM [*a*] in collegam armavit, ut vulnera causæ rimaretur : idem acris ingenii discipulum J. Nicolaum PECHLIN [*b*] , cujus nobilissima prosapia nostro tempore ad summo honores pervenit, ad evertendam SYLVII causam suscitavit. Experimenta difficillima juvenis tunc quidem , deinde celeberrimus archiater J. Conradus BRUNNERUS [*c*] sectæ SYLVIANÆ opposuit. In ea porro refutanda consenserunt Johannes BOHN [*d*] , FRIDERICUS [*d**] HOFMAN , & successor SYLVII HERMANNUS [*e*] BOERHAAVE.

Et primum merito negarunt , acidum [*g*] esse , de quo quærebatur , succum : aut ab eo lac coagulari [*h*].

(*q*) *Vit. anim. morb. & medic.* p. 75.

(*r*) p. 63.

(*s*) DEMOCRIT. *Supplem.*

(*t*) p. 78.

(*a*) Sub nomine LUDOVICI le VASSEUR scripsit L. de triumviratu SYLVII ann. 1668. & 12. alterum , qui SYLVIIUS confutatus anno 1673.

(*b*) JANI LEONICENI *metamorphosis apollonis & æsculapii* Par. 1673. 8.

(*c*) Toto L. de *pancr.*

(*d*) De duumviratu *hypochondrior.* Lips. ann. 1689.

(*d**) De acidi & visceri pro causis morborum *insufficientia* Francof. ann. 1689. 8.

(*e*) *Prælect.* T. I.

(*g*) BRUNNER toto L. Tob ANDREÆ & R. Andreas CASSIUS Groning. ann. 1668. BETTUS de sanguine p. 18. HEUERMANN T. III. p. 807.

(*h*) VATER *physiolog.* p. 667.

Experimentum etiam GRAAFII, Andegavis in nauta factum, falsum esse testes producti CRONIER [i] & J. MURALTUS [k] evicerunt, fuisseque insipidum humorem, cujus acorem GRAAFIUS laudaverat. Etiam J. B. du HAMEL demonstratum a GRAAFIO acorem vix sensu percipi candidus agnovit [l]; & cum discipulus *Cornelii* BONTEKOE [m] bene potus succum nostrum acidum pronuntiaret, alter sobrius confirmavit, insipidum esse.

Potuit autem Clar. Viris aut solus sectæ amor imposuisse; aut acidum liquamen ex intestino retrogradum, cumque succo pancreatis commistum, causam dedisse errori: vel, in illis experimentis tinctorum specillorum, morbi violentia. Certe Cl. DEIDIER syrupum violarum a succo nostro virorem concepisse scribit [n]; etsi etiam id putredini tribuerim.

Porro quod fervorem adinet cum bile subnascendum, monuerunt ILL. Viri, succum utrumque confusum nihil ostendere fervoris, cum neque pancreatis humor acidus sit, neque bilis urinosa [p]: Neque fieri posse, cum tot in animalibus uterque ductus confluat [q], ut in vasculo perangusto fervor locum habeat.

Sed experimentum SCHULII alias non successisse [s], ex auctoris dictatu: alias perinde evenisse, cum alio [t] penitus loco intestinum vinculo comprehenderetur; etiam cum vinculum omnem utriusque ductus bilarii & pancreatici confusionem intercepisset [u]. Manifesto argumento, spumam & intestini tumorem ab aere fieri, per motum peristalticum cum bile, viscido humore, & cum pancreatis succo, & cum massa cibaria intertrito [w].

(i) Apud LEONICEN p. 112.

(k) *Vademec. anatom.* p. 46.

(l) *Corp. adfect.* p. 355.

(m) URATISLAVIENSES *de exp.* p. 20.

(n) *De humor.*

(p) Alias ostendetur L. XXIII. *Seç.* III.

(q) p. 443.

(s) Le VASSEUR SYLV. *confut.* p. 13. 131. BOHN *circ. progr.* X. p. 141.

(t) PECHLIN *purgant.* p. 509. *tab.* 4.

(u) In cuniculo, cum duodenum ligasset, vinculumque utriusque ductui interposuisset. VERHEYEN L. II. p. 80.

(w) Lepus, cuniculus, hystrix, castor, struthiocamelus.

Neque posse ejusmodi fervorem pro causa late patentis phænomeni haberi, cum in non paucissimis animalium pancreas remotissimis ad hepate locis suum humorem intestino tradat, ut cum bile ne commisceri quidem sit probabile.

Denique ut ostenderet, vitæ momentum a succo pancreatico non pendere, [labore summo BRUNNERUS pancreatis canum magnam partem extirpavit [x]: aut certe ductum pancreaticum aut ligavit, aut rese-

cuit [y]. Nunc etsi forte perierunt [z] aliqui canes, ut in administratione difficili expectes, in qua facile intestinum, aut vasa mesenterica lædi poterunt, etsi totum pancreas in cane extirpari [a] nequit [b]; etsi porro aliis in canibus portiones dissecti ductus se comprehenderunt [c], aut novus nasci visus est, quem ego credam esse secundum [d], canibus familiarem ductum, post destructum principem canalem in vitiosam magnitudinem auctum, tamen etiam alii canes superfuerunt, & multis mensibus [e] & absque ejusmodi regeneratione [f]. Ut certe maxima parte hujus lymphæ ab intestino averfa, vitalem illam effervescentiam, ciborumque potissimum coctionem æquum foret diminui, aut perire, cujus causa ablata, aut vehementer debilitata foret. Eorum contraria evenerunt, canesque, quibus ablatus erat pancreatici succi commeatus, etiam magis quam integri, famelici fuerunt [g].

Hisce & aliis ejusmodi rationibus factum est, ut jam coævi aliqui

(x) *De pancreate Exper.* 1. 2. 3. 4. 8. p. 180. *Exp.* 9. p. 182.

(i) *Exp.* 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. p. 172. seq.

(z) GRAAF p. 114. BRUNNER p. 16. VERHEYEN.

(a) Monet SENAC *essai de physiq.* Ed. 1735. p. 160.

(b) Fatetur BRUNNERUS p. 174.

(c) WEPFERUS *cicut.* p. 25. BRUNNER *Exp.* p. 4. 6.

(d) *Exp.* 7. Conf. PEYER *obs.* p. 68.

(e) Mente integro *Exp.* 5. Duobus mensibus *Exp.* 5. p. 29. *Exp.* 6. p. 41. cum bona animalis valetudine: Tribus mensibus BRUNNER p. 13. Supra quatuor menses *Exp.* 3. Supra sex menses *Exp.* 8. p. 177. Supra annum *Exp.* 7.

(f) Nullo cum intestino commercio reliquo *Exp.* 5. 8.

(g) BRUNNER *Exp.* 3. 5. p. 29. & *Exp.* 6. &c. WOLF vom. *Gebr. der Thiere und Pflanz.* n. 74. ex chirurgi testimonio p. 143.

SYLVII (*b*), festæque SYLVIANÆ (*i*), deinde tota posteritas ab ea hypothefi difcefferit.

§. XI. *Verior succi pancreatici utilitas.*

In plurimis animalibus pancreas reperitur, quadrupedibus utriusque sanguinis (*a*), avibus (*b*) universis, & piscibus nonnullis frigidis (*c*), Quibus deest, iis certe appendices illæ cæcæ locum tenent pancreatis. Hæc ostendunt, nobilem aliquam esse hujus visceris utilitatem.

Deinde in omnibus pene animalibus, paucissimis exceptis, pancreatici canales vel eodem (*d*) ostio cum bilariis in duodenum intestinum aperiuntur, vel, quod pene eodem redit, vicinis (*e*). Sufficit enim ad theoriam, si facilis fuerit succi pancreatis cum bile commistio. Videtur ergo ejus succi aliquam esse utilitatem, quam cum bile communem habeat siquidem eodem loco ad cibi massam adfunduntur.

Porro cystica bilis plerumque animalium acerrima (*f*) est, & eadem apprime viscida (*g*). Ex illa dote vehementissime intestinum ad motum peristalticum stimulare non absque vomitus forte periculo. Ex ista parum commode cum cibo misceretur, cum viscor repugnet. Si aliqua absque fellea vesicula animalia sunt, eorum certe nonnullis, remoto loco ab hepatico ductu, pancreaticus (*h*) inseritur.

Est autem in duodeno intestino, ut in ventriculo, sensus ad irritationem acer; hinc motus peristalticus vehemens. Est septi transversi ibi motus, & incumbentis hepatis. Iis viribus lymphæ pancreatis cum bile interteritur.

Quare omnibus computatis, pars certe utilitatis succi nostri erit, di-

(*b*) DEUNSGII *Sylva cædua cadens. In Sylvam Echo: Sylva cædua jacens: tres diff. antisylyvania*. Ille quidem SYLVII alioquin æmulus.

(*i*) Qui tamen aliquantum acoris ad misera *Phil.* VERHEYEN II. p. 82. seq. & L. a CAPOA, qui rarum esse acorem fassus est *ragg.* II. p. 453.

(*a*) p. 427. 428.

(*b*) Ibid.

(*c*) p. 428.

(*d*) p. 443.

(*e*) Ibid.

(*f*) Vide L. XXIII. *Seç.* III.

(*g*) Ibid.

(*h*) *Struthiocamelo*, equo; *Hystrici* parva, aut nulla in canadensi specie *Mém. de 1727.* p. 387. Parva in lepore PAULIN. *lagograph.* p. 74.

luere bilem (*i* cysticam & mitigare. Ex illo quidem beneficio bilis latius per intestina cibique massam poterit dilui, & cum massa ciborum melius misceri.

Ex isto acrimonia temperabitur, quæ alioquin iter cibi præcipitaret, quem hic maxime oportet coqui.

Inde possis interpretari famem animalium (*i**), post deletum pancreas potius auctam, quam acriori bili in ventriculum resumtæ tribuas: Si omnino constans aliquid in eo est eventu.

Hinc canes, qui, ex pancreate destructo perierunt, & etiam eorum, qui vitales superfuerunt, aliqui biliosa vomuerunt (*k*).

Hinc magnum crocodilo pancreas, cui bilis acerrima (*l*).

Possis etiam in universum recipere, a succo pancreatis cibariam massam dilui (*m*), & dissolvi, ut a saliva, succoque ventriculi. Voracibus nonnullis animalibus in ventriculum effunditur (*m**). Hinc magnum pancreas, multique ductus avibus unguibus, quæ potu abstineant (*n*).

Alvus sicca homini, cui scirrhus ductum pancreaticum comprimebat (*o*). Inter canes Brunnerianos fuerunt, quibus, ablato pancreate (*p*), alvus dura fuit.

Facere, cum aliis salivalibus succis, ne vasa lactea inania otientur & coalescant, non repugno (*q*).

Plura possunt esse officia liquoris nondum fatis noti.

(*i*) BRUNNER p. 120.

(*i**) p. 451.

(*k*) BRUNNER p. 27. 37. 55. 120. 175.

(*l*) HASSELQUIST p. 601. major quam bovi. Duplex famelico ductus pancreatis BLAS *obs.* p. 58.

(*m*) LOWER p. 22.

(*m**) Bombyci MALPIGH. *posthum.* p. 57.

(*n*) ARISTOT. *hist. anim.* L. VIII. c. 3. p. 1017.

(*o*) VIRIDET *bon chyle* p. 259.

(*p*) BRUNNER p. 175. 176. Non tamen nimium huic experimento tribuo.

(*q*) BIANCHI *hist. hepat.* p. 93.

LIBER XXIII.

HEPAR. VESICULA. BILIS.

SECTIO I.

HEPAR.

§. I. *Communia hepatis.*

LA T E per animale regnum hepar dominatur, etsi paulo angustioribus finibus continetur, quam aut intestinum aut cor. Reperitur in omnibus quadrupedibus utriusque sanguinis, avibus omnibus & piscibus, constanter ita situm, ut suum liquorem ad ventriculum, vel sub eo in proximum intestinum mittat. Insectis non paucis *aliquid* datum est, non quidem totum simile hepatis, cavumque & cellulosum potius, & similis appendicum (*a*) pyloricarum, ut tamen a Cl. Viris sit cum hepatis nomine descriptum, ut in cancris (*b*), inque conchis nonnullis, ostreis (*c*), cochleis (*d*), etiam aquaticis (*e*), limacibus (*f*), mytulis (*g*); etiam in sepia (*h*), gryllo, gryllotalpa (*i*). In bombyce (*k*) vascula in ventriculum bilaria ire magnus auctor est.

Omniū viscerum hepar semper maximum est, aut certe ponderosissimum, si pulmo mole cum hepate pugnaverit. Est autem primum viscerum secretoriorum, quod in fetu nondum confirmato distinguitur,

(*a*) In cochleis LISTER p. 79. In cancris ROBERG. *Diff. de astaco*. De erucis, & cancris MALPIGHII.

(*b*) WILLIS *de anim. brut.* p. 20. t. 3. f. 1. LISTER *de cochl.* MERY *Mém. de l'Acad.* 1710. p. 418. Habet & HEYDE *de mytul.* f. 7. SACHS *Gamarol.* p. 225.

(*c*) WILLIS *ibid.* tab. 2. f. 2.

(*d*) LISTER *de cochleis* p. 73. 77. 78. SEVERIN *Zootom.* p. 331. HARDER *ov. cochl.* f. 8.

(*e*) Spirale glandulosum SWAMMERDAM p. 123. 163.

(*f*) LISTER foliaceum & venis albis plenum *de cochleis* p. 23. *Exerc. anat.* t. 3. f. 3. HARDER *Exp.* 204.

(*g*) Huic sunt grana glandulosa liquore flavo plena, quæ in intestinum deponunt.

(*h*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 888. 889.

(*i*) MALPIGHI *gland. conglob.* p. 6.

(*k*) IDEM in *diar.* TINASSI ann. 1670. p. 170.

magnumque, quo tempore pulmo vix ullus adparet, & in avibus (l), & in quadrupedibus (m).

Quare etiam in fetu, quam in adulto, majorem (n) ad reliquum corpus rationem (o) habet, quæ perpetuo minuitur, ut homo [vel animal] adolescit. Majus homini esse, quam bestiis dictum est (p).

Ad $\frac{1}{30}$. totius corporis æstimabat BARTHOLINUS (q) & est fere $\frac{1}{25}$. (q*). Sed in aquila est $\frac{1}{28}$. (r), in cane $\frac{1}{20}$. in pisce cane, $\frac{5}{20}$. (s), seu $\frac{1}{4}$.

Pondus in homine, ut facile intelligitur, varium est, ut ætas; robur, vitæ genus tulerit, majus in hominibus & animalibus quietis (t) laute pastis (u), in chronicis morbis (x), in rachitide (y); minus in ferocibus, & exercitatis (z). Medium pondus in sano homine æstima-
tur circa 45. uncias. Nam reperio fuisse unc. 28. (a), L. 2. unciarum tredecim (a*), L. trium 1. (b), Unc. 52. (b*), L. 3. cum semisse (c). Lib. 3. unciar. 12. (d). Lib. 4 & unc. 5. (e). Lib. 4 $\frac{3}{4}$. (f); denique lib. 5.

(l) De la formation du poulet II. p. 123.

(m) Sic in ovium & caprarum embryonibus videtur.

(n) GALEN. de util. part. L. XV. c. 6. GHIGI Sezione del Maffa curati p. 18.

(o) PFISTER hom. & anim. gener. p. 27. de quadrupedibus. Hepar fetus ad hepar adulti ut 48. 43. SAUVAGES Embryolog. p. 11. In vacca hepar ad universum corpus est ut 77964. 6461376. in vitulo abortivo, ut 9965. 427488. p. 120. quarum rationum illa est $\frac{1}{31}$. hæc $\frac{1}{43}$. Duplo ergo in fetu majus.

(p) HEROPHILUS apud ORIBASIIUM p. 112.

(q) Anat. p. 127. etiam ad $\frac{1}{33}$. In gallina SCHENK de monstr. p. 661. LOESEL p. 64. ic. Libræ unius hist. de l'Acad. 1730 p. 43. In anseris biliore BRASSAVOLA: & trium, & quatuor librarum BRADLEY farmers direct.

(q*) Unc. 45. in unciis 1140. SAUVAGES l. p. 399.

(r) BORRICH herm. ægypt. sapient. p. 265. Aquila pendet l. 10. hepar 34. drachmas.

(s) Animal libr. 26. hepar lib. 5. STENON. myol. specim. p. 115.

(t) ROBINSON p. 109. 110. LEOPOLD Opusc. æcon. p. 504. de anseribus: BRADLEY farm. direct. p. 27. de iisdem.

(u) CHEYNE diseas. of bod. and mind. p. 188.

(x) ROBINSON p. 112.

(y) STORCH Kinderkrankh. T. III. p. 267 Eph. Nat. Cur. Vol. VI. GLISSON rachit. p. 11.

(z) In sylvestribus avibus, & maribus ut 121. ad 614. 4. in femellis ut 129. ad 525. 6. in cortinis masculis ut 412. ad 1694. & in femellis ut 446. 14418. ROBINSON food. and. discharg. t. 1. 2. Tamen grand carnivoris, ut urso SEHRADER digest. carnivor. p. 9. Si ursus vere carnivorus est.

(a) CHESELDEN p. 165.

(a*) SAUVAGES nosolog. I. p. 499.

(b) BARTHOLIN. Hist. 5. Cent. I.

(b*) SPIELMANN Chem. p. 179.

(c) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 228.

(d) CHESELDEN p. 165.

(e) HEUERMANN III. p. 687.

(f) BÜCHNER miscell. 1727. p. 65.

cum sem. (*g*), sex cum dimidia (*h*), septem (*i*), octo (*k*), novem (*l*), duodecim (*m*^{*}), quatuordecim (*m*) & ultra (*n*), quindecim cum semisse (*n*^{*}), & sedecim (*o*), & triginta sex (*p*) libr. sed hæc vitiosa. Post longas febres vegrande (*q*).

(*r*) Nullum fuisse (*r*), quod frequenter veteres aruspices renunciarunt, & de nonnullis hominibus legitur: aut vicissim duplex adfuisse (*s*), non valde crêdo.

Duo fuisse hepata, & alterum per discedentes musculos de abdomine exivisse, rarissima est adnotatio (*t*).

§. II. Color.

Levis momenti videtur hæc observatio, & tamen diuturnum errorem omnium scholarum etiam sola evertit. Hepatis nempe color flavescens in plerisque piscibus, in nonnullis etiam albus (*t*^{*}), flavus [*u*], cæruleus [*x*], viridis [*y*]; in aliis tamen purpureus [*z*], est. In pullo, qui ovo continetur, cinereum [*a*] primum, deinde pallide rubrum [*b*], abit inde

(*g*) BARTHOL. *Cent. I. hist.* 32.

(*h*) In puella BECK *de palp. cord.* p. 34.

(*i*) CHESELDEN. *Bresl. Saml.* 1720. p. 653.

(*k*) CHESELDEN p. 164. 165. *Fränk Anmerk.* T. III. p. 530.

(*l*) STORK *anim.* II. p. 261. sed steatomata habebat.

(*m*^{*}) RENEAUME *des hern.* p. 144.

(*m*) Materia intus furunculorum simili *Fränkische Anmerkungen* T. III. p. 340.

(*n*) In hydropico ZACUT. & unc. 4. CHESELD.

(*n*^{*}) MIRG. *thes. anat. hotan.* in icterico.

(*o*) In cachectico purulentum. WOLF *obs.* 22.

(*p*) GHIGI *Istoria d'una sezione.*

(*q*) ARISTOTELES *hist. anim.* L. III. c. 7. Hepar in obeso grande, sex lib. *Nov. Eph. Nat. Cur.* Vol. II. *obs.* 28. & in febre: In Cardinale Gualthieri hepar 7. librarum fuit per nova publica. In febre cæterum sanum, lib. quinque MEDICUS *beobacht.* p. 74. In atrophica puella hepar 6 $\frac{1}{2}$ lib. cum calculis felleis MIEG. *thes. anat. bot.* Sebaceum lib. 16 cum calculis in Comitissa MAFFEI ORTESCHI *diar.* II. p. 92.

(*r*) ORTELIUS apud PLEMP. *fundam.* p. 134. puto ob connata intestina, tum C. BAUH. ad ROUSSET p. 238.

(*s*) ARISTOTELES.

(*t*) MORGAG *sed. & caus. morb.* II. p. 247.

[*t*^{*}] HARVEI *gener.* p. 155. RONDELET, & cinereus IDEM.

[*u*] RONDELET *ibid.* croceus.

[*x*] IDEM *ibid.*

[*y*] In lampetra BRUNNER, & apud BLAS *anat. anim.* p. 279.

[*z*] Mullus SANTORIN *obs.* p. 4. Murex *Phil. transf.* Vol. 50. P. II. p. 588. Crocodilus VESLING. *Epist.* 4.

[*a*] *De la form du poulet* p. 123. ENT. *apolog.* p. 135. Candidum quadrupedi PFISTER l. c.

[*b*] *De la form du poulet.* *ibid.*

inde in flavum [c] pulchrum sine virore. In homine adulto obscure rubrum est, non tamen absque admista flavedine [d], quæ in morbis diuturnis augetur, & non raro sola regnat. In pinguibus gallinis album est [e].

Nunc si album, flavum, viride, cæruleum datur hepar, non ab eo adeo viscere ruber sanguinis color est [f]. Is enim humor omnino ruber est cum pellucido hepate, aut flavo, & in omnibus iis piscibus, quibus tot diversi in hepate sunt colores.

§. III. *Situs.*

In universum hepar abdominis partem superiorem, costis definitam; dextramque & in avibus tenet, & in quadrupedibus, & in homine: tantum ut ad sinistra eo magis se extendat, quo animal junius est; inque avibus perpetuo sinistrum etiam hypochondrium teneat, quibus ventriculus, & lien, magis in medio corpore sint.

Ita in fetu humano hepar utrumque pariter [g] hypochondrium occupat [h], & ultra lienem antè & superius producit, etiam in annotino puero, ut lieni adhæreat. In epigastrio mediam pariter totam sedem tenet; & ad inferiora ultra costas exporrigitur, ad umbilicum [i] usque, & ultra [k]. In nuper nato [l] fetu eandem tenet magnitudinem, & dimidium [n] abdomen replet, & paulo brevius est umbilico.

(e) p. 124. Jam bene plumato BOYLE *de util. physiol. Exp.* p. 116. In quadrupedis fetu PFISTER.

(d) WINSLOW. n. 250.

(e) HARVEI.

(f) BRONZER *de hepate lampetr.* ENT.

(g) Jam MOTH. ad WORMIUM p. 575.

(h) MARCHETT.

(i) FABRIC. *de format. fetus ic.* 23.

(k) Infra umbilicum RIOLAN p. 411. ad ossa ilium BERTIN *Mémoire de l'Acad.* 1757.

p. 363.

(l) VERDIER II. p. 95.

(n) Pene totum RIOLAN. p. 411.

Inde sensim in adolescentibus hominibus se sub costas recipit (*o*), iisque fatis accurate continetur (*p*), ut tantum de hepate nudum sit, quanto spatium costarum deficiunt, vel certe paulum ultra costas emineat, ut aliquoties in tabulas retuli.

Neque tamen etiam inter homines adultos rari sunt, quibus amplius hepar trans oesophagum, in sinistrum hypochondrium (*q*) lobum sinistrum ad lienem usque mittit (*r*), & cum eo confervet (*s*), ut etiam trans lienem ad sinistriora (*t*) transiisse viderim. A victu lauto ita demum grandescit, ut totum abdomen repleat (*u*). In adulto etiam homine pariter saepe infra costas eminet (*x*), & ad umbilicum usque (*y*), & infra eum (*z*).

In cane tantum hepar MANGETUS (*a*) memorat, ut detracto diaphragmate animal subito occiderit.

Vicinias hepatis omnes discere non est facile, in qua re etiam varietas aliqua sit.

Convexa certe pars hepatis tota fere septum (*b*) transversum contingit, ut modice, & in junioribus aliquanto ulterius, infra id septum producatur, in medio epigastrico (*c*), pone musculos abdominis, rectos imprimis.

(*o*) EUSTACHIUS insigniter majus hepar pene ad umbilicum deducit t. 9. longe remotum a VESALIANO L. V. f. 2. 6. 20. 22. quod sit adulti hominis

(*p*) VESAL. p. 618. MORGAGN. *Epist.* I. p. 17. Conf. LUDWIG l. c. p. X. Ita reperi in puella 19. annorum, deinde in suspenso, & in alio viro, & iterum in venatore, inque tertio viro. Fere GLISSON p. 50.

(*q*) VESAL. WINSLOW n. 250. MORGAG. *sed. & caus. morb.* II. p. 205. LORSEL de renib. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs.* 128. Vol. I. *obs.* 75. Rarum esse ORIBAS. p. 114.

(*r*) MARCHETT. p. 25. 26. MORGAGN. *Advers.* II. p. 13. VESAL. f. 20. & L. V. f. p. 504. tum p. 618. KALTSCHMIDT in proprio progr. In hydropico PETZOLD *obs.* 88.

(*s*) RIOLAN. DIEMERBROECK p. 65. 79. BERTRANDI p. 8. *Histoire de l'Acad.* 1727. n. 9. VELSE de ingress. intestin. p. 35. GHIGI *Storia d'una sezione.* BECK de palpit. cordis. In hydropico STORCK *Ann.* I. p. 145. Præter naturam LUDWIG. *Sit part. inf. ventr.* p. X. Et ipse bis vidi.

(*t*) BLAS L. I. *obs.* 19. GUNZ de hepate p. 6.

(*u*) CHEYNE l. c. Vidit funesto eventu in duobus pueris RAYMOND *Malad. danger. à guer.* II. p. 293.

(*x*) COWPER. *tab.* 38. f. 5.

(*y*) FABRIC. *progr.* 1759. in hydropico.

(*z*) GLISSON. p. 50.

(*a*) *Biblioth.* p. 255.

(*b*) VESAL. in *fig.* p. 504. & p. 618. JENTY.

(*c*) WINSLOW n. 250. VESAL. L. V. f. 22. minus f. 6. & p. 618.

Replet autem in dextro latere totum diaphragmatis fornicem [d], carnesque ejus septi lumbales, costales, alam tendineam. In medio denovo [e] a gula ad carnes costales, tendinem totum. In sinistro latere partem juniori in corpore non exiguam, anteriorem [f] costalium carniū, tendinis alæque sinistræ, ut tamen ea sede lien sibi partem sumat. In adultioribus, aut se ad dextrum limitem gulæ recipit, ut certo vidi, aut paulo ultra gulam in alam sinistram producit [g].

Pars cava magis multiformis est. In dextro latere primum, hepar per eminentem lineam divisum [h] anteriori parte imæ suæ faciei colo incumbit dextro & transverso, & in fetu etiam intestinis [i]; posteriori reni [k], & capsulæ renali dextræ, cui per cellulosa telam adnectitur.

Inde porro lobus dexter duodenum intestinum tegit, cujus transversi dexter pars vesiculam fellis urget: & pyloro venas umbilicalis [l] respondet, quam tamen etiam multo sinisteriori loco, & ad medium vidi ventriculum.

Porro hepar ventriculi partem majorem operit [m], minoremve [n], sua quidem parte sinistra ventriculi planitiem anteriorem, cujus initio [o] vena umbilicalis respondet, ut tamen alias sinisterior sit, & medio demum ventriculo immineat. Donec, si tantus est, lobus sinister superior & anterior lienem contingat [p]; eaque sede ante gulam prorectus, eam posterius positam urgeat margine averso, qui pro gula exsculpitur, ad dexteriora lobuli. Idem lobulus inter ostia ventriculi inmissus, pancreas tangit & urget.

(d) VESAL. l. c. & p. 618.

(e) IDEM p. 618.

(f) Ibid.

(g) EUSTACHIUS t. 10. Conf. eumd. f. 2. VESAL. L. V. f. 12. longius in f. 20. & f. 4. p. 504. JENTY. *Tab. celiac. I.*

(h) BERTRANDI p. 9.

(i) FABRIC. *format. fet.* in ic. cit.

(k) VESAL. f. 20. G. f. 25. f. p. 504. BERTRANDI p. 9. CHESELDEN. *Tab. art. celiac. I.*

(l) Conf. p. 119. JENTY t. 1.

(m) EUSTACH. t. 9. t. 10. f. 2. WAINWRIGHT *de hepate* p. 3. CHESELDEN t. 21. JENTY.

(n) VESAL. f. 12. 6. 6. & p. 618. Hinc ventriculus plenus hepar comprimit CHESELDEN p. 164. & cardialgiam fecisse visum est BECK *de palpit. cord.* p. 34.

(o) Pyloro EUSTACH. JENTY. Dexterior appendice DRAKE *tab. I.*

(p) p. 458.

Præterea in homine erecto pars convexa in dextro latere partim posterior est, partim superior, partim descendens & dextra: in medio partim horizontalis, partim anterior, & perpendicularis; in sinistra parte iterum superior, & anterior.

Margo acutus totus anterior est (*q*), & inferior, idemque tanto superior, quanto sinisterior (*r*). Margo obtusus posteriora tenet.

Facies cava in universum inferior (*s*), in dextro latere præterea partim inferior. versus renes, partim posterior versus duodenum: in sinistra sede tota inferior.

Vesicula, ut alias repetetur, fere transversa (*t*) est. Quando in la- tus dextrum decumbimus, lobi dextri lateralis pars dextra ima est, sinister mucro supremus, & ventriculus & duodenum a pressione hepatis liberiora fiunt (*u*).

Ita fere se in homine sano habet, multis tamen modis mutari potest, ut hepar ex morbo mole auctum majorem partem abdominis sibi summat, aut, quod rarius, vidi tamen, insolitam in parvitatem limites suos contrahat. Sed etiam a tumoribus (*w*) variis loco moveri potest.

Visum est etiam in sinistro latere (*x*) fuisse, commutatis ejus cum liene partibus. Visum est perpendicularem (*y*) situm tenuisse, ut sinisterior esset pars cava. In thoracem etiam migravit (*z*), & extra abdomen, & ipse vidi (*a*), tum alii Cl. Viri (*b*).

Sed etiam cum diaphragmate perpetuo adscendit & descendit, ut reliqua abdominis viscera, non parvo motu (*c*), ut ad duas costas spurias imas descenderet (*d*): cæterum eo in motu nihil mutatur in viscerum mutuo sito & contactu.

(*q*) In omnibus iconibus.

(*r*) Pariter.

(*s*) Conf. CHESELDEN p. 122.

(*t*) Ibid.

(*u*) Credit laxari tunc vesiculam DUVERNEY *possh.* T. II. p. 233.

(*w*) GLISSON l. c.

(*x*) COCCHI *anat.* p. 13. DAUBENTON T. III. p. 205. TALENTONIUS *Chir.* In ariete HEUERMAN T. III. p. 709.

(*y*) *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs. 1.*

(*z*) BECKET ad I. *de morte submers. sine epota aqua obs. 1.* Hepatis in pectus migrantis aliqua exempla cum ventriculi pariter vitioso itinere conjuncta fuerunt, ut nuper in *Verhandel der hollandz maatschapp.* T. VIII. P. I. In VARNERI casu, cum pulmonem purulentum se putarent pertundere, hepar fuit, quod per exclusum diaphragma in pectus adscenderat *cas. 18.*

(*a*) *Opusc. pathol. obs. 29.*

(*b*) HEUERMAN l. c. &c.

(*c*) *Oper. anat. min. Exp. 50. 51. 52.*

(*d*) VERDIER l. c.

A repletis intestinis, & a colo potissimum, margo anterior sursum repellitur, ut qui inferior fuit, sit nunc anterior (*e*), & pars convexa, quæ magna parte anterior erat, nunc tota fit superior.

§. IV. *Hepar simplex & multiplex.*

Hepar humanum simplex est, minusque quam in plerisque animalibus divisum; etsi enim finditur passim, suosque habet colliculos, non tamen perinde in lobos, (*a*) profunde diffecatur. Vetustas, cum rarius humana cadavera inciderentur, & tamen nonnunquam conjunxit hominis & bestiarum fabricam, & diversam esse recepit in diversis cadaveribus figuram hepatis, aliasque rotundum esse, alias in duas, tres, quatuor fibras dividi scripsit (*b*). Aliquanto deterius RUFUS (*c*), atque CELSUS (*d*), in quatuor omnino & quinque fibras dividi diserte reliquerunt. Neque subito verior sententia prævaluit. Etsi enim VESALIUS (*e*), COLUMBUS (*f*), & procul dubio EUSTACHIUS meliora docuerunt, & plerumque unicam in hepate fissuram MASSA vidit (*g*), & simplex plerumque PAREUS (*h*) fecit; tamen adhuc PUTEUS (*i*) GALENI defensor, in principe fabaudo quatuor *Pinnulas* hepatis se vidisse adfirmabat, & C. GEMMA (*k*) hepar in fibras divisum, equidem inter rariora refert, & quadrifidum JASOLINUS dixit (*l*), & fatis nuper quinquelobum Clar. GRANDI (*m*), & noster olim SCHREIBERUS (*n*). Paulatim tamen vis veri prævaluit, & PUTEI

(*e*) Recte DISDIER *splanchnol.* I. p. 156.

(*a*) Λεβες partes hepatis extremæ: λεβες in aruspicina signum in hepate SUIDAS II. p. 453.

(*b*) ORIBAS. p. 112. GUNTHER. p. 216. CARPUS in MUNDINUM p. CXLV. C. STEPHANUS p. 183.

(*c*) *Part. appell.* II. p. 58.

(*d*) L. IV. c. 1.

(*e*) p. 619.

(*f*) p. 164.

(*g*) *Introduct.* p. 27.

(*h*) *Administ. anat.* p. 15. b. add. L. II. c. 17.

(*i*) *Apolog.* p. 1536.

(*k*) *Cosmocrit.* p. 105.

(*l*) A se visum de adipe cord.

(*m*) *Phil. transf.* n. 58. & apud FANTONUM.

(*n*) *Comm. Acad. Petrop. Vol. VII.* p. 228.

hepar quadrifidum fabulosum esse GABRIEL (o) CUNEUS monuit. Etiam J. SYLVIVS duos (p) tantum in hepate lobos vidit, ut tamen sæpe quaternos esse adfirmaret (q), ne a vetustate discederet. Liceat paucis hepatis varietates tradidisse.

Inter quadrupeda simplex solidumque, vel certe humano modo bilobum hepar habet. Pygmæus (s), bos (t), camelus (u), elephantus (w), cervus (x), non tamen constanter, alce (y), gazella (z), rupicapra (a), caprea (a*), caprea stepnosarai (b), porcellus brasiliensis (c), tursio (d), manati (e).

Animalibus quadrupedibus, quibus divisi sunt pedes, plerisque etiam hepar in multos lobos dividitur, in simia (f), hyaena (g), lupo (h), cane (i), vulpe isatide (l), panthera (m), leone (n), fele (o), tigride (p), lynce (q), catopardo (r), marte (s) ursulo coati (t) & coati mundi (u), fele zibethica (w), animal cibetho (x), ur-

(o) p. 98.

(p) *Isagog. anat.* p. 70.

(q) *Calum. depuls.* 26.

(s) TYSON. p. 34.

(t) VESALIUS. PARIS. *Compar. anat.* p. 86.

(u) *Comm. petr.* T. X. d. 310. Trilobum PARIS.

(w) BLAIR. *Phil. transf.* p. 326. Simplex & bilobum MOULINS p. 21. & PARISINI.

(x) PARIS. nam in cerva ajunt multilobum fuisse.

(y) PARIS.

(z) Bilobum cum tertio parvo lobulo PARIS.

(a) PARIS. trilobum.

(a*) COLLINS *tab.* 44.

(b) Bilobum ut homini *Nov. Comm. Petr.* T. IV. p. 391.

(c) BUFFON T. VIII. p. 9. Lobi duo magni, tertius parvus.

(d) TYSON *anat.* p. 24. Sed bilobum faciunt *Phil. transf.* n. 76. ROND. p. 460.

(e) Duo lobi & tertius quadratus *Comm. Petr.* Nov. II. p. 318.

(f) BLAS *anat. anim.* p. 112. Sex *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 61.

(g) VESLING *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 5. Trilobum BUFFON T. IX. p. 284.

(h) Sex lobi FABER p. 814.

(i) Septem BLAS *misc. anat.* p. 269.

(l) In *Nov. Comm. Acad. Petrop.* T. IV.

(m) Quinque BUFFON T. IX. p. 181.

(n) Octo lobi BARTHOLIN. C. IV. n. 100. Quinque BUFFON T. IX. p. 34.

(o) Sex SEVERIN. p. 314.

(p) Sex lobi BLAS *anat. anim.* p. 121.

(q) Septem PARIS.

(r) Sex PARIS.

(s) Sex BARTH. C. V. h. 14.

(t) *Mém. de Berlin.* T. XII. p. 181. Quinque BUFFON T. VIII. p. 367.

(u) Septem PARIS.

(w) BLAS *misc.* p. 269. Sex PARIS. BARTHOLIN. C. IV. h. 1.

(x) BUFFON. T. IX. p. 320. 321.

fo (*y*), mele (*z*), genetia (*a*), mure indico (*b*), forice aquatica (*c*), glire aquatico (*d*), sciuro (*e*), mure (*f*), glire (*g*), talpa (*h*), mure montano (*i*), vespertilione (*k*), ratto fibirico (*l*) castore (*m*), lutra (*n*), lepore (*o*), erinaceo (*p*), opossum (*q*), viverra (*r*), mustela (*s*), putorio (*t*), agouti (*u*), mani (*w*). Sed etiam & equo multilobum est (*y*), & porco bifulco (*z*) atque apro tayacu (*a*).

Inter amphibia calida phoca (*b*) multos hepatis lobos habet, tum ur-
sus marinus, quod aliud genus est phocæ (*e*).

- (*y*) Octo *Comm. nor.* 1. c. Conf. BUFFON T. VIII. p. 269.
 (*z*) Sex lobi ARNAULD *hist. natur.* T. V. p. 2. p. 242. 245. 288.
 (*a*) BUFFON T. IX. p. 350.
 (*b*) Septem SEVERIN. *zoctom.* p. 328.
 (*c*) Quinque BUFFON T. VIII. p. 65.
 (*d*) Sex lobi BUFFON T. VII. p. 354.
 (*e*) Quinque *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. obs.* 61.
 (*f*) Sex BARTHOL. *Ep.* IV. n. 51.
 (*g*) Septem PARIS. In glire vero quinque. BUFFON T. VIII. p. 176. 48. in ratto sex p. 288.
 (*h*) GAUTIER *obs. period.* T. I. p. 28. 29. Septem HARDER *apiar. obs.* 24. Tres BUFFON VIII. p. 91.
 (*i*) Novem lobi PARIS. Sex lobi *Ph. tr.* 355. Quinque BUFFON T. IX. p. 233. Septem SEVERINUS 325. RICHARD III. p. 136. Quatuor HARDER *apiar. obs.* 22.
 (*k*) Trilobum HOOKE *Exp.* p. 82. Fere quadrilobum BUFFON T. IX.
 (*l*) Ultra quinque lobos *Nov. Comm. Petr.* T. IV. p. 385.
 (*m*) Septem lobi *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 51. Sex lobi *Ad. Erud.* 1684. p. 362. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2. obs.* 251.
 (*n*) Sex lobi PARIS. Septem lobi MARSIGLI t. 23. *Mém. Etrang.* II. p. 201. Quinque BUFFON T. VII. p. 143. Quinque & sex in marina lutra *Nov. Comm. Acad. Petrop.* T. II. p. 377.
 (*o*) Quatuor lobi BUFFON T. VI. p. 275. Tres BARTHOL. C. II. h. 86.
 (*p*) Quinque BLAS *anat. anim.* p. 63.
 (*q*) Tres lobi *Phil. transf.* n. 239. TYSON p. 34.
 (*r*) In *furet.* sex lobi BUFFON.
 (*s*) In *beletta* BUFFON *ibid.* p. 232.
 (*t*) *Fouine* BUFFON T. VII. p. 171.
 (*u*) Quatuor lobi BUFFON T. VIII. p. 385.
 (*w*) Quatuor lobi *K. Svensk. Acad. Handl.* X. p. 267.
 (*y*) BUFFON T. IV. p. 316. Quatuor & quinque lobi GIBSON.
 (*z*) Quatuor & quinque VESAL. p. 629.
 (*a*) Huic quatuor lobi *Phil. transf.* n. 153.
 (*b*) Sex lobi *Phil. transf.* n. 469. Ad octo PARIS.
 (*c*) *Nov. Comm. Ad. Petrop.* T. II. p. 344.

Aliis piscibus frigidi generis mihi quidem integrum (*d*) visum est, & bilobum (*e*), ventriculo & intestino ei obverso adtensum. Simplex efoci (*f*), cycloptero (*g*), hirundini marinæ (*h*), lampetræ (*i*). Bilobum afello (*k*), galeo (*l*), pleurostomo (*n*), orbi (*o*), blenno (*p*).

Plures tamen lobos habere dicitur in aliis piscibus, tres (*q*) inprimis in raja levi (*r*) galeo acanthia (*s*) gymnoto (*t*).

Bilobum sed ulterius divisum est in hufone (*u*). In rhombo multi sunt lobi (*w*). Etiam in eodem genere simplex & divisum (*x*) reperitur.

In avibus etiam continuum, grande, utrumque pene hypochondrium (*y*) replet, & bilobum (*z*) est, non tamen sine laciniis, ex quibus plures faciās lobos. Bilobum in aquila (*a*), accipitre (*b*), buteone (*c*), Psittaco (*d*), cornicibus variis (*e*), casuario (*f*), struthione (*g*), an-

- (*d*) COLLINS p. 451. HILL. *review*. p. 115
 (*e*) HILL. *ibid*.
 (*f*) GRONOV. *musf. ichthyol.* p. 10.
 (*g*) GRONOV *ibid*. p. 56.
 (*h*) IDEM *ibid*. p. 9.
 (*i*) COLLINS T. 38.
 (*k*) SCHONEVELD p. 20.
 (*l*) Longissimum RONDELET L. III. c. 19. COLLINS T. 33. Maximum *Merc. de france* 1737. Dec.
 (*n*) GRONOV. *musf.* p. 27.
 (*o*) BARTHOLIN. C. II. h. 1.
 (*p*) GISLER. *K. Svensk. wetensk. Acad. Handl.* 1748. trim. I.
 (*q*) HILL. l. c. Plerique PARISINI. SCHÆFFER *pisc. Bavar.* p. 31.
 (*r*) ALDROVAND p. 452.
 (*s*) KLEIN *miss.* IV. p. 62. Galeo levi PARIS.
 (*t*) GRONOV. p. 20.
 (*u*) MARSIGLI *opus danub.* T. VI. t. 15.
 (*w*) COLLINS t. 37. f. 3.
 (*x*) Salmoni Nov. *Comm. Petrop.* T. III. p. 420.
 (*y*) C. BAUHIN. *theatr.* p. 348.
 (*z*) COLLINS p. 449.
 (*a*) HARDER *apiar. obs.* 15. PARIS.
 (*b*) BLAS *anat. anim.* p. 131.
 (*c*) ALBIN. *avium hist.* n. 1.
 (*d*) COLLINS t. 23.
 (*e*) ALBIN. T. II. n. 21. 23. 24.
 (*f*) PARIS.
 (*g*) VALISNER *oper.* T. II. P. 244.

fere (*b*), colymbo (*i*), fulica (*k*), laro (*l*), vanello (*m*), himantopode (*n*), scolopace (*o*), ciconia (*p*), scope (*p*^{*}), butauro (*q*), ardea (*q*^{*}), meleagride (*r*), tarda (*s*). In nonnullis trilobum est (*t*), etiam quadrilobum (*t*^{*}).

In quadrupedibus frigidis pariter bilobum, trilobum, quadrilobum, ut ne in eodem quidem genere fatis constans sit. In vipera (*u*) bilobum, etiam in caudifona (*w*), tum in crocodilo (*x*), lacerta (*y*). In lacerta tockaye trilobum (*z*) est, sic in rana (*a*). Quatuor lobi sunt in salamandra (*b*).

Ex his omnibus nihil fatis certi, aut alicujus in physiologia momenti deduci potest, cum neque cum alimenti genere propria hepatis fabrica conjungatur, neque cum classe animalis. Homo enim omnivorus est, animalia, quibus hepar simplex, pleraque herbivora: turio plane carnivorus. Lepori, cuniculo, muri montano, potissimum herbivoris, multifidum hepar est. Ut pene cum VESALIO crederes, hepatis nullam certam figuram esse, sed ad vicinam suam ad viscus se accomodasse,

(*h*) COLLINS t. 20. f. 1.

(*i*) ALBIN. I. n. 82.

(*k*) IDEM. I. n. 82.

(*l*) IDEM II. n. 87.

(*m*) IDEM I. n. 74.

(*n*) IDEM I. n. 78.

(*o*) IDEM I. n. 70.

(*p*) HARDER *apiar.* p. 2.

(*p*^{*}) PARISINI.

(*q*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 2. obs. 31.*

(*q*^{*}) SCHRADER.

(*r*) PARIS.

(*s*) HARDER *obs.* 19.

(*t*) Tres lobi in cygno BARTHOL. *Anat. Cygn.* p. 36. in gallo pavone COLLINS I. c. in corvo aquatico PARIS. Bilobum in eo ALBIN. II. n. 81.

(*t*^{*}) In struthione WARREN.

(*u*) CHARAS T. II. F. F. In serpente prælongum COLLINS t. 41. f. 2. Simplex in vipera COITER p. 126. Simplex, sed tota intestina legens PARIS.

(*w*) *Phil. transf.* n. 144.

(*x*) *Mém. de phys. & de mathem.* p. 22.

(*x*) JACOBÆUS p. 109.

(*z*) *Mém. de phys. & de mathem.* p. 52.

(*a*) HARDER *apiar. obs.* 13 RONDELET II. p. 219. JACOBÆUS qui ranæ quatuor lobos facit p. 51. Bufoni tres JACOBÆUS.

(*b*) Quatuor lobi JACOBÆUS p. 120.

nisi satis certum esset, vicinas partes potius post hepar grandescere (*c*), & ipsas adeo potius ad hepar se contemperare (*d*). In avibus a corde tamen divisio in lobos nascitur.

§. V. *Hepatis in universum figura.*

Hepatis humani figura verbis vix potest describi. In dextro tamen latere crassissimum & compressum tuber (*a*) id viscus orditur, quod, uti diximus, diaphragma replet, & hypochondrium ejus lateris.

Inde sinistrorsum gracilescit (*b*), tamquam de ovo majorem partem per apicem (*c*), obliqua, non penitus ad basin penetrante, curva sectione abstulisses: & abit in lobum sinistram hinc convexum inde cavum, donec & gracilior semper & tenuior pene plano apice finiatur (*d*), in aliis obtusior (*e*).

Posterius omnia obtusa sunt, anterieus pars, quam dicemus, convexa hepatis, cum concava in aciem coit, qui margo sensim sursum (*f*), & sinistrorsum tendit, & est utique inferior, inque cultri pene modum acutus, dum crassities hepatis antrorsum continuo diminuitur. Is margo in lobo dextro incipit ad renis sedem; adscendit inde mutato ductu, sinistrorsum se confert, in universum, lunatus. Eum marginem nonnunquam quasi aliquæ digitorum impressiones (*g*) interrumpunt, quarum princeps est pro ventriculo (*g**), alia venam umbilicalem admittit (*h*). Pro emittenda etiam vesicula sinus exsculpitur, non perpetuus.

(*c*) *Form. du poulet* p. 123. sub finem diei IV.

(*d*) Vide, si placet, philosophantem de figura hepatis GLISSONIUM p. 10.

(*a*) VESAL. f. 18. ad dextra venæ cavæ. EUSTACH. t. 10. f. 2. t. 11. CHESELDEN t. 22. Conf. JENTY t. 3.

(*b*) VESAL. f. 18. 22. &c. EUSTACH. t. 9. CHESELDEN t. 21. etiam JENTY.

(*c*) GLISSON p. 110.

(*d*) VESAL. f. 12. 18. 20. 22.

(*e*) EUSTACH. T. XI. f. 4.

(*f*) VESAL. L. V. f. 6. 12. 18. 20. 22. EUSTACH. t. 9. JENTY t. 1. f. 3.

(*g*) VESAL. f. 18. JENTY t. 3.

(*g**) Conf. GUNZ p. 5.

(*h*) VESAL. f. 6. 12. EUSTACH. T. X. f. 2. T. XI. f. 4. CHESELDEN t. 21. 22. JENTY l. c.

§. VI. *Pars gibba.*

Simplex hæc pars hepatis est (*a*), & partim diaphragmati respondet, partim, ut in epigastrio, musculis abdominis. In dextro latere, crasso tubere incipit, cujus lateralis facies ad hypochondrium dextrorsum se admovet; deinde & superior, gibba, septi transversi alæ dextræ obvertitur, atque costalibus & lumbalibus carnibus. Ea sæpe sede hepar crassius est, & accessorium quasi gibbum habet (*b*).

Inde media pars gibba pene posterius plana est, cui cor insideat, solo septo transverso ad hepate divisa. Ea ipsa sede ad diaphragma adhæret (*c*).

Quæ pars antrorsum descendit (*d*), costalibus carnibus anterioribus obversa ut vel colon tegat vel duodenum, vel ventriculum, ea modice convexa versus marginem deorsum extenuatur.

Cæterum per ligamentum suspensorium (*e*), ab accessione venæ umbilicalis, retrorsum ad dextra venæ cavæ, convexum hepar dividitur, *dexterque lobus* dicitur, qui dexterior huic limiti adjacet, *sinister*, qui sinisterior.

§. VII. *Pars sima (a).*

Multo magis hæc composita est, & multiformis. Ut enim convexa facies foli diaphragmatis & continuis musculis abdominis, ita sima ista diversissimis partibus applicatur, reni, colo intestino, ventriculo, iterum colo, lieni, & ab omnibus fere figuratur, ut convexam eorum figuram sua concavitate exprimat. Deinde hæc potissimum pars vasa recipit, & ob ea variis fissuris dividitur.

Ergo primum lobus dexter duas habet facieculas modice excavatas, quarum anterior major, colo intestino (*b*), uti diximus, insidet.

(*a*) VESAL. f. 18. EUSTACH. T. XI. f. 3. JENTY l. c.

(*b*) MORGAGNUS *Ep.* l. n. 12. 13. BERTRANDI p. 2.

(*c*) L. XX. p. 352.

(*d*) VESAL. f. 22. 25.

(*e*) EUSTACH. t. 9. CHESELDEN, JENTY.

(*a*) POLLUX p. 256.

(*b*) VESAL. L. V. f. 12. BERTRAND. p. 3. CHESELDEN t. 22. DRAKE *tab.* 2. Junioribus major DUVERNEY II. p. 214.

Posterior (c) reni respondet, & magis sursum capsulæ dextræ, ad dextra transeuntis venæ. Utramque facieculam linea evidens dividit, quæ a cauda lobuli postici continuatur.

Sinisterior lobus molliter excavatur (d), & faciei anteriori, magna, ventriculo, minori & maxime anteriori colo imponitur.

Media pars hepatis, inter has, quas descripsimus, sed quæ tamen lobo dextro accenseatur, eadem maxime multiformis est. Ordinem a fulcis sumemus.

Ergo ab accessione venæ umbilicalis, quæ est in parte anteriori, paulum dexteriori, hepatis, retrorsum ad usque venæ cavæ in hepar adventum, fulcus (e) exit, in universum continuus, quem *horizontalem* (f) dicemus. In puero tenero adscendit, & ductus venosus etiam magis. In adulto homine hepar brevius est.

Ejus fulci pars anterior venam umbilicalem continet (g), pars posterior angustior ductum venosum (h). Media parte cum fissura transversa committitur, satis directe (i), ut tamen sæpius ductus venosus paulo dexterior sit (k), & magis sinistra (l) petat: vidi etiam fossam umbilicalis venæ serpentinam fuisse. Vidi venam umbilicalem sinisteriorem fuisse. Est ubi tota hæc rima aperta est (m): est ubi vena umbilicalis vel ejus certe particula, ponte quasi ex ipso hepate (n) facto tegitur, & per tubulum (o) incedit, huic substratum ponti, a dextro lobo in sinistrum continuato. Vidi duos fuisse ejusmodi pontes. Rarius autem est ejusmodi pontem (p) in ductu venoso conspici.

Hæc fissura in parte finia lobum dextrum a sinistro dividit.

(c) VESAL. *ibid.*

(d) VESAL. f. 12. 20. CHESELDEN t. 22.

(e) *Grande scissure* WINSLOW n. 256.

(f) BERTIN. *Mém. de l'Acad.* 1753. p. 332.

(g) Ubi vena ab umbilico prodit, intervallum est rupium simile ORIBAS p. 112.

(h) *Sillon* WINSLOW n. 257.

(i) TREW *different. fetus.* f. 1. 22. 23. 24.

(k) BIANCHI t. 2. 3. nimium & f. 12. Paulum TREW f. 1. 56. 74.

(l) CHESELD. *tab.* 34. FABRIC. *form. fet.* f. 20. GLISSON c. 33. p. 292. & in *tab.* BERTIN.

p. 334.

(m) Nudam GARENGEOT BIANCH. *tab.* 2. Rarius nuda est GUNZ. p. 4.

(n) Parvus pons EUSTACH. T. X. f. 2. T. XI. f. 3. TREW. f. 73. *Comm. Nor.* 1733. t. 3. f. ARANT. *de fetu* p. 18.

(o) Tubulus FABRIC. *progr.* n. 1759.

(p) Nunquam etiam GUNZ. p. 4. Sed videtur tectum pingere EUSTACH. l. c.

Nunc a media, sed tamen potius paulum a posteriori, parte hujus fulci alter ad rectos angulos dextrorsum procedit sulcus *transversus* (*q*), amplior, profunde in hepate exsculptus, nunquam ullo ponte hepatico contactus. Is recipit sinistrum ramum venæ portarum. Idem in dextro sine suo in gracilem rimam finitur, quæ ramum ejus venæ dextrum continet. Tenet tertiam partem, aut paulo minus, latitudinis hepatis: ut visceris portio hoc eodem sulco anterior multo major sit.

Iterum, ante partem hujus transversæ rimæ dexteriores, ovata fere vallecule in hepate modice excavatur, non penitus dimidii ovi capax (*r*); eademque modo in hepate manet (*s*), ut solet in junioribus modo ipso in margine hepatis porro exsculptur (*t*), quando vesicula de hepate eminet, quod in adultis hominibus frequentius est (*u*). In hac vallecule fellis est vesicula, ductu horizontali (*w*) retrorsum (*x*), & sinistrorsum (*y*) tendente.

Rarissimum est, & tamen vidi, in sinistro lobo fellis vesiculam fuisse, & trans fossam umbilicalem, quam tegebat, dextrorsum oblique ivisse. Rarum etiam, quod pariter vidi, in eodem cum vesicula fellis hepatis sulco appendiculam coli sedem habuisse.

Denique ad dextra lobuli: quem statim dicemus, similis fere semicylindrica vallecule exsculptur, quæ hinc *papillam* habet eminentem lobuli, inde posterius advenientem processum *caudatum*, qui dextrorsum in lineam quam diximus, dextri lobi hepatis abit. Inter hos colliculos celeberrima vallecule intercipitur, & in anatome & in pathologicis magni nominis. *Portas* aut dixerunt (*z*) veteres, aut certe dixisse potuerunt, si hominis jecur iis notum fuit. Nam venam certe *ad portas* dixerunt,

(*q*) HEISTER. t. 3. f. 12. GARENGEOT. BIANCHI *tab.* 2. a D. ad P. *tab.* 3. *Second enfoncement* WINSLOW n. 257. *Fissura transversa* GUNZ. p. 4.

(*r*) VESAL. f. 22. 25. WINSLOW n. 290.

(*s*) GARENGEOT. VESAL. L. V. DRAKE. RIOLAN. p. 409. FABRIC. in iconibus I. de *form. fet.* JENTY. Negatur in *Eph. Nat. Cur. Ann.* IX. p. 102. sed sæpe vidi.

(*t*) Subinde WINSLOW n. 258. Habet BERTRANDI p. 2.

(*u*) RIOLAN. p. 409. EUSTACH. t. 10. f. 2. *tab.* 11. f. 4. BIANCHI ubique CHESELD t. 22. Media parte VESALIUS p. 623.

(*w*) CHESELDEN t. 22.

(*x*) WINSLOW n. 291.

(*y*) Ita etiam GUNZ. p. 4.

(*z*) HIPPOCRATICUS *Auctor. de anat.* CELSUS L. V. p. 26. GALEN. de *diff. venar.* ab init. Venas ita vocasse RUFUS II. p. 38. I. p. 39.

sed ea per eorum collium intervallum ad hepar advenit. Deinde manifesto ARETAEUS, melioris ille notæ auctor scripsit, a *portis* venam (*a*) recta in hepar ingredi, quæ in multa tenuia & demum in tenuissima per hepar findatur. Inde ORIBASIUS portas eum locum dixit (*b*), in quem venæ a mesenterio veniunt, quæ certe sunt nostræ. Nam ab iis solis una vena porrigitur in multas fissa, quibus caro visceris interjacet. Et POLLUCI (*c*) *πυλαί* sunt, secundum quas sanguis advenit, ut per unicam venam dividatur. Denique ne de fini hepatis colliculos cogites, ARISTOTELES venam dixit, a majori ortam, qua *portæ* habentur (*d*). Hæc addidi ob ILL. GUNZII dicta (*e*) & BERTRANDI (*f*).

Venit is sulcus sursum paulum dextrorsum in rimam transversam posterius, quam vesicula.

Diximus caudatum processum, obliquum, paulum curvum eminere a lobulo postico. Ad ejus caudæ dexteriores alius sulcus (*g*) in hepate exsculpitur, qui jam magis (*h*), fere ad convexam partem spectat, oblique antrorsum, dextrorsum ducens. Ex eo sulco vena, porro insigni satis flexione (*k*), sinistrorsum (*l*), versus medias vertebrae emergit; modo continuo nuda, non raro a carne hepatis tamquam a ponte contacta, etiam ut integer cylindricus tubulus sit (*m*). Est venæ cavæ a corde, aque foramine diaphragmatico, versus vertebrae tendentis nidus: qua vaginam a peritonæo habet, reliqua tota parte sui extra ejus faccum posita (*n*).

Cæcæ & regula carentes rimæ etiam aliæ in dextro hepate apparent, fere transversæ (*o*). Oportet autem meminisse, sulcum horizon-

(*a*) *Acut. sign. caus.* II. c. 8.

(*b*) p. 114.

(*c*) p. 257.

(*d*) *Hist. anim.* L. I. c. 17.

(*e*) p. 5.

(*f*) p. 10.

(*g*) Solus sulcus BIANCHI t. 4. Sed nimis longus MORGAGN: n. 28. p. 29. Add. BERTRANDI p. 10. Vena EUSTACH ibid. BIANCHI tab. 2. 3.

(*h*) MORGAGN. *Ep.* I. p. 14. n. 10.

(*k*) IDEM ibid.

(*l*) EUSTACH. t. 10. f. 4. MORGAGN.

(*m*) EUSTACH. ibid. Negat VESALIUS L. III. p. 458.

(*n*) KAAUW n. 607.

(*o*) MORGAGN. VESAL. I. c. BERTRANDI p. 11. MALPIGHI c. 25.

talem in hepate suo in situ relicto non adparere, neque ullas inesse patulas in hepate valles: sed fulcorum hepatis oppositas quasi ripas se contingere, easque interpositos quasi fluvios penitus abscondere.

§. VIII. Lobuli.

Lobulos volumus, posticum, anteriorem, & aliquos erraticos.

Posterior celebrior est HIPPOCRATICO (a), forte auctori dictus, certe VESALIO (b) & Jacobo SYLVIO (c); ab EUSTACHIO pictus (d), neque adeo bene a SPIGELIO nominatus (e).

Is lobulus a margine posteriori hepatis incipit, sub trunco venæ cavæ, ibi simplex, & latus. Eo loco vertebris innititur, inter venam cavam & œsophagum. Inde adscendit in partem visceris cavam, antrorsum (f) eundo, & continuo in duos colliculos dividitur.

Eorum *superior posterior* (g) oblique, & cum curvitate, oblique pone vesiculam dextrorsum migrat, a lobulo in dextrum lobum (h), & limitem facit inter venam cavam, portarumque venam (i). Idem dilatatur denique, fulcumque subtendit, qui ex transversa rima continuatur, porroque lineam orditur (k), quæ renalem facieculam hepatis dextri a colica faciecula separat. *Caudatum* dicās.

Major colliculus, qui solus vulgo lobulus SPIGELII audit (l), antrorsum pergit & deorsum, & in magnæ papillæ similitudinem, obtusus definit (m).

(a) περί σπλ. Sect. 6. duas etiam nominat eminentias: sic duos parvos lobos in fime parte SYLV. calum. 26.

(b) Portiuncula ad ortum venæ portæ protuberans VESAL. p. 620.

(c) Lobulus minimus ad Portæ exortum Varior. corp. diff. p. 71. Ex eo PARE L. II. c. 17.

(d) EUSTACH. t. II. f. 4.

(e) A nemine dictum esse SPIGELIUS L. VIII. c. 12. p. 234. t. 8. f. 1. Habet & RIOLANUS p. 748. & alii.

(f) EUSTACH.

(g) Appendicula GUNZ. p. 5. Isthmus MORGAGN. Ep. I. n. 19. Alter, puto, colliculus HIPPOCRATIS, SYLVII & RIOLANI.

(h) Tab. art. Cæl. I.

(i) EUSTACH. l. c.

(k) Tab. Cæl. I.

(l) An hic alter colliculus dictus SYLVIO RIOLANO p. 748. Eminence triangulaire WINSLOW n. 254. 255.

(m) EUSTACH. t. II. f. 4. semiovatum.

In ejus latere dextro, finistrisque eminentiæ candatæ finibus fulcus : est, qui venam portarum adducit (*n*).

Cæterum hæc papilla infulæ habet modum, ad cujus dextra vena, quam dixi, portarum, ad sinistra ductus venosus, antè fulcus transversus hepatis sit. Ipse lobulus inter ventriculi ostia (*o*) quasi urgetur, contiguus pancreati, eumque insidens magnus & sinister lobus premit. Omentum hepaticogastricum ante se habet, & denique liber definit (*p*).

Lobulus *anterior* [*q*] anonymus, pene parallelogrammus, ovato colliculo [*r*] tamen intumescens, ante fulcum transversum ad marginem hepatis anteriorem pervenit, idemque a sinistro lobo fossa umbilicali separatur. Ad dextra habet accumbentem vesiculæ fulcum.

Alii lobuli ab hepate aliquando producuntur, quorum aliquis vel lieni incumbit; vel ante ventriculum descendit, proprio ligamento ad diaphragma nexus. Alius ad dextra & posteriora vesiculæ capsulæ renali incumbit, omnes quidem non perpetui. Lobum minimum petiolatum, alibi citatum lego [*s*]. Hepar multilobe fetus [*t*].

§. IX. *Vasa hepatis. I. Adducentia.*

I. *Arteria hepatica*

Solum hepar id habet singulare, quod sanguinem non ab arteria sola, sed a duabus etiam venis habeat, certe dum fetus utero continetur. Quare merito inter prima viscera evolvitur [*a*], & grande jam est, uti diximus quo tempore pulmo, renes, ventriculus, intestina, oculos fugiunt [*b*].

Ut ingens autem viscus est, ita numerosissimas arterias accipit, magnas quidem a cœliaca pene sola: sunt tamen aliæ, non quidem perpetuæ, sæpe tamen magnæ, a coronaria, a mesenterica: tum aliæ, semper minores, a mammaria, ab epigastrica, a phrenica, a capsulari, a spermatica.

(*n*) *Tab. cæl. I.*

(*o*) De junioribus GHIIGI *osserv. sulla sexione del Mazzacurati* p. 18. Sed perpetuum est.

(*p*) MORGAGN. l. c.

(*q*) VERHEYEN p. 92.

(*r*) Jam habet SPIGELIUS L. VIII. *tab. 8. f. 1. N. N.*

(*s*) *Phil. transf.* n. 464.

(*t*) Nudum idem K. *Swensk. wetensk. Handl.* 1763. *Triem. I.*

(*a*) p. 466.

(*b*) *Conf. de la form. du poulet II. p. 123.*

Quæ a cœliaca (c), ea maxima est, eamque diximus ad eam usque sedem, in qua venam portarum attingit. Est autem, ne repetam, major in juniore homine cœliacæ ramus, transversim per portas ad venam advena, inque vena ejus nominis duodenalem emissura, & coronariam. Ex aorta hepaticam prodierit, inter cœliacam & mesentericam, rara est Cl. BERTRANDI adnotatio.

In funiculum vasorum hepaticorum, venit proprio in sulco lobuli, ut præterea ejus aliquo incurvo quasi processu nonnunquam ambiatur. Plurimis vasculis exiguis lymphaticis & rubris, tum filis imprimis cellulosis cum vena portarum & bilariis ductibus irretita, pergit sursum; dextrorsum, propior lobulo, & sinisterior (f), conspicua, dum vena portarum latet, a ductibus bilariis & ipsa sæpe partim tecta (g). Eo in itinere ramulos edit minutos ad fasciculum vasorum biliariorum, adque glandulas conglobatas vicinas. Dat etiam nonnunquam hepaticam (b) finistram, etiam prius, quam duodenalem.

In ipsis portis, ante venam ejus nominis, separatur in ramos duos (i), aut tres (k), frequentius tamen, ut puto, duos, dextrum finistrumque: vidi etiam quatuor fuisse.

Dexter major, etsi minus conspicuus (l), profundior vasis bilariis tectus, ipsaque vena portarum, trans venam portarum quam alias contegit dextrorsum adscendendo (m), in eam parvam partem transversi sulci abit, quæ ab accessione trunci venæ portarum dexterior superest.

Minores autem prius, quam hepar subeat, ramos edit ad vasa biliaria (n), cum finistrarum furculis, aliisque hepatici trunci propaginibus & duodenalium ramulis irretitos. Nonnunquam etiam pylori-

(c) Jam SYLVIVS habet *Isag.* p. 70. b.

(d) p. 32.

(e) EUSTACH. t. 10. f. 2. t. 27. f. 1.

(f) IDEM *ibid.*

(g) WINSLOW n. 187.

(i) *Tab. cæl. I.* EUSTACHIUS t. 10. f. 2. t. 27. f. 1. BERTRANDI p. 31. SPIGEL. L. VIII. t. 8. f. 1. PECHLIN *obs.* 59. *Gent.* I.

(k) LOQUET. de *art. hep.* n. 6.

(l) *Tab. cæl. I.* in ventriculo.

(m) EUSTACH. l. c.

(n) *Tab. cæl. I.*

cam hic edidit, & furculum in pancreas retrogradum, comitem venæ portarum (o). Inde porro dividitur in ramum anteriorem & posteriorem.

Ille sæpius dat *cysticam*, longe plerumque (p), ut raro a sinistra nascatur: *cysticam* dico, quod longe frequentius unica sit, etsi tamen subinde duæ sunt (q).

Ea dextrorsum ad cervicem vesiculæ venit, & constanter satis in duos ramos abit, superiorem, occultum, ad partem vesiculæ in hepar demersum, sed imprimis in vicinum hepar, & inferiorem, manifestum (r), similem, pariter proprie hepatis (s) datum, etsi etiam vesiculæ prospicit.

Isti rami vesiculæ cum arteriis hepatis plurimis furculis inosculantur (t) fundum sulci vestientibus, pro vesicula parati. Earum furculi exigui etiam *cysticam* adeunt.

Arteriæ *cysticæ* in vesiculæ tunica nervea præcipuum & perelegans rete (u) faciunt, stellatisque finibus (w) terminantur; ut multi ex uno centro rami exeant.

A *cystica* etiam arteria ad vicinos bilarios ductus peculiaris elegantior arteria ad cervicem venit.

Quando duæ sunt *cysticæ*, ut aliquoties vidi, earum alteram sinistra (x) cœliaca dedit, alias mesentericæ propago cum hepatica dextra conjuncta, alias ramus dexter arteriæ duodenalis.

Reliquus truncus anterior adit lobum anonymum & dextrum.

Truncus *posterior* hepaticæ, tectus plerumque vena portarum, tamen etiam manifestus, dat ramum dexteriores lobulo SPIGELIANO, etiam anonymo (y), & alium magnum per fissuram colliculo caudato subjec-

(o) L. XXII. p. 432.

(p) ORIBAS. p. 122. VESAL. p. 623 SPIGEL. L. VIII. t. 8. f. 1. PECHLIN. *obs.* 59. Cent. I. RUYSCH. *Ep.* V. t. 5. f. 4. COWPER. *app.* t. 3. f. 34. BIANCHI. *tab.* 2. ab uad. WALTHER *de cœliaca*. HEBENSTREIT *confn. venar.* LIEUTAUD p. 490. BERTRANDI p. 31. *Tab. cœliac. I.*

(q) Duas habet VESALIUS p. 490. ic. p. 484. WINSLOW n. 189. HEISTERUS, KULMUS, &c.

(r) *Tab. cœl. I.*

(s) Ibid. RUYSCH. *tab. cit.* f. 4. *Thef.* X. n. 132. *Thef.* I. *aff.* 11. n. 7. *Hist. de l'Acad.* 1705. n. 9.

(t) LOQUET. n. 4. RUYSCH. f. 4.

(u) RUYSCH. *ic. cit.*

(w) SEGER. p. 15.

(x) WALTHER *ven. port.*

(y) *Tab. cœl. I.*

tam, dextrorsum euntem. Dat etiam nonnunquam cysticas, & trunco suo, posteriori loco, totus per hepar dextrum dividitur.

Numerosi autem ab eo [& ab aliis hepaticis] ramuli in superficiem (z) hepatis emergunt, perque eam sub externa membrana conspicui ludunt, carne hepatis perforata, reteque faciunt, quo hepar ab omnibus aliis visceribus distinguitur. Hi sunt procul dubio furculi, qui de superficie hepatis tenuem humorem exhalant (a).

Sinister ramus hepaticæ arteriæ, plerumque minor est, & valde exiguus (b), quoties coronaria arteria major magnum ramum per ductum venosum ad hepar dat. Cæterum ante venam portarum incedit. Eadem in magis consueta fabrica dat coronariam minorem ventriculi (c); dat ramulos ad vasa biliaria, cum prioribus inosculatos: sequitur venæ portarum ramum sinistrum (d), per sulcum hepatis transversum; ad aliquam tamen distantiam: & tribus fere truncis, sed cum varietate aliqua, adit lobum anonymum (e), lobum, SPIGELII (exque eo in fossam etiam ductus venosi) fissuram umbilicalem, & venosi ductus fossam, perque eas rimas in lobum sinistrum.

Ab eo sinistro ramo elegantes anastomoses nascuntur, cum truncis minoribus hepatis. Et a ramo quidem fossæ umbilicalis alias tamen a trunco potius dextro, aliqui rami oriuntur, qui per eam fossam cum vena (f) ad epigastrium (g) & umbilicum veniunt, inosculati cum epigastricis (h), & mammariis (i).

Alius ad idem ligamentum (k) sed antè & versus umbilicum se addit, pariter & priori inosculatus. Idem dat venæ umbilicali.

(z) MORGAGN. *Ep. I. n. 21. adv. anat. III. p. 39.* RUYSCH. *Epist. V. p. 22. t. 5. f. 5. t. 6. Thef. 10. t. 3. f. 5.*

(a) BOYLE *de poros. corp. p. 18.* KAAUW n. 562.

(b) *Tab. art. cæl. I.*

(c) L. XIX. p. 150.

(d) EUSTACH. t. 27. f. 1.

(e) *Tab. cæl. I.*

(f) BIANCHI t. 2. RUYSCH. *Epist. V. T. V. f. 5. Tab. cæl. I.*

(g) *Tab. art. brach. I. 34.*

(h) *Ibid. 35.* Huc refero, quæ MORGAGNUS habet *Epist. I. n. 4.*

(i) *Tab. art. brach. 36. p. 8. & 9.*

(k) An iste LOQUETO dictus n. 8. aut BERTRANDO p. 32.

Alius (*l*) ad ligamentum suspenforium venit, ex ipsa carne hepatis, legit radicem ejus ligamenti, & hinc cum mammaria (*m*), inde cum phrenica (*n*) numerosis furculis coit.

Denique ad posteriora ligamenti suspenforii ex carne hepatis ramus accedit, qui & retrorsum radicem ejus ligamenti sequitur, & antrorsum cum arteria modo dicta, in arcum continuatur, quæ de fossa umbilicali exiit, aliamque cum phrenica sinistra coronam facit retrorsum redux.

A ligamento etiam sinistro ramuli hepaticæ sinistræ eunt in lienem (*o*), & diaphragma, per ligamentum sinistrum (*p*).

Quando tres sunt arteriæ hepaticæ rami, tunc dextra est, sinistra, & media.

Media ista, quæ minus frequens sit, est etiam minor, magisque in superficie visceris manet. Edit ramos pyloricos, coronariam parvam, ramos ad ductus bilarios, adque cervicem vesiculæ, denique ad duodenum, adit lobum anonymum, & fossam umbilicalem, perque pontem intratum in sinistrum lobum exit.

Alter a coeliaca hepaticus truncus plerumque parvus est, & a coronaria majori advenit, datque omento hepatico gastrico, & in fossam ductus venosi (*q*), perque ligamentum ad sinistrum lobum. Idem tamen nunquam magnus est truncus (*r*), & dextræ hepaticæ par. Quando ejusmodi est, tunc rami sinistri lobi omnes, & plerique rami lobi anonymi, & SPIGELIANI, & illi cum phrenicis & mammariis communicantes, sunt ab hoc trunco, quem nunc dicimus, medio.

A duodenali, quæ est a coeliaca, & ad ductus bilarios ramuli veniunt, innisti hepaticis, & aliquando ad proximum hepar.

Cæterum hepatica, etsi forte pro visceris portione non maxima, non (*s*) tamen exigua est, neque ejusmodi, ut recte cum bronchiali (*t*) compares. In alio enim cadavere puerili dextram 10. sinistram

(*l*) *Tab. cæl. I.*

(*m*) *Tab. art. brach. 8. & 9.*

(*n*) *Conf. RUYSCH l. c.*

(*o*) *FALLOP. p. 117. b.*

(*p*) *Tab. cæl. ad 6.*

(*q*) *Fasc. III. p. 55. Habet HEUERMANN T. III. p. 714.*

(*r*) *WALTHER SCHMIEDEL de inflam. intest. p. 8. 9. Tab. cæl. I. Huc videtur etiam spectare WINSLOW 181.*

(*s*) *Monet PECHLIN. l. c. LISTER de hum. c. 38.*

(*t*) *ORTLOB. de negot. cholep. n. 16. WEISS vaf. propr. visa.*

11. centesimarum pollicis reperi, ut summa diametrorum quadratorum esset 121. in alio cum tres essent trunculi 7. 9. & 11. ut summa foret 251. quæ erat quarta pars luminis venæ portarum, cujus diameter foret 32. & quadratum 1024. (u). Fines dicentur, cum reliquis vasis ipsius hepatis.

§. X. *Alia arteria hepatis.*

Perpetua (a) primum est, quæ ex mesenterico trunco, omnium prima, prodit. Ea cum arteria pancreaticoduodenali facia anastomosi, sociata venæ portarum, pone pancreas, & pone eam venam, per dexteriora vallecule portarum, tecta ipsa magna ea vena, ad hepar dextrum venit, & arcum cum aliqua hepaticarum habet, quas dat cæliaca.

Plerumque exigua est, non tamen raro (b) adeo grandis, ut rami dextri celiacæ absentiam suppleat, ejusque solitos ramos ipsa edat, hepaticos dextros, in sulci transversi hepatis finem euntes, & in fossam ductus venosi, & in umbilicalem (ba); & in lobos adjacentes: tum coronariam ventriculi dextram, cysticas (b*), & primam (b†) duodenalem, cum mesenterica solito more inosculatam etiam pancreaticam (b**), duodenalem sinistram, quæ cum aliis duodenalibus arcum facit, etiam alias. Quando ramus a cæliaca dextra una adest (c), ea a mesenterica propago locum tenet trunci posterioris dextri hepatici. Rem sæpe satis vidi; & alii ante Cl. viri (d). Vidi diametrum 11. centes. poll. habuisse.

(u) Majorem homini esse, quam brutis WAINWRIGHT *liver.* p. 84.

(a) *Fasc.* VIII. p. 33.

(b) GALENUS, cum arteriam eandem mesenterium ajat adiisse & hepar *de arter. & venar. diffc.* D. de MARCHETTI *comp. anat.* p. 27. S. COLLINS & WILLIS apud COLLINS *system.* NICOLAI *Comm. Lit. Nor.* 1732. *hebd.* 33. CHESelden *anat.* Ed. III. *tab.* 20. f. 7. Edit. VI. p. 188. WINSLOW p. 189. KFUGER *anat. theodidæos* p. 10. WALTHER *de intest. angust. obs.* 3. PETSCHÉ *diff.* n. 49. 51. HENSING *de periton.* n. 41. MOSEDER *de vesic. fell.* p. 8. GUNZ l. c. n. 10. HEUERMANN III. p. 714 SCHMIEDEL *de inflam. intest.* p. 8. 9. HENRICI *de oment.* ALBINUS apud LAMBRECHTS *obs.* p. 25.

(ba) Etiam HENRICI.

(b*) Etiam SCHMIEDEL. HENRICI.

(b†) Ramum ad duodenum SCHMIEDEL.

(b**) Ad pancreas SCHMIEDEL.

(c) PETSCHÉ. WALTHER.

(d) GUNZ. WALTHER.

Proxima classis est, quam mammaria ad hepar mittit. Earum princeps (*e*) non minima est *phrenico pericardiaca*, quæ non rarissime perforato diaphragmate in gibbam partem hepatis descendit, prope posteriorem terminum ligamenti suspensorii atque cum ramulis hepaticis ad superficiem visceris erumpentibus inosculatur.

Porro alia (*f*), ad quintum costarum intervallum nata, ad peritonæum super umbilicum & anteriora ligamenti suspensorii, & cum duplicibus arteriis ab hepatica inosculatur, & cum venæ umbilicalis sodalibus, & per ejus venæ fossam advenis: eadem cum ea vena in eam fossam & in hepar dat ramum aliquando.

Ultimi furculi sunt rami musculo phrenici (*g*), qui & ipsi ligamentum suspensorium adeunt, similes facturi anastomoses. Nonnunquam majores sunt.

Porro ex ipso trunco mammariæ abdominali (*h*) alii furculi peritonæo dati, in vena umbilicali & in ligamento, quod dixi, ramulos habent, cum hepaticis irretitos.

Arteriis *phrenicis* multiplex cum hepate commercium est. Dextra phrenica (*i*) mistas cum capsularibus hepaticas emittit, quæ cum vena cava ad lobulum, & ad dextra & posteriora hepatis veniunt.

Alius ramus, post priorem ortus, proxime (*k*) ostium venæ cavæ, ad dexteriores ejus venæ, posteriora hepatis adiit, cum hepaticis solitis varie inosculatus. Duas etiam fuisse vidi ad sinistrum venæ cavæ latus propagines: alteram ad fossam pro vena cava exsculptam, eamque sedem hepatis: alteram in partem hepatis, quæ est pone eminentiam obliquam. Ab ea ad ductus bilarios, & ad pancreas ramum vidi ivisse.

Hi a sinistro ramo arteriæ phrenicæ dextræ, a dextro aliæ, inter capsulares natæ, ad ligamentum dextrum, & per idem ad hepatis sedem convexam posticam veniunt.

A sinistra porro phrenica fere ex origine (*l*), ramus ad sinistra venæ cavæ sedemque ductus venosi tendit.

(*e*) *Fascic. VI. p. 8.* Habet HENSING l. c. a mammaria arterias ad hepar.

(*f*) *Fascic. VI. l. c.*

(*g*) *Fascic. VI. l. c. p. 9.*

(*h*) *Fascic. VI.*

(*i*) *Fascic. III. p. 53. 54.*

(*k*) *Fascic. VIII.*

(*l*) *Fascic. VIII.*

A ramo ejus phrenicæ sinistro (*m*) cum ligamento hepatis sinistro duo furculi adveniunt. Eorum alter ad lobum sinistrum & ad lienem tendit; alter in fulcum ductus venosi venit, cum arteriis ligamenti suspensorii, ejusque fulci, inosculatus.

Sed a dextro ramo sinistræ phrenicæ ramus (*n*), legit radicem ligamenti suspensorii, qua id ligamentum hepati innascitur, & contrarius occurrit arteriæ ab hepaticis, ab anterioribus secundum eandem radicem advenienti (*o*). Eadem cum aliis hepaticæ furculis, huic ligamento datis, & cum mammariis, & cum epigastricis inosculatur.

Et a mediis five anticis capsularibus (*o**) rami minuti ad partem hepatis venæ cavæ proximam veniunt, & cum hepaticis communicant.

A capsularibus imis (*p*) five renalibus, ad lobum SPIGELII, aut ad lobum dextrum veniunt, cum hepaticis varie mixtæ.

A spermatica dextra duo rami hepar adeunt, comites venæ cavæ, anterior & posterior, in fulcum ejus venæ dati, varie cum hepaticis superficialibus, & cum aliis conjuncti, qui profunde per ejus visceris parenchyma ad venæ cavæ sedem veniunt.

Ab epigastrica (*q*) furculi in regionem umbilicalem sedemque venæ umbilicalis minuti veniunt, ejus venæ focii, in hepar & in ligamentum suspensorium, cum hepaticis ex fulco umbilicali advenientibus (*r*) inosculati.

§. X I. II. Vena umbilicalis. (*a*).

Et si hæc vena pariter possit in fetus historia describi (*b*): in longo tamen opere, incertus vitæ, tempore præfente utor, ne abrupto forte

(*m*) Fascic. III. p. 53.

(*n*) Hæ forte dictæ RUYSCHIO l. c. Epist. IX. p. 10 & Cl. HEBENSTREIT de vasor. confin.

(*o*) p. 475. 476.

(*o**) Fascic. III. p. 57.

(*p*) l. c.

(*q*) Fascic. V. p. 3.

(*r*) p. 475.

(*a*) Secundam venam umbilicalem KERKRING ad mesaraicam pertinentem, qualis est in an. malibus obs. 37. In vitulo habet RUYSCH obs. post vavl. lymph. 7. Dicetur in fetus historia.

(*b*) Ut in Comment. Boerh. T. V. p. 2.

opere hac tota magni momenti contemplatione jocinoris historia destituatur.

Ergo princeps vena funiculi umbilicalis (*c*), quando ex eo exivit, sursum tendit, & sinistrorsum (*d*), inposita peritonæo, & tecta alba linea, aliqua etiam cellulosa tela obnupta, quam non bene *falcem* (*d**) dicas. Brevis in fetu, cui hepar proxime ad umbilicum descendat, in adulto longior (*e*) subit, uti diximus, imam partem ligamenti suspensorii (*f*), inter dextram sinistramque laminam, & per foramen peritonæi in sulcum, sibi paratum, horizontalem, qui non raro tubulus est, se demergit (*f**).

Dum per eum sulcum retrorsum it, intumescit eundo (*g*), & ex eo tumore ramos insignes (*h*) ad angulos sinistrorsum acutos in hepar emittit, ad lobum anonymum & sinistram; hos majores (*i*), & in directione venæ umbilicalis. Multum cæterum in eorum numero & magnitudine varietatis est. Viginti (*k*) omnino numeravi, & vidi inter eos, qui venam portarum æquarent.

In alio exemplo primus ramus, antè quam pons hepaticus (*l*), adiit lobum anonymum, mediocris iste, sinister alter grandis: porro alius magnus, bifidus, ductu dextrorsum contrario ad venam portarum (*m*), alter maximus, multifidus, in eum ipsum pontem ivit: alium ad lobum SPIGELII misit, & tunc demum ductum venosum edidit (*n*).

Is nunc tumor pergit ad usque conjunctionem cum vena portarum & demum, qua sulcus transversus cum horizontali coit, inflexa vena

(*c*) TREW *Comm. Lit. Nor.* 1733. *tab.* 3. f. 2. FABRIC. f. 16. 18. 19. 20.

(*d*) *Comm. Nor.* 1737. *tab.* 1.

(*d**) Solent tamen vaginam dicere & a funiculo deducere BIANCHI *tab.* 2. 4. TREW *Comm. Nor. ann.* 1732. n. 13. *Falcem* dicit BARBAUT.

(*e*) JENTY t. 1. EUSTACH. t. 9. VESALIUS f.

(*f*) p. 351.

(*f**) Peritonæo non continetur HENSING *perit.* n. 13. 44. non bene.

(*g*) EUSTACH. *tab.* 27. f. 1. qui duos habet MORG. *Ep.* I. n. 25. CHESELDEN t. 34. FABRIC. *form. fet.* f. 16. 17. &c. TREW *de differ. fet.* f. 1. 56. BERTIN. p. 332. &c.

(*h*) Negarunt ex vena umbilicali ramos exire NIEDAM, TAUVRY p. 130. TREW p. 73. GUNZ *diff.* p. XVI. ALBIN. *explic. tab.* EUSTACH. p. 243. & 166. 167.

(*i*) Etiam Cl. BERTIN. majores esse sinistros p. 336.

(*k*) Numerosi rami CHESELD. FABRIC. f. 16. 17. 18. 19. 20. HARDER *apiar.* n. 8. HOBOKEN *secundin. vitul.* Habet & ill. TREW, sed alio refert & ad portarum venam, tum HEBERSTREIT f. 22. 23. 55. 56. Neque diffitetur GUNZIUS n. 13.

(*l*) p. 468.

(*m*) Recte eos ramos tuetur Cl. BERTRANDI p. 17. & imprimis BERTIN p. 332. seq. 335. 336. 337. 339. in ic. ccc. &c.

(*n*) Unum in fossa TREW *Comm. Nor.* 1733. D. unum ex sinu transverso d.

umbilicalis (*o*), cum venæ portarum sinistro ramo ita continuatur (*p*), ut is magis ad umbilicalem venam (*q*), quam ad eam pertinere videatur, quæ per portas advenit; cum & multo major sit, & umbilici venæ e directo in sinum transversum continuetur, vena vero portarum, vix ductu venoso major, impar sit tantis ramis producendis (*r*). Et omnino vena umbilicalis bifida videtur, ut alter ramus sit venæ portarum sinister truncus, alter venosus ductus (*s*). Utique vero nulli erunt venæ umbilicalis ad hepar rami, si excæcata parte eam finias. Nihil in ea vena valvulosi (*x*) est, & cera & aer utrumque iter facillime legit.

Sed e directo venæ umbilicalis, uti diximus, aut paulum ad latus dextrum (*x*^{*}), ex ipsa tamen vena umbilicali (*x*^{**}), educitur ramus præcipuus venæ umbilicalis, qui per fossam sibi paratam (*y*) *ductus venosi* (*z*) nomine, absque ramo, quem unquam viderim (*a*), paulum sinistrorsum, in cavam venam, jamjam hepar subituram, aut in venam hepaticam (*b*), quæ sit inter cavæ radices, patulus & paulum dilatatus (*c*), & proxime venam phrenicam, pene in istam, aperitur, ut angulum cum cava sursum acutum, deorsum obtusum faciat. Vidi in ostio suo, quo ad sinum venæ portarum patet, futura quasi transversa

(*o*) TREW *Comm.* l. c.

(*p*) *Tronc de réunion* BERTIN. p. 339. 341.

(*q*) BERTIN. toto libello.

(*r*) BERTIN. p. 342. seq. 358.

(*s*) *Icon.* TREW in *Comm. Nor.* 1733. l. c. BERTIN. p. 333. Bipertiri & altero ramo in sinum portarum inferi EUSTACH l. c. SPIGEL *form. fet.* L. II. c. 1. ARANTIUS *de fetu* p. 40. RIOLAN. &c. etiam FABRICIUS in *iconib.*

(*x*) Plicam pene circularem ad conjunctionem cum sinu venoso TREW. f. 1. Non multum ei tribuit p. 44.

(*x*^{*}) Ad dextram BIANCHI t. 2. 4.

(*x*^{**}) Ex vena portarum HEUERMAN. T. IV. t. 4. f. 3.

(*y*) TREW *Comm. Lit. Nor.* 1733. l. c.

(*z*) Inventor dicitur ARANTIUS *de fetu* p. 40. Sed manifeste habet EUSTACHIUS l. c. & eodem tempore descripsit VESALIUS *Exam. obss. fallop.* p. 90. b. 91.

(*a*) Habet GUNZ n. 13.

(*b*) Sic fere TREW *differ. fet.* f. 23. Etiam BERTIN. p. 334. & in ic. Add. FLURANT T. II. p. 124.

(*c*) Quadruplo GUNZ n. 13. *Ampoule* BERTIN. p. 334.

fuisse (*d*) terminatum, quæ esset in directione sinus venæ portarum. Etiam ad cavam venam simile quid Cl. Viri dixerunt (*e*). Vidi semel omnino ductum venosum nullum fuisse (*f*).

Addi debet, necessario, venam umbilicalem multo (*f*^{*}), quam venam ad portas majorem (*g*) esse. Duplo alias major mihi visa est, alias diametrum habuit 27. centes. cum vena portarum esset 20. quæ rationes lumina faciunt 729. & 400. In alio fuit 23. centesimar.

Deinde venosum ductum multis vicibus minorem (*h*) esse umbilicali vena, nimis est manifestum. Vidi ei ductui diametrum fuisse 11. Cent. cum vena umbilicalis esset 27. nempe ut lumen sextuplo minus esset (*i*): alias diameter ductui fuit 10. cent. cum umbilicalis vena esset 23. nempe lumen ductui quintuplo minus (*k*). Vidi diametrum fuisse 14. centes. cum venæ umbilicalis diameter esset 22. quæ rationes sunt 484. ad 156. ut venosus ductus subtripplus sit (*l*), Vidi ductum venosum æqualem venæ portarum (*m*), vidi multo majorem (*n*).

Quare, cum manifesti ex umbilicali rami in hepar veniant, atque multo minor sit ductus venosus, quam qui omnem sanguinem per eam venam adlatum avehat, dudum mihi visum est (*p*), in fetu umbilicalis venæ sanguinem, non per solum ductum venosum, sed utique

(*d*) Aliquid simile TREW f. 1. 18. 19. 64. Eperon dixit BERTIN. 333. Habet TAUVRV HUYBERS de valvulis n. 24. HESS. in *Specimine anat. botan* qui flatum morari vidit.

(*e*) TREW t. 1. f. 8. TAUVRV, CROESER p. 4. HUYBERS ibid. p. 44. [Non vidi. Negavit BESLEBUS veras esse valvulas p. 10.

(*f*) Etiam GUNZIUS *K. Svenska wetensk. Acad. Handling.* 1751. *Trim. I.* ejus loco ramum venæ portarum vidit, in hepar divisum.

(*f*^{*}) Ad venam portarum est uti 9. ad 4. BERTIN. p. 358.

(*g*) CHESELDEN TREW. p. 45. f. 1. 22. 23. 56. 73. 74. BERTIN. p. 339.

(*h*) TREW. *Comm. Lit.* i. c. Dimidio VESALIUS.

(*i*) 729. 121.

(*k*) 100. ad 529.

(*l*) Etiam variam rationem facit BERTIN. p. 334. 351. Sed tamen esse fere ad venam umbilicalem ut 2. 9. p. p. 358. Valde parvum pinxit EUSTACH. l. c. Quartæ parti sinus æqualem RIDLEY p. 200. Minorem TREW. f. 1. 23. 73. 74.

(*m*) Pene æqualem FABRICIUS f. 16. 17.

(*n*) Majorem IDEM f. 20.

(*p*) Ab anno 1738. M. Januar, inde de omento tab. 2. edita ann. 1742. deinde *Comm. in Præl. Boerh.* T. V. P. I. p. 310. edita anno 1744. *Physiol. prim. lin.* edit. 1747. n. 832. Eadem est sententia BERTINO *Mém. de l'Acad. des Scienc.* 1753. & apud ILL. SENAC. *tr. du Cœur* T. II. p. 70.

per hepaticos (*q*) pariter ramos, perque ejus visceris carnes in cavain venam venire. Et sanguinem a vena umbilicali per sinum transversum pergere, & per ramos sinus transversi etiam lobum anonyum, & SPIGELII adire. Et demum venam portarum in fetu, eas tantum dexteriores (*r*) venas hepatis replere, quibus pro sua diametro, suaque sanguinis copia sufficiat (*s*). Inde Cl. BERTINUS etiam partem lobi dextri a vena umbilicali ramos habere maluit (*t*). Quare, ut finiam, si bilis ex venis nascitur, si ductus bilarius radices habet a lobo sinistro, anonymo, & SPIGELIANO, etiam in fetu pars bilis a vena umbilici nascetur. Venæ vero utriusque sanguinem misceri, nemo negavit (*t**). Vena umbilicali hepar in fetu componi dudum dictum est (*u*).

§. X I I. *Vena umbilicalis in adulto.*

Et si nunc continuo, nihil porro ad venam umbilicalem venit, quando a partu de funiculo fetus solutus est, atque adeo ea tota penus sanguinis hepati subtrahitur, non ideo continuo vena umbilicalis clauditur, quam 21. die, & quadagesimo (*a*), mense sexto & septimo, octavo (*b*) apertam repererim, & in annua puella in hepate plenam, ad umbilicum inanem; demum septimo anno dimidiam cum ramis perviam, & sanguine plenam Cl. DUVERNEY (*b**) Aliquousque per vena portarum aliquot annis repleti (*b*†) alius Vir Cl.

Certum etiam videtur, sanguine plenam fuisse in hominibus annorum viginti (*c*), triginta (*d*), & triginta quinque (*d**), in quorum mul-

(*q*) Etiam TREW p. 46. RIDLEY, CHESELDEN. Eam copiam nimis parvam facit LEMERY *Mém. de l'Acad.* 1739. p. 155. Tres quartas BERTIN. p. 331. 355. Maximam partem non bene HEBENSTREIT *ven. communic.*

(*r*) Ita etiam BERTINUS p. 330.

(*s*) p. 483.

(*t*) p. 337.

(*t**) LEMERY *Mém de* 1739 p. 152. addito fine.

(*u*) Venam umbilicalem hepar facere GALEN. *form. fet.* HARVEY p. 62.

(*a*) Secundo mense ex umbilico sanguis HOECHSTETER.

(*b*) Jam crassior erat.

(*b**) t. II. p. 138.

(*b*†) VATER *musf. propr.* p. 58.

(*c*) DUVERNEY *oper. posth.* T. II. p. 138.

(*d*) *Eph. Nat. Cur. Cent. X. app. obs. 2.* Sanguine plena.

(*d**) Etiam COITER p. 117.

tis cum periculo sanguinem sponte (*e*), vel cum læderetur (*f*) effudit, ut menses etiam ea via fluerent (*g*). Denum in summo senio cavitatem suam retinuisse (*h*) exempla exstant. Tursioni, adulto, aperta (*h**).

Plerumque tamen inanita clauditur, ex compressione, ut puto, quam a musculis abdominis contra grande hepar, & contra diaphragma se contrahentibus intercepta patitur. Quare & ipsa excæcatur, & abit in quamdam ligamenti speciem, quæ *teretis* nomine innotuit (*h***), & sanguis in hepar porro unice per portarum venam advehitur. Qui ergo ejus visceris rami ab umbilicali vena sanguinem accipiebant, ii nunc a vena portarum replentur, & ejus sanguinem, pro umbilicali sanguine, nunc ad cavam venam convehunt. Et manifesto vidi collato pueri anniculi hepate cum femina non juvenis & cum suspensi viri jocinore, partem venæ umbilicalis, quæ est inter ostium magnorum ramorum (*i*), & inter ramum sinistram venæ portarum, apertam manere (*k*), & nunc esse ejus rami sinistri partem.

Ductus venosus inter lobum SPIGELII, & sinistram interceptus, in fossa perangusta ab eadem contractione hinc diaphragmatis, inde abdominis costarumque ad invicem accessione, juga hepatica ad se mutuo adprimente, sensim eliditur & inanitur, cum præterea vel recto sub angulo, vel etiam ad angulum acutum cum sinu venæ portarum cohæreat, & sub eo difficiliter sanguinem accipiat.

Ea etiam sede is ductus excæcari incipit, dum ad cavam apertus superest (*l*). Vidi in fetu 70. dierum (*l**) & in homine trigesimo anno eum ductum plenum (*m*) fuisse.

(*e*) HILDAN. *Cent. III. obs. 37.* RIDLEY *obs. p. 174.* ut videtur. LANZON *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 9. obs. 143. Comm. Lit. Nor. 1737. hebd. 6. Hist. de l'Acad. des Scienc. 1737. hist. 7.* Menstruatim in hexagenerio SCHURIG *hamatol. p. 293.*

(*f*) HILDAN. *Cent. I. obs. 53.* ubi funesta hæmorrhagia supervenit, cum umbilicus læderetur; tum in serenissima persona PLEMP in CABROLIUM *p. 90.*

(*g*) Cl. MIEG. ea ætate sanguine coacto plenam vidit, quæ singulis mensibus sanguinem sudaverat.

(*h*) In femina 96. annor COSCHWIZ *valv. ureter. p. 23.*

(*h**) HOFMAN *ven. portar. p. 7.*

(*h***) TYSON *p. 31.*

(*i*) *p. 480.*

(*k*) Etiam WEITBRECHT *syndesinol. p. 224.*

(*l*) Ita FANTON *diff. p. 239.* Vidi in puero 40. dierum.

(*l**) Undecima hebdomade clausus TREW *f. 39.*

(*m*) In puero 3 $\frac{1}{2}$. ann. apertus MOEBIUS *diff. a. 5.*

Quare in hepate non valde hactenus nota sanguinei circuitus fit commutatio, ut a funiculo primum finisteriores venæ sanguinem habeant, deinde a portis.

Eadem causa facit, ut hepar (o) in fetu maximum (p), post partum perpetuo minus fiat, breviusque, magna nunc parte ejus sanguinis intercepta privatum, qui in ejus carnes ante partum veniebat. Primus autem & magis diminuitur lobus sinister (p), qui sanguinem suum omnem a vena umbilicali habuerit, & ad quem sanguis venæ portarum longiori via perveniat, quam ad dextrum. Quinto (q) anno, aut ferius hepar ad eam magnitudinis suæ ad alia viscera rationem redit, quam in adulto conservat.

§. XIII. III. Vena portarum. Pars prior sive radices.

Vena ad portas (a) aut portarum, quam etiam portam possis ex RUFII (b) auctoritate vocare, cum vena umbilicali, ut alia multa, ita hoc habet commune, quod utraque & radices habeat & ramos, absque corde interposito. Illa quidem ex funiculo radices suas in unum truncum colligit ex quo porro sanguis per ramos decrecentes tamquam ex arteria per hepar dispergitur (c); & secundo per venosas radices denique ad cavam venam inferiorem, & ad cor revehitur. Ita portarum vena ex omnibus visceribus chyli elaborationi inservientibus, sanguinem, quem tres grandes arteriæ coeliaca, mesenterica & mesocolica advexerunt, una reducit, in truncum, qui per hepatis pariter sulcum singularis ad id viscus venit, pariterque in ramos decrecentes ramosque divisus, hactenus arteriæ similis, in venosas radículas suum sanguinem reddit quæ ad eam-

(o) BERTIN p. 363.

(p) GALEN *util. part.* L. XV. c. 6. PLATER. *quest. physiol.* p. 254. DIEMMERBROEK p. 227. VERHEYEN L. II. p. 377. COWPER ad *tab.* 62. &c.

(q) BERTIN. *ibid.* p. 364. Neque tamen arteriæ hepaticæ in fetu parvæ sunt; neque hepar informe *ibid.*

(r) COWPER l. c. BERTIN. p. 363.

(a) Επὶ πύλας GALENO *diff. ven. ἀπο τῶν πύλων* auctori HIPPOCRATICO de venit.

(b) I p. 39. Jecoris porta vena est.

(c) ORIBAS. f. 114. ARETEUS L. II. *Sign. acut.* c. 8.

Ergo vena portarum præcipuas habet radices mesentericam venam; gastrocolicam; colicam mediam; hæmorrhoidalem internam sive mesocolicam, splenicam: reliquæ parvæ sunt, ut gastrica minor, & cystica, duodenæ pancreaticæ.

Ramus posterior adscendens dat insignem ramum (*b*), qui circumit cavum arcum duodeni, cum arteria pancreatico duodenali: & pariter ad pancreas transversos aliosque ramos, & ad duodenum furculos radiatos mittit, & minores ad pylorum; eum tamen ramum circumlegentem cavum arcum duodeni vidi ex colico trunco venisse.

Eadem denique dextrorsum reflexa est vena *gastroepiploica dextra* (*k*),
cujus venæ ventriculares (*l*), & omentales (*m*), & anulus (*n*) cum
vena *gastroepiploica sinistra* factus arteriarum similes sunt.

(e) EUSTACH. l. c.

(g EUSTACH. t. 27. f. 2. 4. SALZMANN *de vena port.* p. 16. WINSLOW n. 244. seq.

(g*) EUSTACH. l. c. WINSLOW n. 246.

(h) Puto etiam EUSTACH.

(i) SALZMAN *ibid.* p. 54. WINSLOW n. 247. ad mesentericam refert.

(k) WINSLOW n. 245. conf. p. 154. & EUSTACH. l. c.

(1) p. 154.

(*m*) Ibid.

(n) EUSTACH. t. 27. f. 2.

Est ubi hæc gastroepiploica seorsim a colica nata in venam portarum se confert (o), supra colicam, sed id rarum est.

Post eam editam gastrocolicam venam, aliquando tamen prius, truncus mesentericus *colicam mediam* (p) recipit, sodalem arteriæ cognominis, quæ alias etiam ex hæmorrhoidæ nascitur (q). Est ubi tres recepit colicas, duas, quas diximus, tertiamque mediam (r). Etiam hæ colicæ pancreaticas alias ediderunt.

Inde porro truncus mesentericus ante duodenum (s) pone pancreas adscendit, recipit ibi ramos minores pancreaticos (t), numerosos, recipit etiam duodenales dextras, & sinistras (u), & illas inosculatas duodenis supremis, has reliquis intestinalibus (w).

Deinde, dum pone pancreas est, adrepentem circa originem jejuni intestini grandem venam habet, & accedentem sibi *colicam sinistram* (x), five hæmorrhoidæ, a crassis intestinis reducem, a recto, & a colo sinistro; quæ alias in splenicam (y), paulo tamen rarius, sanguinem suum effundit, aut in angulum (z) splenicæ cum trunco interceptum: vidi etiam duas fuisse. Ejus unicum ramum hic adduco, qui ex angulo cum splenica natus profunde (a) ad pancreas adscendit; dat mesocolo parvos ramos, & trans venam portarum arcum facit cum ramo venæ gastroepiploicæ. Omento furculos dedisse videtur (b).

Paulo post, in superiori nunc sede pancreatis sub duodeno tamen, recipit *splenicam* (c) venam paulo se ipsa minorem, quam alias dixi-

(o) VESAL. p. 444. SPIGEL. L. V. tab. 1.

(p) EUSTACH. f. 2. WINSLOW n. 243. SPIGEL L. V. t. 1. 2. SALZMAN p. 16. WALTHER II. p. 8. Tab. nostr. art. mesent.

(q) EUSTACH. f. 2. 4.

(r) SALZMAN p. 16. SPIGEL p. 149.

(s) WINSLOW n. 231.

(t) SALZMAN p. 17. WINSLOW n. 256. WALTHER p. IX.

(u) SALZMAN p. 17. BIANCHI WINSLOW n. 247.

(w) WINSLOW ibid.

(x) EUSTACH. l. c. f. 4. LEONCENA. GLISSON p. 113. RIOLAN. p. 113. BOHN. FABRICIO tribuit ramos ad renes euntes BARON. oper. mejend. p. 243.

(y) EUSTACH. t. 27. f. 2. SPIGEL tab. 1. L. VI. p. 150. MARCHETT l. c. pro pene perpetuo BOHN. p. 283. RHOD mant. n. 59. COWPER Phil. trans. n. 280. WALTHER p. X. WINSLOW n. 262. 233. BIANCHI. Ex ipso liene HEUERMAN p. 61.

(z) SALZMAN p. 15. & pene BIANCHI tab. 8. & WINSLOW n. 233. 262 MARCHETT l. c. & Phil. transf. n. 307.

(a) Duodenam WINSLOW n. 263.

(b) SALZMAN obs. p. 54.

(c) EUSTACH. t. 27. f. 2. 4. CASSER. L. VI. tab. 1. L. VESAL. L. III. c. 5. p. 444. CHESELD. tab. 18. f. 2.

mus (*d*), & in quam sanguis omenti sinisterioris, lienis, ventriculi sinisterioris & superioris se conjungit.

Et nunc transit pone duodenum primum vena nostra, & ad portas accedit, hinc lobulo SPIGELII, inde caudato lobulo terminata, sursum euns, paulumque tamen in eo sulco dexterior, qua in sede coronariam (*e*) minorem, a dexteriori posteriori parte ventriculi, habet insertam, & duodenam superiorem (*f*) sociam arteriæ (*g*), circa convexum duodeni arcum flexam, & pancreati pariter dantem, quæ ipsa alteram etiam retis venosi originem edit. Sed etiam nonnunquam cysticam (*h*) in truncum suum recipit, & minorem duodenalem venulam, quæ numerosis suis ramulis rete (*i*) facit, quo vena portarum, arteria hepatis & ductus bilarius obnubuntur; Dat etiam duodenam primam & ramos ad cysticas glandulas, & parvas pyloricas (*k*), & nonnunquam coronariam parvam, & cysticam. Etiam coronariam magnam eo loco dedit (*l*), &, quod non vidi (*m*), gastroepiploicam majorem.

Unicus nunc truncus est, grandis, tamen quam vena cava minor. In fetu, cui parva est (*m*^{*}), diametri fuerunt 15. & 24. cent. Etiam 20. cum vena cava inferior esset 37. In nuper nato infante vidi fuisse 37½. cent. cum arteria mesenterica fuisset 17. colica 11. coeliaca 13., & vena cava superior 40. nam ad cor neglexi metiri. In alio puero 7. mensium fuit vena portarum 32. cent. arteriæ hepaticæ 11. 9. & 7. In adulto homine fuit eadem 23. cum vena cava ad hepar esset 35. Alias fuit ad eam venam ut 48. ad 55., & ut 25. ad 35.

(*d*) p. 401. seq.

(*e*) EUSTACH. t. 27. f. 2. nam in f. 4. nullam habet. SPIGEL p. 149. WALTHER II. p. 4. qui pyloricam vocavit. BIANCHI t. 8. f. 2. r. Rarius esse WINSLOW n. 240. Pyloricam jam SPIGELIUS dixit.

(*f*) LEONCENA 6. VERHEYEN d. BIANCHI l. c. c. u. SALZMAN l. c. WALTHER p. 6. WINSLOW n. 234. 239. Primus dixit CALPENSIS *Isag.* p. 148.

(*g*) p. 431.

(*h*) Duas facit SALZMAN *vena port.* p. 15. Duas WINSLOW n. 336. Duas MARCHETT p. 41. Sunt cysticæ LOQUET. n. 4. Unicam ramosam habet SPIGEL p. 149. Unam BERTRANDI p. 15. 16. Unam VERHEYEN t. 39. f. 2.

(*i*) SALZMAN p. 5. & WALTHER p. 24.

(*k*) WINSLOW n. 234. 288.

(*l*) PARE L. II. c. 21. WALTHER p. V. SALZMAN ad HORST *ep.* p. 448. SPIGEL L. V. t. 1. N. BIANCHI. Ex sinu venæ portarum HUMMEL apud WENCKER *de vuln. ventric.* p. 15. Addit WALTHERUS, aliquando ex splenica oriri Verum ea pene constans ejus origo est, quam diximus.

(*m*) WALTHER p. IX. BIANCH. *d. inferius*

(*m*^{*}) RIDLET *obs.* p. 201.

Incedit autem in fasciculo vasorum hepaticorum posterior, occulta, tecta glandulis cysticis, & reticulo arteriolarum, atque venularum, tum arteriis & bilariis ductibus, omnibus utique major.

§. XIV. *Rami venæ portarum.*

Truncus venæ portarum integer est, dum portarum vallecule continetur. Eam ubi emensus est, in parte pene dexterrima sulci transversæ hepatis, in duos (a) perpetuo grandes ramos, nunquam in quinque (b), rarissime in tres (c) dividitur, quando duo sunt sinistri rami.

Ii rami ad maximum angulum a se invicem secedunt, ut sibi sint pene e directo (d), & truncus, perinde ut solent arteriæ, ad sedem divisionis paulum latefcere videatur (d*). *Dexter* aliquanto major (e), brevi spatio conspicuus est (f), cum sulcus transversus ad dextra ingredientis venæ portarum pene continuo finem sui faciat (g), & venæ, quæ per eum sulcum incesferant, hepatis carne operiantur. Recipit frequenter venam cysticam, quæ non facile duplex est visa, & a media fere vesicula advenit: etfi præter eam numerosæ sane venulæ ab hepate, ex ovali sulco, ad vesiculam adrepunt (i).

Cæterum duobus (k) fere magnis ramis, eorumque numerosis ramu-

(a) VESAL. *rad. chin.* p. 177. KERKRING. LIEUTAUD p. 301. GUNZ n. 5. p. 13. BERTRANDI p. 16. ALBIN. ad EUSTACH. p. 163.

(b) Quatuor, & quintus ad vesiculam AVICENNA p. 24. Quinque SPIGEL p. 148. GLISSON ad p. 293. CARP. *Ifag.* p. 14. WINSLOW n. 275.

(c) Tres constanter EUSTACH. t. 27. f. 1. 2. 4. Aliquando esse tres ALBIN. *ibid.* Earum duæ sunt sinistræ, quarum minor cum umbilicali connectitur, major sola sinistram lobum adit.

(d) Ita fere KERKRING.

(d*) ALBIN. ad EUSTACH. p. 161.

(e) WALTHER *progr.* 11.

(f) Nimis longus LEONCENÆ: & nimis parvus. Nimis longum etiam faciunt GLISSON ad p. 292. & BIANCHI l. c.

(g) add. GUNZ. p. 13. BERTRANDI, MORGAGN. n. 25. GARENGEOT *Splanchnolog.* T. I. p. 288. f. 3. Sexta pars mihi superesse videtur.

(h) Duplex VESAL. p. 623. Magnum esse ORIBAS. p. 122. Sed facile credo MASSA. qui non semper invenire potuit *introduc.* p. 26. Recte a portis esse, non a cava GALEACIUS *Comm. Acad. Bonon.* T. II. P. II. p. 337. LOCQUET. n. 4.

(i) Multas esse GUNZ. n. 10.

(k) KERKRING.

lis, per hepar dextrum totus dividitur. Vidi, cum accurate requirerem tres (*l*) fuisse, transversalem in fossam pone vesiculam felleam & lobum dextrum; anteriorem in lobum dextrum; posteriorem in confinia lobuli & lobi dextri (*m*).

Celebrior est *sinister venæ jecoris ramus*. Is enim majorem nactus fulci transversi longitudinem (*n*) eam replet, modice tectus ductibus bilariis, & arteriis, & eundo alias contractior (*n*^{*}) fit, in adulto, puto, alias latior ut in fetu. Ejus fulci longitudinem emensus, incurvatus (*o*), fossam umbilicalem subit, qua olim incurvus pariter truncus umbilicalis in ramum venæ portarum sinistram adveniebat. Vidi fuisse ejusmodi ramum in medium lobulum quem alias truncus dat; alium minorem ad fossam ductus venosi, & lobulum duos mediocres in lobum anonymum; ramos plusculos illos (*p*), quos dabat olim umbilicalis vena, in lobum anonymum & sinistram: in fossam transversam plusculos parvos; duos grandes in lobum sinistram: Vidi sinistram venæ portarum ramum coronariam minorem accepisse (*q*). Cæterum numerum (*q*^{*}) vix in eas, qui in aliis corporibus alius fit, multi tamen semper sunt rami.

Hi rami per carnem hepatis distributi (*r*), perinde, ut arteriæ, etiam ad superficiem veniunt, & de hepate exeunt per ligamentum suspensorium & sinistram (*s*); in peritonæum (*t*): & per ligamentum sinistram etiam in lienem (*u*); denique ut videtur, nam non vidi, ad ventriculum (*w*).

(*l*) GARENGEOT.

(*m*) Duos tantum habet GUNZ & subinde tres, duos KERKRING.

(*n*) TREW f. 73. 74. GARENGEOT, KERKRING.

(*n*^{*}) ALBIN. p. 162.

(*o*) p. 480. 481. add. MORGAGN. *Ep.* I. n. 25. & 75.

(*p*) GUNZ n. 5. p. 13.

(*q*) Dextrum SCHRADER *obs.* Dec. I. n. 7.

(*q*^{*}) Duos, tres magnos, multos minores, imprimis in fetu emitit ALBINUS *ibid.* p. 164.

(*r*) In iconibus KERKRINGII, GLISSONII CHESELDENII & aliorum. Vidit ARETÆUS *sign. acut.* L. II. c. 8.

(*s*) GUNZ n. 6. 7. f. 1. 2.

(*t*) GUNZ n. 8. FALLOP. p. 117. b. qui addit, descendere ad dorsum, & cum aliis venis a portis uniri, extra hepar natis.

(*u*) FALLOP. l. c. In fele, non in homine BERTRANDI p. 16.

(*w*) PAW. *obs.* 26.

(*x*) Flatum communicasse SCHRADER l. c. BERTRANDI p. 16. & venas septi transversæ cum venis ad portas anastomoses habuisse EUSTACH. *de renib.* p. 133. tum de vena brevi & diaphragmaticis RIOLANUS p. 115. Habet etiam cum venis ab azyga natis anastomolin. Negat DUVERNEY T. II. p. 223.

Ita cum ramis phrenicis ad azygam, adve. cavam venam pertinentibus (x), venæ ad portas anastomoses habent.

Etiam alibi id venarum systema, quod sanguinem ad portas revêhit, cum venis spermaticis per mesocolon dextrum & duodenum advenientibus & ad cæci intestini ligamentum (y), cum renalibus (z), cum hæmorrhoidæis porro mediis (a) & externis (b), cum uterinis aut vesicalibus (c) varie communicat, ut ex ordine alias dicemus. Parvæ vero sunt inosculationes, quales ubique inter vicinos trunculos locum habent. Vena portarum hætenus etiam arteriarum similis est, quod perinde de superficie hepatis injectum humorem aqueum exhalet (d).

§. XV. *Quæ vena portarum peculiaria habeat.*

Habet primo naturam, quam diximus, arteriosam, ob quam dudum ad arterias (a); hætenus relata fuit. Pariter enim, ut arteriæ, summa luminum ramorum hujus venæ lumen trunci vehementer superat, inque eadem ratione necesse est sanguinis portarum motum tardari ex iis, quæ alibi ostensa sunt (b).

Sed etiam ideo magis probabiliter cum arteriis conjungitur, quod insigni robore omnes alias venas corporis humani (c), & eo magis arterias una vena portarum superet. Accurata experimenta ostenderunt, venæ portarum tunicas, ad sanguineæ cylindri diametrum comparatas, minime

(y) BERTRANDI p. 15.

(z) Inter venam gastricam sinistram, & renalem sinistram, ramus est communicans SCHMIEDEL n. 19. A sinistra hæmorrhoidæam externam natam dicit BARTHOL. *Hist.* 32. C. I.

(a) *Comm. Boerh.* T. V. P. I. p. 409. *Fascic.* V. not. 17. *Fascic.* III. p. 50. *Fascic.* VIII. p. 37.

(b) *Fascic.* III. p. 50. *Fascic.* V. p. I. c. Nempe hæ cum mediis, mediæ cum internis.

(c) De femina STAHL & de vagina SCHMIEDEL *var. vas.* n. 15. Negat BERTRANDI p. 15. Sed vidi in *Fascic.* VIII. de arteriis. De venis vesicæ & vesicularum seminalium & penis admittit IDEM BERTR. p. 14. not. c. De utrisque *Fascic.* III. p. 50. *Fascic.* VIII p. 37.

(d) GUNZ n. 12. KAAW n. 562.

(a) PECQUET *dis. anat.* I. p. 32. LISTER *de cochl.* p. 101. BOERHAAVE *Prælect.* T. III. p. 182. Semiarteriam vocat BIANCHI p. 23.

(b) L. VI. p. 176. seqq.

(c) CLIFTON, WINTRINGHAM viri præstant. *enquiry* p. 204. 230.

crassas (*d*) esse: cum ea ratio sit in ove pene ut 23. ad 1. in cane ut 17. ad 15. Robur tamen cum ea tenuitate insigne conjungitur. In ove enim eadem vena tulit atmosphæras quinque & pressiohem libr. 139. unc. 10. & ultra (*e*), habetque robur computatum ad robur venæ cavæ ut 6. ad 5. (*f*) ad aortæ vero robur ut 7. ad 5. & paulo ultra (*g*). In cane eadem pene 6. atmosphæras tulit (*h*), & pressiohem 64. libr. & ultra (*i*), roburque habuit, ad aortam comparatum, iterum ut 7. ad 5 (*k*) ad cavam venam ut 3. ad 2 (*l*). Splenicam etiam venam superat in ratione pene 51. ad 10. five decupla (*m*) venam renalem vero in ratione 47. ad 10 (*n*).

Sed primarium, ut quidem creditum est, venæ ad portas privilegium, est in capsula propria, quam a GLISSONIO nominant (*o*), quem pro inventore habuerint: etsi *Johannes WALÆUS* (*p*) ejus paulo prior meminit, & posterior etiam WALÆO PECQUETUS (*q*) GLISSONIO antiquior. Nempe vena portarum multam cellulofam telam ex mesenterio & liene secum adfert. Præterea membrana flava lubrica: externa hepatis (*r*), a fulco transverso hepatis, & a fellis vesicula, ad duodenum & colon transit, & ejus pars, quæ est in fulco transverso, dicitur *omentum minus*, pars ad ejus dexteriores pertinet ad mesocolon (*s*). Cum ea sustentante membrana, & cum arteria hepatica (*t*), poroque bilario, vena portarum sustentatur plurimis filis cellulosis, longis, absque adipe, quibus ea vasa omnia inter se mutuo revinciuntur: & quam augment

(*d*) Tenuiores non bene GUNZ p. 10. Crassiores esse PECQUET. Duplicem habere tunnicam ut arteriæ GLISSON p. 233. BARTHOLIN. p. 132.

(*e*) 4. 98. p. 179.

(*f*) p. 180.

(*g*) Ut 14. 4. 1000. p. 181.

(*h*) 5. 73. p. 189.

(*i*) p. 190.

(*k*) Ut 1407. 1000. p. 191.

(*l*) Ut 1544. 1000.

(*m*) Ut 5187. ad 1000. p. 181.

(*n*) Ut 4751. 1000. *Exp.* 46.

(*o*) Jam anno 1542. etsi demum a 1654. liber prodiit *Anat. hep. c.* 28. 256.

(*p*) In *hist. ann.* 1640. edita cum SPIGELIO p. LXXXIV.

(*q*) *De sang. & bilis motu c.* 2. f. 32. Prodiit certe ann. 1650.

(*r*) *Tab. Oment. I.*

(*s*) GUNZ de *hep.* p. 7.

(*t*) PECHLIN. WINSLOW.

ramuli nervei (*u*) ramuli retis venosi, jam descripti (*w*); & ramuli arteriosi ab arteria hepatica nati & a duodenali, & vascula demum lymphatica (*x*). Ea omnia vasa, æque membranæ, inter se invicem colligatæ, cum cellulosa tela conjunguntur, quæ venæ portarum parietes constituit.

Similis porro cellulofitas, cum eodem omento minori, in sulco transverso venæ portarum, ramum dextrum & potissimum sinistrum cum biliaris vasis, cumque arteriis hepaticis conjungit. Similis etiam venam umbilicalem, ductumque venosum, ad suos sulcos religat. Ipsa etiam vesicula fellis (*y*) cellulosis fibris ad suum sulcum revincitur.

Sed etiam ramos venæ portarum, & arteriarum & biliariorum ductuum ejusdem naturæ cellulosa tela per hepar comitatur ad minima (*z*).

Ea porro cellulosa tela utique peculiare robur vasis hepaticis addit, cum venæ portarum rami dissecti non perinde concidant (*a*) & complacentur, ut aliæ venæ solent, sed arteriosa cum firmitate se sustineant, lumenque fervent circulare.

Ita hæc vere se habent, reliqua hypothesis addidit. Vaginam nempe arteriosæ (*b*) tunicæ proximam, debiliorem tamen, dixerunt, factam ex fibris carneis (*c*) intricatis.

Eam dixerunt venæ portarum, & ejus ramulis in ipso hepate, circumponi, cæterum pollere vi contractili (*d*) & ad cordis similitudinem pulsare, nihilo debilius quam aorta (*e*), non tamen eo pleno robo-

(*u*) Ob id rete fila mercurio plena in capsula GLISS. vidit VIEUSSENS *obs.* p. 156.

(*w*) p. 488. Habet VIEUSSENS *obs.* p. 133. HUBER *epist.* p. 23.

(*x*) VIEUSSENS l. c. & p. 157. Externam tunicam a peritonæo esse exsanguem; internam vasculosam, in qua sunt lymphatica LOQUET, n. 11.

(*y*) GLISSON p. 258.

(*z*) VIEUSSENS p. 134. Tenuis est intra jecur POZZI p. 71.

(*a*) Collabi WINSLOW n. 280. Sed sustineri vidi.

(*b*) GLISSON p. 257. 306. BURCHART *de bile* p. 53. GORTER *mot. vital.*

(*c*) GLISSON p. 257. WAINEWRIGTH *of the liver* p. 46.

(*d*) Musculum esse BELLINI *Prop.* 30.

(*e*) LISTER *hum.* p. 253.

re (*f*) quo cor. Alternis adeo vicibus laxari & adstringi (*g*), venisque largiri (*h*) robur adfine arterioso, bilemque propellere (*i*).

Quare cor abdominale (*k*) non pauci dixerunt partem venæ portarum, quam *sinum* (*l*) vocant, qui vel solus sinister (*m*) est ramus venæ portarum, vel cum continuato dextro (*m*^{*}). Id cor dixerunt sanguinis iter per universum hepar adjuvare, alioquin lentissimum futurum. Neque defuerunt, qui etiam nostro seculo carneam naturam ejus capsulæ restituere sunt conati (*n*).

Magna fuit hujus hypotheseos celebritas, unus tamen alterque auctorum hujus seculi pulsationem aut impugnavit (*o*), aut ad arterias retulit (*p*). G. COWPER (*q*) etiam de musculo capsulæ robore dubitare cepit, quem alii sunt secuti. Arteriæ munus ab ea removit SCHELHAMMER (*r*); fibrasque carneas parvi fecit (*s*). In fabrica non arteriosa & in pulsationis defectu adiutorem habet STAHLIUM (*t*) & parum ei tribuit ILL. MORGAGNUS (*u*). Primus tamen, ni fallor, FANTONUS (*w*), deinde AUGUSTINUS FRIDERICUS WALTHER (*x*) naturam cellulofam hujus textus detexit; quem & ipse secutus sum (*y*), & plurimi nuperorum (*z*).

Rubedinem, & fibras in cocto hepate facile ad arterias, venas, nervosque referas.

(*f*) GLISSON p. 387. NEEDHAM *form. fet.* c. 5. Pene pulsare SALZMANN *ven. port.* n. 6.

(*g*) Constringi a plexibus fibrosis STAHL. *obstrucl.* n. 35.

(*h*) GLISSON p. 233.

(*i*) DUVERNEY II. p. 236.

(*k*) NEEDHAM TIMMERMAN *lus. natur.* p. 24 BOERHAAVE *prælect.* T. III. p. 115.

(*l*) BOERHAAVE ut videtur.

(*m*) LIEUTAUD p. 301. Sed nullum esse sinum OVERKAMP *ven. port.* Esse ramum dilatatum VINK *van bloedvaten* p. 204.

(*m*^{*}) ALBIN. I. c. p. 161.

(*n*) POZZI p. 70. in cocta capsula fibras adparere p. 71.

(*o*) REVERHORST *circul. bil.* p. 13.

(*p*) WINSLOW n. 282.

(*q*) Ad BIDL. t. 75.

(*r*) *Analecl. anat.*

(*s*) *Physiolog.* p. CCVI.

(*t*) STAHL *ven. port. mal.* p. 9.

(*u*) *Advers.* III. p. 48.

(*w*) Nihil differre ab aliis arteriarum vaginis, & nihil in ea esse virium contractilium. FANTON. *anat.* p. 109. Ed. 1711.

(*x*) *De ven. port. progr. I.* Ad omentum refert GUNZ & HENSING *de periton.* n. 46. Non penitus recte. Nam fila vera cellulosa sunt, etiam ubi nullum omentum est, circa venam umbilicalem, inque sulco vesiculæ fellis.

(*y*) In *Comm. ad Boerh.* T. III. Ed. 1741.

(*z*) GUNZ; LIEUTAUD p. 299.

Denique, quod vena portarum valvulis careat (*a*), de natura arteriosa participare videtur.

In plerisque classibus animalium vena portarum reperitur, peculiaris nempe vena systematis chylopoietici, etiam in avibus (*b*) quadrupedibus amphibiiis (*c*), & frigidis (*d*).

§. X V I. *Sanguis venæ portarum.*

Magnum etiam venæ portarum privilegium est, quod sola venarum omnium succum aliquem separet de sanguine. Sed id quidem demonstratione indiget.

Hoc loco autem liceat de natura sanguinis quærere, quem ea vena ad hepar advenit. Credibile certe videtur, diversum esse a sanguine aliarum venarum. Eæ enim, ut ab uno viscere, & uno membro, sanguinem revehunt, ita videntur unius ejusdemque ingenii sanguinem continere. Non ita vena ad portas. Ea enim a diversissimis visceribus sanguinem revehit. Oleosum quidem ab omento & mesocolo, nam, etsi recipere MALPIGHII experimenta (*a*), certe tamen olei partem in sanguinem regredi necesse est fatearis: si autem regreditur, non alia ei oleo, præter venam ad portas, via patet. Est etiam in bile tanta vis adipis (*b*), ut non videatur superfutura ejus in vena materies, nisi per venam ad portas suscepta rediret, postquam certe arteriæ omnes, & potissimum omentales, mesocolicæ, & mesentericæ, tantum deposuerunt adipis.

Quin ex intestinis tamen mesentericæ venæ aquam, sed halitu putrescibili plenam, resorbeant, vix dubitari potest (*c*). Qui homo sæces fluidas percepto stimulo egere neglexerit, & curru vel equo vectus naturæ instinctum moratus fuerit, is post plussculas horas sæpe durissima egeret. Ea omnis aqua, quæ decessit his excrementis, ut durescerent, in crassis

(*a*) L. II. p. 144. Etsi vena portarum valvulas non habet, nimium tamen foret, fluxum & refluxum in ea vena admittere (ROBERT *petite verole* p. 63) cum vincula injecta veram venosam naturam ejus magni trunci demonstrent p. 499 & L. III. p. 213. Sed neque aliæ internæ venæ cerebri, pulmonis, renum, uteri, valvulis donantur. Mortorum effectum vitiosum non totum repudiaverim. Verum etiam in morbis venæ solent versus hepar intumescere.

(*b*) Struthione VALISNERI *oper.* T. I. p. 244. 245.

(*c*) Phoca SEVERIN. p. 32.

(*d*) In rana BERTRANDI p. 18.

(*a*) *De Oment.* p. 42.

(*b*) *Sect.* III. Etiam piscium hepata mero fiunt adipe.

(*c*) Dicitur L. XXIV.

intestinis vel potissimum, non per vasa lactea acescente plena chylo, sed per venas mesentericas ad sanguinem rediit: prægnans utique putredine, & fætidò halitu, quanta enim sit ejus ad febrem incitandam potentia, vel ex morbis adparet, in quibus continuo æstus sanguinis effervescit, quando alvus cessat, & subsidet idem postquam clystere eluta est ea quasi putridi humoris sentina.

Sic etiam vapor ille abdominalis, fætidus, pariter & volatilis, qui de omni superficie vivi animalis conspicuus halat, is omnis per venas resorbetur utique (*d*), & sanguini ad portas redituro se addit.

Quæ de lienalis sanguinis peculiari indole diximus, huc oportet revocare (*e*). Et de bilis ad hepar reditu alias etiam videbimus. Neque defunt, qui chylum ipsum venis mesentericis recipi viderint, & ipsum multo pingui fectum.

Quare in sanguine venæ portarum plus erit adipis, quam in ullo alio totius corporis cruore secretioni destinato. Eritque in eodem sanguine multum putrescibilis & subalcalescentis vaporis.

Nunc hæc omnia non videntur refutari posse, si per ipsas rerum causas refutare tentaveris. Num per experimenta vero sanguinis venarum ad portas convenientium peculiaris indoles perinde confirmetur, id est expendendum.

Chylo cinereo (*f*) misceri venarum mesentericarum cruorem, & ejus chyli strias in his ipsis venis vivo in animale ligatis conspici (*g*), cæterum diversa indole esse ab aliarum venarum sanguine, neque perinde cogi (*h*) lego.

In ipsis portis sanguinem amarum esse (*h*^{*}), inque vena portarum ligata, postque duas horas aperta, amarum adparuisse (*i*), fluidumque & mobilem (*k*) dilutum magis & quasi biliosum (*l*) alii auctores sunt. Utcunque hæc probabilia sunt, non ideo continuo sunt vera. Nempe

(*d*) p. 342. seq. Adtenuat sanguinem hepaticum KAAUW *perspir.* n. 623.

(*e*) p. 416. seqq.

(*f*) BERSIUS *Epist. diff.* p. 21. 22.

(*g*) JON. SWAMMERDAM not. ad. I. v. HORNE *prodr.* p. 28. 29. etiam GLISSON, cum casu vinculum prope hepar injecisset, *ventric. & intest.* p. 280.

(*h*) HELMONT *sextupl. digest.* n. 38.

(*h*^{*}) GLISSON p. 395. CORN. CONSENT. CLOS. PAPA *de humor.* p. 111. BIANCHI.

(*i*) FANTON. ad MORGAGN *Epist.* II. p. 209. LANCIS ad FANTON. p. 124.

(*k*) EX ILL. MEXELLI experimento *Mémoir. de l'Acad. de Berlin.* T. 12. p. 40. 41. HEUERMAN *Physiol.* T. III. p. 736. CLOS FASELIUS *de sang. ven. port.* p. 29.

sæpe ea est nostra infelicitas, ut experimenta negent confirmare, quæ tamen ex ipsis rerum causis necessario fluere videantur. Non quod ideo non vera sint, sed quod experientorum nondum satis captum sit; quod omnino capi non possit. Quare idem hic repeto, quod sæpe oportuit repetere, non me negare, quæ sensuum testimonia non confirmantur: tantum non recipere.

Ita quidem cinereum illum sanguinem venarum mesentericarum contraria experimenta magnorum virorum refellunt (*m*).

Sed neque admittunt illam majorem (*n*) fluiditatem, negatque BOHNIVS, difficilius hunc sanguinem cogi, eo quem ex jugularibus venis sumseris.

Et polypum solidum ramos venæ portarum replentem idoneus testis vidit (*n*). Minusque aquæ, plus vero olei & alcali habere, auctor existat (*o*). Neque in sanguine ad portas veniente magis consentitur, & omnino eum sanguinem negatur, quidquam a venæ cavæ (*p*) sanguine distare. Subsalsum alii & subdulcem vocant (*q*), sed ejusmodi est sanguis de quacunque vena sumtus. Nigrum esse alius VIR ILL. (*r*), ab amisso sero, ex quo non colligas fluiditate excellere.

Repetitis experimentis in sanguine venæ portarum sani animalis, ut vituli, hæc oportet definire, non uno, neque paucis. Si enim in viginti experimentis plus in eo sanguine fuerit aut aquæ, aut adipis, vix fallatur, qui perpetuo plus inesse pronunciaverit: semel si experimentum fecerit, poterit alia causa subesse.

(*l*) BOHL. *de lact viis* n. 49.

(*m*) STENONIUS apud BARTHOL. *Cent. III. Ep. 56. p. 228.* BOHN. *progymn. XIII. p. 195. ENT. p. 363.*

(*n*) CHESELD p. 165.

(*o*) HEUERMAN III. p. 736.

(*p*) HARVEI *circul. p. 142.* BARTHOL. *defens. in RIOL. p. 120.* NEEDHAM. *philos. trans. n. 85.* SLEGEL p. 82. STENONIUS l. c. BARTHOL. l. c. & *hepat. defunct. p. 84.* DIEMERBROEK p. 469. TAUVRV *med. rais. p. 47. 48. per experimenta.*

(*q*) FIZES *de liene p. 178.*

(*r*) SENAC. II. p. 90. Fuscum BARLETTE ad BARTH. *desp. hep. caus. f. 1.*

§. X V I I. *Vasa avehentia.*I. *Vena cava (a).*

Vena cava quando præteriit lobulum posteriorem (*b*) hepatis, tangit diaphragma, & per aptum sibi (*c*) foramen, in parte non contractili (*d*) tendinea interceptum, subit thoracem, & nunc est in auricula dextra. Homini enim, cui cor tota sua basi septo transverso infidet (*d†*), nulla est vena cava thoracica inferior, ut quidem bestiis, quarum cor solo mucrone id septum attingit. Sunt etiam duo alias foramina (*d**), quorum alterum est pro hepaticorum venarum altera (*d***).

In eo brevi per hepar itinere vena cava angustior est, quam sub hepate, versus renes, & sub ipso diaphragmate rami de hepate venosi in venam cavam subeunt, de lobulo multi, parvique, sex septem (*e*) Deinde de universo hepate grandes venæ, quæ sensim versus convexam hepatis partem coeunt, & in truncos duos (*f*), vel tres (*g*) colliguntur: eorum dexter maximus est, sinister minimus, & in lobulum aliquando tertius etiam sinistro major. Vidi alias sinistrum majorem fuisse. Hi trunci in cavam venam aperiuntur, etiam cum phrenica vena commissi. Est in tanta distantia a corde brevitate, ut tamen in ipso hominis pectore in cavam venam subierint (*h*).

Ad earum grandium venarum in cavam insertionem valvulas esse dictum dictum est. Id nunquam vidi & ægrè plicæ aliquæ adfuerint, aut exstantes limbi, quos obliqua insertio faciat, tot quot sunt venæ ad cavam tendentes, neque moraturi sanguinis quodlibet iter. Primas dixerat inter

(a) Altera vena ad convexa usque in spinam euns ARETÆUS *fig. acut.* II. c. 8.

(b) p. 470.

(c) L. VIII. p. 83.

(d) Ibid.

(d†) L. IV. p. 301. EUSTACH. t. 26 t. 16. f. 1. VESAL. *ic. art. venar.*

(d*) MORGAGN. *sed. caus.* II. p. 381. 491.

(d**) IDEM *ibid.* p. 387. *Epist.* I. n. 26.

(e) Habet EUSTACH. l. c. MORGAGN. l. c. VESAL. l. c. C. C. WINSLOW *Expos.* IV. p. 310.

(f) Habet EUSTACH. *tab.* 27. f. 1. VESAL. L. III. c. 6. p. 458. cum *ic.* GLISSON. *de hepate* p. 292. f. 1. 2. pene tres MORGAGN. *Epist.* I. n. 29. Conf. ARETÆUS l. c.

(g) MORGAGN. *Epist.* I. n. 26. BIANCHI *tab.* 3. KERHRING *tab.* 29. f. 2. KULMUS p. 89. WINSLOW IV. n. 309. VERDIER II. p. 98. etiam CASSBOHMUS, ut pro lobulo unicus truncus numeretur.

(h) MORGAGN. l. c. & de *sedib. & caus. morb.*

valvulas venofas *Jacobus SYLVIUS* (*i*), repetierunt plurimi (*k*), refutarunt dudum *Cl. Viri* (*l*).

Grandissimam eo loco esse venam cavam (*m*) & mereri nomen *lacus* (*n*) non tamen video, neque adeo multo majorem esse, quam est sub hepate.

Nunc, si de sanguinis itinere quæres, vena portarum suam penum tradit ramis venæ cavæ hepaticis, sic cordi. Nam & mesenterica vena (*o*), & splenica (*p*), & ipsa portarum (*q*) vena, vinculo injecto turgent ad id viscus, a quo adveniunt: & ad hepar, intercepto nunc sanguine, inaniantur. Sola vena cystica, cum nulla alia sanguinem ex vesicula fellea ad venam cavam ducat, necesse est sanguinem per ramos suos in truncum venæ portarum revehere. Eam etiam viam & facile quidem legit *hydrargyrus*, arteriæ hepaticæ injectus (*r*) & a vena portarum in cysticam (*s*) subire (*t*) negatur. Mihi, quoties venam portarum sebo repleveram vena cystica semper repleta est.

Porro aer (*u*) aquosus humor (*w*), *hydrargyrus* (*x*), cera (*y*), facile & expedite exportarum vena in cavam transeunt; &, nam oportet

(*i*) *Isag. anat.* c. 4.

(*k*) *VESAL* l. 3. c. 5. f. 13. *BARTHOLINUS anat.* p. 137. *REISEL Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann.* 9. 10. *obs.* 141. *WINSLOW* l. c. *WINTRINGHAM* p. 221. *FOURNIER*. In vacca barbarica *PARISINI*.

(*l*) *KEMPER de valv.* p. 29. *FABRICIUS ostiol. tab.* 3. *RIOLANUS*. p. 346. *ILL. SENAC.* conf. *L. H.* p. 143.

(*m*) *WINTRINGHAM* p. 234.

(*n*) Lacum superiorem inter hepar & cor dixerat *FOURNIER anat. pacifq.* p. 13.

(*o*) Conf. *L. III.* p. 213.

(*p*) *Ibid.*

(*q*) *Ibid.* *PECQUET. diff. anat.* I. p. 32.

(*r*) *VIEUSSENS obs.* p. 203.

(*s*) *I. F. ORTLOB cholep. negot.*

(*t*) *Idem de venis membrana externæ adnotat LOQUET n. 7. quod nunc experimentum non possum iterare.*

(*u*) *VESAL.* p. 443. *RIOLANUS anat. pneum.* p. 168. *BACK. de corde* p. 168. *BARBETTE* p. 27. *GALEACIUS Comm. Bonon. T. II. P. II.* p. 334.

(*w*) *BERGER nat. hum.* p. 211. *MARCHETT* apud *des NOUES* p. 19. *FRANCKEN de hepate* p. 19. *BARBETTE HEUERMAN III.* p. 728. *GLISSON* p. 287. *LISCHWIZ. THRUSTON resp.* p. 115. *ORTLOB n. II.* *COWPER ad t.* 38. f. 2. *MURALT vadem.* p. 99. *ROEDERER* apud *SCHEEL de hepate* p. 16.

(*x*) Prius quam ductum biliarium *VIEUSSENSII obs.* p. 156. 129.

(*y*) *RUYSCH.* apud *BOERHAAVE de fabr. gland.* *SCHACHER administr. anat.* p. 31. de cera.

fateri vicissim per venam cavam in truncum portarum regurgitant (z). Et tanta est experimenti facilitas, ut COWPERUS ob eam rem laxiores esse & ampliores in hepate quam alibi anastomoses (a) concluderit (b). An eadem fuit causa, cur LAURENTIUS (c) & PICCOLHOMINEUS (d), enormes inter cavam & portarum venas anastomoses pinxerint, quas feverius judicium refutaret (e).

Si ergo sanguis venæ portarum in hepar fluit, si ab hepate aperta in venam cavam via est, non oportet dubitare, eum de hepate sanguinem in venam cavam & cor venire.

Sed etiam arteria hepatica sanguinem suum venæ cavæ reddit. Nam in ramos quidem minores ex arteriosa indole sanguinem suum dividit, & ex ea arteria in cavam impulsæ aquei humores (f) penetrant, & hydrargyrus (g), & cera (h).

Comparata humorum adducentium mole cum revehentibus: reperitur plures (i) omnino & grandiores ramos venæ portarum esse & quemque ramum magis ramosum (k), & majorem adeo partem hepatis ad venam portarum pertinere, minorem ad cavam venam (l), etsi aliter Cl. Viri senserunt.

Minores adeo & pauciores rami sunt venæ cavæ quam venas ad portas. Illos majorem partem globi hepatis tenere, hos cavi probabile est (n), etsi & ad gibbam sedem a vena portarum, & ad finem a cava ramos venire

(z) In cysticum GALEACIUS *Comm. Bonon.* l. c. VIEUSSENS *obs.* p. 129.

(a) Continuationem ramorum venæ portarum cum ramis venæ cavæ GLISSON habet p. 222. 246. 274. & RUYSCH. *Thef.* VI. n. 82.

(b) Ad t. 38. f. 5.

(c) p. 231. f. 1. C. BAUHIN. *theatr.* p. 151. t. 35. f. 4.

(d) *Præleſt.* p. 117.

(e) BARTHOL. p. 591.

(f) COWPER l. c. ORTLOB l. c. n. 9. VIEUSSENS *tr. de liq.* p. 354. HALES *hæmaphys.* Faciliorem, quam a vena portarum viam esse BIANCHI p. 144.

(g) VIEUSSENS. *obs.* p. 115.

(h) ALBIN. apud VISSCHER *de cholepoies.* n. 16.

(i) Triplo SPIGEL p. 235. add. RIOLAN. in SLEGEL p. 302. J. v. HORNE ad *Mitrocossin.* p. 69.

(k) BARTHOL. p. 132.

(l) RUYSCH *Thef.* II. *aff.* 3. n. 1. *Thef.* V. n. 17. *Thef.* VI. f. 3. 4.

(m) MALPIGHIUS *de hep.* p. 61. nuper natis usus animalibus, quibus vena portarum exigua est; GLISSONIUS qui pauciores cavæ ramos videri scripsit, quod essent ampliores, quod teneriores forent, quod facilius abrumperentur, cæterum summam luminum æqualem fecit p. 219. 233.

(n) SPIGEL p. 161. C. BAUHIN. l. c. Hinc durior pars gibba CARP. ad MUNDIN. p. EXLII. Negat GLISSONIUS. p. 226.

non negatur (o). Idem venæ cavæ rami extra cellulofum ramorum ad portas tendentium textum pofiti, folitarii, angulos cum ramis venæ portarum magnos faciunt, & pene rectos.

Quare, cum venæ cavæ radices folæ, & arteriæ non minimæ & venæ fe ipfa majoris, fanguinem revehant, manifeflum argumentum eft, celeriore in ea vena, quam in portarum venis fanguinis motum eſſe; atque adeo vi derivationis fanguinem ex hepate reſſuum accelerari.

Neque immerito, cum ex legibus dudum dictis fanguis venæ portarum tantum de ſua celeritate amittat (p), quanto majus eſt ramorum ſimul ſumtorum lumen trunci lumine. Et viciffim vena cava tantum celeritatis ſui fanguinis incrementum (q) adquirit, quanto lumen venæ cavæ diaphragmaticæ minus eſt conjunctis ramorum hepaticorum luminibus, quibus oportet addi venam cavam renalem.

Ita fit, ut venæ portarum fanguis lentius motus (r), majorem partem hepatis occupet, cum per motum in vena cava acceleratum anguſtiora vaſa ſufficere poſſint.

§. XVIII. II. Vaſa lymphatica.

Hæc vaſa in hepate adeo promta (a) ſunt viſu, ut eo ipſo in viſcere, inque portis, primum a FALLOPIO (b) ſint detecta, viſa deinde ab ASELLIO & a VESLINGIO (c): ſed etiam Jacobi de BACK (d) vaſ lacteum in hepate viſum huc pertinet, & TILEMANNI filamenta quæ ſtilum reciperent (e). Etiam in hepate vaſa pellucida PECQUETUS vidit & RUDBEKIUS. Eorum hiftoriam ita dividimus, ut cavi primum hepatis vaſcula lymphatica deſcribamus, deinde gibbi.

(o) GLISSON p. 222.

(p) L. VI p. 176.

(q) Ibid. p. 344.

(r) QUESNAI *Eſſ. ſur l'Oecon.* p. 234. 235. Sed de ea re uberius.

(a) Hoc loco magis conſpicua BARTHOL. *lymph.* p. 18.

(b) *De venis obſ.* 3.

(c) *In Epiſt. poſth.* multis locis & vide not.

(d) p. 106.

(e) TILEMANNUSCOUS p. 15.

Oriuntur in ipso cavo hepate, undique ex intima carne (*f*), ut tamen intra hepar difficilior ostendantur (*g*).

Repunt sub membrana hepatis exteriori (*b*); in qua undique apparent in cellulosis cæruleis lineis (*i*), quas alias dicemus: internuntur capsulæ GLISSONII, ut in ea non contineantur (*k*): & demum ex sulcis hepatis cum vasis rubris prodeunt (*l*).

Abeunt in fasciculum vasorum numerosorum, qui adit glandulas conglobati generis (*m*) quæ in fasciculum vasorum hepaticorum per portas (*n*) euntium se immiscunt, & vesiculæ felleæ (*n**) cervici etiam adfident. In cane (*o*) & in capra manifestum plexum pellucidum vidi, in gazella PARISINI, alii in aliis animalibus (*p*).

Eadem trans pancreas arteriam mesentericam ad aortam usque (*q*) sequuntur, & uno (*r*) pluribusve ductibus (*s*), inferuntur vesiculæ chyli (*t*), ductuive thoracico (*u*), commista cum vasis lacteis secundi generis (*w*), aut supra eadem (*x*).

(*f*) *Hist. de l'Acad.* 1721. p. 30 in hydropico. in centro hepatis morbofi DEIDIER *Physiol.* p. 41. 42. *Consult.* T. III. p. 122.

(*g*) WINSLOW GLISSON p. 269. Ex celluloso rete externo nascire VIEUSSENS *obs.* p. 167.

(*h*) REVENHORST T. I. f. 2. WINSLOW n. 289. BIANCHI t. 3.

(*i*) Ipsas lineas esse lymphaticas PETSCHÉ n. 83.

(*k*) VERDIER II. p. 99. BIANCHI p. 20. *tab.* 3. &c. Plexum in ea fuisse HEUERMAN III. p. 718. Tamen in membrana, quam vocat internam capsulæ, lymphaticas ponit LOQUET. n. 11.

(*l*) ASELL. f. 4. BIANCHI

(*m*) HEISTER *Compend.* T. II. n. 29. GLISSON p. 315. BRUNNER *pancr.* p. 82.

(*n*) C. ASELLIUS *de lact.* f. 2. 3. & imprimis PECQUET *exper. nov. anat.* p. 116. T. BARTHOLIN. *vas. lymphatic.* p. 16. 18. *Cent. II. Ep.* 19. *lact. thorac.* p. 48. *lymph. hum.* 1. 17. VESLING *syntagm. anat.* c. 8. t. 2. a. a. a. RUYSCH *de valv. lymph.* f. 2. RUDBECK *duct. hep. aquos.* t. 1. HIGHMOR p. 50. BIANCHI *tab.* 3.

(*n**) VIEUSSENS *obs.* p. 169.

(*o*) HARDER *apiar.* p. 20.

(*p*) In echino SEGER apud BLAS *anat. anim.* p. 83.

(*q*) GLISSON p. 268. 417.

(*r*) ZELLER *admin. vas. limph.* c. 1. MURALT p. 43. BLAS *anat. can.* p. 199.

(*s*) RUDBECK. RUYSCH. NUCK. p. 144. REVENHORST.

(*t*) RUDBECK *ibid.* PECQUET. GLISSON p. 457. BARTHOL. *lact. thorac.* p. 21. & *Amstel. damenses observ.* p. 35. Id glandulam vicinam BIANCHI t. 3.

(*u*) In ductum thoracicum HEUERMAN III. p. 719.

(*w*) RUDBECK p. 270. SWAMMERDAM *Act. Hafn. II. obs.* 97.

(*x*) HENNINGER *de mesenter.* n. 13.

Vasa lymphatica vesiculæ felleæ (*y*), sub ejus tunica externa repunt, vel ab ea ipsa, vel a vicino hepate (*a*), aorta, pauciora; sequuntur iter ductus cystici (*b*) & bilarii pori, conveniunt cum priori fasciculo ad portas (*c*) & una cisternam adeunt (*d*).

Convexi hepatis vasa lymphatica sub membrana externa (*c*) uberrima repunt, absque valvulis (*f*) ramorum minorum: dum se in suos truncos colligunt (*g*) equidem valvulosa. Eadem in ligamentum suspensorium (*h*) eunt, & inter ejus laminas adparent (*i*).

Finis nondum satis notus est. Per intervallum triangulare septi in thoracem adscendere (*k*) Clar. Viri. Alii ad glandulas venæ cavæ inpositas ducunt (*l*) sub diaphragmate, hinc in cisternam (*m*): alii in cavam ipsam (*n*). Sed hæc tota aquosorum vasculorum historia hætenus in fragmentis substitit.

Revehentium vasorum genus esse lymphatica, & aliunde adparet, & quod tenuis liquor, ipseque aer, ex vena portarum (*o*) in ea vasa subeat, non facillime, sed subeat tamen: sed etiam ab arteria (*p*) hepatica aer in ea vasa transit, & oleum terebinthinæ rubrum.

(*y*) BARTHOLIN. *anat.* p. 151. *Epist.* 88. *Cent.* III. *lymphat.* p. 18. 32. RUDBECK. *ibid.* REVERHORST, t. 1. f. 2. t. 2. f. 4. COURTIAL *Journ. des sav.* 1688. n. 24. in cane: VIEUSSSENS *obf.* p. 204. HEUERMAN. BIDLOO t. 37. f. 2. BIANCHI *tab.* 3. GLISSON. p. 268. KERKRING *obf.* 5.

(*a*) NUCK. *Epist.* p. 145.

(*b*) COURTIAL, BIANCHI.

(*c*) REVERHORST.

(*d*) HEUERMAN III. p. 719.

(*e*) HEUERMAN p. 718. VIEUSSSENS p. 130. SCHMIEDEL in proprio *progr.* RUYSCH *Epist.* V. 21. *tab.* 6. WINSLOW n. 284. REVERHORST t. 1. f. BIANCHI T. I.

(*f*) SCHMIEDEL GUNZ n. XI.

(*g*) SCHMIEDEL *ibid.*

(*h*) RUDBECK, t. 4. RUYSCH, t. 5. f. 5. BIANCHI HEUERMAN T. III. p. 719.

(*i*) LOQUET n. 8. CASSEBOHM. *posth.* &c.

(*k*) ESCMENBACH p. 672.

(*l*) TARIN. *anthropol.* II. p. 149.

(*m*) PETSCHKE n. 83.

(*n*) REVERHORST p. 17.

(*o*) LOQUET n. 7. VIEUSSSENS p. 169. & 130. WINSLOW in scholis M. S. quas mecum communicavit Cl. D. SCHOBINGERUS auctor *disp. de fistula lacrymali.*

(*p*) GOWPER ad n. 38. f. 2.

Etiam vinculum venosis truncis rubris circumjectum, quo una lymphatica vasa (*q*) comprehenduntur, iter ejus fucci ostendit, denique & valvularum ductus rem totam declarat (*r*). Sola maceratione MALPIGHIUS utebatur (*s*) ut ea vascula ostenderet, ut credas etiam a morte aquam conbibere.

§. XIX. III. Ductus bilarii in universum.

Priora vasorum genera hepar cum toto corpore humano communia habet, hæc sibi propria. Nullum est animal, cui hepar sit, & quod ejusmodi ductibus careat (*a*), neque viscus haberetur pro hepate, si biliaris ductibus careret, etiam in cochlearum (*b*) genere.

In homine quidem undique de (*c*) hepatis ambitu, & de ipsis per nuperiora experimenta ligamentis (*d*), adveniunt radiculae biliaræ, quæ etiam ex intimis hepatis ubique natæ, in trunculos sensim majores ad venarum modum conflunt, comites venæ portarum, & pariter cellulosa tela (*e*) comprehensæ, ut denique fere duo (*f*) trunci sint, dexter & sinister.

Vidi ramum de lobulo exiisse; alium anteriorem sinistrum ex fossa umbilicali venisse; alterum posteriorem majorem ex fossa ductus venosi & sinistro lobo accessisse, eos in unum confluisse. Vidi alias sinistrum truncum ductus bilarii confluisse ex ramo lobi anonymi, ramo lobi sinistri, in extrema fossa transversa, ramoque ductus venosi. Deinde alium de lobulo advenisse; & alium ramo majori ante vesiculam etiam anteriorem, alio minori posteriori pone vesiculam in ramum dextrum coivisse. Vidi etiam quatuor ramos fuisse, dextros duos, totidem sinistros;

(*q*) RUDBECK *vasf. hep. aquosf.* c. 5. p. 294. DRELINCOURT *canicid.* II. DIEMERBROEK L. I. c. 13. BARTHOLIN. *nov. vasf. lymph.* c. 3. p. 220, edit. HAMSTERHUS. BIANCHI p. 921.

(*r*) Ic. RUYSCH.

(*s*) *Gland. conglob.* p. 3.

(*a*) Nisi forte molam excipias, cui negat. Vir ILL. esse ductum hepaticum *Comm. Bonon.* T. III. p. 333.

(*b*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 123.

(*c*) BIANCHI t. 5.

(*d*) FERREIN l. c.

(*e*) WINSLOW n° 315. 277.

(*f*) GLISSON. p. 255, ic.

vidi tres (*g*). Plerumque certe prius conjunguntur, quam ductus cysticus accedat, aliquando tamen aliquis prior in cysticum aperitur. In animalibus id frequens est, ut tres quatuorve ex hepate ductus se cum cystico jungant, ut in cane (*b*), echino (*i*), tigride (*h*), catopardo (*l*), lutra (*m*), urso (*n*), fele (*o*), putorio (*p*), porcello guineensi (*q*), hystrice (*q***), glire (*q†*) fimio (*r*), mele (*r†*), etiam in lacerto, torpedine (*r**). Alias rarius aliquis hepaticus in choledochum ductum sub concursum cystici se inmittit (*s*).

Exeunt adeo de hepate, fodales venarum (*t*), numeroque pares, perque sulcum transversum (*u*), in ipso trunco venæ sinistro fere medio coeunt, qua sede bilarius ductus latefcit (*w*).

Denique in unum conflunt *ductum hepaticum bilarium*, aut *choledochum*, nam & olim ita dictus est, & qui nunc ita vocatur communis ductus; is vero cum hepatico continuatur (*x*), tantum ut eo major sit (*y*).

Communis nunc truncus bilarius in trunco etiam venæ portarum ma-

(*g*) Ita fere BIANCHI l. c.
 (*h*) HARDER *apiar. obs.* 20. tres, & tres etiam apud WEPFER (*i*) p. 201. aliquot apud SCHRADER p. 19. Add. BLAS *anat.* p. 65.
 (*i*) Multi ductus hepatici cystico uniuntur. Duo CALDESI t. 5. f. g.
 (*k*) BLAS t. 31. PARIS. Quatuor CALDESI *tab.* 5. f. 2.
 (*l*) Duo DUVERNOI *Commen. Petr.* l. 1.
 (*m*) LORENZINI p. 23. 24.
 (*n*) Quatuor *Comm. Litt. Nor.* 1734. n. 30.
 (*o*) SCHRADER p. 14.
 (*p*) CALDESI t. 5. f. 6.
 (*q*) Duo hepatici CALDESI t. 5. f. 10.
 (*q***) IDEM. *ibid.*
 (*q†*) IDEM *ibid.*
 (*r*) PARIS.
 (*r†*) Quatuor CALDESI t. 5. f. 7.
 (*r**) Unus hepaticus cum cystico conjungitur, reliqui duo inter se LORENZINI p. 22. *tab.* 2.
 (*s*) In vipera MORGAGN. *adp.* III. p. 54.
 (*t*) Tot ramos quot venæ portarum ramos habet SWAMMERDAM *prodr.* p. 40.
 (*u*) GLISSON *ic.* p. 255.
 (*w*) IDEM *ibid.*
 (*x*) Cum cystico WINSLOW n. 303. DISDIER *franchinolog.* p. 174.
 (*y*) PECHLIN *purg.* p. 500. Conf. CHESLIDEN *tab.* 25. GLISSON l. c.

nifestus, dexterior (*z*) quam arteria, venæ parallelus (*a*) & plexu celluloso, five capsula irretitus, adparet, perque portas exit; inde ad pancreas tendit ea sede duodeno circumfusum, à vena portarum recedit, & porro dextrorsum, retrorsum descendens, aliqua parte pancreatis, per fescuncem (*b*) tectus, ad posteriora duodeni, inter laminas mesocoli, cum ductu pancreatico coit, & eodem sinu in ejus intestini aliqua eminente ruga aperitur (*c*). Longo spatio, quo cum ductu pancreatico unitus est, inter membranas intestini intercipitur aliquanto minus quam uncia. Sunt qui duo viderint ostia, bifidumque (*d*) ductum, quale quid mihi quidem non occurrit.

In ventriculum aperitur in multis piscibus (*e*), aut certe proxime sub (*f*) stomacho, nonnunquam etiam in homine (*g*), si fides est auctoribus.

In colon terminatum fuisse (*g**), aut ductum ab hepate ad renes tendisse (*g***), nuperior industria non confirmavit.

Natura biliariorum ductuum peculiaris est, nisi vesiculæ feminales aliquid haberent simile. Exterior nempe membrana stricta fit ex tela cellulosa robusta, & crassa (*h*).

Sequitur textus cellulosus laxus & inflabilis, in quo vascula arteriosa repunt (*i*): tunc nervea tunica, cum villosa superinducta, ex intestino continuata utraque, hæc eleganter reticulata, jugis teneris (*k*) va-

(*z*) EUSTACH. t. 10. f. 2. *ic. art. cæl. I.*

(*a*) EUSTACH. *ibid. ic. art. cæl. ibid.*

(*b*) EUSTACH. *tab. 10. f. 3.*

(*c*) Conf. p. 437. 438.

(*d*) ORIBAS p. 116. JASOLIN. Sæpe se reperisse VATER *de divert.* p. 25. BARTHOLIN. p. 153. BLAS *part. IV. obs. 11.* Duplex undique hepaticus BARTHOLIN. *anat.* p. 153. Duo sunt struthioni DUVERN. II. p. 543. Bifidus in gallo africano STENON. *gland. f. 40.*

(*e*) Anguillæ CALDESI t. 5. f. 11. cyprino PETIT. Conf. L. XIX. p. 308.

(*f*) Simiæ PARIS. hystrici IID. cuniculo HARTMAN *de bile erinaceo ib.* Alter struthionis porus DUVERNEY T. II. p. 547. Duo psittaci COLLINS t. 23. Xiphiæ HARTMAN.

(*g*) In pylorum GALEN. *art. med.* p. 89. Conf. L. XIX. p. 308. 309. Uncia a pyloro RIDLEY *obs.* p. 220. GIERING *Select. Francf. T. III. p. 359.*

(*g**) BARTHOLINUS ex SEVERINO p. 155.

(*g***) MARCHETT *Journ. Sav.* 1682. n. 15.

(*h*) Crassioremem quam venæ portarum BARTHOL. p. 332.

(*i*) LOQUET n. 14.

(*k*) BIANCHI *tab. 5. tab. 7. f. 1. add.* MORGAGN. *Epist. I. n. 52.*

rio ductu intricatis & interceptis scrobibus (*l*) fossulisque , in quibus sunt , qui cryptas se vidisse persuadeantur (*m*). Valvulam in hepatico ductu nullam vidi (*n*).

Musculosa fabrica obscura est ; irritabilitas ad venena (*o*) aliqua , ad ferri aciem nulla (*p*), neque certus motus. In animale tamen viderunt Cl. Viri (*q*), ab ea vi bilem promoveri (*r*), & in bove fibras motrices (*s*) fuisse , & introsusceptionem , quam credas absque aliquo peristaltico motu oriri (*t*) non posse.

Valde dilatabilis est , & ad magnam molem (*u*) distenditur , digiti capax (*w*), & pollicis (*x*), & vena portarum tandem aliquando latior (*y*) fuit , etiam duplo (*z*).

Acriter sentire credas ob dolores acerrimos , quos ægri patiuntur , quibus calculus bilarius major per eum ductum ad intestinum migrat (*c*). Inde delirium (*d*), & feminæ fuerunt , quæ minus acres parturientium dolores putarent (*e*).

(*l*) BERTRANDI p. 28.

(*m*) *Journ. Sav.* 1688. n. 24. BIANCHI ic cit. MALPIGHI *de liene* p. 120. HUBER *Phil. transf.* n. 492. COURTIAL. DUVERNEY II. p. 219. Credit ita se habere LOQUET. n. 15. Negat BERTRANDI p. 25.

(*n*) Habet copiosas JUSTUS VESTI *obsf.* 1. in hepatico. Negat PLEMP *fundam.* p. 132.

(*o*) ZIMMERMAN p. 46. *Exp. nostr. in oper. minor.* I. n. 266.

(*p*) Transversas fibras habet GLISSON p. 134.

(*q*) FOELIX *Exp.* 6.

(*r*) In columba FANTON. *diff. anat.* p. 262.

(*s*) LOQUET n. 15.

(*t*) BLAS L II. *obsf.* 3. MEKERN. *obsf.*

(*u*) BOEHMER *præf. ad obsf. fascic.* p. 18. du HAMEL p. 264.

(*w*) *Phil. transf.* n. 282. in icterico. MORG. *Sed.* II p. 187. Duplo solito latior PETZOLD *cholel.*

(*x*) BIANCHI *tab.* 6.

(*y*) JENTY *Course of anatomy* T. II. p. 129.

(*z*) LOQUET n. 15. In saccum dilatatus *Opusc. Bonon.* T. IV. p. 35.

(*c*) VIEUSSENS *obsf.* SCHURIG *lithol.* p. 239. LORRY *Journ. de med.* 1756. nov.

(*d*) COE *bil. concr.* p. 149.

(*e*) p. 150.

(*a*) MURALT p. 99.

(*b*) LISCHWIZ *de princip. venar.* p. 32.

(*c*) BOERHAAVE *de fabric. gland.* p. 36. FRANKEN *de hepate* p. 19. HEUILMAN T. III. p. 728. OVERKAMP *vena port.* n. 55.

(*d*) VIEUSSENS *obsf.* p. 129. 155. 156.

(*e*) GALEACIUS l. c. p. 334.

§. XX. *Humorum per eum ductum iter.*

Iter ad intestinum alio loco rectius confirmabimus; sed reductorii vasis genus esse, quem descripsimus, ductum, adparet ex transitu humorum tenuiorum, ex vena portarum, exque arteria hepatica, qui in ductus bilarii radículas transeunt.

Ex illa quidem vena humor tenuis (a), & spiritus vini (b), & ceracea materies (c) & hydrargyrus (d), & aer (e), in ductus bilarios transiverunt: ut sæpe vidi. Etsi sunt qui difficilius (f), & aliqua demum parte in ductus bilarios transire (g), & alii omnino transire negant (h). Sed alii etiam facilius viam eam legere testantur, quam ad cavam venam (i).

Contrario ductu ex hepatico poro humor in venam portarum urgeri potest (k), & ipse sæpe urfi (l).

Sed etiam ex arteria hepatica rami profunde, quos diximus, in membranam pori bilarii penetrant (m), demumque injecta cera eam viam sequitur (n).

Negant alii (o), sed etiam facilius repleri GUNZIUS confirmat (p); & negantium argumenta accuratissima & numerosissima requiruntur, ut adfirmantium fidem evertant.

§. XXI. *Aliæ anastomoses.*

Quas hactenus diximus, eas facile cum receptis opinionibus concilies, cumque legibus circuitus sanguinis: difficilius quæ sequuntur.

Primum non valde intelligitur, quid commercii esse possit inter venam portarum & arteriam hepaticam: quorum utrumque sit de genere vasorum efferentium, & quali parallelo similique ductu sanguinem avehat.

(f) COWPER ad tab. 38. f. 5.

(g) FRANKEN.

(h) SCHREL p. 16.

(i) VIEUSSENS l. c.

(k) HEUERMAN T. III. p. 728. VIEUSSENS *struct. de viscer.* De aere negat VERHEYEN II. p. 80.

(l) *Comm. Boerh.* T. III. p. 188.

(m) PAULI in v. HORNE. LOQUET n. 14. Profundius quam venæ ad portarum truncum pertinentes WEISS. *de arter. viscer. progr.* p. 19.

(n) VISCHER de *cholepojesi* n. 16. GUNZ K. *Swensk. wetensk. Acad. Handl.* 1751.

(o) VIEUSSENS l. c. p. 115. OVERKAMP n. 56.

(p) K. *Wetensk. Acad. Handl.* l. c.

Et tamen liquor in venam portarum injectus in arteriam hepaticam (a) transit.

Et vicissim liquor tenuis in arteriam (b), hepaticam impulsus venit in venam portarum, in cujus tunicam vasculosam alioquin distribuitur (c). Num etiam perforat, & tenue quid in eam venam exhalat? (d*).

Altera, certissima, anastomosis est ex ductibus bilariis in cavam venam (d), quam Cl. ante me viri viderunt, & mea experimenta confirmant, uti vicissim ex vena cava mercurius (e) in porum bilarium transit, aut gluten, ut vidi piscium, aut aqua (e*).

Id iter etiam morbi demonstrant, cum bilis ipsa in sanguinem (f) frequenter redeat, quam ostendemus, amarore integro & flavo tinctorio colore per universum corpus dominari.

Difficile nunc fuerit, de anastomosi inter duo revehentia vasa cogitari, quorum contrarii ductus sint. Credas potius venæ portarum ramum in cavæ venæ radicem non longe ab ea sede continuari, in qua de eadem vena portarum ductus bilaris secessit; ut per exiguum particulam venæ portarum, tamquam per medium ramum, communicationi inter venam cavam & ductum bilarium via pateat (g).

Sed neque id facile intelligitur, ut lymphatica vasa cum ductu bilario consentiant; & tamen si aquam & lac (h), & aerem (i), in poros bilarios inpuleris, ductus lymphæ replebuntur, eamque methodum CASEBOHMIUS in *posthumis* ei præfert, in qua aer in venam portarum inpel-

(a) VIEUSSENS *obs.* p. 129. difficilior tamen. HEBENSTREIT *ven comm.*

(b) ORTLOB *cholepojes negot.* VIEUSSENS *trait. des liq.* p. 354.

(c) LOQUET n. 12. etiam de vena cava.

(d) Flatus ex ductu hepatico in eas venit SYLVIVS *diff.* VI. n. 51. & SORGEIOOS *æconom.* corp. *Thef.* 63. COPPENOLL *de motu bilis* n. 7. Aqua, lac NEEDHAM apud BIRCK T. III. p. 233. Cera HEUERMAN T. III. p. 728.

(d*) SEGERUS *de motu bilis cyst.* n. 4. Sanguinem arteriæ hepaticæ in venam portarum transfundi putat. Add. RUYSCH *Comm. Lit.* 1738. JASOLIN. &c.

(e) VIEUSSENS *obs.* p. 155.

(e*) ORTLOB n. 9.

(f) *Seçt.* III. n. 26. 27.

(g) Ex arteria hepatica in porum demum bilarium ceram ire, quando per hepaticas venas transivit VISSCHER l. c.

(h) NEEDHAM apud BIRCH T. III. p. 233.

(i) Aere COWPER ad t. 38. f. 1. *Primit. Polon.* T. II. p. 122.

litur. Etiam aliorum ductuum excretoriorum exempla consentiunt (*k*). Ligatis demum bilariis ductibus cum duodeno nodosa hepatis vascula pellicula replentur (*k*^{*}).

Denique sed hoc facilius est, liquor injectus venæ portarum (*l*) venæ cavæ, ductui bilario, in cellulosa telam hepatis exsudat, vidi-que, cum cæruleum esset gluten, totum ductum & omnes ejus in hepate ramos, cæruleam cellulosa lineam aliquantum latam, comitem & parallelam habuisse. Credas per poros inorganicos liquorem exsudasse. Verum si patent in cadavere, cur non in vivo, calente animale? An forte ad bilem vapor de arteriis secretus se addit? an hæc est via, per quam a ductu bilario in lymphatica vascula liquor transit? Ita HUNTERUS putaverit & MONROUS.

§. XXII. *Nervi hepatici.*

Numerosi fatis (*a*) ad hepar adveniunt, conjuncti ex octavo pare, exque nervo magno sympathico.

Illorum quidem aliqui anteriores (*b*) cum cœliaca arteria & hepatica, ad fossam umbilicalem, sulcum transversum hepar dextrum, vesiculam ituri.

Alii posteriores, & pone venam portarum (*c*) & ante eam, ad sulcum transversum, lobum anonymum, dextrum, vesiculam fellis, lobum SPIGELII.

Sinistri (*d*) nervi a plexu anteriori ventriculi nati, trans minus omentum, & fossam ductus venosi, ad lobum sinistri lateris accedunt, ut tamen cum prioribus jungantur.

Etsi nunc hepar nervos habet cum capsula GLISSONII (*e*) irretitos, comites ramorum venæ portarum (*f*), & pariter in intima visceris

(*k*) L. II. p. 166.

(*k*^{*}) VIEUSSENS p. 169.

(*l*) Hæc putem esse fila mercurio plena, per venam portarum injecto, quæ capsulam GLISSONII faciunt apud VIEUSSENS *obf.* p. 156.

(*a*) Minimi GALEN. *util. part.* L. XIV. c. 17.

(*b*) L. X. p. 237. 263.

(*c*) Ibid.

(*d*) L. II. p. 236. 263. BERTRANDI p. 35.

(*e*) Conf. BERTRANDI p. 36. WINSLOW n. 111. n. 406. CALDAN *Lett.* III. p. 9.

(*f*) VIEUSSENS *obf.* p. 125.

deductos (*g*), tamen cum parvi sint, & in experimentis vivorum animalium (*h*) hepar vix quidquam sentire videtur, & in vulneratis hominibus (*i*), & demum in morbis (*k*), in quibus sæpissime occultum ulcus hepar depascitur, & ægro ignaro, & medico.

Nervis tribuas, quod in sede cardiæ ab uno ictu homo prosternatur (*l*).

§. XXIII. *Fabrica hepatis. Membrana extima.*

Membrana hepatis communis a peritoneo (*a*) est, & ejus naturam sequitur, pariter alba, vasculis picta minutis, solida, absque fibris confpicuis, & undique levis. De hepate, cui per ligamenta advenit (*b*), secedit in fossa transversa & in fossa ductus venosi, facitque omentum minus (*c*). In fossa etiam ovali super vesiculam fellis se conjicit & eam continet, qua sede nulla est in ejus fossæ fundo membrana hepatis extima, nullaque inter duas laminas ligamenti suspensorii, & qua sede omentum de hepate decedit.

De interiori facie, qua ad viscus ipsum respicit, cellulosa tela undique efflorescit, ex communi peritonæi natura, tenera, macilenta, brevis, in qua vascula illa superficialia (*d*) hepatis rete faciunt, & cujus ope membrana extima hepati adhæret (*e*). Sed intervalla sunt in hepate reticulata (*f*), subcærulea, in quibus rimæ quædam hepar dividunt, & cellulosa tela profundius se de extima tunica in viscus demergit.

In ea cellulositate corpuscula sedent, quæ pro glandulis habita fuerunt (*g*).

(*g*) WINSLOW ibid.

(*h*) Experimenta nostra sunt in *oper. minor.* 120. 121. 122. 123. Neque dissentit JAUSERAND, neque de membrana externa LORRY *Journ. de med.* p. 756.

(*i*) MULLER *biga obs. chir.* p. 19. Omnino sensu caret la MOTTE *Chir. Compl. obs.* 59.

(*k*) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 496. obtuse sentire VALCARENGHI *Med. rat.* p. 31. Exiguus sensus cum maximo hepatis abscessu ROLFINK *de hep.*

(*l*) *Art de faire les rapports. nouv. ed.* p. 591.

(*a*) p. 350.

(*b*) Ibid. & seqq.

(*c*) p. 365. seqq.

(*d*) p. 475.

(*e*) DUVERNEY *posthum.* II. p. 215.

(*f*) Reticulatum habet DUVERNEY l. c. p. 220. Hæc sunt lymphatica membranæ extimæ VIEUSSENS p. 132.

(*g*) SAVIARD p. 495.

§. XXIV. *Fasciculi vasorum & lobuli.*

Commune est omnibus visceribus, fasciculos vasculosos, sensim diminutos, ramosos, cellulosa tela obvolutos, per eorum intima dividi; ita viscus in lobos majores, mediocres, parvos, minimos, demum microscopii solius auxilio conspicuos distinguitur.

In hepate hæc omnia potius evidentiora sunt. Fundamentum cujusque fasciculi præbet venæ portarum (*a*) ramus: & ductus bilarius adsidet; circa eum arteriæ ludunt (*b*), & nervi (*c*): obnubit omnia reticulum cellulosum.

In experimento repleti ductus bilarii facile mihi fuit distinguere, cæruleam materiam solam cellulosam vaginam ei ductui propriam replevisse, ut reliquis vasis nihil tincti circumfunderetur. Credas eo facilius iis, quæ citavi ex CASSEBOHMIO & WINSLOWO (*d*), cuique vasi suum esse cellulosum tenerum textum, continuum forte cum reticulato illo externæ tunicæ substrato (*e*); deinde GLISSONIANAM telam, nunc tenuiorem, involvere omnia.

Vena cava extra eam capsulam est solitaria (*f*), cum paucioribus arteriis (*g*), per ejus tunicas distributis (*h*). Ad ramos venæ portarum rami venæ cavæ in decussam feruntur.

Ex his vasis, cum cellulosa tela fit peculiaris hepatis caro. Duritas cellulosæ; brevitās, & copia ad vasa comparata, faciunt duritatem peculiarem hepatis. Partes solidæ, non diffiabiles, in hepate sunt 2898. (*i*), 2435. (*k*), 2304. (*l*), 1953. (*m*), quando in cortice cerebri sunt

(*a*) WINSLOW n. 310.

(*b*) VIEUSSENS *obs.* p. 115. 135. WINSLOW l. c.

(*c*) Ibid.

(*d*) WINSLOW n. 315.

(*e*) RAU apud VALENTIN p. 92.

(*f*) POZZI p. 71.

(*g*) VIEUSSENS *obs.* p. 135.

(*h*) LOQUET n. 13.

(*i*) HAMBERGER p. 188.

(*k*) p. 185.

(*l*) p. 190.

(*m*) p. 183.

2148. (*n*), 1940. (*n*^{*}), 1550. (*o*), & 1477. (*p*), earum partium, quarum hepar integrum & recens pependit 10000. Pondus specificum 1083. (*r*), majus quam in aliis glandulis (*s*), accuratissimus MUSSCHENBROECKIUS reperit, in homine 1. 05203. 1000. in bove 1. 0744, paulo majus.

Firmius etiam vel ad digitum est, quam alia viscera, & sero putrescit. Hepata per multos annos ab aruspibus adservata fuisse legimus, & a se ipsa visa diutissime conservata PETITUS (*t*) habet. Centum annis durasse, per obsidiones compertum est (*u*), ut pene lapidea fiant (*w*). Non ita in aliis animalibus. Equi fatigati hepar subito putrescit & dissolvitur (*x*). Piscibus molliissimum, oleosum (*y*), pene saniei modo diffuit (*z*).

§. XXV. *Acini hepatis.*

Fasciculi isti vasorum cum suis cellulosa telæ vaginis hepatis lobos in minores & minores lobulos dividunt, usquedum denique carnis hepatis minimæ quasi insulæ (*a*) supersint, quas nullæ porro conspicuæ cellulosa lineæ dividant; & quarum propria fila (*b*) cellulosa cum suis vasis firmius coherescant, quam cum cellulosa circumfusa. *Acinos* vocant, & in nonnullis bestiis, ipsoque in homine (*c*), angulosos, hexagonios (*d*)

- (*n*) p. 185.
- (*n*^{*}) p. 190.
- (*o*) p. 188.
- (*p*) p. 183.
- (*r*) SAUVAGES diff. sur l'act. des med.
- (*s*) In glandula maxillari 1590. cum hepar sit 1953. HAMB. p. 183.
- (*s*^{*}) *Introduct.* p. 556.
- (*t*) *Miscell.* L. I. c. 7.
- (*u*) PLINIUS L. XI. p. 629. add. RIOLAN. p. 123.
- (*w*) BOEHMER *effect. rubiæ* n. 12.
- (*x*) KERKING *obs.* 77.
- (*y*) RONDELET L. III. c. 19. de cartilagineis piscibus: de orbe pisce BARTHOL. C. II. hist. 1.
- (*z*) In Xiphia HARTMAN *anat. ejus piscis.*
- (*a*) RUYSCH *resp.* ad BOERH. p. 72. WEPFER ad J. H. PAULI *dubi* p. 98. DUVERNEY T. II. p. 219. WINSLOW n. 286. MALPIGHI p. 61.
- (*b*) WINSLOW n. 285. 286.
- (*c*) MALPIGHI. p. 61.
- (*d*) COLLINS p. 437. *Mém. de* 1749. p. 494. BARTHOL. *Fig. nivis* WINSLOW n. 285. PARIS. in ciconia, in dorcade.

esse scribunt, in sue (*e*), mure montano (*f*), sciuro (*g*) talpa (*b*),
erinaceo (*i*), dorcade (*k*), elephanto (*l*), bove (*m*), capra (*n*),
catopardo (*o*), fele (*p*), tigre, leone (*q*), civetta (*r*), coati mon-
di (*s*), ciconia, scope (*t*): in piscibus (*u*), lampetra (*w*), *garfisch* (*x*),
anguilla (*y*), galeo (*z*): inter frigida quadrupeda in lacerta (*a*); de-
mum in cochlea (*b*).

In eorum acinorum quemlibet ramus a vena portarum se diffundit,
ramis radiatim undique ex trunculo sparsis (*c*).

In eum etiam porus biliaris advenit, & ramus arteriæ hepaticæ, etsi
eam quidem aliqui scriptores exclusam voluerunt (*d*), quæ non esset,
nisi bronchialis arteriæ quoddam irritamentum, inque cellulosa tela glif-
soniana consumeretur (*e*), nullo ad verum (*f*) hepatis parenchyma
ramo dato (*g*). Sed arterias nusquam longe credas abesse.

(*e*) In sue BIERWIRTH *struc. hep.* f. 2. Angulosi in sue BIANCHI p. 1160. Noduli
ex alvo rubentes BOEHMER *effect. rub.* l. c.

(*f*) PARIS.

(*g*) MALPIGH. p. 59.

(*h*) MALPIGH. *posth.* p. 31.

(*i*) PEYER p. 80.

(*k*) PARIS.

(*l*) MOULINS p. 21.

(*m*) MALPIGH. *hep.* p. 60.

(*n*) LANG. *Physiol.* p. 13.

(*o*) PARIS.

(*p*) WEPFER *cicut.* p. 185. MALPIGH. p. 60. PEYER p. 70. 35. Varii anguli COL-
LINS p. 437.

(*q*) PARIS.

(*r*) PARIS.

(*s*) *ibid.*

(*t*) PARIS.

(*u*) MALPIGH. p. 59.

(*w*) COLLINS p. 436. Trifolii esse similitudine p. 437.

(*x*) *Ibid.*

(*y*) Globuli ten RHYNE *vet. med.* p. 121. Acini MALPIGH. p. 59.

(*z*) MALPIGH. *ibid.*

(*a*) IDEM *ibid.*

(*b*) SWAMMERDAM *bibl.* p. 123. MALPIGHII *de hep.* p. 61.

(*c*) Penicillum dicit S. BIERWIRTH f. 1. Pedem anserinum VIEUSSSENS *obss.* p. 139.
qui de vena cava familia adfirmat.

(*d*) LOQUET n. 9. 14. 16. ORTLOB *cholep. negot.* n. 16.

(*e*) GLISSON. c. 29. p. 256. J. v. HORNE apud SYLVIVM *diff.* VI. n. 52. LOQUET.

(*f*) LOQUET.

(*g*) Ita veteres ORIBASIVS p. 114.

Nam arteria hepatica & in omnia puncta (*b*) se diffundit inque acinos (*i*), & inflata acinos inflat (*k*), perinde ut vena (*l*) aut bilarius porus.

In his ipsis acinis venæ a cava venas ad portas adtingunt, & in iisdem illæ humorum suorum inter vasa venosa arteriosa & biliaria sunt communicationes, quas per experimenta evicimus (*m*).

§. XXVI. *Num hi acini cavi sint.*

Acinos nemo rejicit, ne RUYSCHIUS quidem, sed de interiori fabrica disputatur.

MARCELLUS MALPIGHIUS ex ea lege, quam universo corpori præscripserat, cum in hepate & rotunda tubercula videret, & secretionem nosset peragi, cavis glandulis hepar constare docuit. Prior equidem WEPFERUS (*a*) anno 1664. hepar glandulosum fecerat: sed ILL. Viri glandulas meros esse lobulos minores MALPIGHIUS reposuit (*b*).

Docet ergo MALPIGHIUS, acinos (*c*) fieri glandulis simplicibus in racemum collectis, quem propria membrana obvolvatur. Eas glandulas cavas esse, nam insectorum hepate sacculos esse cavos, in eruca, gryllo (*d*), gryllotalpa, cancro. In sue utriculos ampliores a reticulo vasculoso comprehensas, sponte sua (*e*) adparere. In gazella (*f*) simillimos videri, glandulæ simplicis acinos cum suo foramine, & similem esse in civetta fabricam (*g*).

Eam cavitatem demonstravi, quando per morbos hepar vitiosa materia obfarcitur. Tunc glandulas hepatis in rotunda receptacula materia illa

(*h*) PETERMAN *scrutinium icter.* RUYSCH *Thes. max.* n. 86.

(*i*) VIEUSSENS *obs.* p. 201.

(*k*) WINSLOW n. 286. JENTY T. II. p. 116.

(*l*) PARIS. in scope BERGER p. 211. WINSLOW n. 287. WINSLOW n. 219. MALPIGH. p. 61.

(*m*) p. 508. 509.

(*a*) l. c. & ipse sibi vindicat. *de apopl.* p. 374.

(*b*) *Posthum.* p. 32.

(*c*) *De hepate* p. 61.

(*d*) *Fabr. gland. conglob.* p. 6.

(*e*) BIANCHI p. 1160.

(*f*) PARIS I. p. 100.

(*g*) *Ibid.* p. 170.

morboſe plena converti. Aqua repletas abire in hydatides (*h*), qui adeo vulgaris eſt hepatis morbus, ut exempla excitare labor fruſtraneus videatur. Alias gypſeam materiam (*i*), aut veros calculos, aut ſcirrhum concrementum in iis glandulis eſſe. Omneque genus vitioſe grandæcentium in hepate tuberculorum (*k*) ad diſtintas valvulas pertinere. Multi etiam amici nuperi ejus ſententiæ adjecerunt, veſiculas minimas (*k**) bile plenas ſe in reticulari textu hepatis vidiffe. Bile (*k*†) evidenter in leone tumidas fuiſſe, tum in hydropico, cum grandiori eſſent mole (*l*). Et in pullo hepar fieri veſiculis ad ductus hepaticos appenſis (*l**). Viſas fuiſſe morboſi hepatis veſiculas, in ductum choledochum reſumtas (*m*), & per venam portarum vel per choledochum ductum eminentias cellulares hepatis inflatas intumuiſſe (*n*). Totum demum hepar veſiculis fieri biliaræ adfinibus, quæ bilis ſint receptacula (*o*).

Denique & villos radiatos, concentricos, in iis acinis adparuiſſe, & in centro depreſſam foveam (*p*).

(*h*) Conf. L. VII. p. 384. & vide RUYSCH *Cent. obſ.* n. 65. *Theſ.* I. *aff.* 2. n. 12 *Theſ.* VIII. n. 10. GLISSON p. 83. BIDLOO *Exerc.* 11. *de hydat.* p. 8. PACCHIONI *de dura matr. diſſ.* IX. p. 253. COURTIAL *obſ.* 1. *Zod. med. Gall. ann.* p. 102. BIANCHI *hiſt. hepat.* p. 39. VALSALVA apud MORGAGN *Epist.* n. 7. 8. 9. 10. FANTON. *diſſ. anat.* p. 68. BARTHOL. *Cent. III. hiſt.* 81. VALISNER. *Gal. de min.* VII. n. 55. LANCIS *diſſert.* III. CHESELDEN p. 163. 212. LITTRE *Hiſt. de l'Acad.* 1704. n. 18. SENAC II. p. 686. Morbus indububulus epidemicus *Aët.* HAEN. *Vol. III. obſ.* 76. & ovium peſtilentia LINDEN *phyſiol.* 108. Hydatides per anum egeſtæ LOSS. L. III. *obſ.* 44. Nov. Lit. mar. Balth. 1703 p. 287. Magna copia Valisner III. p. 136. albumine plenæ BIDLOO *hydat.* p. 19.

(*i*) Sphærulæ gypſæ RENEAUME *des hern.* p. 114. BURCHART *gland. ſcirrhor.*

(*k*) Glandulæ manifeſtæ PLANCUS *monſtr.* Grana miliacea *Seleſt. Francoſ.* Vol. IV. in ictero WOODWARD *caſes* p. 196. 197. Etiam glandulas hepatis morboſas habet MALPIGH *poſth* p. 30. BROWN *Phil. tranſ.* n. 179. LITTRE *hiſt. de* 1701. *obſ.* 2. BURGGRAV *Comment. Lit. Nor.* 1735. *hebd.* 31. RIDLEY *obſ.* 1. p. 8. in hydropo. In eodem glanduloſi lobuli evidentiffimi MORGAGN. *ſed. cauſ.* II. p. 103. MANGET *bibl. anat. nov. prelim.* p. 63. *Theatr.* p. 370. GIBSON *Edim. Eſſ.* II. p. 357. PEYER *obſ.* 6. *Aët. Lit. Suec.* 1722. p. 373. COWPER t. 38. f. 5. in hypochondriaco acervo globulorum ſimiles. Ipſe ejusmodi puncta alba & duriuſcula vidi. Hepar fætidis craſſis glandulis conſtat MANGET *theatr.* p. 370. In piſcibus globuli duriuſculi SCHÆFFER *piſc. bavar.* p. 80.

(*k**) DUVERNEY T. II. p. 622.

(*k*†) COLLINS p. 447.

(*l*) LEIGH. *nat. hiſt. of. Lancashir.* II. p. 71. add. VALSALVA n. 9. NANZI p. 328. POZZI p. 70.

(*m*) VALSALV. n. 10.

(*n*) SENAC. *du cœur.* II. p. 686.

(*o*) HELVET. *æcon. anim.* p. 141. ex CHIRACO. Etiam inter NANNIANA exempla fuerunt folliculi ſimiles veſiculæ felleæ vel piri *Comun. Acad. Bonon.* T. I. p. 328.

(*p*) WINSLOW n. 286.

Addi posset tenacitas bilis, quæ in humoribus dominatur per cryptas excretis: fimilesque possis citare folliculos, in vesicula bilis certo obvios.

Hiscæ rationibus moti multi Cl. Viri in MALPIGHII sententiam transferunt (*q*), ut acinos hepaticos pro glandulis simplicibus haberent, in quas liquor ab arteriis [aut a vena portarum] depositus, haberet ductum choledochum pro excretorio canali.

Venam portarum in cellulas membraneas ovales abire (*r*), & vaginam GLISSONII in cellulas definere (*s*), ut in pulmone fit, celebris incisor monet.

§. XXVII. Quæ contra ista dicantur.

Cum ipse in juventute RUYSCHIUS (*a*) glandulas, ut in aliis visceribus, sic in hepate admisisset, post nuperiores tamen administrationes sententiam mutavit, ut acinos quidem negaret propriam membranam habere cæterum esse (*b*) fasciculos venarum & ramorum pori bilarii, in fasciculos indissolubiles & penicilli similes, conglomeratorum. Quæ in re ita cum bono sene consentit ILL. ALBINUS, ut eos acinos vascula faciat esse, quæ versus se invicem incurvata, fere conniventes rosas hierichuntinas referunt (*c*). Porro in hepate acinos minutissimos FERRENIUS (*d*) detexit, in unius lineæ spatio millenos, qui tamen omnes abirent in vasculum, in spiram anuli, aut in dimidium anulum curvatum: & similia in rene avium, ut in alaуда vascula (*e*) reperit.

Satis etiam mihi ex meis curis certum videtur, illos animalium hexagonos acinos, non elementum, sed agmen elementorum fuisse, lobu-

(*q*) Petrus NANNI. Joh. FANTONI *diff.* 6. KEIL *anat. abrigid.* p. 72. POZZI p. 70. SENAC. *du cœur* L. II. p. 686.

(*r*) VIEUSSENS p. 120.

(*s*) RAU p. 92. apud VALENT.

(*a*) *Centur. obs. med. chir.* n. 51. *Mus. rar. thes.* B. *reposit.* 4. n. 15.

(*b*) *Thef.* I. *aff.* 2. n. 7. tum *Thef.* IX. n. 59. & t. 4. f. 1. 2. 3. & *Thef.* II. *aff.* 3. n. 1. *aff.* 4. n. 15. *Thef.* II. n. 3. *Thef.* VI. n. 82. 88. 108. *Thef.* VII. *aff.* 1. n. 17. *Thef.* X. n. 77. 80. & *de fabr. gland.* BIERWIRTH f. 1.

(*c*) FRANKEN. *de hep.* p. 18. Sic fere VIEUSSENS *obs.* p. 139.

(*d*) *Mem. de l'Acad.* 1749. p. 497.

(*e*) p. 519.

lum nempe hepatis (*f*), ex multis minoribus particulis compositum; sola clausum cellulosa tela. Quare etiam manifesto & caret communi (*g*) membrana, & flatum impulsum in cellulosa spatiola circumposita dimittit, ut vesicas sub externa membrana excitet (*h*).

Plurimum potest apud me illa, olim proposita, consideratio (*i*): transire ex vena portarum, etiam ex arteria hepatica, in acinos hepatis materiem ceraceam. Nunc si inter venam interque ductum biliarium interpositæ forent cavæ, manifestum est, in eas se diffusuram materiem injectam, & cavam glandulam in nodulum tumefacturam, neque prius in vias bilarias transituram, quam folliculum ei viæ præpositum distendisset. Nihil autem simile, neque clausos nodulos in ejusmodi hepate vidi, quoties impulsæ materies ex vena in porum biliarium viam invenerat, neque longitudo ductus choledochi, cujus aliqui rami semipedem æquare possunt, videtur cum fabrica glandulosa posse conciliari. In proximum cavum mucus de crypta effluere potest, per brevem ductum: per distantem canalem, ut fluat, non videtur satis retinere celeritatis, quam fabrica cryptæ necessario destruat (*k*).

Offert etiam meditati se alia speculatio. Folliculi simplices omnes, vera fide noti, in membrana plana disponuntur, cui circumpositum plerumque est aliquid musculosi. Ita mucum secretum exprimi posse intelligitur. Non perinde, si ejusmodi folliculi in maximos glomeres, viscusque hepatis simile compingerentur. Pressio nempe quæcunque, qualem hepar certo experitur, folliculos contra folliculos ita urget, ut & ipsi intercepti ductus mille modis a vicinis folliculis premerentur, & eliderentur; siquidem folliculorum massa nascente poro maxima ratione major est.

Ad argumenta sumpta ab hydatibus alias respondimus (*l*): fiunt eæ in cellulosa fabrica, & ideo vascula habent, pluresque membranas, & aliæ alias continent (*m*).

(*f*) Etiam FERREIN p. 497. Vide in civetta apud PARIS. in aliis animalibus COLLINS p. 437.

(*g*) BIERWIRTH f. 1.

(*h*) WINSLOW n. 287. JENTY II. p. 116.

(*i*) L. VII. p. 386.

(*k*) Ibid. p. 393 447.

(*l*) Ibid. p. 390. seqq.

(*m*) VIEUSSENS p. 139. LIEUTAUD p. 300 FIZES *de liene* p. 143. BERTRANDI p. 44. 45. &c.

Quare superiores scriptores fere opinionem MALPIGHIANAM deseruerunt.

Non ideo continuo admitterem GLISSONII (n) capsulam telam esse vasorum lymphaticorum, & organum secretorium bilis. Nemo enim hactenus demonstravit, vera fila cellulosa cava esse.

S E C T I O I I.

V E S I C U L A F E L L E A.

§. I. *Quibus animalibus nulla sit.*

Dantur animalia, & ex omnibus classibus, quæ non aliam bilis habeant officinam, quam id ipsum hepar, in cuius descriptione versati sumus. Inter quadrupeda docilia, & herbivora multa huc pertinent, potissimum elephas (a), camelus (b), quem PARISINI dromedarium dixerunt, equus (c), asinus (d), cervus (e), caprea (f), dama (g), alce (h), rheno (i), manati (i*); deinde inter herbivora, & pene omnivora, aper indicus in dorso *umbilicatus* (k) & aper *zain*, idem

(n) VIEUSSENS *obs.* p. 157.

(a) ARISTOT. *Hist. anim.* L. I. c. 17. L. II. c. 15. in maximis animalibus hepar absque felle esse. Et de elephante GILLIUS *descr. eleph.* p. 505. CALDESI p. 46. MUL-LINS p. 22. BLAIR *Phil. transf.* 326. STUKELEY p. 96 PARIS ic RAY *synops. quadrup.* p. 138. In China coram Imperatore incisa bellua, neque ulla reperta est vesicula. *Receuil d'obs. cur.* T. IV. p. 89. 35.

(b) CALDESI, PLIN. L. XI. p. 628. PARIS. T. I. p. 75. Fel venis quibusdam inest ARISTOT. *part. anim.* L. IV. c. 2.

(c) ARISTOT. *hist. anim.* L. II. c. 15. *P. anim.* L. IV. c. 2. SNAPE p. 31. *Act. Hafn.* Vol. I. *obs.* 11. Vol. III. *obs.* 31. Habere vesiculam SANCASSAN *dilucid.* p. 80. KUNDMAN *Seltenh.* p. 229. Sed nullam reperit Cl. DAUBENTON T. IV. p. 316:

(d) *Act. Hafn.* Vol. V. p. 272.

(e) ARISTOT. II. cc. CALDESI. PLIN. NEMESIUS L. I. c. 4. p. 13. BUFFON T. VI. p. 119, 102. in hinnulo HARDER *apiar.* p. 82: Conf. PARIS. P. 2. p. 71. 74. Etiam cervus brasiliensis PISO. *hist. natur. ind.* p. 98.

(f) CALDESI. PLIN.

(g) CALDESI PLIN. II. cc.

(h) PARIS. P. I. p. 175.

(i) LINN *Cervus Rheno* p. 19. SCHÆFFER *lapon. ill.* p. 326.

(i*) *Nov. Comm. Acad. Petrop.* T. II. p. 318.

(k) *Tayacu* BARTH. C. II. *hist.* 26. *Phil. transf.* n. 153.

puto priori (*l*). Inter omnivora animalia quædam (*m*) de murina classe, mus rattus (*n*), mus *surmulot* (*o*), hystrix canadensis (*p*), rattus cauda squamosa (*q*), glis minor (*r*).

Inter aves vesicula carent princeps struthiocamelus (*s*), deinde pavo (*t*), gallina montana (*u*), psittacus (*w*), columba (*x*), palumbus (*y*), cuculus (*z*), grus (*a*).

Inter pisces myrus (*c*), gadus (*d*), lampetra (*e*), farda (*f*), mulus (*g*), faber (*h*). Legas etiam passim homines vesicula destitutos fuisse (*i*).

Adparet inde, hepar solum generandæ bili sufficere; & si fides est dissectionibus, satis esse naturæ, dum in ductu choledochi diverticulum (*k*), & lacum aliquem recipiendæ bili paraverit (*l*). In delphino enim ductus choledochus in ovalem amplitudinem dilatatur, rugis & cellulis variam (*m*). Vesiculæ plures erant, ad sex, in homine, veræ vesicæ loco, quæ nulla aderat (*n*). In lutra ductus cysticus appen-

(*l*) WORM *Mus.* p. 349.

(*m*) PLIN. ARISTOT. *part.* L. IV. n. 2. *hist. anim.* L. II. c. 15. BARTHOL.

(*n*) BUFFON T. VII. p. 315. BLAS p. 270.

(*o*) BUFFON T. VIII. p. 212.

(*p*) *Phil. transf.* n. 196.

(*q*) BUFFON. T. VIII. p. 186.

(*r*) *Mém. de l'Acad.* 1727. p. 387.

(*s*) *Phil. transf.* n. 386. 394. PARIS. II. p. 140. VALISN. *Oper.* p. 244.

(*t*) *Act. Hafn.* II. p. 289.

(*u*) *Phil. transf.* n. 307.

(*w*) COLLINS t. 23.

(*x*) *Oeconom. Abhandl.* V. p. 80. FANTON. *diff. anat.* p. 262. *Act. Hafn.* I. obs. 96. GRAF *pancr.* p. 20. CALDESI. COLLINS p. 456.

(*y*) CALDESI *ibid.*

(*z*) COLLINS.

(*a*) COLLINS. BARTHOL. *Cent.* IV. *hist.* 12.

(*c*) RONDELET p. 408.

(*d*) GROŃOV. *Act. lit. suec.* 1742. p. 95.

(*e*) CALDESI. BLAS. 9. 279.

(*f*) CHARLET. *Mantiss.* p. 25.

(*g*) RONDELET p. 293.

(*h*) IDEM p. 329.

(*i*) Fuisse nonnullos ARISTOT. *Part. anim.* L. IV. c. 2. & PLINIUS. Habet etiam TARGIONI *obs.* p. 138. SCHURIG. *hamatol.* p. 232. HUBER *Phil. transf.* n. 492. *Hist. de l'Acad.* 1705. n. 9. *hist. de* 1701. p. 54. BERTRANDI p. 29.

(*k*) HARTMAN *de bile* c. 2. Etiam in vipera bulbus adest ductus choledochi FANTON. p. 10.

(*l*) FANTON. I. c. Amplissimos canales bilarios habet REDI I. c. p. 112. 113.

(*m*) BERTRANDI p. 28. 29.

(*n*) TARGIONI *Hist. de l'Acad.* 1705. n. 9.

dicem habet (*n*^{*}). In aliis hominibus vesicula fellea carentibus ductus choledochus certe major (*o*) est: sic in hinnulo (*p*) manati (*q*), hystrice (*r*).

Quare autem aliqua animalia absque vesicula sint, difficillimum fuerit dictu. Fel habere, quibus sanguis minus purus, & contra, ARISTOTELIS (*s*). Sed cur bovi magis quam equo purus sanguis fuerit? Et in murium genere alii vesicula carent, dum alii ea destituuntur. Inter cervos equidem nullus vesiculam habet, ut moschus (*t*), & caprea stepnoisara (*u*), & rupicapra (*w*), non videantur ad cervos pertinere.

Forte etiam rem ipsam adnotatio minus accurata difficiliorem fecerit. Parvam certe vesiculam sæpe pro nulla habitam fuisse certum est, ut in ovibus (*x*) ponticis, chalcidicis (*y*), quæ dicuntur felle carere; in fuis (*z*), quæ notissimam habent vesiculam, & tamen dictæ sunt absque ea fuisse; in meleagridibus (*a*), quas legas non omnes vesiculam habere, cum vix tantam naturæ inconstantiam liceat imputare; in mure montano (*b*), sorice aquatico (*c*), ratto aquatico (*d*) mure domestico (*e*), in glire (*f*), talpa (*g*), lepore (*h*), cyprino (*i*), phoca

(*n*^{*}) CALDESI.

(*o*) TARGIONI *Hist. de l'Acad.* 1705. n. 9.

(*p*) HARDER l. c.

(*q*) *Nov. Comm. Petr.* l. c.

(*r*) SARAZIN l. c.

(*s*) *Part. anim.* L. IV. c. 2.

(*t*) *Nov. Comm. Petr.* T. IV. p. 403.

(*u*) *Ibid.* p. 391.

(*w*) PARIS.

(*x*) ÆLIAN. L. XI. c. 29. & in universum de ovibus frigidarum regionum L. XI. c. 28.

(*y*) ARIST. *part. anim.* L. IV. c. 2. *Hist.* L. I. c. 17. PLINIUS.

(*z*) MATTEI *anim.* p. 174.

(*a*) Non omnes habuisse vesiculam PARIS.

(*b*) BUFFON T. IX. p. 233.

(*c*) T. VIII. p. 69.

(*d*) T. VII. p. 354.

(*e*) Negat BORRICHIVS apud BARTHOLINUM *Ep.* 51. *Cent.* IV. PEYER *obs.* 15. CALDESI t. 5. f. 12. Sed habet ARNAULD. *Hist. des anim.* Tom. VI. f. 4.

(*f*) BLAS p. 270. BIANCHI & C. Conf. MORGAGN *Ep.* II. n. 36. CALDESI, BUFFON. T. VIII. p. 170. REDI *oper.* T. V.

(*g*) Negat GAUTIER *obs.* T. I. habet HARDER *apiar. obs.* 24. BUFFON. L. VIII. p. 93.

(*h*) Negat REDI *anim. viv.* p. 71. BARTHOL. *Cent.* II. n. 86. Habet FANTON. *diff. anat.* p. 257. PAULIN. *lagograph.* p. 54. BUFFON. T. VI. p. 275. Etiam cuniculo innata hepatis vesicula est & parum conspicua.

(*i*) Negatur Bresl. *Saml.* 1723. April. Sed manifesta est.

(*l*), noctua (*l*), in quibus animalibus aliqui scriptores vesiculam felli, descripserunt, & quæ tamen accuratius re inquisita felle non carent; in tursione (*m*), quem plerique scriptores negant fel habere, & tamen subinde eo præditum esse nuperus auctor exstat; in galeo (*n*), cui negant alii, alii tribuunt. Sic etiam in homine vesicula fellea nulla videbatur, quæ accuratiori facta inquisitione adparuit (*o*). Et potuit hepatis immerfa vesicula latuisse (*p*): potuit contracta fuisse & exigua (*q*), & ductu cystico non latior (*r*). Potuit denique consumpta fuisse (*r**), uti consumptam vidi.

Totam etiam oviparorum quadrupedum tribum (*s*) ea vesicula carere admitti nequit; vidi in rana, in lacerta (*t*), in salamandra; alii in chamaeleonte (*u*), crocodilo (*w*), testudine (*x*), lacerta tockaye (*y*).

Quare si rejicere licet tursionem, galeumque piscem, eo res fere rediret, ut felle carentia animalia sint de classe herbivora, poteritque nasci suspicio, ea animalia, quæ nunquam adipe vescantur, non eguisse tanta in bile acrimonia, ut carnivora quidem animalia, quæ pinguedinem inter cibos recipiant. Effet & alia conjectura, in animalibus parci victus, certe inter quadrupeda, illam ad tempus passionis adstrictam necessitatem copiosioris bilis non eam esse, ut proprio receptaculo egeat.

(*k*) Negat ARISTOTELES II. cc. Restituunt nuperi.

(*l*) *Phil. transf.* n. 469. HARTMAN *anat. ejus pisc.*

(*m*) ARISTOT. *part. anim.* L. IV. c. 2. *Hist. anim.* L. II. c. 15. FANTON. *anat.* p. 110 REDUS I. c. p. 112. 113. RONDELET p. 460. TYSON p. 29. KLEIN *miss.* I. p. 25. BARTHOL. *Cent. II. hist.* 25.

(*n*) CHARLETON *mantiss.* p. 86. In Galeo acanthio KLEIN *Miss.* III. Sed habent PARIS. T. I.

(*o*) LIEUTAUD *essay* p. 306. CAL. TACCONUS sive JANUS PLANCUS apud BIANCHUM p. 960 post MORGAGNI *Epist.* II. p. 299. Minimam etiam BIANCHI admittit. t. 6.

(*p*) In mure SCHRADER I. c. p. 23. in piscibus PARIS. de galeo, & in universum de piscibus cartilagineis HILL. *review* p. 115. in testudine terrestri CALDESI.

(*q*) JENTY *cours. of. anat.* II. p. 129. add. RUYSCH. *Centur. obs.* 31.

(*r*) SCHMIEDEL *pericard.* p. 28.

(*r**) KERKING *obs.* 82.

(*s*) ARISTOT. *hist.* L. II. c. 15. Sed fere in omnibus reperit REDI *anim. viv.* p. 4.

(*t*) Etiam HARDER *apiar. obs.* 21. FANTON. I. c.

(*u*) VALISNERI.

(*w*) HASSELQUIST p. 295. BORRICH *herm. Ægypt. sapient.* p. 276.

(*x*) CALDESE p. 36.

(*y*) *Mém. de physiq. & de Mathem.* p. 52.

§. I I. *Figura Situs.*

Quadrupedibus ergo carnivoris & herbivoris (*a*) plusculis commune est bilis receptaculum, quod veteres fere *fel* dixerunt, nuperi *vesiculam fellis*.

Ponitur in fulco, quem diximus (*b*) hepatis, transversa retrorsum & sinistrorsum; aliis minus, aliis tantumdem sinistrorsum ac retrorsum inclinata, horizonti in adulto homine, & in puero, sæpe etiam in annuo infante, parallela (*c*), ut tamen cervice (*d*), sua paulum adscendat, parallela etiam venæ portarum. In fetu tota adscendit (*e*). Decumbenti descendit ad perpendiculum (*f*). Vidi vesiculæ fundum paulo superiorem fuisse, ut versus ductum cysticum descenderet, vidi in fetu (*g*) ex perforato pro ipsa vesicula hepate eminuisse. Vidi in lobo sinistro nidum habuisse, & cervicem oblique dextrorsum in dextrum lobum venisse. Dicitur gibbo hepati innata fuisse (*h*).

Duodenum contingit finemque fere (*i*) transversi ejus ductus, raro pylorum (*i†*). Finis cæcus colo intestino incumbit (*i**), & peritonæo respondet, & nonnunquam adnascitur (*k*).

Figura aliquid habet piriforme (*l*), ut nempe antè cæco, pene hæmisphærico, sacco incipiat, inde in maximam sectionem subito aucta, sensim & lente retrorsum decrescat. Est tamen ubi omnino ovalis (*m*)

(*a*) Bovi, ovi, rupicapræ.

(*b*) p. 469 Aliquando nullus fuit MORGAGN. *Sed. caus.* I. p. 252. Solet tertiam partem vesiculæ continere VERDIER II. p. 100. etiam ultra conf. FABRIC. *form. fet. ic.*

(*b**) TREW f. 1.

(*c*) COLLINS t. 7. f. 2. CHÉSELDEN.

(*d*) Etiam BERTRANDI p. 21.

(*e*) HUBER *Eph. Nat. Cur.* IX. *obs.* 102.

(*f*) De situs varietate WINSLOW VERDIER II. p. 100.

(*g*) Sic in vulpe *Anc. Mém.* T. II. p. 244. in tigre PARIS. Vidit etiam, ut nunc lego, MORGAGNUS *sed. & caus. morb.* I. p. 57.

(*h*) BLAS L. II. *obs.* 3.

(*i*) VESAL. f. 12. MONRO *Eff. of a Soc. at Edimb.* IV. t. 1. EUSTACH. t. 10. f. 2.

(*i†*) COLLINS T. I.

(*i**) Aliquando adnascitur VOGEL *Anmerk.* p. 70. & in colon dat calculos.

(*k*) PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.* I. p. 486. *Select. Francf. Vol. IV. Journ. med.* 1759. mens Maj. VOGEL *Anmerk.* T. IV. & in *Hamburger Magazin.* T. XIV.

(*l*) Sic fere EUSTACHIUS t. 10. f. 2. t. 11. f. 4. tum GLISSON. &c.

(*m*) GARENGEOT *Jplanchnolog.* t. 1. p. 288. f. 3. 5. &c.

fuerit, est ubi præter modum longa (*n*) & gracilis; est ubi finem cæcum longum & acutum reflectit, & pene bifurcatum (*o*) habet.

Raro aut nunquam axi secundum longitudinem recto procedit, sed plerumque cis cervicem, ductusque cystici principium a tela cellulosa antrorsum replicatur (*p*), unde, secundo fluxu, sursum in ductum cysticum continuatur, & sinistrorsum primo, deinde deorsum, ad duos angulos rectos, in eum ductum abit (*q*). Viderunt alii Cl. Viri serpentinam (*r*). Hæc autem omnia delentur, quando purgaturus incisor cellulosam telam destruit (*s*).

Est ubi in appendiculas & diverticula exuberat (*t*).

Duas fuisse passim lego, etiam in homine (*u*), & duas in glire (*w*), vulpe (*x*), fele (*y*), ardea (*z*), cyprino (*a*), sparro (*b*). In Naxo insula oves esse duplici felle (*c*) veteres. Olim ita in victima visum (*d*); ego quidem nunquam vidi.

Magnitudo incerta est, & in diversis hominibus, & in eodem, cum a pleno ventriculo inaniatur, eodem inani repleatur. Intestino æqualis in hernioso (*e*). Duas uncias in mediocri corpore continet (*f*) etiam tres (*f*^{*}).

(*n*) In fetu cylindrica ROEDERER *fet. perf.* n. 25.

(*o*) RUYSCH *Centur. obs.* n. 90. *catal. rar.* p. 161. *Comm. Lit. Nor.* 1738. *hebd.* 47. *tab.* 7. f. 10. 11. hic ex vitulo.

(*p*) Incisionem habet RUYSCH *Ep.* V. t. 5. f. 6. & PECHLIN L. I. *obs.* 59. replicationem vix quisquam. Inflexa in Pygmæo TYSON p. 36. ic.

(*q*) Sat bene CHESELDEN t. 25. C. BAUHIN. t. 38. f. 1. nulla re mutata JASOL *de por. choled.* RUYSCH *Epist.* p. 5. l. c. *Thest. max.* n. 170. REVERHORST t. 2. f. 4. Capiti aviculæ comparat WINSLOW n. 297. 298.

(*r*) RUYSCH *cat. mus.* p. 182. FANTON. *anat.* p. 158.

(*s*) Ut in iconibus EUSTACHII, BIANCHI, GLISSONII, VESALII.

(*t*) RUYSCH. *catal.* l. c. p. 161. MORGAGN. *adv.* III. p. 74. HOFMAN *Instit. med.* p. 93. 94.

(*u*) BLAS L. IV. *obs.* 10. GOHL. *Comm. Lit. Nor.* 1738. *Eph. Nat. Cur. ann.* IX. *obs.* 102. *Phil. transf.* n. 207.

(*w*) CALDESI *tab.* 5. f. 1. p. 46.

(*x*) CALDESI p. 46.

(*y*) GRAAF p. 16. 18.

(*z*) *Garza bianca* CALDES. *ibid.*

(*a*) *Comm. Nor.* 1738. *hebd.* 47.

(*b*) SEVERIN *Zootom.* p. 128.

(*c*) AELIANUS *anim.* L. XI. c. 29. Grands ARISTOT. L. I. c. 17.

(*d*) PLUTARCHUS in ARATO.

(*e*) FANTON. *obs.* 18.

(*f*) *Select. Francof.* III. p. 381.

(*f*^{*}) In tertiana febre MORG. *Sed.* II. p. 257.]

Adeo tamen per morbos augetur [*g*], ut duas libras [*b*], fesqui pintam [*b**], & tres pintas [*i*], & quinque menfuras [*k*] (*demi-septiers*) [*l*], & octo libras [*m*] & decem cum duabus unciis [*n*] omnino receperit. Bovi uncias octo ad undecim capit [*o*], in lue 12. 15, uncias [*o**], etiam 8. libras [*p*].

In morbis etiam magna ejus copia subito fere excernitur. Libræ tres in febre petechiali [*q*] vomitu ejectæ, & in ictero de ano, puto hoc ex fonte egestæ [*q**], tres pintæ post icterum [*r*], libræ decem uncia duæ [*r**], libræ quindecim uno mane [*s*]. Turget etiam in famelicis, non vescentibus [*s**]. Quatuor digitis ultra hepar eminuit [*s*†].

In universum piscibus grande est fel [*t*], & animalibus carnivoris [*u*] famelicis, etiam castori [*w*].

§. III *Fabrica vesiculæ felleæ.*

Membranaceum, & tunicatum hoc est receptaculum, in universum ejusdem cum aliis faccis in corpore humano fabricæ.

- (*g*) RUYSCH *obs.* 13.
 (*h*) Cum ductus biliarii calculis clauderentur RAYMOND *des malad. danger. à guérir* II. p. 244.
 (*h**) RUYSCH *obs.* 13.
 (*i*) *Phil. transf.* n. 449.
 (*k*) *Mém. de l'Acad. de Chir.* I. p. 296.
 (*l*) *Ess. of a Societ. at Edimb.* II. n. 30.
 (*m*) *Phil. transf.* n. 333.
 (*n*) BUFFON T. I. p. 493. Unc. 10. dr. duas sem. scrup. duos GHERARDESC *giorn. di Parma* 1687. p. 193.
 (*o*) BUFFON T. IV. p. 493. (*o**) ENGELMAN *Verhandl.*
 (*p*) BUCHWALD *de lue Boum.* Quadruplo major & pedis diametro MANCET *resten.* p. 163. 196.
 (*q*) VALCARENGHI *med. ration.* p. 168. Tantum 12. 15. unc.
 (*r*) PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.* I. p. 260. 261.
 (*r**) *Phil. transf.* n. 333. in hydropica.
 (*s*) RAYMOND. *malad. danger. à guérir.* p. 47.
 (*s**) L. XIX. p. 299. add. RIOLAN. p. 125. *Zod. Gall.* ann. 4. Febr. In serpentibus BORELL *mot. anim.* II. *prop.* 147. Vesiculæ felleæ absque bile repertæ passim exempla reperio, alia à ventriculo distantissimo, ut videtur, per venena HASENEST *Vicht.* I. p. 143. HOFMAN *med. conf.* T. III. Dec. I. c. 9. & in experimento HILLEFELD p. 4. Cum grandi repate BADER *obs.* 18. In rachitide, cum ob vitiosum hepar nulla bilis generaretur BUCHNER *de rachitid.* p. 10. 11. In morbis lentis simili, ut puto, ex causa K. *Swensk Wetensk Acad.* ann. 1752. *Trim.* I. ex incerta causa STEIN *lithogen.* p. 27. in icterico.
 (*s*†) MILITIA p. 74.
 (*t*) ÆLIAN. L. XI. p. 628. In Siluro MONAVIUS.
 (*u*) In leone BARTH. *Cent.* IV. n. 100. *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 2. p. 6. In Lynce BUFFON T. IX. p. 247. in urso SCHRADER p. 77.
 (*w*) BUFFON T. VIII. p. 315.

Extima membrana in majori, & inferiori parte vesiculæ est, nata ab hepatis membrana externa [*a*], quæ vesiculæ quasi superjicitur: dum pars minor, in sulcum jecinoris recepta, absque ejusmodi membrana, sola cellulosa tela longa & laxa ad hepar revincitur. A vesicula prope collum ostendimus, membranam hepatis externam ad duodenum & colon transire (*b*).

Intra hoc velamentum commune cellulosa tela (*c*) laxa est, fibris facta variis, in qua non rarum est adipem colligi (*d*) etiam steatoma. In ea vasa lymphatica repunt, & elegantia illa vasa rubra RUYSCHII (*e*),

Sequitur quam musculosam vocant, sed est in ea varietas. Vidi, alique ante me Cl. Viri viderunt, in ea fibras non rubras quidem, sed splendentes (*f*) potius, vario ductu, tamen ut pene longitudinem (*g*) vesiculæ sequerentur, & ad valde inæquales angulos se secarent. Circulares etiam (*h*), etsi infrequentius vidi. Est ubi nullæ adparuerunt, nullæque a nuperis, sed neque a vetustioribus (*h**) harum rerum gnaris admittuntur.

Irritabilitas (*i*) est ejusmodi, ut a venenis vesicula se contrahat, non perinde (*k*), quantum ego memini (*l*), ab aliis verioris notæ irritationibus. Constringi equidem, ut bilem Cl. FELICIS (*m*) est adnotatio. Circa calculos etiam sæpe se ita angustat (*n*), ut articulatam filiquam (*o*) raphani referat, & inter duos calculos arctissimus isthmus sit. Alias

(*a*) VESAL. p. 623. WINSLOW n. 292. add. EUSTACH. t. II. f. 4.

(*b*) L. XX. p. 365.

(*c*) DUVERN. II. p. 234. WINSLOW n. 294. LIEUTAUD p. 304.

(*d*) HARTMAN *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. obs.* 23. VERHEYEN p. 93. BORRICH *Act. Hafn.* II. *obs.* 53. MORGAGN. *Epist. anat.* I. n. 62. DUVERNEY II. p. 234. in bove ORTLOB *cholep. negot.* n. 9. LOQUET n. 4.

(*e*) *Ep.* V. t. 5. f. 4. Hæc est lamina interna vasculosa LOQUETI n. 4. Duas etiam habet PAULI.

(*f*) HEUERMAN T. III. p. 760.

(*g*) DUVERNEY p. 234. PAULI *de siphon. Wolf.* WINSLOW *ibid.*

(*h*) DUVERNEY *ibid.* PAULI *ibid.* WINSLOW n. 293. facit duas laminas. Admittit etiam fibras musculares Cl. LUDWIG *de viis bilis cyst.*

(*h**) RIOLANUS in LAURENTIUM p. 659. SCHELHAMMER *physiolog.* VIEUSSSENS *tr. des liqueurs* p. 355. CASSEBOHM. LORENZ. *singular. ad vesic. fell.* Parum iis tribuit PERSON *diff.*

(*i*) Irritabilem esse GLISSON p. 184. BOHN. p. 245. BORDEU *sur les glandes* p. 426. PAGANI & BONIOLI p. 193.

(*k*) *Exper. nostr.* 265.

(*l*) Neque GERARD in celebri thesi, etsi id vocat sensile.

(*m*) *Exper.* 6. 7. 8. PAGANI & BONIOLI p. 193. Add. nostra experimenta *de part. irritab.* 252. 253. 255. 256. 257. 258. 261. 263. 263*. 265. 266.

(*n*) *Opusc. patholog. obs.* 33. *hist.* I. II. 13.

(*o*) Habet etiam RUYSCH. *obs.* 31. Cl. de HAEN *rat. med.* IV. p. 21. Add. *Journ. de med.* 1759. nov.

pigra fuit, neque contractilis (*p*), & certe minus alacris est, quam urinaria vesica (*q*).

Cellulosa altera imprimis, ut solet, vasculosa [*s*], elegante reticulo arterioso percurritur.

Sensu sat acri gaudere aliqua suadent [*r*].

Nervea se habet, ut in intestino; tum tenerior cellulosa tertia [*t*], & villosa [*u*], semper ut in intestino, pulchre reticulata [*w*], jugis eminentibus, brevibus, inter se invicem intricatis, scobibusque intermediis. Floccos propendentes non frequenter, sed tamen vidi. Versus cervicem plicæ longitudinem magis sequuntur [*x*].

In animalibus carnivoris, leone, tigride, fele, lynce [*y*], panthera [*z*], catopardo [*a*] plicæ ingentes vesiculam quasi septo [*b*] aliquo distinguunt [*c*]. Etiam hæ plicæ destructa cellulosa tela abolentur [*d*]. In homine non sunt rarissimæ [*e*]. Etiam contracta visa [*f*] est, & suo modo minor [*g*].

Non perpetuo reperiuntur, sed tamen, cum aliquando adsint, possunt pro perpetuis haberi, folliculi veri glandulosi (*g**), qui in media

(*p*) SPROEGEL l. c. p. 48. *Exper. nostr.* 254. 259. 260. 262. 289. Parum tribuit GLISSONIUS huic suæ irritabilitati l. c.

(*q*) *de part. irrit.* p. 380.

(*r*) LORRY *Journ. de med.* 1756. m. Nov.

(*s*) RUYSCH *Epist.* V. t. 5. f. 3.

(*t*) Habet WESTPHAL *exfist. duct. hep. cyst.* p. XII.

(*u*) PICCOLHOM. *prælect. anat.* p. 130.

(*w*) BIANCHI t. 5. tab. 7. f. 2.

(*x*) DUVERNEY p. 235. WINSLOW n. 295.

(*y*) Plicata BUFFON T. IX. p. 247.

(*z*) BUFFON T. IX. t. 16.

(*a*) *Comm. Petr.* T. I.

(*b*) PARIS. BUFFON T. IX. p. 34. *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 11. obs. 5.* MERY apud FANTON. p. 113. COLLINS p. 455. In mola pisce PLANCUS.

(*c*) In galeo foliaceæ intus valvulæ PARISINI.

(*d*) BUFFON.

(*e*) RUYSCH. *obs.* 31.

(*f*) MORGAGN. *sed. caus.* I. p. 18.

(*g*) II p. 332.

(*g**) Habet MALPIGH. *de liene* p. 120. FANTON. p. 111. DUVERNEY T. II. p. 235. RIDLEY *obs.* p. 174. 196. SANTORIN. c. 9. n. 11. BERGER *natur. hum.* p. 220. DISDIER *splanchnolog.* I. p. 173. BIANCHI t. 7. f. 3. RUYSCH. *Epist.* V. tab. 5. f. 2. 3. *Thef.* V. n. 19. EWALDT *de somno* BERTRANDI p. 24. WINSLOW n. 295. qui lacunas vocat, tum PERSON. LIEUTAUD p. 305. Habet TREW. *Chylos. fet. obs.* I. tab. 2. f. 1. 2. *Journ. Sav.* 1688. in animalibus. In leone PARIS. Pori muciferi FANTON. *diff. anat.* Ed. nov. p. 248.

parte vesiculæ, & circa cervicem (g^{**}) conspicuis poris mucum rubrum effundant, de quo alias dicetur.

Sed etiam arteriæ hepaticæ ramuli minores per ultimam cellulofam membranam distributi, succum tenuem (g^{\dagger}) in vesiculam exhalant, etiam hydrargyrum (h), denique aerem (i), etsi non semper succedit experimentum (k). Et vicissim venæ portarum radiculæ aliquid de ea vesiculâ forbent (l); certe aquam, tenuemque liquorem, in venas impulsam (m) videmus in ejus caveam dimitti, & in tunicam interiorem BERGERUS duxerat (n).

Pori etiam inorganici (o) frequentes sunt, ut bilis per integram vesiculam perspirans colon late tingat (p), & flavedo in thoracem penetret (p^*), & aliam avium sapore suo (q), & ventriculum gelatina biliosa inquinet (r), & hepar amarore. Lympham flavam & subamarâ alii circa vesiculam viderunt (s). Aqua in vesiculam injecta pariter exhalat (t), ut de ventriculo.

§. IV. *Ductus cysticus.*

Vesicula fellis in omnibus animalibus mihi notis ductum excretorium educit, quem *cysticum* nunc ab origine dicimus; veteres enim (a), minus accurate his vocibus sunt usi. Is in homine (b) & in omnibus quadrupedibus mihi notis cum ductu hepatico convenit; serius aliquan-

(g^{**}) MORGAGN. *Epist.* I. n. 96. MOSEDER *diff. de vesicul. fell.* p. 10.

(g^{\dagger}) OVERKAMP *ven. port.* n. 75.

(h) VIEUSSSENS *obs.* p. 205. 206.

(i) Aer SYLVIVS *diff.* VI. n. 53.

(k) Aerem non transire VERHEYEN II. p. 80. nempe in humano cadavere.

(l) Utique refluit GALEACIUS I. c. p. 337.

(m) OVERKAMP. n. 76.

(n) p. 211.

(o) Etiam HUNTER *Comm. Med.* T. I. p. 41.

(p) TULP. L. II. c. 27. BLAS L. II. *obs.* 4. G. v. SWIETEN T. III. p. 500.

(p^*) MORGAGN. *sed. caus. morb.* II. p. 24.

(q) *Examen du L. de M.* TRONCHIN p. 42. 43.

(r) In febre putrida *Journ. med.* 1762. m. Mars.

(s) KERKRING *obs.* 5. PECHLIN L. I. *obs.* 60.

(s^*) IDEM *ibid.*

(t) KAAUW n. 562.

(a) MORGAGN. *de sede & causis morborum* II. p. 85.

(b) CALDESI t. 5. f. 8.

do (c), demum in sinu duodeni, etiam in phoca (d). Ita in oviparis quadrupedibus plerisque crocodilo (e), lacerta (f), chamæleonte (g), salamandra (h), testudine (i), rana (k), serpente (l), vipera (m), tum in avibus nonnullis porphyryone, qui poule fultane (n), anate, ut accuratior docet BOHNIUS (o).

Inter pisces uterque ductus conjungitur in raja piscatoria (p), anguilla (q), torpedine, trocta, ut coram video, & puto in multis.

Ejus in homine fabrica est ejusmodi. Vesiculæ felleæ finis posterior conicus his (s) replicatus, in ductum gracilescit (t), paulum decrefcentem eundo, qui finistrorsum ad hepaticum accedit. Eam cervicem vidi furcam arteriæ hepaticæ a duodena secedentis replevisse. Idem ductus multis cellulosis vinculis in se ipsum retractus plicis per cellulosam telam conjunctis (w), spirale (x) quid habet, alias evidentius, minus manifestum in aliis.

Advenit ad hepaticum in ipsis portis, dexterior inter vasa ejus partis, & longe ei adglutinatur, ad eum multa cellulosa tela revinctus, & parallelus (y), & quasi bilocularem (z) ductum effecturus, demumque

(c) Vidit tamen ductum cysticum in homine ab hepatico ad usque duodenum divisum VATER *cat. mus. propr.* p. 93.

(d) HARTMAN p. 10.

(e) PARIS. P. III. t. 25.

(f) HARDER *apiar. obs.* 21.

(g) PARIS P. I. p. 49.

(h) BIANCHI p. 990.

(i) Terrestri CALDESI T. IV. f. 11. marina f. 12.

(k) JACOB. c. 3. HARDER *apiar. obs.* 3. BLAS p. 292.

(l) MORGAGN. *Adv.* III. p. 14. BLAS *anat.* p. 333.

(m) MORGAGN. *ibid.* BOHN. p. 233.

(n) PARIS. Nempe cum altero hepaticorum P. III. t. 12.

(o) L. c.

(p) CHARLÉTON *mantiss.* p. 78.

(q) CALDESI t. 5. f. 11.

(r) LORENZINI p. 22. t. 2. f. 3.

(s) p. 524.

(t) Conf. WESTPHAL. p. XIII.

(w) Ligamentum proprium vocat SEGER p. 10.

(x) Etiam in phoca contortus CALDESI, & in panthera BUFFON IX. *tab.* 16. p. 180.

181. in mola PLANC. *Comm. Bonon.* T. II. P. 2. p. 301.

(y) VESAL. L. V. ic. 12. 20. VIDUS t. 64. f. 11. BAUHINUS t. 30. f. 2. hic optime.

WINSLOW IV. n. 302. GARENGEOT *tab.* 10. f. 1. COE t. 2. LORENZ. n. 10. GIERING *Select. Francof.* T. III. n. 5.

(z) BAUHIN. LUDWIG *progr.*

Haller *Physiolog.* Tom. VI.

X x x

in eum ita aperitur, ut altera ductus communis sit radix, qui ex hepatico continuatur (*a*). Deleta cellulosa tela angulus acutus nascitur (*b*); aut omnino rectus. Hepatico ductu plerumque multo minor est (*c*), vidi fere æqualem fuisse, vidi majorem (*d*). Longior est, & pene duplo, choledocho ductu.

Valvulam in conjunctione utriusque ductus multi posuerunt (*e*), quæ equidem nulla est, nisi eminens non maximum calcar, quæ etiam in venarum concursu solet.

Fabrica hujus ductus in universum eadem est, quæ vesiculæ, & membranas habet easdem (*f*), cum aliqua, non manifestissima irritabilitate (*g*).

Qua vinculis cellulosis extus in sulcos colligitur, ibi intus rugæ tunica villosæ & nerveæ eminent, quæ possint aliquam spiralis (*h*) fabrica imaginem referre, valvulaque nomen ferre (*i*), ut tamen molles, alternæ (*k*), transversæ aut obliquæ plicæ (*l*), singulares, deorsum, sive ad intestinum, concavæ (*n*) sint, neque tamen iter bilis valde morentur (*o*), etsi videntur morari (*p*). Prima valvula (*p**) maximâ

(*a*) CHESELD t. 25.

(*b*) EUSTACHIUS GLISSON. BIANCHI &c.

(*c*) PECHLIN *purgant.* p. 500. JASOLIN. c. 5. & in ic. CHESELD. t. 25. ic.

(*d*) Fabrica ludere TEICHMEYER *anthrop.* p. 130.

(*e*) LAURENTIUS *histor.* p. 315. ed. Paris. LAUREMBERG p. 259. MARCHETT *compend. anat.* p. 28. WINSLOW n. 303. Cum tuberculo. LOWERI FANTONUS *comparat. diff. anat.* p. 249. 253.

(*f*) p. 525. 526.

(*g*) Habent PAGANI & BONIOLI p. 193. ZIMMERMAN p. 46.

(*h*) HEISTER *compend.* f. 6. VATER *divert. bibl.* p. 20. FABRIC. *Progr.* n. 1759. Aliquando reperiri TEICHMEYER *anthrop.* p. 130. STROHLEIN p. 8.

(*i*) JASOLIN c. 5, p. 125. 126. BACK p. 131. JUSTI VESTI *obs.* 1. RIOLAN. p. 129. SCHRADER *obs. Dec. I.* n. 4. CALDESI p. 40. t. 2. f. 10. RUYSCH. f. 3. BIANCHI t. 7. f. 1. COE *bibl. concret. tab.* 2.

(*k*) DUVERNEY p. 233.

(*l*) Duas, tres SPIGEL p. 238. BAUHINUS p. 15. t. 6. C. BARTH. *anat.* p. 84. PLANCUS. plures, quinque & ultra RUYSCH. *Thef.* X. n. 78. LAUREMBERG p. 259. Tres majores prope ostium, septem & octo in ductu VIEUSS. *obs.* p. 207.

(*n*) Etiam VIEUSS. l. c.

(*o*) Negat fuisse valvulam spiralem CASSEBOHM & omnino valvulas adesse non vult CALDESI p. 41. Rugas dicit, quæ factæ sint, ut ductus constringi & dilatari possit Cl. LORENZ n. 12. & valvulas esse negavit. Defuisse eas valvulas, raro tamen, CALDESI p. 41.

(*p*) Valvulas esse, & iter ita regere, ut ne flatus quidem contra eat LAURENT. p. 319. Sustinere iter bilis ex vesicula expressæ SPIGEL l. c. Stilum facile in ductum ire, non contra SCHELHAMMER *phys.* p. CCXIV.

(*p**) TREW *chylos. fet.* t. 2. f. 3. 4. BUCHNER *miscel.* 1727. p. 61.

est, & sæpe pene totum ostium vesiculæ claudit, reliquæ ex ordine minores.

Reticularem fabricam idem ductus habet, & depressas, ut in chole-
docho ductu, scrobes. Sphincterem in ostio musculosum (*q*) non re-
perio (*r*).

Ita nunc in homine se habet, avibus autem bene multis (*s*) duc-
tus cysticus seorsim, absque conjunctione cum hepatico, aperitur in
intestinum. Eo pertinet pavo (*s**), gallus (*s***), etiam indicus (*t*),
tarda (*u*), casuarius (*w*), anas (*x*), fulica (*y*), grotto (*z*), nume-
nius (*a*), pavoncello (*b*), ciconia (*c*), ibis, (*d*) platea (*e*), phœ-
nicopterus (*f*), scops (*g*), regia (*h*) avis, pelicanus (*i*), ardea
(*k*), grus (*l*), aquila (*m*), falco (*n*) corvus (*o*) vultur (*p*).

- (*q*) GLISSON p. 139. In salmone PEYER *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. p. 203.*
(*r*) CL. BERTRANDI p. 24. VATER *divertic. bil. p. 16.*
(*s*) MORGAGN. *Adv. III. p. 54.* STENONIUS *de musc. gland. p. 39.* REDUS *anim. viv. p. 5.*
(*s**) Ut videtur BLAS p. 169.
(*s***) HARDER *apiar. p. 73.*
(*t*) PARIS. *Mém. pour l'hist. des anim. P. I. t. 34.*
(*u*) PARIS. II p. 105. t. 52.
(*w*) PARIS. P. II. p. 57.
(*x*) BOHN. p. 233. *Colleg. priv. Amstelod. obs. p. 36.* BLAS *anat. anim. p. 281.* RE-
DI T. VII. f. 4.
(*y*) PEYER p. 103.
(*z*) REDI l. c. f. 1.
(*a*) REDI f. 6. ALBIN. I. n. 79.
(*b*) RED. Ib. f. 5. Est. Vanellus.
(*c*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 6. obs. 109.* PARIS. f. 3. t. 14.
(*d*) PARIS. P. III. t. 14.
(*e*) PARIS. p. III. t. 6.
(*f*) PARIS. I. III. t. 9.
(*g*) PARIS. P. II. p. 8.
(*h*) PARIS. P. III. t. 29.
(*i*) PARIS. P. III. t. 27. REDI t. 7. f. 3. ALDROVAND III. p. 51. B.
(*k*) *Bresl. Saml. 1725. Dec. COLL. t. 22. 23.* REDI t. 7. f. 2. BLAS p. 147.
(*l*) CALDESI t. 5. f. 3.
(*m*) BORRICH. *Hermet. Egypt. Sapient. p. 260.* PARIS. P. III. t. 5. HARDER *apiar.*
obs. 15. CALDESI t. 5. f. 6.
(*n*) MURALT *vadem. p. 366.* PEYER *obs. p. 107.*
(*o*) PEYER *obs. p. 100.* SCRADER *carniv. p. 27.*
(*p*) *Bresl. Saml. 1726. p. 86.* PARIS. P. III. p. 215. ut videtur.

Sic in piscibus frequens est, ut in alofa (*q*), perca (*r*), lucio (*s*), rhombo (*t*) hippoglossio (*u*), xiphia (*w*), & in testudine marina (*x*), serpente (*y*), salamandra (*z*), quæ testimonia, ut adversa sunt prioribus, aut de alia specie vera, aut omnino falsa esse oportet.

In colon ivisse (*a*) pariter ut videtur, parum accurata est observatio: & ab adhæsiōne vitiosa nasci potuit.

§. V. *Ductus hepaticysticipiscium & avium.*

Nullum, quod sciam, animal vesiculam absque hepate nactum est, nullum etiam, cui vesicula ab hepate libera sit, & distans. Videtur quidem vesicula ab hepate soluta (*a*), uti ductu non communicat, ita neque cohærere aliis modis, in nonnullis potissimum piscibus (*b*) alofa (*c*), perca, lucio, hippoglossio, xiphia (*d*), rana piscatrice (*e*), salmone (*f*), milvo, doro (*g*), inque serpente (*h*), vipera (*i*), interque aves in tarda (*k*), corvo marino (*l*), ossifraga (*m*).

(*q*) BLAS t. 49.

(*r*) BLAS p. 281. ut vid.

(*s*) t. 52. f. 12.

(*t*) t. 50. f. 6.

(*u*) Ibid. f. 8.

(*w*) HARTMAN *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 2. p. 13. append. SCHELHAMMER* apud VALENTIN. p. 166.

(*x*) PARIS. l. c. P. II. p. 184. t. 59. Testudo aquæ dulcis CALDES. t. 4. f. 10.

(*y*) SEBA *Thef. T. I. tab. 109. f. 12. SEVERIN. 2007. p. 365.*

(*z*) PARIS. P. III. t. 16.

(*a*) DIEMERBROECK p. 74.

(*a*) Piscium multorum fel semotum a jecore & adjunctum est intestino ARISTOT. *part. anim. L. IV. c. 2.*

(*b*) Aliis piscibus fel in jecore, aliis sejunctum & dependens ARISTOT. *hist. anim. L. II. c. 15.* Modo ab hepate pendere, modo ad intestinum adhærere RONDELET L. III. c. 20.

(*c*) In iconibus BLANSIANIS.

(*d*) Per membranas tamen adhæret HARTMAN.

(*e*) CHARLETON l. c.

(*f*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs. 85.*

(*g*) REDI p. 4. 5.

(*h*) SEBA l. c. BLAS p. 281.

(*i*) VESLING *Epist. IV. SEVERIN. p. 234. In caudifona Phil. transf. n. 144.*

(*k*) PARIS. II. p. 105.

(*l*) PARIS. I. p. 219.

(*m*) CORTES apud ALDROV. I. p. 226.

Non tamen ideo continuo licet pronuntiare nullum esse in iis animalibus hepatis cum vesicula commercium: nam uti plerisque avibus, ita & in iis speciebus, parum puto perspectis, aliud genus communicationis locum habere potest.

Et nimia quidem fere sunt, quæ de hepatis a vesicula distantia dicuntur. Nihil simile vidi in piscibus, quos dissecai, etiam in trocta, quæ de salmonis genere est.

Deinde ductus quidem cysticus in intestinum peculiari loco se aperit. Sed oriuntur de hepate radices, quæ in unum ductum confluentes, etiam in duos, pluresve, aut in vesiculam se inmittunt. Alias non ex hepatis quidem parenchymate, sed ex ductu hepatico nati rami in vesiculam se inaniverunt.

Frequens id est imprimis in avibus. Ex ipso hepate ductus in cystidem inmittitur in phœnicoptero (*n*), scope (*o*), anfore (*p*), cornice (*q*), fulica (*r*), falcone (*s*); aut duo ductus in platea (*t*), ibide (*u*), ciconia (*w*), corvo (*x*), & incerto numero in ave regia (*y*).

Ex ductu hepatico in vesiculæ cervicem aperti ductus sunt in ardea (*z*), grue (*a*), butauro (*b*), laro (*c*), aquila (*d*), bubone (*e*), avibus gabbiai & mugna (*f*); inter quadrupeda ovipara in testudine (*g*), crocodilo (*h*), vipera (*i*).

(*n*) PARIS. P. III. t. 10. p. 47.

(*o*) P. II. p. 8.

(*p*) ALDROV. L. XIX. p. 107.

(*q*) PEYER p. 100. Locum insertionis non nominat.

(*r*) IDEM p. 104. perinde.

(*s*) p. 107.

(*t*) PARIS. P. III. t. 6.

(*u*) P. III. t. 14.

(*w*) Ibid. PARIS.

(*x*) PEYER p. 101. 106.

(*y*) PARIS. P. III. p. 204.

(*z*) FANTON.

(*a*) CALDESI tab. 5. f. 3. FANTON.

(*b*) CALD. Ib. f. 4. duo rami in collum inserti.

(*c*) FANTON. diff. anat. p. 264.

(*d*) Duo CALDESI t. 5. f. 6. Unus PARIS. II. p. 96. in fundum vesiculæ insertus. magni & multi HARDER apiar. obs. 15.

(*e*) CALDESI t. 2. f. 1. in cervicem. Hepaticysticum ductum habet PEYER p. 113. WEPPER cicut. p. 173.

(*f*) In corpus vesiculæ CALDES.

(*g*) Giorn. di Parma 1687. p. 68. CALDESI t. 4. p. 37.

(*h*) PARIS. P. III. t. 25. in cervicem.

(*i*) VESLING Epist. p. 72.

Sic in piscibus ego teneros meatus (*k*) ex hepate in vesiculam venire, in raja (*l*), acipensere (*m*), dentice, muræna, gladio : adde salmo- nem (*n*), garfish (*o*), torpedinem (*p*), milvum (*q*).

Omnibus comparatis, nihil hi ductus a communi fabrica videntur differre. Nam per continuos gradus, hepaticus porus cum cystico ductu, vel proxime intestinum (*r*), vel pluribus ramis (*r**) & superius, ut in homine, & in cervicem vesiculæ (*s*), & demum in ipsum ejus corpus, aut ipse convenit, aut inmittit ramum, pluresve ramos.

Ipsi ductus, qui in vesiculam inferuntur, sunt ab hepatico meatu, quoties in minima inquiritur (*t*).

Etsi nunc paucæ aliquæ avium aut piscium sunt species, in quibus nemo hactenus hepatici ductus commercium cum vesicula fellis profectus est, valde tamen probabile fit, ex analogia numerosissimarum specierum, ex eadem classe sumtarum, & univerforum quadrupedum, etiam in iis animalibus ejusmodi commercium iri repertum, si periti incisoris curiositas accesserit.

§. V. I. *Ductus hepaticystici quadrupedum.*

In testudine, vipera, crocodilo, anate, torpedine duplex est ductus hepatici cum vesicula commercium; prius, per ductus cystici cum hepatico consensum, alterum per ductus hepatici ramulos cervici, corporive cystidis felleæ infectos.

Hæc nunc eadem in plurimis quadrupedum est fabrica, ut & cum cystico ductu chōledochus jungatur, & præterea alii canaliculi minores numerosi de hepate prodeant, seque in vesiculam inmittant.

(*k*) Bilem a jecore per meatum proximum adtrahit SEVERIN l. c. In cervicem COLLINS p. 456. f. 15. 12. In testudine terrestri & marina in cervicem.

(*l*) ARIST. *hist. anim.* L. II. c. 15. inde RONDELET L. III. c. 20.

(*m*) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 1. obs.* 85.

(*n*) COLLINS t. 38.

(*o*) Tres in cervicem LORENZINI p. 23.

(*p*) REDI c. 4. 5.

(*q*) In lutra.

(*r*) In testudinis duabus speciebus CALDESI t. 4. f. 11. 12.

(*r**) p. 505. Leviter nexa in erinaceo cum hepate vesicula. Sed ductus hepatici duo in cysticum inferti. CALDESI p. 43.

(*s*) CALDESI icon. t. 2. & 5. PARISINI.

Primaria experimenta sunt in bove facta, cujus maximum hepar inquirenti se facilius præbet. Similem ut in avibus ductum reperit in bove Societas Amstelodamensis (a), & post eam Cl. PERRAULT (b), grandem utique, & in ipsam vesiculam apertum, ut ostio præfixam valvulam (c) haberet: altero fine in ductum hepaticum aperiri PERRAULTUS addit (d). Unum alterumve ductum in bove ex hepate in vesiculam patere PECHLINUS auctor est (e), multos in corpus vesiculæ, & majorem valvula munitum in cervicem insertum BLASSIUS dixit (f). BOHNIIUS vasculum inter ductum hepaticum & vesiculam medium habet (g), sic in bove VERHEYENIUS (h). Similes inter ductum hepaticum & cysticum communicationes BIDLOUS pinxit; & unum majorem & plures minores ductus ab hepate natos in vesiculam duxit (i), & ex ove (& bove) DUVERNEYUS (k), nam huic ob memorabilem magnitudinem refero, etsi ostio cervici sunt propiora. Numerosa, & in vesiculam & cervicem in bove ostiola CALDESIUS pinxit (l), & dixit WEPFERUS (m), FANTONUS in bove ductus ab hepatico plures in cysticum canalem vidit produci (n), magnos etiam vidit SEGERUS (o), & omnino CALDESIUS in vitulo, ligato cystico ductu, per hepaticum aerem in vesiculam adegit, cujus in vicinia cum collo per conspicuum ostium exiit (p). Deinde prior GLISSON (q), & post eum Cl. PERRAULT (r), minorem ductum aciculæ fere capacem ex hepate natum pro re nova,

(a) Colleg. priv. Amst. obs. p. 16. 17. f. 7. BLAS miscell. p. 287. 288.

(b) Description d'un nouveau conduit de la bile. *Essays de physiq.* T. III. p. 339. 348. tab. 2. Journ. Sav. 1680. n. 26. *Mém. avant.* 1699. p. 476. T. X. Socius inventi PEQUETUS est, cui hoc loco tribuitur.

(c) PERRAULT G. p. 341.

(d) l. c. F.

(e) *Purgant.* p. 498. 499.

(f) *Anat. Anim.* p. 20.

(g) *Act. Lipsf.* ann. 168. t. 2. quæ non sunt ad manus.

(h) Quatuor D. D. f. 6. t. 11. p. 94. 95. Adde post L. I. p. 23.

(i) t. 38. f. 4.

(k) *Mém de* 1701 p. 156. f. 2. 3.

(l) t. 2. f. 3.

(m) *Cic. aquat.* p. 176.

(n) p. 111.

(o) p. 17.

(p) CALDESI p. 44. 45.

(q) p. 136.

(r) *Ess. de Physiq.* T. III. p. 341.

etiam duos GLISSONIUS vidit (s); & cum hepaticis ductibus communicare reperit (t). Habet ejusmodi ductum in ove COWPERUS (u); habet GLISSONII fere verbis in bove BOHNIUS (w). in bubulo ductu cystico LOQUETUS decem ostia duoque majora vidit cervici vicina (x). Unum in collo WEBBERUS (y). Unum in cervice, plura in vesicula FANTONUS (z), RUYSCII figura pertinet ad vulgarem illam fabricam; secundi hepatici ductus in cysticum inserti (a). In ove quatuor, in cervicem apertos ductus pingit CALDESIUS (b), unum in lepore (c), inque erinaceo (d), idemque multis in animalibus eandem fabricam locum habere addit (e). Vidit in lupo J. M. HORMANNUS (f), neque in cane desiderantur (g), cum hepate pressa bilis guttulæ per oscula in folliculum elabantur (h). In lutra numerosos poros & in cervicem & in ductum cysticum apertos (i), idoneus auctor dixit.

Inflato ductu choledochi, cystico ligato, aerem in vesiculam irrumperet, & in vivo animale, dum calet, bilem de revulsis radiculis effluere SCHACHERUS (k).

Etiam hæc fabrica cum ea consentit, in qua plures ductus hepatici cum unico ductu cystico conveniunt. Adparet enim etiam in quadrupedibus hanc conjunctionem, modo pene in exitu cystici canalis (l), modo alibi per ejus longitudinem, aut simplici canali (m), aut duplici (n), modo

(s) p. 138.

(t) p. 180.

(u) Ad BIDL. t. 38. f. 4.

(w) *Circul. Anat.* p. 232. 235.

(x) n. 15.

(y) *Cicut.* p. 176, *apopl.* p. 355.

(a) *Obs.* 31. f. 31.

(b) t. 2. f. 4. p. 45.

(c) f. 7.

(d) t. 5. f. 2.

(e) p. 44.

(f) v. HORNE p. 162.

(g) Desiderari BOHN. *Act. Erud.* 1683. p. 127.

(h) PECHLIN *progr.* p. 458.

(i) LORENZINI *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 9. 10. *obs.* 175. *Grampsis* p. 23.

(k) *Administr. vasor.* p. 38.

(l) p. 529.

(m) In homine.

(n) p. 505.

modo in cervicem (o), modo in vesiculam perfici (p), quæ sit cystici ductus caput & initium.

§. VII. *In homine.*

GALENUS de meatibus in vesiculam ducentibus primus sermonem fecit (a): deinde *Julius JASOLINUS* (b), in cervice vesiculæ humanæ, cis incurvationem, aliquot oscula pinxit, & manifestius vascula tenuissima vesiculæ dixit se invenisse, ex hepate (c) nata. Eadem sede repetiit *SPIGELIUS* (d), neque improbavit *RIOLANUS* (e). Et *HIGHMORUS* (f), similia vascula pinxerat, & toti vesiculæ & cervici inserta, & ductui cystico. Inde *A de MARCHETTIS* (g), poros in fundo vesicæ felleæ vidit, qui bilem sudant, dum de hepate separatur (h).

Johannes BOHN (i), ductum *GLISSONIANUM* bis in cadavere humano sibi visum esse auctor est. *DUVERNEYUS junior* (k) multa oscula vasorum biliariorum, oblique vesiculam perforantia in humano cadavere, sed valde morbofo vidit. *Cl. BRANTHWAIT*, inflato porro bilario, aerem per multa oscula in vesiculam penetrare, demonstravit auditori *DRAKIO* (l). Neque tamen hominem ait fuisse, quem incidisset.

Johannes FANTONUS (m) quem adeo nuper amisimus, cum suspi-

(o) p. 529. 533.

(p) *Ibid.*

(a) *Loc. adfect.* L. v. 6. Hepatis pars cava vesiculæ fellis bilem dat *POLLUX* p. 256.

(b) f. 2. inter u. & x.

(c) c. 5. & ic. cit a. a. a. a. f. 1. D. D. p. 57.

(d) p. 238.

(e) *Icones* laudat *RIOLANUS* p. 74. & 126. Addit vesiculam tenuiorem bilem per membranas de hepate fugere p. 130.

(f) p. 58. t. 5. f. 1. 2. e. e.

(g) *Phil. transf.* n. 307.

(h) Sic *FRANK. diapedes restitut.*

(i) *Circul. anat.* p. 235.

(k) *Mém. de l'Acad.* 1701. p. 150.

(l) L. I. p. 210.

(m) *Anat.* p. 111.

catus effct, etiam in homine ejusmodi ductum reperiri, & in bove facile reperisset (n), frustra quæpe in eos per humana cadavera inquisisset, denique in icterico (o) credidit, se vidisse ductum ex hepatico in cysticum communicantem, ut tamen ipse fateretur, rem ambiguum esse, neque se suo experimento multum tribuere. Idem alio loco peramplos in ductu hepatico hominis meatus excretorios styli capaces describit (p).

Inter nuperiores CAJETANUS TACCONUS (q) admittit equidem eos ductus, magis tamen ob physiologicam aliquam necessitatem, & quod obstructa a calculis vesicula tamen amarum bilem continuerit. Eodem fere modo ligato cystico, inflato (r) choledocho, vesiculam tamen tumuisse legimus. Sic JOSEPHUS PAPA ductus ejusmodi admittit (s).

Vere in homine repertos esse, inter hepaticum ductum & cystidem communicantes, WINSLOWUS refert (t), non proportio, quantum videtur, usus experimento. Post eum ILL. SENAC (u), alii (w), & CL. GALEACIUS (x), ductum reperit a vesicula biliaria ramis suis ortum, & in ductum hepaticum apertum; sed fatetur, in caveam vesiculæ non patere.

In cadaveris humani monstrifica vesicula ductum hepaticocysticum ostensum (y) esse lego. Oscula aliquam stili portionem admittentia non rejicit MORGAGNUS (z).

Manifestius CL. BERTRANDI (a) ductus ait, a poro hepatico ortos, divisos duos in duos, tresve minores ramos, euntes versus vesiculam, eique insertos osculis fetam recipientibus, neque habuisse valvulas: in homine se vidisse non addit.

Ductus ab hepate in collum vesiculæ abeuntes GARENGEOTUS a
Cl.

(n) Ibid.

(o) *Diff. anat.* p. 249. 250.

(p) Ibid.

(q) *Hepat. adfect.* p. 335. *Comm. Nor.* 1743. hebdom. II.

(r) *Bresl. Saml.* 1723. Januar.

(s) *Humor. c.* 8. p. 107.

(t) n. 296.

(u) Ed. 1735. p. 174.

(v) VERDIER T. H. p. 105. *Elem. de Physiol.* p. 76. 71. BARBAUT *Splanchnolog.* p. 151.

(x) *Comm. Bonon.* T. II. P. II. p. 333. 336.

(y) *Phil. transf.* n. 449.

(z) *Advers.* III. p. 57.

(a) p. 28. seqq.

Cl. VERDIER ostensos esse adfirmat (b). Refert Cl. WESTPHAL (c) experimentum, in quo de toto hepate inferiori exilissimi ductus in principio filo non latiores, in progressu diametro majori aucti, ad vesiculam accesserint, & in tres ramos bile plenos collecti in collum vesiculæ se inmiserint, ut per eos cystis inflari potuerit.

In homine ductus ex hepatico in vesiculam ducentes & apertos repertos esse C. N. JENTY (d), Cl. DETHARDING aliud quid, huc tamen pertinens, profert, duos nempe ductus bilarios proximos ramulis inter se mutuis communicasse (e). Ex his, & ut puto, ex brutorum animalium historia, J. Baptistæ BIANCHI systema ornavit, productis etiam suis in homine factis experimentis. Ductus esse alios *cystibepaticos* (f) fecit qui ex præcipuis hepatici pori truncis oriantur, & inferantur circa vesiculæ cervicem, qui iidem ductus bilem ex vesicula in porum bilarium efferant.

Alios contra *hepaticocysticos* (g) dixit, qui & ipsi ex ductus hepatici, sed ex minimis ramulis nascantur, exilissimi, inque corpus ipsum fundumque vesiculæ aperti; ex hepate bilem in folliculum deferant.

§. VIII. De iis ductibus dubia.

Primus, puto, PECHLINUS (a) venas esse monuit, quas HIGHMORUS pinxisset.

Deinde *Fridericus* RUYSCHIUS, idoneus in iis auctor, quæ sola industria professoris nituntur, in prioribus jam operibus oscula perpauca, si ulla, in vesicula admisit, ut de iis eum dubitasse manifestum sit (b).

Deinde e ductu cystico (c) radices advenire dedit, omnino quales ter quaterve vidimus; nempe ductus ab hepatico præter communem confluentem

(b) *Splanchnolog.* T. II. p. 296.

(c) *Exsistent. duct. hepaticyst.*

(d) *Cours. of anatomy* II. p. 118.

(e) *Anat. jucund. & util. dem.* 3.

(f) t. 5. d. d. p. 961. & c. 20. p. 15.

(g) t. 5. a. a. a. p. 115. & c.

(a) P. 497.

(b) *Obj.* 31.

(c) *Mus. rar.* p. 183. & *Thef.* IV. n. 87.

fluentem in cysticum missos. Quæ vero in fundum ire dicerentur cystidis (d), ea vasa rejecit, & demum vesiculæ radices in universum refutavit (e).

COWPERUS (f) etiam, cum BIDLOI tabulas ederet, in homine nihil simile se reperisse memoravit. P. J. HARTMANNUS (g), ductus GLISSONII negat se invenisse.

Rejecit inde BERGERUS (h), RUYSCHII discipulus, & major DUVERNEYUS (i); & in universum nuperiores se in iis viis admit- tendis difficiliores ostenderunt, MORGAGNUS (k), HEISTERUS, Janus PLANCUS (l), LUDWIGIUS (m), PERSON, LIEUTAUD (n), DISDIER (o); & junior PEYERUS (q). Addidit CHESeldenus (s), revincto, vel obstructo, ductu cystico non intumuisse vesiculam, ut quidem in bove (t): eo major autem ejus vi auctoritas est, quod eos ductus a se inventos fuisse putaverit. Qui peculiarem laborem in viis bilariis impendit Cl. GIERING (u), eosdem omnino rejecit, eademque est egregii viri SEGERI opinio (w).

Vasa fuisse, rubra, quæ pro bilariis ductibus habita fuerint, post PECHLINUM, RUYSCHIUS (x) & GUNZIUS (y) monuit, & PERSON: ductusve hepaticos alii, supra vesiculam repentes (z).

Ego quidem sæpe in humano hepate sum expertus, neque unquam vidi, alia via, quam per ductum cysticum, bilem ex hepate in vesiculam venisse: neque vidi inflatum ductum choledochum, revincto cystico; tamen

(d) Ibid.

(e) *Respons. ad BIDLOI vindic. p. 38. &c.*

(f) *Tab. 38. f. 3. et si in ove adsint & in bove.*

(g) *Perit. anat. vet. spec. p. 59.*

(h) p. 223.

(i) *Postb. T. II. p. 233.*

(k) *Epist. I. n. 42. etiam sed. caus. morb. L p. 252.*

(l) In *hist. Catharinæ VIZZANI.*

(m) *De viis cystic. bil.*

(n) *Essays p. 305.*

(o) Negat se de iis ductibus sibi satisfacere potuisse I. p. 172.

(q) *Obs. p. 32. in rana.*

(s) p. 163. 166.

(t) CALDESI l. c.

(u) l. c. p. 374.

(w) *Dissert. cit. p. 14. 18. 24. &c.*

(x) *Epist. V. p. 19. Thes. IV. l. c.*

(y) *De hepat. n. 11.*

(z) SEGER p. 21.

tamen aerem in vesiculam dedisse; uti ductu hepatico avium, aut boum inflato vesicula turget. Sæpe etiam ductum hepaticum tenui materie replevi, quæ in cellulosa spatia circumposita exsudaret: nihil ivit in vesiculam.

Sollicite denique vesiculam felleam (a) de hepate solvi, ut singula vascula numerarem, quæ refecarem: vidi ramos arteriosos plurimos ex hepatico vesiculæ alveo in ejus membranas tendentes: vidi venulas: vidi cellulosa fila, omnia ista flavissima (b), ut facile pro biliariis canalibus habuissem, si placuisset mihi imponi. Sed originem naturamque veram follicite rimatus, nunquam reperi bilarios esse meatus, aut in cavum cystidis patere. Non repugnat, ut a membrana externa hepatis (c) alibi, sic ex ea sedē, qua vesiculam tegit, ductus bilarios nasci, & eo GALEACII referas adnotationem.

Neque vidi, cum vesiculam aere plenam, aut bile, de hepate solverem, ullam particulam ejus humoris aut de vulnere hepatis stillasse, aut de vesicula lente revulsa.

JASOLINUM, & Clar. VIROS BRANTHWAITH BERTRANDI & SCHACHER nihil repugnat animalia incidisse.

Pro ostiolis in vesicula visis, folliculorum ductus excretorios, aut scrobiculas inter retis villosi areolas credo habitos esse.

In morboſis cadaveribus potuerunt de hepate viæ non naturales in vesiculam se aperuisse. Contra WESTPHALIANAM adnotationem a testibus præsentibus dubia mota percepi.

Quare omnibus computatis, non credo eas peculiare bilis in vesiculam felleam vias, in historiam constantiori fabricæ humanæ recipi posse, Si unquam vere adfuerunt, pro *varietate* habuerim, quales a communi modulo recedentes vasorum distributiones non rarissime etiam in aliis & maximis vasis reperimus.

SECT.

(a) Sic MORGAGN. Ep. I. n. 42.

(b) Etiam lymphatica circa vesiculam vasa flava sunt & subamara KERKRING obs. 5.

(c) p. 511.

(d) Ita ORTLOB *cholepojes*. negot. n. 21. neque aerem, neque bilem effluxisse vidit.

S E C T I O . I I I .

B I L I S .

§. I. Num duplex bilis

PRIMUM oportet statuere, qui liquor bilis nomine venire debent. Vulgo omnem humorem ita vocamus, qui vel in vesicula biliaria continetur, vel in vasis illis de hepate ad duodenum patentibus. Intercessit nuper VIEUSSENIUS (a), qui id omne lympham vocat, quod est in hepate, ut hepar princeps lymphæ colum (b) sit.

Statim adparet, si eam rationem tenuerimus, bene multa animalia absque bile esse, ea nempe omnia, quæ vesicula ab hepate diversa destituuntur. Non bene tunc quidem, cum eorum animalium aliqua veram, amaramque bilem in hepate habeant, ut cervus (c), elephas (d).

Bilis ergo est, quæ de hepate per ductus bilarios exit; superest ut quaeratur, num ejusdem cum cystica generis sit: num oporteat duas facere bilis species.

Equidem non infrequenter in humano hepate subflavum, non spissum, parum amarum, modice mordacem liquorem reperi, cum cystica bilis amarissima, & viscida & obscuri alicujus coloris esset (e). Renoni nulla vesicula, sed hepar dulce (f). Quæ felle carent animalia, iis hepar dulce (g); & in equo credas debiliorem bilem esse, cum PLINIUS inter fella medicata animalium equinum damnari ajat (h). Columbæ bilis viridis, sed non amara (i).

Videntur hæc cum JASOLINI (k) placitis consentire, qui obscuram
&

(a) *Obs. d'anatom. & de medec. prat.* p. 171. 173. Paulum bilis a cysticis ramis accipere dat p. 171.

(b) p. 218.

(c) Intestina cervi amarissima ARISTOTELES *hist. anim.* L. II. c. 15. Amariusculum hepar DOEREL *Jäger prat.* p. 13.

(d) MOULINS.

(e) Dulcem olim ALBINUS.

(f) LINT. *cervus rhen.* p. 19.

(g) ARISTOT. *part. anim.* L. IV. c. 2.

(h) PLIN. L. XXVIII. n. 40.

(i) Cum vesicula careant *Oeconom. Abhandl.* T. V. p. 80.

(k) *Epidoch.* III. c. 2. 4.

& pernissam de hepate bilem advenire docuit, in vesicula claram & sinceram. Ita MALPIGHIUS (*l*), hepaticam bilem flavam & minus amarum reperit, cum vesicula destructa esset, & hepaticam puram haberet. PECHLINUS (*m*) in avibus inque rana nigricare hepaticam bilem, cysticam vivere reperit.

Melius, si nostris adnotationibus credimus, *Johannes BOHN* (*n*) ex hepate canis bilem aqueam, modice amaram, pene falsam effluere vidit; & in vesicula viridescentem, & obscuram posuit. Bilis in duodeno flava, cum in folliculo viridis esset RIDLEY (*o*). Dulcior hepatica bilis, cystica amara (*p*), [cum dulcedine] & viridior (*q*). In noctua PEYERUS Junior (*r*), in hepatico poro amarore viridem & tenuiorem, in folliculo atram & amarissimam collegit. Et hæc fere recepta est sententia (*s*), ut duas biles fere scriptores admittant (*t*). Sulfuream magis bilem hepaticam, & contra salinam atque terream, quæ in folliculo est GALEACIUS (*u*).

Neque tamen desunt contrariæ sententiæ suæ rationes; nam & cystica bilis sæpe absque amarore fuit, aquea, & fluida; & in fetu (*w*) constanter dulcis est, mucosa, rubra, insipida.

Etiam

- (*l*) *De liene* c. 6. p. 120. seq. *posth.* p. 33.
 (*m*) *Purg.* p. 493. BARTHOL. *anat.* p. 281. SCHELHAMMER I. c.
 (*n*) *Circ. anat. phys.* p. 233. 236. VERDUC *usag. des part.* T. I. FANTON. *anat.* p. 115.
 (*o*) *Obs.* p. 220. 221.
 (*p*) VERHEYEN II. p. 79. Non amara ROEDERER *progr.*
 (*q*) ORTLOB *cholep.* n. 17.
 (*r*) *Obs.* 50. p. 113.
 (*s*) BLANCHI *hist. hepat.* II. p. 94. REVERHORS T & c.
 (*t*) BARTHOL. *lact. thorac.* p. 61. PECQUET *diff.* p. 91. BÖHN. I. c. BAYLE. *corp. anim.* p. 287. KEIL. *abridgm.* p. 76. JUNKER p. 288. FIZES *physiol. conspect.* p. 27. VERHEYEN II. p. 29. SCHELHAMMER *physiolog.* p. 212. 213.
 (*u*) *Comm. Bonon.* l. c. p. 356.
 (*w*) In fetu non amara est SWAMMERDAM *resp.* p. 113. WIDEMAN *corputent. nim.* VIRIDET *bon chyle* p. 254. SANGASSANI *Gal. di minerv.* V. p. 267 albumine plena in puero *Eph. Nat. Cur. Dec. Vol. IX. obs.* 102. adv. RIDLEY p. 196. Ego in fetu & in nuper nato homine, & in puero 14. dierum insipidam reperi: semel in modo nato sub. amarum. In calculosis pene constanter insipida est. In febre BIANCHI p. 942. In hydrope RIDLEY p. 174. de HAEN T. IV. p. 123. & c. In cachexia LIEUTAUD p. 91. In vetula ichor coagulabilis in folliculo LANCISI *diff.* 3. In alio casu COS *bil. concret.* p. 157. In ictero *Cal. di minerv.* T. VII. p. 198. Vidit etiam non acrem WIERUS ad HILDANUM.

Etiam in ranunculo (x), inque pullo avium teneriori (y) insipidam reperi (z). Eadem hora 303. bilis in pullo (a) acris fuit, & hora 336, amara (b).

Et vicissim diversitatem hepaticæ bilis a cystica idonei judices nullam reppererunt (c). Amaram in minimis ductibus hepaticis magni testes viderunt, & ipse non frequenter, sed tamen in sanâ & strangulata femina, iterumque in fure suspenso amaram reperi, ut in vesicula tamen furis cystica bilis amarior & viridis esset. Ex hepate vulnerato bilis flava & amara fluxit (e), & amarissima fuit in ductu hepatico, cum vesicula a calculis obstrueretur (f). Horum similia *Guilielmum* COLE (g) vidisse necesse est, qui acriorem hepaticam bilem, cysticam mitiorem fecerit, cum a cysticarum glandularum succo mitigetur.

In elephanto etiam, cui nulla vesicula sit, sed choledochus ductus peramplus, tamen in poro flavam tenuiorem & gelatinosam, in eo receptaculo vero, quod hæc bellua solum habet, viridem bilem bonus auctor vidit (h). Sic in scirrhus hepate, cum reliqui rami aperti haberent bilem fluidam, in scirrhusa parte virefcebat (i) eadem; & in ductu choledochi, cum nulla vesicula esset, satis amaram ILL. HUBERUS (k) reperit. Cum vesicula inutilis esset, multa & amara tamen ad duodenum fluebat (l).

Hæc omnia collecta ostendunt, in hepate quidem bilem minus amaram esse, posse tamen per moram solam in robusto animale, & denique in sano homine, amarefcere, dotesque consequi, quæ sunt in cystica bile. Contra bilem quidem cysticam in sano & adulto homine amaram: neque tamen hunc saporem ei proprium esse, cum ad cysticam fetus

bilem

(x) SWAMMERDAM *bibl.* p. 824.

(y) *Form. du poulet.* T. II. p. 126.

(z) MAITREICAN *form. du poulet.* p. 205.

(a) l. c. p. 122.

(b) SCHENK *exerc.* p. 400. DIEMERBROECK. p. 72. RUYSCH. *obs.* 31.

(c) FERREIN *Hist. de l'Acad.* 1733. POZZI *Epist.* p. 77.

(e) *Hist. de l'Acad.* 1730. p. 40.

(f) LUDWIG *de viis bilis cyst.*

(g) *Secret. anim.* p. 240.

(h) MOULLIN p. 22.

(i) BOHN. p. 245.

(k) *Phil. transf.* n. 492.

(l) LUDWIG *de viis bilis cysticæ.*

bilem nondum quidem accesserit: ne bile morbosa denique frequenter decedat.

§.II. *Bilis indoles propria viscor, pondus.*

In hoc toto fermone bilem dicemus, quæ de cystide fumitur. Amorem enim, & reliquas dotes bili proprias perfectiores possidet, & facilius ad experimenta colligitur.

Prima fere dos bilis est, viscidam esse: eam enim naturam in fetu præ se fert, quando neque amaro natus est, neque color.

Est autem inter viscidissimos humores, ut calida bilis octies plus sustineat ponderis quam aqua (a). Cum albumine comparat Cl. VISSCHER (b).

Ea viscedo augetur, tum per ætatem, nam bubula, quam vitulina (c). viscidior est, tum per morbos; abit enim & in olei (d) speciem, & in gluten vix a membranis detergendum (e), & similis in boum lue reperta est (f): sic in peste bilis viscida fuit (g), & in febre leipyria (h), & flava illa Americani (i) morbi bilis viscida est, & in variolis fuit (k), & in mania (l). Picea, spissa, & fætida in femina post magnos moerores (m). Et in podagrico similis (n). In ictero vesicula atrabilario succo plena (o) fuit spissifove

(a) SAUVAGES ad HALES *bamastat.* b. 43.

(b) l. c.

(c) ROBINSON *on the act. of. medicam.* p. 200.

(d) BORDEU *recherch. sur les glandes* p. 300. & scirrhum pancreas, post frequentem vomitum.

(e) In vacca morbosa coacta in suis vasis ad coralli morem. *phil. trans.* n. 358.

(f) *Fränk. Anmerk.* II. p. 105. SAUVAGES *Mém. sur la malad. des bœufs,* p. 16.

(g) COVZIER *tr. de la peste* p. 398. 402. SOULIER *ibid.* p. 278. a CASTRO *pest. Rom.* p. 10 ut vix detergeri posset. Viscidissima, fila. trahens RIRDEL *Versuch von der Viehseuche.* Pici fuscae similis MANGET *reflexions* p. 162.

(h) BARRERE *obs. nov.* p. 133. seqq.

(i) *Ess. of. a Societ. at Edimb.* T. II. p. 384. Ed. nov.

(k) HOFMAN *bil. med. venen.* n. 12.

(l) IDEM *ibid.*

(m) G. v. SWIETEN *Comment.* T. III. p. 500.

(n) HOFMAN *Consult.* T. II. Dec. V. c. 3.

(o) VALCARENGHI *med. ration.* 1737. p. 94. Vesicula turgida palmum longa. Bilis coagulata scissilis.

fove sedimento (*p*), inque fluxu hepatico (*q*). Post colicam materies picea per vomitum, & alvum egesta (*q*^{*}).

Demum omnium frequentissime, ut alias dicetur, in calculum cogitur.

De pondere ejus aliquantum ambigitur: graviolem quidem, quam aqua est, omnes fecerunt (*r*), & bilis bubula in aqua fundum petit (*s*): sed levior quam lac (*t*) aliis, & certe quam sanguis (*u*) est.

Sed HARTMANUS bilem etiam sanguine ponderosiolem reperit (*w*), & Cl. PAYEN (*x*), omnino tota sedecima parte sanguine ponderosiolem. Potest in ipsa bile varietas subesse.

Globulos; sed minimos dicitur continere (*y*).

§. III. Amaror.

Quadrupedibus adultis, & homini, bilis sana est amara, ut maximam aquæ portionem suo sapore imbuat admista, & sex guttæ aquæ unciam vehementer amaram reddant (*a*). Amarior tamen est animalibus adultis, tum carnivoris, si cum herbivoris comparaveris (*b*). Falconi amarissima.

In quadrupedibus oviparis acerrima (*c*) est, & pungente sapore: sic
in

(*p*) Schol. ad SPINDLER *obs.* 3.

(*q*) MESAPORITUS VALISNER. T. III. p. 167. tenacissimam, coloris piceæ, semper se reperire.

(*q*^{*}) VALENT. *Chir. med.* p. 229.

(*r*) VISSCHER *de chalep. obs.* n. 37. in ratione 102. ad 100. & 810. ad 795. Paulo aliter HARTMANNUS *coroll.* 1. 2. Ut 38: 37. LAMURE *des. secret in fin.*

(*s*) TORTI *therapeut. spec.* p. 32. BOHN. p. 247.

(*t*) Ut 272. ad 277. SILBERLING *ponder. specif. humor.* p. 15. ut 2004. ad 2086. Ad. FRIDER. HOFMAN *nov. hypoth. physiol.* p. 1. 5.

(*u*) Ut 272. ad 181. SILB. ut 395. ad 406. HAMBERGER in vacca p. 190. Ut 2006. 2072. Ad. F. HOFMAN l. c. Graviolem etiam faciunt. Batavi; ut VISSCHER l. c. p. 46. NARCISS. *de recept. Chyl.* n. 8. ex JURINO, ut ratio sit 100. 102. Pondus bilis bubulæ fuit 1. 0246. ad aquam, vitulinæ 1 0072. ovillæ fere tantumdem MUSCHENBROECK *Introd.* p. 558. sanguine adeo levior est, aqua gravior.

(*w*) Ut 129. ad 125. *ibid.*

(*x*) In Thesib. ann. 1735. Parisiis: propositis & prius BIANCHI l. p. 85.

(*y*) LORB. p. 140. ASCHE in *Disp.* sæpe cit. *obs.* 60. 61.

(*a*) Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. *obs.* 125.

(*b*) ROBINSON *Art. of medicam.* p. 200.

(*c*) In crocodilo HASSELQUIST p. 295. 601.

in piscibus, in quibus non adeo amara (*d*), acerbior tamen & diu durante sapore est, ut in cyprino.

Acidam fuisse, & heliotropii succum tinxisse in galeo (*e*) pisce, aut in Caudifona (*f*) vipera, id explices ab admisto alio humore, et in WOODWARDI (*g*), ægroto non quidem acida, & amara bilis os deglubens sibi alterne successit, sed bilis vicem acidum ventriculi liquamen (*h*) alternis vicibus tenuit. Eo acidam bilem veterum (*i*) refero, quam ajebant cum ipsa terra fervere. Acida cum stupore dentium redita fuit, sed ex abusu limonum (*k*). Minima enim acoris particula, quæ in bile latet, in sapore non est manifesta. Massæ quidem farinaceæ pro fermento esse potest (*l*), sed idem & caro facit.

Per morbos insipida fit (*m*), qualia exempla produximus.

Una fere crescunt hinc visciditas & acrimonia, inde per morbos tenuitas & aquea debilitas.

S. IV. Color

Color in plerisque animalium viridis (*a*) est, tum in piscibus (*b*), quadrupedibus oviparis (*c*), avibusque.

Carni-

(*d*) Amarissimam SCHÆPFER pisc. bavar. p. 31.

(*e*) PARIS. P. I. p. 122. Etiam vermibus diuturnus acer fapor in bile superest, ut in cochlea SEVERIN. Zootom. p. 331.

(*f*) MATHER Phil. transf. n. 339.

(*g*) Cases. p. 228.

(*h*) p. 316. 317.

(*i*) GALEN. de atrabile meth. med. L. XIV. Conf. SENNERT instit. med. L. II. P. II. c. 6.

(*k*) HUXHAM de colic. Danion. p. 20.

(*l*) BORELL. Cent. II. obs. I. ORTLOB Cholepojes. ZYPÆUS p. 81. Negat quidem SBARAGLI vigil. ment. & ocul. p. 117. Sed confirmat VALISNERI cum pane acetosum spirare & panem fermentare Gal. miner. VI. p. 87. Oper. III. p. 141. & lac coagere TESTI ibid. p. 148. & fermentationem augere PRINGLE p. 398. 413. de bile ovilla.

(*m*) Bilis iners cum secundæ ad quintum annum in abdomine mansissent PETERMAN T. I. obs. 5. In febre acuta tenuis nec amara bilis BIANCHI p. 942. In lue boum aquea MANGET l. c.

(*a*) In herbivoris, ove, capreolo, vacca cuniculo FLOYER præternat. state of hum. p. 115.

(*b*) Dulcem ex amara esse in fluviatilibus, & minus amaram quam quadrupedum FLOYER p. 118. non ita reperio: acerrima est, etsi non vere amara.

(*c*) Rana, chamaeleonte, HASSELQUIST p. 297. 298. testudine WELSCH hecatost. l. n. 47. Azurca caudifonæ vipera MATHER.

Carnivoris animalibus obscurior est color (d), & flavedo plurima admiscetur, ut in homine bilis extensa, inque minuta vasa translata, aut in succo aliquo diffusa, flava adpareat (e). In lepore rubra nigricat (e*).

In morbis pene ad nigredinem accedit, ut in peste (f), inque febre flava (g), morbo nigro (h), & in atrabiliis hominibus (h*), in peste boum (i).

Ab admistis contentis ventriculi & intestinorum color mutatur, ut idem homo, ex ordine, pallidam, vitellinam, æruginosam, statoden demum revomerit (m).

Crassiores esse particulas bilis; quando flavescit, tenuiores quando cærulescit, lego (n).

Cum amarore & viscedine intensior color conjungitur; aquosa & insipida expallescit in cachexia, hydrope, ictero: etiam in fetu ad bilem viredo die decimo (o), & undecimo [p] accedit, & præcedit amarorem [q], ut credas tingentes particulas prius generari, serius amaras. Ita per morbos colores induit varios, ut tamen in systema vix consentiant; Sic alias viridis in peste [t], & flava [u] fuit. In peste boum nigra [w] nigro viridis

(d) Nigra leoni BARTH. Cent. IV. n. 100.

(e) Flava est in cane, porco, homine, FLOYER p. 116. in mustela flammea IDEM p. 118.

(e*) BUFFON T. VI. p. 275..

(f) COUZIER l. c. & ibid. p. 201. 278. a CASTRO. DEIDIER p. 513.

(g) l. c.

(h) TISSOT Epist. p. 28. 29. WALTHER, ut etiam tingeret. In homine deliquis obnoxio bilis vesiculæ aterrima MORGAGN. fed. caus. morb. I. p. 251. Cum pancreate sub scirrhus nigerrima IDEM I. II. Epist. 30. Sanguini nigro similis dejecta PASTA in aphor. hipp. Ep. 69.

(h*) WALTHER de atrabile.

(i) Luteonigra Fränk. Anmerk. l. c. RAUDOT p. 22. Fusca SAUVAGES Mém. p. 16. MANGET reflex. p. 162. Scripta Soc. Danic. p. 393. seq.

(m) COBER Silesiac. V. p. 48.

(n) ROBINSON l. c. p. 198.

(o) Form. du poulet T. II. p. 125.

(p) MALPIGH. form. fet. II.

(q) p. 545.

(r) SOULIER ibid. p. 261. 264.

(u) SCHREIBER obs. 12.

(w) Vide not. (i).

(x) GOELICKE de lue contag. boum. PLANQUE III. p. 39.

viridis [x], sed alias splendens & fluida [z], & flava [a], alias æruginosa [b], alias picea, alias aquea [c] fuisse legitur. In hydrophobia viridis nigricans [d]: in hysterica aliquando isatodes [e] adparuit. Sed hæc omnia, & quæ alia his cohærent, nihil habent constans & perpetuum.

A rubiæ usu visa est rubro colore tingi [f].

§. V. Vapor.

Exhalans portio bilis recentis odore est fatuo [a], fere incisi abdominis: in nonnullis animalibus acrior, Ursi marini hepar odore fætido veratri [b] est, fætet mustelæ, & putorii [c], & bilis in lue boum fætebat [d]. Ut in moschi odorem transeat, continuo dicetur. Sic in femina post longos mœrores [d*]; & in hydrophobo (d**). Eadem particulæ exhalant, quæ colore sunt imbutæ, & sapore (e).

§. VI. Phænomena mixtionis cum aliis corporibus.

Bilis primum recens, facile cum aqua miscetur, cum oleo (a) difficilius (b): miscetur tamen intertrita (c): etiam calculus biliaris colorem & vim suam aquæ impertit, fere ut gummi gutta (d). Cum aqua
subacta

- (z) HILD. p. 28.
- (a) PLANQUE.
- (b) PLANQUE *bibl.* T. III. p. 31.
- (c) MANGET. *reflex.* p. 162. *Mém* 1748. p. 137.
- (d) LIEUT. *precis* p. 475.
- (e) FLOYER p. 117.
- (f) BOEHMER *effect. rub. tindor.* p. 24.
- (a) *Aromaticum* vocat RAMSAY *de bile* p. 4.
- (b) STELLER *Nov. Comm. Petr.* II. p. 344.
- (c) FLOYER l. c. p. 118.
- (d) GOELICKE l. c. MANGET l. c. p. 196.
- (d*) G. v. SWIETEN T. III. p. 500.
- (d**) JAMES p. 64.
- (e) p. 528.
- (a) VISSCHER n. 48. BOHN. p. 247. cum oleo juniperi C. J. LANG. FLOYER p. 124.
- (b) RAMSAY p. 5.
- (c) BOHN. p. 347. VISSCHER n. 48.
- (d) POMET *dict. des Drog.* II. p. 32. *Journ. des Sav.* 1690. n. 10. KUNDMAN p. 229. & de felle Tauri PLIN. L. XI. p. 628.

subacta vires gerit saponis, & solvit oleum [e], ut aquæ misceatur [f], & maculas omnes eluit, quæ ab adipe sunt [g]. Resinas etiam dissolvit & cum balsamis miscetur [h]. Et cum pariter in aqua diluatur [i], etiam gummi species varias dissolvit, ipsam myrrham, bdellium [k], & aloes viscorem optime destruit [l], & ceram, ut vitellus ovi colliquat [l*], Ad suum vernicem Chineses admiscunt [m].

Demum humores humanos creditur fundere [n], cum icterus sanguinis densitatem in aquosam tenuitatem mutet [o].

Quare vires dissolventes bilis inprimis in oculorum morbis omni tempore celeberrimæ fuerunt, & apud Græcos [p], & apud Arabes [q], & apud nuperos [r], demum & apud Chineses [s].

Adversus albuginem [t], & ungues [u] corneæ eo tempore, quo l. *Tobia* scriptus fuit, vulgo solebat adhiberi, & avium [w], & piscium [x] quidem etiam magis, & crocodili [y]. Crudo gallinæ jecore

(e) FLOYER *præternat. stat* p. 124. DOSSIE *introduc.* I p. 428.

(f) BAGLIV p. 428. VISSCHER l. c.

(g) HOFMAN *med. syst.* p. 183. Vermiculos cutaneos dissolvit HOMBERG. *Mém. de l'Acad.* 1709. p. 263.

(h) VISSCHER.

(i) Le FEVRE *physiolog.* p. 54.

(k) GESNER *quadruped. de Tauro.*

(l) *pharmacien moderne* p. 98.

(l*) *Act. Acad. Mogunt.* II. p. 193.

(m) *Mém. des savans étrang.* T. III. p. 121.

(n) QUESNAI *æcon. anim.* p. 181. G. v. SWIETEN III. p. 500.

(o) Coactionem impedire HEUERMAN T. III. p. 796.

(p) Suffusiones APOLLONIUS Pitaneus felle felino curabat PLIN. L. XXIX. n. 38 & MILETUS ibid L. XXV. n. 2. de felle humano: GALEN. ad PISONEM c. 9. de hyænæ felle. Ad amblyoniam fel hyænæ, perdicis, & aquilæ laudat ALVANDER TRALLIANUS L. II. c. 5. PLINIUS, & fel leonis PLIN. L. XXIX. n. 25. & MARCELL. *Empir.* L. XXVIII. n. 40.

(q) JAN. DAMASCENUS L. IV. c. 9. Ad oculos debiles fel avis Hoobaara SHAW *traveis* p. 252.

(r) De felle viperæ WEDEL *Eph. Nat. Cur. Dec I. ann. 2. obs.* 126. BARTHOL. *morb. bibl.* 12. 15. FORESTUS L. II. *obs.* 9. HEISTER *de cataract.* p. 182. MANUTII *hermes.* p. 786. de felle aquilæ MONTIN. *med. lap. Lule ens.* Ejusdem & cygni & lupi bilem in unguentum ocularium faciunt HARMENS *med. lap.* n. 15.

(s) Fel elephanti.

(t) Fel caninum DEMETRIUS *cur. accipit.* p. 559. vulturis IDEM p. 633.

(u) BURRHUS *de felle humano.*

(w) Aquilæ, aut vulturis fel ad suffusionem PLINIUS L. XXIX. n. 36. Rapacium avium AVICENNA L. II. tr. 2. c. 256.

(x) Hirundinis fel ad suffusiones RONDELET p. 286.

(y) HASSELQUIST p. 296.

jecore cæcitas vespertina (z) sanata legitur; etiam assum hepar (a), & fel ad pupillæ dilatationem (b) a veteribus laudatur. Ipse vapor coctorum hepatum, ad eandem cæcitatem (c), ad amblyopiam, ad morbos oculos vetustum est remedii genus. Ad corysam & oculos fellis tauri lapis (d).

Sed etiam scrophulas bile bubula FULVIUS GHERLI sanabat (e), & ganglion (f) tendinis extensoris frictione cum ea bile administrata superatum est: eademque & flatuosam colicam (g) dispulit. Bonum emeticum medicamentum est tinctura spirituosa fellis bubuli (h).

Ad icterum demum solvendum bilis bubula (i), & calculi bilarii ipsi (k), laudati fuerunt. Ad rachitidem fel anguillæ BOERHAAVIUS commendat (l).

In septentrione salmonis sicca bilis (m), ad varios morbos, & ad ulcera & tumores adhibetur.

Calidissimis in regionibus nimia sua acrimonia in venenum abit, ut ex pisce *guamajacuatinga* (n): tum fel bufonis *cururu* (o) apud barbaros inter summa venena habeatur (p); sed neque ego dosin majorem fellis cyprini facile deglutiri suaderem, in tanta acerbitate saporis.

Ita bilis cadaverum peste mortuorum in venas canis injecta (q) occidit. In acuta (r) febre, etiam in maligna (s) non perinde funesta fuit.

§. VII.

- (z.) SPORI *Reisebeschreib.* p. 9. C. Aug. a BERGEN in *disp.*
 (a) KRAMER I. p. 92. & anguillæ jecur PANAROL. *Pentec.* III. *obs.* 49.
 (b) AVICENNA I. c.
 (c) In China SAUVAGES *medic. sinens.* p. 4. Du HALDE LAMBERT *obs.* L. X. p. 212. *Recueil d'obs. cur.* p. 361.
 (d) AVIC. L. II. tr. 2. c. 400
 (e) *Obs.* p. 102. RONCALLI *hist. morb.* p. 43.
 (f) KALTSCHMIDT *de bilis intern. & extern. usu* n. 42.
 (g) ZACUT *prax. med. mir. obs.* 30. L. XXXI.
 (h) ARNAULD *hist. natur. des anim.* T. IV. p. 68.
 (i) VALISNER. L. III. p. 599. ad 15. & ultra guttas.
 (k) SCHMIDT *de usu bilis* SACHS *gammarolog.* KRAMER *Med. Castr.* I. p. 76. Ad viginti & quadraginta grana VALENTIN. *de pedra del porco* p. 18. & *polychrest. exot.* p. 43. SCHURIG. *lithol.* p. 790.
 (l) *Prax.* I. p. 164.
 (m) BRANDES *Piscatur.*
 (n) PIS. *hist. nat. bras.* L. I. p. 295.
 (o) IDEM p. 297. 298.
 (p) p. 272.
 (q) DEIDIER *exp. sur la peste Exp.* 2. 3. 5. *des tuma* p. 388. 389.
 (r) *Journ. des Sav. Decembr.* 1722.
 (s) DEIDIER *Exp* 10. ut tamen bestia ægrotaret.

§. VII. *Ut se habeat ad acida.*

Pleraque horum experimentorum cum bile bubula (a), aliqua cum oville (b), nonnulla cum canina (c), paucissima cum humana (d) capta sunt. Neque perperam: cum enim bilis a putredine insigniter mutetur, præstat, ut recens sit, ex bestiis domesticis habere, cum earum præterea bilis sapore, colore, aliis dotibus parum ab humana differat. Et etiam tunc metus est aliquis, ne putridæ bilis phænomena se in ea immiscuerint, quæ proponemus; plurima autem fide digna sunt GAUBIANA, descripta apud summi viri discipulos.

Initium faciemus cum mutationibus, quas bilis cum acidis subit liquoribus.

Præmittemus syrupum violarum, cum quo virescit (e), deinde cum tinctura malvæ (f)

Lac dicta est coagulare (g), non bene (h), cum etiam adtenuet: acescentiam arceat, etiam coactum lac solvat (i).

A contentis ventriculi porcini acidis cogitur (k).

Acidi sales sicci, ut albumen (l) bilem coagulant, fere ut spiritus acidi. Additur etiam eos cum felle effervesce (m).

Acidi liquores vegetabiles parum mutant, neque a vino fel cogitur, neque cum eo effervesce, ne cum rhenano (n) quidem acidiori. Sed neque putredo bilis a vegetabili acore impeditur (o). Cum succo limo-
num

(a) GAUBIANA, BAGLIVIANA p. 439. BOHNIANA, SCHEUCHZERIANA, VERHEYENIANA.

(b) BAGLIV. p. 436. seq.

(c) Apud ORTLOBIIUM.

(d) BAGLIV. p. 419.

(e) HOFMAN *med. syst.* I. p. 283. VERHEYEN L. II. p. 90. FLOYER p. 113. STIEF *Hamb. Magaz.* T. VI. n. 4. cum grumo nubeculoso viridi. Negat RAMSAY p. 5. Sed confirmat *de bile cystica* Cl. SPIELMANN. in literis ad me datis.

(f) DEIDIER *tum.* p. 52.

(g) TESTI *Galer. di minerv.* T. VI. p. 145. seqq. VALISNER. *galer. Minerv.* T. VII. p. 87. *Oper.* T. III. *Off. var.* p. 141. ORTLOB *cholepoje. negot.*

(h) Non cogit MOSEDER *negot.* p. 14.

(i) VISSCHER I. c. n. 49. NARCISS. p. 9.

(k) FLOYER. p. 124.

(l) FLOYER p. 121. ut grumi fiant flavi.

(m) HOMBERG *Mém. de l'Acad.* 1709. p. 360.

(n) BIRCH T. II. p. 22. Ab eo diluitur ORTLOB.

(o) BAGLIV. p. 439.

num non fervet (*p*), cum aceto etiam parum mutatur (*q*). Subsidebat tamen grumus viridis (*r*), & nonnunquam bilis coacta est. (*s*). Canina bilis cum aceto instillato in filamenta abiit (*t*), & a spiritu aceti distillato, etiam de æruginē, nihilo magis mutatur (*u*).

Cum omni acore minerali cogitur (*w*), dum satis meracus fuerit (*z*), & in durabilem offam tota abit, si is acor fuerit generosior (*y*), ut cere similis stet (*z*), & ad ignem demum colliquescat (*a*), etiam quando septem totis diebus servata (*b*) fuit, & demum in arenulas conteratur (*c*). Neque tamen id experimentum semper perinde succedit (*d*), neque cum felle nonnullorum animalium, ut talpæ (*e*), sciuri, erinacei, & piscium (*f*). Cum eodem fossili acore in universum viridem (*g*) colorem induit (*h*), quæ flava fuerit. Fætet acriter cum acidis liquoribus mixta (*i*).

A spiritu salis, qui reliquis liquoribus stillatitiis acidis de gente fossili debilior sit, etiam bilis minus efficaciter coagulatur (*k*), neque valde ejus phænomena differunt ab iis, quæ cum aceto (*l*) nascuntur. Grumus tamen

(*p*) LEONICEN. *metam.* p. 106.

(*q*) VISSCHER *cholepojes.* n. 49. Solvi potius SCHAPER *corp.* p. 27. Effervescere ROBINSON *oper. med.* p. 201. 202. aliter quam reliqui.

(*r*) STIEF. *Hamburg. Magaz.* T. VI. n. 4. RAMSAY p. 9. NARCISSUS p. 8.

(*s*) VISSCHER n. 50.

(*t*) ORTLOB n. 18.

(*u*) RAMSAY p. 9. Coactam fuisse CARTHEUSER I. c.

(*w*) VISSCHER n. 50. NARCISSUS p. 8. RAMSAY p. 6. HARTMAN.

(*x*) Non cogitur si debilis fuerit HARTMAN.

(*y*) HARTMAN *de bile.* BAGLIV p. 439. CALDESI p. 49. VERHEYEN II. p. 90. VISSCHER n. 50. NARCISSUS p. 8. NEUMAN p. 1253. Præcipitatur sedimentum RAMSAY. p. 6.

(*z*) HARTMAN.

(*) Ad bilem bovis & equi nupera experimenta Cl. BOURGELAT. Ab acore concentrato vitrioli cogitur absque fervore: cum spiritu nitri virescit: cum spiritu vini meraco addensatur ut albumen: sic etiam cum aceto radicali: syrupum violarum tingit colore viridi; MAT. MED. p. 19. In hydropica cum spiritu vitrioli effervuit. PRINGLE APPEND. IV. p. CXXVII.

(*a*) IDEM Ibid.

(*b*) Ibid.

(*c*) Ibid.

(*d*) IDEM Ibid.

(*e*) IDEM Ibid.

(*f*) IDEM.

(*g*) IDEM.

(*h*) VIEUSSSENS *traité des liqueurs* p. 357. BAGLIV. p. 429. Viridem cæruleum BROEN. *dupl. bil. vet.* p. 56.

(*i*) HARTMAN.

(*k*) FLOYER p. 120.

(*l*) STIEF. I. c.

Haller *Physiolog.* Tom. VI.

A a a a

tamen subsidet viridis. In canina bile nequidem fluida natura mutata est (*m*); bubula bilis, aliunde spissior, magis cogitur (*n*). Efferbuisse BAGLIVIVS (*o*), sed negant idonei testes (*p*), & experimenta ejus viri in bile putrida facta videntur, quæ utique cum ejusmodi acore ferveat; non ita sana & incorrupta (*q*). Si idem salis spiritus meracior fuerit, utique bilem in offam coagulat (*r*). Auget idem amarorem (*s*).

Spiritus nitri bilem efficacius cogit (*t*), ut virides & duri grumi infero subsideant. Viridem fecit, quæ flava fuerat (*u*). Amarorem auxit (*w*). Cum bile hominis ante viginti quatuor horas mortui efferbuit (*x*), non ita in aliis experimentis, cum bilis bestiarum adhiberetur (*y*).

Cum aqua forti alias arbusculæ virides (*z*) natæ sunt; & grumus in fundo subsedit. In aliis puto meracioris acidi exemplis, bilis in coagulum amarum (*a*), viridis resinæ (*b*) simile, abiit, aut in resinam inflammabilem (*c*). Etiam efferbuisse visa est (*d*).

Cum spiritu vitrioli (*e*), & etiam (*f*) magis cum oleo, effervescebat,

(*m*) BOHN p. 247.

(*n*) IDEM Ibid.

(*o*) p. 437.

(*p*) VERHEYEN II. p. 90. NARCISSUS BOHN. p. 139. Paulum fervere NEUMAN p. 1253. Ovilla cum chymico acore non fervet RAST.

(*q*) HOFMAN *acid. viscid.* p. 35.

(*r*) VISSCHER, &c. BRUNO *de bile* BOHN. p. 139.

(*s*) FLOYER p. 125. BAGLIV. p. 437.

(*t*) FLOYER p. 120. BOHN. VISSCHER n. 50.

(*u*) In meis experimentis, etiam FLOYER p. 115. 120. & BOHN.

(*w*) FLOYER p. 125.

(*a*) *Misc. Taurin.* T. I. p. 77. GREW *parts of anim.* p. 250. etiam cum vetusta bile BAGLIVI p. 438. Etiam apud GRAAF *succ. pancr.* p. 82. Paulum fervet NEUMAN 1253.

(*y*) VERHEYEN T. II. p. 98. NEUMAN *oper. chem.* p. 1252. NARCISSUS, BOHN. p. 139

(*z*) STIEF I. c.

(*a*) NEUMAN *oper. chem.* p. 191.

(*b*) CARTHEUSER *mater. med.* p. 247.

(*c*) SCHAPER I. c. p. 28.

(*d*) HOFMAN I. c.

(*e*) SCHEUCHZER ad DEID. p. 41. Omnino non BOHN p. 139. Debiliter BAGLIV. p. 438. magis p. 439. A debili, puto, spiritu sulfuris non cogitur du HAMEL *hist.* p. 76.

(*f*) CALDESI p. 50.

fcit, ut calor nascatur (*g*), & fumus (*b*). Cogitur (*i*) etiam, grumosve duos deponit (*k*), deinde eo magis cogitur, quo ipse acor est meracior (*l*).

Virescit (*m*), etiam bilis hominum peste extinctorum (*n*). Amarorem a spiritu sulfuris admisto amittit (*o*), & cum debilius sit ejus acor, tantum filamenta in bile nascuntur (*p*). Cum sublimato hydrargyro soluto mista coit (*q*).

Spiritus vini, qui in sanguine & sero vim exercet similem efficaciam acidorum spirituum, neque cum bile effervescebat, etsi id dictum est (*r*), neque coit (*s*), nisi aliquando (*t*) debiliter (*u*). Putredinem arcet (*w*). Sapa & præcipitati fellis sedimentum ad partem maximam in spiritu vini solvitur (*x*).

§. VIII. *Cum salibus mediis, cum lixiviosis, cum urinosi.*

Parum est, quod cum ejusmodi salibus, aut liquoribus, bilis patitur. Amarorem a lixiviosis frangi (*a*) video, ut etiam rhei amaror ab admisto oleo tartari debilitatur.

Non effervescebat cum salibus mediis (*b*), & placide miscetur. Non cogitur

- (*g*) VISSCHER n. 50. HOFMAN. Etiam spuma BOHN.
 (*b*) VISSCHER. BOHN. BAGLIV. In butyri speciem FABRA. *aq Nucerin.* p. 49
 (*i*) In flavos grumos FLOYER p. 120. SCHEUCHZER p. 23. BAGLIV.
 (*k*) HARTMAN. SCHEUCHZER.
 (*l*) VISSCHER. BOHN. &c.
 (*m*) SCHEUCHZER. P. 23. BAGLIV.
 (*n*) DEIDIER *Exp.* I.
 (*o*) FLOYER p. 125. *Acida fit* BAGLIV.
 (*p*) In canina bile ORTLOB.
 (*q*) BOHN. p. 257. SCHEUCHZER ad DEIDIER BAGLIV. p. 430. ORTLOB. Ponit sedimentum albescens l. c. n. 18.
 (*r*) ROBINSON l. c. p. 201. 202. *Projet pour l'hist. des anim.* p. 235.
 (*s*) HARTMAN, BAGLIV. p. 428.
 (*t*) Coire BOHN. p. 246.
 (*u*) NARCISSUS l. c. *Nebulas facit* NEUMAN p. 253. *Mucosi quid deiecit.* RAMSAY p. 5.
 (*w*) BAGLIV. p. 436.
 (*x*) RAMSAY p. 8.
 (*a*) FLOYER p. 125.
 (*b*) VISSCHER n. 50.

gitur cum fale marino (*c*); neque cum fale ammoniaco (*d*), aut nitro (*e*), sed utique cum tartaro vitriolato (*f*). A liquore terræ foliatæ tartari diluitur (*g*).

Cum *fixis* salibus non effervescebat (*h*), neque mutatur (*i*), & clarior potius facta est (*k*), & flavedo intenditur (*l*), ut sit in rheo cum ejusmodi fale misto. Aliquando bilis turbatur (*m*), & nonnihil de ea subfidet (*n*). Magna tamen copia adfusis ejusmodi salibus cogitur (*o*), sed leviter (*p*), aut nihil quidquam (*q*). Odorem urinosum cum ejusmodi fale mista spargit (*r*).

Cum spiritu salis ammoniaci diluitur (*s*), & commode unitur (*t*), & color intenditur (*u*), ut olivaceus fiat. Cum bile a spiritu vitrioli coacta idem alborem facit (*w*).

A spiritu cornu cervi bilis vix mutatur (*x*), aut (*y*) colore intenditur, neque a tinctura cantharidum (*z*). A spiritu sanguinis humani solvitur (*a*).

Quando

- (*c*) VISSCHER.
 (*d*) FLOYER p. 121.
 (*e*) VISSCHER.
 (*f*) IDEM. Aliquid deiecit RAMSAY p. 10.
 (*g*) HARTMAN.
 (*h*) VERHEYEN l. c. NARCISS. RAMSAY p. 5. FLOYER p. 121. HARTMAN Habet jam L. TESTI l. c.
 (*i*) RAMSAY. HARTMAN. Tantum spissari BROEN. l. c. BAGLIV. p. 436. BURCARD debile.
 (*k*) SCHEUCHZER.
 (*l*) DEIDIER *Exp.* I.
 (*m*) PETIT *Epist.* II. p. 30. 31. VALISNER. l. c.
 (*n*) NEUMAN, STIEF. Muci similis fit ORTLOB.
 (*o*) BAGLIV. p. 439. STIEF: in mellis speciem BOHN. p. 247. non tamen eanina.
 (*p*) VISSCHER, VERHEYEN p. 91. ut agitando solvatur.
 (*q*) RAMSAY p. 5.
 (*r*) VISSCHER.
 (*s*) HARTMAN, BOHN. p. 246. VISSCHER, MOSED. p. 1. Non mutari ORTLOB. Non cogi FABBRA *aq. nucer.* p. 40. RAMSAY.
 (*t*) NEUMAN.
 (*u*) STIEF l. c. Rubinea fit BAGLIVI p. 438.
 (*w*) FLOYER p. 124.
 (*x*) STIEF. Præcipitari porci bilem, sed parum FLOYER p. 112.
 (*y*) BAGLIV.
 (*z*) BAGLIV. p. 437.
 (*a*) BOHN.

Quando cum acidis coacta fuit, solvitur ab addito alcali (*b*). Etiam sapa bilis, quæ per exhalationem nata est, solvitur in (*c*) salibus lixiviosis. Sanguinis etiam coagulationem impedit (*d*). Cum aqua abdominali, puto urinosa, commista rubrum colorem induit (*e*).

A limatura martis turbatur & virescit (*f*), aut omnino nigrescit, in lue certe pecorum (*g*).

§. IX. *Bilis putrescit.*

Experimenta Cl. Virorum hac de re ita sibi sunt obposita, ut vix possint conciliari.

Sunt qui negant bilem facile sponte putrescere (*a*), ne in suspenso quidem vesicula servatam (*b*), Cum caro hora sexta fæteret, in eodem calore bilis tantum post 48. horas odorem moschi induit (*c*), (quem alii Cl. Viri demum longæ putredini ajunt supervenire).

Alii utique bilem facile putredinem concipere scribunt (*d*), etiam celeriter (*e*), celerrime inter humanos (*f*) humores, & humanam celerius quam bubulam (*g*), & etiam intra hominem vel animal ex morbis ita mutari, ut cum acidis liquoribus stillatitiis ferveat, ut in ictero (*h*), tum in morbo boum epidemico (*i*), inque lue pannonica (*k*), & in omni morbo maligno fere (*l*) vitiata esse. In lue boum aerem generat,

(*b*) CARTEUSER, RAMSAY p. 8.

(*c*) RAMSAY l. c.

(*d*) HEUERMAN III. p. 796.

(*e*) Fränk. Anmerk. V. p. 573.

(*f*) ORTLOB.

(*g*) FISSCHER p. 201.

(*a*) LOWER pyretol. WILLIS defens. p. 109.

(*b*) QUESNAI Oecon. anim. T. III. p. 50.

(*c*) RAMSAY p. 11.

(*d*) BOEHMER de effect. rub. NARCISS. p. 3. VISSCHER: Phil. transf. n. 495. BAGLIV. p. 431.

(*e*) Cito sponte fætere ALSTON. on quiklime p. 35.

(*f*) BOERHAAVE Praelect. I. p. 430. VISSCHER n. 38. NARCISS. SENAC. Eff. de physiq. I. p. 311.

(*g*) GABER p. 78.

(*h*) PRINGLE diseases of the army. p. 435.

(*i*) SALCHOW von der Viehseuche, cum spiritu vitrioli.

(*k*) HOFMAN acid viscid. p. 35. cum in sanis hominibus non ferveat.

(*l*) SCHREIBER de peste p. 87. In febribus Americæ tropicæ acerrima est BISSET I. c. In lue boum fætida bilis Verhand. der hollandy. maatschapp. VI. 2. GOELICKE & in hydrophobia James canine madn. p. 64.

rat, ut videtur, hinc vesiculam eo magis distendit, uti morbus est acutior (*m*).

Accuratius Cl. GABER bilem humanam frigido loco intra duas a morte horas (*n*), jam fætere testatur, & cum aqua forti effervesce (*o*), aut cum aliis acidis liquoribus ejus generis in calore 25°. R. intra vigesimam quartam horam (*p*), esseque inter Humanos humores eum, qui omnium citissime effervescentem naturam induit (*q*), ut etiam cum aceto pugnet (*r*). Tardius & intra triduum putrescere alii Cl. Viri (*s*). In morbo a longo mœrore, putridissima fuit cum summo fæto (*t*).

Fætet autem, dum putrescit (*u*). Sed eum fætorem tandem deponit, inque odorem non ingratum transit (*w*), & citius quam natura lixiviosa fætor oritur, & diutius durat, nam vis effervescendi cito perit (*x*), & visa est natura acida renata fuisse (*y*).

A putredine utique mutatur, & odorem moschi (*z*) induit & ipsa (*a*), & ejus aqua (*b*), & extractum (*c*), ipsæ demum fæces alvi (*d*), & eorum aqua decies distillata (*e*).

Sapor cum putredine fit acerrimus (*f*).

Salem

(*m*) *Phil. transf.* n. 456. Expandi, ut vase suo non contineatur HEBENSTREIT *de calore* p. 45. In eo morbo fætet MANGET *reflex.* p. 196.

(*n*) *Miscell. Taurin.* p. 76. sic MOSEDER p. 14.

(*o*) Add. VISSCHER.

(*p*) Ibid.

(*q*) p. 78.

(*r*) Ibid.

(*s*) VISSCHER n. 39.

(*t*) G. v. SWIETEN T. III. p. 500.

(*u*) GABER p. 79. BOERHAAVE T. I. p. 431. BAGLIV p. 436. G. v. SWIETEN.

(*w*) Ibid.

(*x*) p. 78.

(*y*) PRINGLE p. 398. 419. Sed addito pane.

(*z*) GRULICH. *cholelog.* p. 48.

(*a*) RAMSAY *Exp.* 25. 26. celeriter iste & biduo. Lente & longo tempore BOERHAAVE p. 431. Post aliquot menses ALSTON. p. 35.

(*b*) CARTHEUSER *mater. med.* p. 464. MEAD. *of. poisons.* p. 34. De tinctura fellis lupini SCHROEK *de moscho.*

(*c*) RAMSAY p. 28. CORVIN. *de olfact.* p. 61.

(*d*) Post abactam aquam moschum olet HOMBERG. *Mém. de 1711.* p. 44.

(*e*) PECHLIN *obs.* p. 325.

(*f*) NARCISS. VISSCHER.

Salem alcalinum digesta ante aquam (*g*) dat copiosiore (*h*) & acerrimum (*i*).

Cæterum natura per acorem mineralem coagulabilis in putrida bile supereft (*k*).

Demum sibi relicta abit in liquidum supernatans (*l*), & id quod turbidum subsidet.

Non est tamen balsamum, quod a putredine sanguinem fervet (*m*).

Putredinem adjuvat addita terra absorbens (*n*), avertit rubia (*o*), fal medius Neuholtenfis aquæ (*p*).

§. X. *Extractum bilis.*

Vel lenis ille calor, qui in atmosphæra (*a*) fere regnat, vel paulo major, qui tamen non superat gradum ebullitionis, abigit de bile aquam ad $\frac{7}{8}$. totius (*b*).

Paulatim filamenta in arbusculæ speciem conjuncta fundum petunt (*c*), & coeunt in massam spissam (*d*), amaram (*e*), cum dulcedine (*f*). Ea in aere deliquescit (*g*), in aqua lactescit (*h*), inque spiritu vini aquoso solvitur (*i*), etiam in alcohole (*k*). In igne liquefcit (*l*), &

(*g*) VISSCHER.

(*h*) HENNINGER *de bile*.

(*i*) MOSEDER p. 14. Magis volatilem. BRUNO *de bile* n. 8.

(*k*) RAMSAY *Exp.* 27. HARTMAN. Alias debilitatur IDEM.

(*l*) VISSCHER, NARCISS.

(*m*) HELMONT *sextupl. digest.* n. 34. GLISSON.

(*n*) GILBERT *putred. in corp. anim.* p. 18. Utique adeo in vivo homine alcali generari potest.

(*o*) BOEHMER I. c.

(*p*) RUTTY *Synops.* p. 307. Etiam cum ea aqua mista septimo demum die putrescit IDEM.

(*a*) RAMSAY *Exp.* 5.

(*b*) DAVIDS *calc. bilar.* p. 5. RAMSAY.

(*c*) STIEF I. c.

(*d*) Terebinthinæ similis GHIARESCHI. Picea STRÖHLEIN. Sicca in frigore & fragilis RAMSAY *Exp.* 7.

(*e*) VISSCHER n. 45. RAMSAY, ROBINSON p. 173. Amarissima CARTHEUSER.

(*f*) GIARESCHI *Giorn. di Parm.* 1687. p. 194. post de stillationem VISSCHER.

(*g*) VISSCHER, NARCISS. Cera cum terebinthina miste comparatur. *Epb. Nat. Cur.* Vol. X. *obs.* 91.

(*h*) JAHN *physiolog.* p. 219. DAVIDS. VISSCHER. RAMSAY.

(*i*) STRÖHLEIN *calc. bilar.* p. 8. DAVIDS VISSCHER.

(*k*) STRÖHLEIN, VISSCHER. Negat DAVIDS & CARTHEUSER: & difficilior liquefcere neque totum RAMSAY p. 15.

(*l*) HARTMAN. NARCISS. VISSCHER.

& in calore (*m*), inque fale lixivo (*n*); ignique exposita flammam concipit (*o*), & partim deflagrat (*p*), tota vero quando terra pinguis admiscetur (*q*). Porro non putrescit eadem (*r*). Craffamentum ab acore minerali coactum inflammatur (*s*), idemque cum multa aqua in bilis recentis similitudinem redit (*t*).

Odor, dum deflagrat, est capillorum ambustorum (*u*).

Cum fabulo in calculum coalescit (*w*), aut cum argilla (*x*). Porro non putrescit (*x**) fapa bilis.

Ex putrida bile simile magma (*y*) potest parari, quod in aqua frigida induratur (*z*) moschumque olet. Aqua, in qua solutum fuit coagulum ab acore minerali factum, in crystallos abit acicularum similes, acidissimas (*z**),

Sicca bilis cum spiritu nitri fervet [*z*†].

§. XI. Calculi bilarii.

Ejusmodi nunc coagula non raro in bile nascuntur, non solorum animalium, quæ splene destituuntur (*a*), sed omnino sanorum (*b*).

In piscibus etiam globuli albi duriusculi (*c*) reperiuntur: in homine concrementum sebosum cum calculis mistum (*d*) & grumi (*e*). In icterico

(*m*) RAMSAY *Exp.* 7.

(*n*) RAMSAY *Exp.* 14.

(*o*) MOSEDER p. 14. HARTMAN DOSSIE I. p. 461. COE p. 100. STRUVE *Exerc.* III. p. 159. STROHLEIN DAVIDS *calc. bilar.* GMIARESCHI, VISSCHER, BAGLIV p. 428. HOFMAN p. 182 RAMSAY.

(*p*) DAVIDS *Ibid.*

(*q*) COE I. c.

(*r*) VISSCHER.

(*s*) HARTMAN, MOSEDER p. 16.

(*t*) RAMSAY *Exp.* 12.

(*u*) GHIARESCHI.

(*w*) MOSEDER.

(*x*) DAVIDS.

(*x**) VISSCHER.

(*y*) VISSCHER. RAMSAY *Exp.* 28.

(*z*) RAMSAY *Exp.* 11.

(*z**) RAMSAY *Exp.* 28.

[*z*†] GREW *parts of anim* p. 250.

(*a*) BOHN. p. 249.

(*b*) IDEM *Ibid.*

(*c*) SCHAFFER *pisc. bavar.* p. 80.

(*d*) ROEDERER *progr.*

(*e*) BARTH. *Cent. I. hist.* 80.

rico calculus in ductu cystico immobilis, & una bilis in vesicula granulosa (*e**).

Bilem in globulos coactam post icterum (*f*), & coagulum album in ductibus bilariis cum globulis in cystide durioribus (*g*) legimus. Molles intus globulique sebacei natantes (*h*). Molles erant quos in oleum dissolutos vidit VALISNERIUS (*k*), cum ægrotus oleum amygdalarum bibisset. Molles viridesque pilas alter excrevit ictericus (*l*). Calculus unus & cum eo concrectiones in bile molles (*l**). Ictericus calculum exerauit quem pilæ virides molles secutæ sunt (*l***). Egesti ab icterico calculi 72. inter quo aliqui molles (*l†*). Tres in vesicula molles calculi (*m*). Unus gummeus (*n*) lapillus, & gummei calculi redditi (*o*). Concrectiones nigricantes pilulares (*q*). Calculi ex puero annuo: pisi mole, molliculi multi (*r*), Bilis glutinosa in morbo lento (*s*). Vesicula plena bile coagulata scisili (*t*). Per anum redditus calculus mollis pene semuncialis (*u*). Calculos BEWERWYKIUS vidit in aqua fundi, & ad naturam bilis redire (*w*). Etiam hystricis calculus in ventriculo mollis est (*w†*). Ea concrementa sunt calculorum primordia (*w**).

Sed eadem bilis multis modis inque multis animalibus magis induratur: in bobus etiam frequentius, per hibernos (*x*) maxime menses, quibus & sicco (*y*) fœno aluntur, & motu carent: addunt, in Hungaria

(*e**) STORK ann. I. p. 150.

(*f*) HOFMAN *bilis med. & venen.*

(*g*) Comm. Nor. 1738. hebdom. 18.

(*h*) SCHENK *Exerc.* p. 478.

(*k*) T. III. p. 132.

(*l*) MEERMAN apud SCHURIG *chylolog.* p. 562. & IDEM p. 143. sed isti durescebant in aere. Alia exempla habet PETIT *Acad. Chir.* I. p. 308.

(*l**) MORGAGN. *sed caus.* I. p. 38.

(*l***) MEERMAN apud SCHURIG *chylolog.* p. 562.

(*l†*) PETERMAN *scrutin. icter.*

(*m*) *Zod. Med. Gall.* p. 128.

(*n*) Ibid. p. 78.

(*o*) COE p. 83. una ex eodem ægro arenosi.

(*q*) *Phil. transf.* n. 173.

(*r*) ADOLPHI *de colo intestino multor. morbor. nido.*

(*s*) CAMERAR. *exstispic.*

(*t*) VALISN. *oper.* T. III. p. 197. 198.

(*u*) PETIT *Acad. Chir.* I. p. 308.

(*w*) *Schaz der Ungefundh.* p. 216.

(*w†*) BONTAD GARC. ab ORTA. c. 46.

(*w**) *Mém. de l'Acad.* 1722 p. 161. initia calculorum felleorum hactenus mollia *Ad. Helvet.* n. v. p. 165. Glomer biliosus de ano dejectus IMBERT in utili libello *de calc. bilar. obs.* 6 quem I. fero nimis, & scripto L. XXIII. accepi, mecum calculos informes a polygonis separat Cl. IMBERT. p. 70. calculus solitarius nunquam angulosus est IDEM p. 32. recte.

garia (z), & Turciā (a) frequentius malum esse, etsi neque in Dania (b), rarum est, neque in Germania (c). Frequens esse (d) credas, quod omnium primum inter calculos felleos medicis innotuerit (e).

Est autem duorum generum: prius (f) pene bobus proprium, crusta est flava, subfusca, reticulata, qua ductus cysticus (g), & hepatici pori (h), in eo animale ita obducuntur, ut exemta arbusculæ siccae & ramosæ (i) imaginem referat. Ea crusta aquam tingit, coloremque dat.

Altera species, humanis calculis similior, unice in vesicula bubula reperitur (k). Grandis etiam (l), & sæpe lamellata (m) rotunda figura aut angulosa (n), amarissima, in aquam colorem suum diffundit: eadē levis est & aquæ innatat (o), flammamque plerumque concipit (p). Sponte visa est loco humido in liquorem contabuisse (q): in aceto etiam (r), & in spiritu vini mollescit. Usta ambram oluisse dicitur (s).

Etiam

- (x) GLISSON p. 89.
 (y) CHESELD. p. 167. BETTUS *de sanguine* p. 275.
 (z) KRAMER *medic. milit.* II. p. 176.
 (a) BELLÓN *singul.* III. p. 46.
 (b) DETHARDING.
 (c) In Saxonia *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs.* 44.
 (d) Ita RUYSCH *obs.* 31. MALPIGH. *posih.* p. 31. & DETHARDING l. c. p. 390.
 Multos ejusmodi calculos a laniis habuit MATTHIOLUS. Habet etiam pro re frequente GLISSON. p. 88. 89.
 (e) RHazes *fac. anim.* c. III.
 (f) Anuli modo in felle boum reperitur RHazes *ibid.*
 (g) RUYSCH.
 (h) Habet RUYSCH *obs.* 18. REVERHORST, GLISSON. p. 88. 89. *Colleg. Amstelodam*, p. 18. LOQUET p. 5. BOERHAAVE T. III. p. 185. Cum corticibus comparat LEIGH. *natural. hist. of Lancash.* l. c.
 (i) GLISSON, REVERHORST.
 (k) *Hist. nostr.* X. p. 80. RUYSCH *obs.* 17. MAJOR *progr.* p. 10. *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs.* 44. MALPIGH. l. c. BOYLE *util. philos. exp.* p. 140. KUNDMAN p. 229. *Bresl. Saml.* 1724. m. Mart. SACHS *Gammamol.* p. 296. qui etiam in ventriculo eorum sedem ponit. MOEBIUS *de usu hepat. & bilis.* BARTHOL. *Hist.* 32. Cent. II. Jam WIRSUNG apud MOEBIUM *de bile* auctor est, vesiculam in lue boum lapideam fuisse.
 (l) Drachmarum sex VALENTIN. *polychrest. exot. de pedra del porco* p. 18. Etiam prægrandes calculi bilarii, moschatae nucis mole IMBERT p. 6. BADER *obs.* 45. Ori columbini magnitudine GMELIN *CHOLEL.* p. 8. Juglandis ROBINSON *stone* p. 62. gallinaceo ovo pene æqualis BADER *obs.* 14. et ejusmodi calculus cum ictero de ano egestus IMBERT p. 7.
 (m) WELSCH ex hepate bubulo GREW *mus. rar.* p. 26.
 (n) WELSCH *hecatost. obs.* 3. LEIGH. *Lancash.* II. p. 47.
 (o) DETHARD *Ath. Societ. Dan. T. II.* p. 385. 387. Subinde fundum petit *Ath. Lit. Suec.* 1725. p. 75.
 (p) DETHARDING p. 387.
 (q) CHARLETON *lithogen.* p. 24.
 (r) DETHARD. l. c. p. 387. &c.
 (s) *Bresl. Saml.* l. c.

Etiam elephas (*t*), cum vesiculam non habeat, calculum in poro habuit. Et in equi alvo calculi inflammabiles (*u*) triangulares, levesque reperiuntur, de bilario genere sunt. Et ex vesicula equi (puto ex ductu choledochi) KUNDMANNUS calculos flavos habuit laminatos (*w*), non inflammabiles (*x*). Neque rarum est, epidemice in equis calculos reperiri (*y*).

Hystricis celeberrimus calculus est (*z*), etiam medicis notus, tunicatus, ad tactum unguinosus (*a*), amarissimus (*b*), aquam tingens amaro sapore coloreque viridi (*c*), & vi, ut creditur, medica (*c**).

Quem F. SLARE descripsit, fistularis (*d*), idem videtur de priori bubulorum classe esse.

Diversi ab hystricis calculis sunt porcini, similes humanorum, angulosi, natantes (*d**), qui & in nostratibus suis reperiuntur. Qui vero ex apro indico (*e*) calculus intus pilos & fibrillas habet (*f*), is non est de bilaria classe, neque ad cysticos pertinet, & a *pedra del porco* debet distinguui.

Testudinis vesicula (*g*) lamellatum calculum continet.

Inter carnivora occurrit tigridis lapis (*h*), & canis molossi trianguli, crystallini (*i*) calculi, & in ibide (*k*). Inter omnivora simiæ lamellatum concre-

(*t*) SEBA *Thef.* t. II. tab. 113.

(*u*) BROMEL *Aët. Lit. Suec.* 1725. p. 33.

(*w*) *Seltenh.* p. 229.

(*x*) VALISN. III.

(*y*) KRAMER II. p. 176.

(*z*) Garc. ab ORTA L. I. c. 16. SEBA T. I. t. 50. f. 1. p. 82. SPENER *de muribus marinis*. Non in omnibus hystricibus DAELMANN p. 156. Esse ex hystrice contra REVENHORSTIUM p. 48. ob pondus in aqua subsidens negantem confirmat VALENTIN. *polychrest. exot.* & KÆMPFER.

(*a*) SEBA. Etiam mollis BONT. c. 46.

(*b*) VALENTIN. *append.* III. *Epist.*

(*c*) *Phil. transf.* n. 305. LINN *system. natur.* ed. Belg. T. I. P. 2. p. 368. SEBA, VALENTIN.

(*c**) DECKERUS qui caro vendebat.

(*d*) *Bezoar* p. 37. seq.

(*d**) Mergi KEVERHORST.

(*e*) SEBA t. 13.

(*f*) CAMELLI *Phil. transf.* n. 305. PIELAT *Thif. ccilan.* p. 46. BEVERWYK *litogenesf.* p. 14.

(*g*) *Hist. de l'Acad.* 1729. n. 5.

(*h*) SEBA T. II. tab. 113.

(*i*) PLANCUS in *Excerpt. Lit.* 1759. n. 3.

(*k*) PARIS.

concrementum [*l*], cysticum idem & humano simile est. In castoreo, quod multa cum bile communica habet, etiam lamellati, inflammabiles, felleorum similes calculi visi sunt.

§. XII. *Calculi fellei humani.*

Pauca de plurimis decerpo, cum innumeras pene historias [*a*] huius morbi coram habeam, neque paucas ipse viderim, aliquas etiam post editum libellum. Invenio eum morbum [*b*] vulgarem esse [*c*], multo frequentiore calculo urinariae [*d*] vesicae, etsi plerumque sub colicae nomine latet. Juniores [*e*] ei minus obnoxii sunt, senes magis [*f*], tum feminae [*g*]. Frequenter in utraque vesicula calculus est [*b*].

Multa varietas est eorum lapillorum, in quos bilis concrevit, neque facile classes constituas, cum praeterea historiae pleraeque non valde plenae sint. Graeci scriptores, nisi fallor, hunc morbum non habent, qui sub tempora renovatarum litterarum innotuerit.

Possis

(*l*) *Oryctologie* p. 378.

(*m*) *Mémoires de l'Acad.* 1712. p. 210.

(*a*) Etiam ducentas in inimitabili MORGAGNI *de causis & sede morborum opere.*

(*b*) GENTILEM, inde NICOLUM id malum dixisse MORGAGNUS II. p. 77. Globuli in vesicula fellis PEIRESC. p. 58. E. & D. CLARÆ reliquis exemptus calculus mole olivæ CÆL. RHODIGINUS. Inde *Alex.* BENEDICTUS p. 21. BENIVENIUS nigrum de vesicula fumtum calculum habet c. 94. VESALIUS duorum pugnorum æqualem vesiculam vidit, plenam calculorum *Exam. obs. fall.* p. 124. CARDANUS calculum in leproso vidit *subtil.* L. VII. p. 210. & *de venen.* p. 47. Eo laborabat Hieronymus SCHREIBER operum MONTANI editor CRATO *Epist.* ad GESNERUM CORDI app. *pramissa* MELCH. ADAMI *Elog.* p. 83.

(*c*) Frequens esse C. STEPHANUS p. 356. SANCTOR. *meth. vit error.* p. 354. RIO-LANUS p. 131. HEISTER *Ann. Jul.* 1726. Aug. *Eff. of a Societ. at Edimb.* l. p. 265. BAGLIV. p. 433. MORGAGN. *sed morb.* II. p. 77. Non rarum WIER ap. HILD. I. *obs.* 54. Ad alios morbos in universum, se habuit, etiam ad supplicia, uti 14. ad 230. *Opusc. pethol obs.* 33. p. 70. In peripneumoniciis frequentes sunt *Mém. des savans étrang.* III. p. 443.

(*d*) Ut 7. ad 1. *Opuscul. pathol.*

(*e*) COEP. p. 67. Ne semel quidem in juvene vidi: habet tamen calculos pisi mole in vesicula infantis VALENTINUS *polychr. exot.* p. 42.

(*f*) C. STEPHANUS.

(*g*) COEP. p. 67. *Phil. Contr.* FABRICIUS *progr.* 1759. p. 25. DETHARDING II. c. p. 386. Nostra non repugnant.

(*h*) BAGLIV. p. 434. Exemplum habet WELSCH *Episagm.* 65. MORGAGN. *Epist.* n. 78. *Phil. transf.* n. 337. SCHURIG. *lithol.* p. 143. *Giorn. de Letter.* T. XXIX. 207. BERGER p. 22. HELWIG. *obs.* 17. *Phil. transf.* n. 185. MEKEL p. 97. CONNOR. *Hist. of Poland.* T. I p. 200. TITSINGH *rustuuren.* p. 289. GOGKEL II. o 99 BERGER p. 220. WEICKMAN *de marte.* HOECHSTETTER *Dec.* X. LANCIS *Diff.* X. VITI *dialogh.* IV. p. 109.

Possis tamen utcunque duas classes facere. Grandes alii [*i*], iidemque subrotundi [*k*] sunt, olivæ [*l*], nucis [*m*], ovi [*n*], aut alia ejusmodi elliptoide figura: etiam tesserarum [*o*] similes, quando plures in eadem vesica se confricuerunt [*p*], ut planæ superficies levesque natæ sint, fere ut in carpi [*q*] officulis, atque convexitas cavitati respondeat [*r*]. Eos sæpe quasi capsula aliqua vesicula contracta continet [*s*], alias totam replevit unus [*s**].

Hi calculi plerumque, ut de meis loquar, non [*t*] sunt lamellati; & alias ex calce aliqua albisque [*u*], aut flavis [*w*], aut viridibus

(*i*) Pondere gr. 126. *Phil transf.* Vol. 50. P. II. p. 546. Ambitu $3\frac{1}{2}$ unc. longitudine 2. pondere gr. 130. BETZOLD *cholelith.* n. 2. Calculus tripartitus pondere drachm. ij. gr. 45. *Comm. Nor.* 1742. *hebd.* 32. Ad grana 150. *Act. Med. Hafn.* Pondere unc. 4. drachm. duar. cum sem. *Mém. Chir.* III. p. 55. 56. Drachmarum sex pondere in recto intestino retentus *Journ. Med.* ann. 1756. Unciarum quatuor SCHAARSCHMIDT ad Cl. D. COTHENIUM. Duo maximi COITER p. 122.

(*k*) Flaventes auales aut rotundi BIANCHI I. p. 475.

(*l*) Olivæ mole SCHURIG *lithol.* p. 143. CÆL. RHODIGINUS CONTULI *lapid. & pod.* p. 64. *Mém. de Berlin.* XI. n. 92. Olivaris CONTULI p. 64.

(*m*) Juglande major ROBINSON *of the Stone* p. 62 HEISTER *Ann. Jul.* 1722. p. 129. HILD. I. *obs* 66. Gallæ turcicæ æqualis in electore F. WILHELMO BIERWIRTH *structur. hep.* p. 17. Ovi pulli æquales ex femina prodeuntes *Phil transf.* n. 282.

(*n*) Ovi columbini mole J. a CASTRO *pest. Rom.* p. 78. *Act. Philexotic.* FISCHER *de calc.* p. 3. Ovi gallinacæi mole *Jour. Sav.* 1697. n. 30. VALISNER. III. p. 96. Etejus modi per anum egestus calculus HOOKE *Exp.* p. 79. Vesiculam replens STORCK *Ann.* I. p. 129. SCHAARSCHMIDT 1740. n. 26. REDI *Lettr.* T. II. Magnitudine ovi gallo pavonis COE p. 113. Cucurbitæ figura cum appendicibus MOSED. Magnus $5\frac{1}{2}$ uncias longus pondere 14. dr. MEKEL T. X. p. 95.

(*n**) Nucis moschatæ magnitudine RUSSEL *tab.* p. 166. Moschatæ nucis mole per vomitum redditus ORTESCHI *diar.* p. 283. Similem SOLENANDER ex vesicula fellea excidit: similem, cum pancreate scirrhuso habet DANGEAU ad BAGLIV. p. 171. In dysenteria epidemica *Journ. Sav.* ann. 1756. m. Nov.

(*o*) *Obs. nostr.* I. 6. II. 12. TITSING *van Steensnyden* p. 17. qui per alvum egestus est. Septem lapides cubici LANCIS. *Diff.* X. Tres magni nigricantes ex viridi SCHURIG p. 143. 296. Quinque pentagonii, nisi hi sunt classis sequentis BARTH. C. II. *hebd.* 54.

(*p*) HILDAN. *Cent.* IV. n. 44.

(*q*) MOSEDER p. 24.

(*r*) MOSED. *ibid.* de HAEN IV p. 21.

(*s*) *Obs. nostr.* I. 2. MORGAGN. *sed. caus. morb.* II. p. 79. RUYSCH. n. 31. LIEUTAUD *Essays* p. 306.

(*s**) SCULTET. *obs.* 61.

(*t*) ALBIN. *adnot.* L. I. III. c. 13. HEISTER *Annal. Jul* 1726. *Aug.* MOSEDER p. 223. FANTON. p. 114. SCHAARSCHMIDT, ut puto.

(*u*) *Obs. nostr.* 13.

(*w*) *Obs.* 2. G. v. SWIETEN T. III. p. 107.

bus [x], glebulis componuntur, friabiles iidem [x*], & insipidi. Eam calcem crusta fere nigra [y], continet aut alba [z]. Est ubi nondum in calculum ea calx coivit, sed arenosorum lapillorum [a], aut gypsi [b] calcisve, aut crustæ specie bilarios ductus obsidet [c].

Alias crystallini quid habent [d], & centrum, ex quo radii aliqui non valde bono ordine, nitidi, in ambitum exeunt.

Est ubi tunicati [e] ceparum ad morem sunt, ut bezoar illud animale solet, superficie plerumque glabra, nigra bile picta.

Aspera tamen alias superficies, aut his, aut crystallinis calculis est, ut cum aliqua mori similitudine granulis tota hirta sit [f].

Plerumque [g] ad ignem colliquescent, & funduntur fere ut cera
figilla-

(x) *Obsf.* 1.

(x) *Journ. med. ann.* 1756. m. Nov.

(y) *Obsf.* 2. Extus flavus intus viridis MORGAGN. *adv.* p. 60. Alterne flavi & viridis ibid. Albicantes subflavi SCHAARSCHMIDT l. c.

(z) COE p. 83. 99.

(a) COE p. 97. Sabuli WELSCH *Epifagm.*

(b) GEILFUS *de moxa* p. 11. C. BAUHIN *theatr.* p. 114.

(c) FANTON. p. 114. POZZI p. 70. In cellulis RUYSCHE *musf. rar. catalog.* p. 161.

(d) PETERMAN. Crystallinus in pyramides dissiliens SCHINZ *de calce* n. 39. FANTON p. 114. de HAEN V. p. 51. HAGEDORN *Cent.* II. n. 8. BAGLIV. 433. Intus talcosus *Journ. Med.* 1760. Août & T. III. n. 1. Add. *Bresl Saml.* 1719. MEKEL. T. X. p. 9. TREW. *Comm. Nor.* 1743. h. 28. Pellucidus BETZOLD SCULTET. *obsf.* 61. HELWIG *obsf.* 81. HILDAN. VI. p. 58. Calculus in vesicula crystallis incrustatus *Phil. transf.* n. 209. Crystalliformis, pellucidus, felleus PETERMAN *Scrut. icter.* Pellucidus ille grandis SCULTET. *obsf.* 61. Asperimus fuscus, cui mista fragmenta lucida FANTON. p. 114. Extremis finibus levis, cæterum asper CONTULI p. 64. Nigri quasi crystallini, ut fæle facti BAGLIV. p. 433.

(e) MERY *Mém. de* 1713. p. 112. 113. ALBIN *Adnot* L. III. c. 13. *Mém. de Chir.* T. III. p. 55. 56. MORGAGN. *sed. & causf.* T. I. n. 47. 48. BOSCHUS *facult anatom.* 1570. BIANCHI *hist. hep.* I. p. 476. de flavescentibus calculis una mollibus tophaceis TACONI *hepat adfect.* p. 320 BETZOLD f. 3. 4. In calculo ochreo, nucleo crystallino. BETZOLD n. 2. In cysticis TACON *Mém. di fis.* II. p. 306 In vesicula lamellatus calculus BETZOLD *Chilolith.* f. 3. 4. In WALPOLIO *Phil. transf.* In magnis illis HILD. IV. [n. 44. In variis HILD. II. o. 24. ALBIN. l. c.

(f) COE t. 2. p. 97. Moriformis *Fränk. Anmerk.* T. IV. p. 480. DAUBENTON III. p. 299. P. C. FABRIC. *progr.* 1759. *Phil. transf.* n. 209. MOSEDER p. 25 *Bresl. Saml.* l. c. REVERHORST t. 2. f. 4.

(g) Plerique ardent COE p. 99. MORGAGN. *Ep.* I. n. 49. In universum POSTEL. *factum* p. 39. REVERHORST p. 48. NEBEL c. 5. omnes nostri ignem conceperunt: sic magni illi per alvum egesti FRIDERICI SLARE ad KOENIG p. 20. 21. VALISNER. III. p. 593. Lamellati *Mém. de Chir.* l. c. Fuscus COE. p. 99. Maximi MEKEL. p. 95. Non lamellatus ille HEISTERI Leviores magis inflammabiles sunt MEKEL ibid sic. vomitu redditus BEKERI, tum Crystallinus & inflammabilis *Bresl. Saml.* TREW. Friabiles TACCONI grandes *Aët. Erud. Hafn.* De alvo egesti *Journ. de médec.* T. III. n. I. HEISTER l. c. *Mém. de Chir.*

figillaris, flammamque etiam concipiunt, etiam qui cretacei & calcarii videbantur. Nempe in istis bilis abundat (*h*).

Est tamen ubi ardere recusant (*i*), ex magnorum virorum testimoniis. In his plus terræ est (*k*).

Natant persæpe (*l*), merguntur alias (*m*).

Denique frequentissimi sunt (*n*) calculi minores unius, alteriusve grani,

Chir. T. III p. 55. 56. *Assembl. de Beziers* 6. Dec. 1731. Flavos flagrare & guttatim diffundi BIANCHI p. 479. Hepaticos melius ardere IDEM ibid. Flavi ardent le ROY l. c. Etiam obscuri inflammabiles sunt DAVIDS p. 4. & virides TEICHMEYER p. 12. Etiam duri MOSED. p. 24. Flammam etiam concipiebat ille *Journ. med.* ann. 1759. & tubuli similes corticati BRENDDEL. Plerique ardent *Journ. med.* ann. 1758. mens. Nov. Albos ardere MEKEL *Brol. T. X.* p. 98. eo magis quo leviores.

(*h*) COE p. 82.

(*i*) Virides difficulter ardere le ROI *Quest.* 10. Add. MEKEL *T. X.* MORGAGN. p. 84. & non inflammari BIANCHI p. 479. RICHA *T. IV.* p. 79. & cysticos minus bene BIANCHI IDEM ibid. & TACONI l. c. p. 306. nec crystallinos ignem concipere MEKEL. Non ardere albos arenosos COE p. 99. Magni illi non ardebant I. *Med.* 1756. Nov. Albos, cinereos, gypseos vix ardere, & ceræ modo fluere DAVIDS. Nigri non inflammabiles MORGAGN. I. p. 252. Magnos nigros non inflammari *Berlin. Mém. T. X.* p. 98. In febribus mesentericis nigri plerique non arserunt RICHA *Epid. III.* p. 78. Alius per anum egestus non inflammabilis *Journ. med.* ann. 1756. m. Nov.

(*k*) IDEM ibid.

(*l*) Tophacei BIANCHI l. c. Flavi plerumque MORGAGN. *Ep. I.* n. 45. 46. etiam nigri n. 46. Natarunt radiati van der MONDE l. c. tum aliqui apud COE p. 94. & crystallini TREW. in *Journ. de med.* l. c. In universum natate, qui per anum reddebantur *Journ. med.* ann. 1756. m. Nov. SLARE ad KOENIG. REVERHORST. Lamellati illi BRENDELLI. Fere natate CHESELDEN p. 166. Sæpe FERNEL. *pathol. hep. c.* 22. MORGAGN. *Adv. III.* p. 59.

(*m*) Flavi paulum macerati merguntur BIANCHI l. p. 475. Magnetem sequentes SCHURIG Magnus ille *Journ. de medec.* 1756. Nov. Utique post tempus sublidet COE p. 95. Walpoli tres subliderunt quasi polita, & laminati *Phil. transf.* V. n. 49. P. I. p. 207. De ano egestus BUCHNER *misc.* 1730. Sæpe merguntur MORGAGN. *sed. morb.* II. p. 82. etiam nigri magni p. 84. Non omnes natant SCHURIG *lithol.* p. 248. Non illi in epidemica dysenteria *Journ. med.* l. c. Non sphæricus ille MORGAGN. *caus. sed.* II. p. 443. Magni sex non inflammabiles nigri p. 84.

(*n*) FERNEL *corp. human. delin. pathol. L. VI.* c. 10. BAUHIN. *bezoar. C. GEMMA cosmocrit.* p. 99. VESAL. *chin.* p. 251. MEKEL p. 96. BIRCH. *T. III.* p. 483. BORELL. *Cent. III. obs.* 22. WISLICENUS. STEIN. BROMEL. BERGER. p. 220. SACHS. GAMMAROL. p. 100. *Phil. transf.* n. 300. PETERMAN *de ictero.* CHIFFLET, BESSE *Thef. app.* 280. Giron. *de Lett. t.* 29. p. 207. TACON. *Mém. di fific.* n. 2. *Act. Erud.* II. n. 21. STROHLEIN. *calc. bil. Obs. nostr.* 26. *Journ. Sav.* 1723. m. Jan. BARTHOL. *med. Danor.* p. 43. VALISNER. *III.* p. 338. BETZOLD *de cholelith.* BERGER *Phil. transf.* n. 142.

grani, ferè semper nigri [o]; etiam pellucidi [o*], angulosi, figurarum polyhedrarum [o***], quæ videntur aliquid cum granatis simile habere [p], in quibus sæpe adgnoscas rotundos [q] fuisse, & hedras per frictionem natas [r] esse. Sæpe lamellati sunt [r*]. Est ubi multi in unum quasi conglutinantur [s]. Numerosi sunt [t], de hoc genere calculi, non ad viginti, sed ad centum [u], ad 150. [w], ad 200. [x], ad 500. [y]; etiam ultra mille, & ter mille [z].

Plerique eo pertinent, qui per ulcus aliquod exeunt quales sæpe vidi [a].

Hi

(o) FERNEL. C. BAUM. MEKEL &c.

(o*) HELWIG *obs.* 81. CrySTALLINI aliqui inter 500. MEKEL.

(o**) GEMMA, VESAL. *Chin.* p. 251. *Journ. med.* III. n. 1. GUIDETI, GMELIN, BILLEBAULT *Journ. med.* 1756. m. Apr. 1757. m. Novembr HELWIG *obs.* 81. MORGAGN. p. 217. & *Opusc.* T. I. VOGEL. BROMEL *Act. Lit. Succ.* 1726. p. 133. BERGER p. 22. BECKER. GMELIN *Phil. transf.* n. 142. C. BAUHIN. *bezoar.* p. 157. Triginta tesseram referentes ROLFINK *de calc.* In hydropica triginta per annum excreti trianguli *lithogenes*. Angulosi 32. in folliculo GEMMA p. 95.

(p) GUIDET I. Non vero corpore regulari MORGAGN. *Ep.* I. n. 44. 45.

(q) Etiam flavi STEIN, etiam rotundi IDEM. HEYDE *disc.* p. 160.

(r) Tesseram referentes triginta ROLFINK *de calc.* CONNOR. HOFMAN *mus.* p. 95. 96. Innumerabiles historias calculorum de genere polygonis non addo, quæ mihi supersunt. Fabricam dat Cl. BETZOLD *cholel.* Omnes calculos, præter subvirides, ignem concipere IMBERT p. 16. plerisque natare p. 26. etiam fulvirides fundum petere. Flavos tamen, butyraceos, non inflammabiles habet GMELIN *Cholelith* p. 5. & 200. Fundum petentes, non sine ferro &c, quod magnetis obsequis se proderet DOLAEUS *epist.* IV. p. 15.

(r*) *Phil. transf.* n. 142. BERGER. BILLEBAULT. Ex centro radiati *Journ. med.* III. n. 1. VOGEL *Anmerk.* p. 68. ORTLOB. C. BAUHIN.

(s) COE p. 117. FANTON. *anat.* p. 114.

(t) Plurimi ORTLOB. Multi nigri *Edimb.* II. n. 27. Numerosi ex alvo egesti. *Journ. med.* III. n. 1. Calculi 36. & innumeri in ductibus biliaris MATANI. *Excerps. lit.* 1761. T. IV. in ictero. Calculi 53. VITI *dial.* p. 109. Calculi 67. HELWIG. Calculi 70. quasi cubici intus bile madidi, crusta alba MORGAGN. *Sed.* I. p. 217. Calculi 60. nucleo resinoso, splendentes, extus fusci LUBWIG *progr.* Uno die 70. egesti de ano COE p. 154. Post icterum egesti 72 PETERMAN Calculi 82. COLLOT. p. 6. Manipulus ex legato lusitanico extractus *Phil. transf.* n. 282.

(u) Centum in ictero ten. RHYNE *vet. med.* p. 222. Centum per anum egesti BIRCH. T. IV. p. 321. Super centum congesti COE p. 120. Centum & ultra BROMELL. *Act. Lit. Succ.* 1726. p. 133. & ultra TROTTER *de lethargo* p. 124. HEYDE *disc.* & 130. BOEHMER *præf. obs.* p. 17. Calculi 140. REVERHORST p. 16. In icterico lapilli 145. TACONI 316: seq. BICKER *post. I. de submers. mort.* sine aqua. *Obs.* II.

(w) Lapilli 151. subflavi, duri *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. *Obs.* 36. 181. STEIN *lithogen.* 153. STORK *ann.* II. 165. Ad 180. GMELIN *cholelith.* Ad 182. butyracei non amari GMELIN.

(x) Plus ducentis in iracunda FABRIC. *progr.* ad HOFMAN. Ducenti in vesicula *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. *obs.* 36. Sensim ad 200. calculos egestos habet VOGEL 5. *Anmerk.* Ducenti septem in vesicula *Journ. med.* 1757. m. Nov. Ducenti G. v. SWIETEN III. p. 132. 133. ex vetula CHIFFLET *obs.* 41. STORK *ann.* p. 126. *Eph. Nat. Cur.* II. *ann.* I. Calculo 300. RHOD III. n. 2.

(y) Ad 500. MEKEL T. X. p. 97. Conf. MORGAGN. *sed. morb.* II. p. 79. Centum in ictero excreti, inde alii 300. RUSSEL. *tab.* p. 163.

(z) MORGAGN

(a) LITRE *ann.* 1704. *hist.* 15. &c.

Hi mihi semper visi sunt arsisse (b). Non ita aliis claris viris (b*). Fundum petunt (c), sæpe, non semper (d).

Neque a ductu cystico absunt. In eo calculus 20, granorum immobilis (d*). Ductus cysticus, quasi tartaro obstructus (d**). Inter ejus valvulas calculos vidi (d†).

Superfunt calculi hepatici (e), qui in ductu hepatico aut choledochu reperiuntur (e*), inque ejus ductus quasi sacculis. Inde ostium digito capax, puto, a transmissis calculis (f). Varia figura sunt, subrotundi (g); etiam angulosi (h),

(b) TACCONI *Mém. di fific.* II. p. 306. VISLICEN *lapid. bilios. lymph.* STROHLEIN. FABRIC. *progr. ad disp.* HOFMAN. VANDERMONDE III. P. I. POZZI *Epist.* p. 69. BROMEL. PETERMAN. BERGER. MEKEL. De fuscis BESSE *Thef. app.* p. 280. 281. Plerique inter 120. minores MORGAGN. *Adv.* III. p. 60. Calculi 4. subcubici *sed. & caus.* p. 287 & 16. alii II. p. 48. Per anum egesti *Journ med.* 1756. m. Nov. Ducenti & ultra FABRIC. ad HOFMAN *progr.* Alii 70. MORGAGN. *Hist.* I. p. 217. Calculi 120. BROMELII.

(b*) Non omnes MORGAGN. I. c. Non qui crystallini MEKEL. T. X. p. 97. Non unguinosi illi GMELIN. Non nigri 15. MORGAGN. *Sed.* II. p. 355. Non illi in *Opuscul.* MORGAGN. duri fundum petentes, liquecebant tamen. Non illi 200. aculeati fundum petentes N. *Eph. Nat. Cur. Vol. II. obs.* 1.

(c) FABRIC. PETERMAN. BERGER *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs.* 39. Utroque loco TACCONI. FABRICII ducenti. Nigri 15. MORGAGN. *Sed.* II. p. 355. & alias *Opuscul.* T. I. Ferrei DOLÆI *Epist.* IV. aculeati 200 N. *Eph. Nat. Cur. Vol. II. obs.* 1. Non penitus natabant VIRIDET *bon chyle* p. 632. Pars exterior fundum petebat PETERMAN.

(d) Natantes *Hist. de l'Acad.* 1704. n. 15. *Journ. de med.* III. I. 1756. m. Nov. 1758. m. August. *Phil. trans. Vol. II. p. 549. Supp.* 192. GMELIN. P. I. MORGAGN. n. 45.

(d*) STORK *ann.* I. p. 150.

(d**) POZZI. p. 69.

(d†) Etiam LUDWIG *de viis bilis cystic.*

(e) Jam BENIVENIUS habet c. 3. In bibacibus BAYNARD. p. 381.

(e) REVERHORST t. 2. f. 1. In venis hepatis CAMENICENUS ad MATTH. p. 324. In sacco a duodeno facto viginti intus micantes *Hist. de l'Acad.* 1710. n. 3. In ductu hepatico ossescentia dentata *Act. Budissin.* p. 376. & innumeri calculi MATANI *Excerpt. Litt.* 1761. T. IV. Calculus in ostio duodeni ductum obstruens SCULTET *obs.* 61. Calculi 136. in ductu hepatico ORTLOB n. 17. Ductus choledochus dilatatus in sacculum, in quo 20. calculi non inflammabiles *Comm. Bonon.* IV. p. 35.

(f) HEISTER *annal. jul.* 1722 p. 129.

(g) Duo avellanæ mole VIEUSSENS *obs.* p. 449. Ovi mole, in funiculum contractus ALBIN. apud SAVASTO *lithogenes Moriformes obs. nostr.* h. 7.

(h) BARRERE *Nov. obs. anat.* p. 133. seq. DILTHEY *obs.* 8.

& numerosi [i], ut in fellis vesicula, inflammabiles [k], flavi [l], alias tamen terrei & non inflammabiles [m]. Alias, ut in bubulis ductibus, ramosi [n], ut bilarii ductus nonnunquam materia calcarea claudantur [o]. Concrementa in ductibus bilariis levia [p]. Duo avellanæ mole in choledochus [q]. Et in vesicula fellea calculi & in ductibus bilariis (r).

Etiam arenulæ in hepate reperiuntur [s], ut ægri pro pulmonicis haberentur [t]. Calculi per hepar in arthritico [u]. Hepar sphaeris gypseis plenum [w]. In Barbado patritio calculus in hepate [x]. Quatuor calculi in gibbo hepate (y). Hepar argilla pene plenum (z). Huc refero fere sex cylindros cartilagineos, ex cava parte hepatis in convexam penetrantes (a).

Denique potest in hepate calculus ex rupta vesicula advenisse (b). In hepate faccus, in quo septem calculi angulosi inflammabiles (b*).

§. XIII. Bilis analysis Aer in bile.

Etsi non absque cauto iudicio corporum naturam ex iis mutationibus definire

(i) Centum LENTIL *jatromnem*. Centum triginta sex ORTLOF I. c. n. 17. Add. MATANI *Excerpt. lit.* 1761. trim. 4. Ductus choledochus plenus calculi bilaris TRAFELMAN.

(k) BARRERE. TACCONI p. 307. BIANCHI p. 479.

(l) BIANCHI p. 479.

(m) *Comm. Bonon.* T. IV. In sacco ductu choledochi dilatati. MORGAGN. *Ep.* I. n. 49. CAMERARI *extispic. hepat defunctor.* In animalibus frequens CONTULI p. 60.

(n) BIANCHI p. 480. PLATER. *obs.* 13.

(o) POZZI p. 70. FANTON. p. 114. RAYMOND II. p. 244.

(p) CHESELDEN p. 186. add. *Comm. Litt. Nor.* 1738. hebdom. 18. In animalibus frequenter fabula in hepate CONTULI p. 60.

(q) VIEUSSENS *obs.* p. 449.

(r) *Comm. Nor.* 1738. n. 18.

(s) Principis Poloniae CONNOR. I. c. In bibace VIRIDET *bon chyle* p. 9. In animalibus CONTULI *lap. & pod.* p. 60.

(t) La METTRIE *obs.* 68.

(u) CHIFFLET *obs.* 46.

(w) RENAUME *des hernies* p. 114.

(x) CARDAN *variet.* p. 334.

(y) FONTAN. ad VESALII *Ep.* p. 21.

(z) LANCIS *subit. mort.* I. c. XI. In eo tophacea fabulosa materies CAMERARIUS *extispic.*

(a) STORK *ann.* I. p. 120.

(b) COE p. 77.

(b*) BARRER *obs. d' anat* p. 133. seq.

definire licet, quas ignis in corporibus excitat, habent tamen prudenter adhibitæ aliquam utilitatem. Aer in bile proditur in spuma, quam in vacuo (a) spatio agit; in colore prius etiam spumat, quam aqua communis, & gradu fere 104. FAHR (b).

In calculis etiam felleis maxima copia aeris est, ad 108. uncias replens in lapillo sexta parte unciae non majori, adeoque ad 648 plam molis prioris portionem, quæ totius calculi fuit (c).

§. XIV. Aqua.

Ut in omnibus humoribus humanis maxima portio aquæ est, sic in bile. Ea ex recente bubula (a) fere bile, lento igne & leni abacta insipida prodit, non acris (b), odore singulari, sub moschato (c).

Portio in GAUBIANIS experimentis fuit 112. part. 128. marum (d). CL. STIEF habuit earundem partium 88. (e). CASSIUS partes 110. (f). P. VERHEYEN III. & pene 112. (g), J. C. BARCHUSEN partes 117. (h). GHIARESCHI ex bove 109. (i), ex vitulo pene 88. quod non satis videtur respondere (k). F. HOFMANNUS partes 114. (l). *Pancratis* BRUNO partes 116. (m). P. C. HARTMAN partes 108. (n). & alias 94. (o). C. DRELINCOURT 106. (p). J. N. PECHLIN. 117. (q). PARISINI tantumdem

(a) HARTMAN de bile.

(b) VISSCHER n. 44.

(c) HALE vegetab statik. p. 190.

(d) Omnia pondera reduxi ad libram 128. drachmarum.

(e) HENNINGER & C. STIGELIUS ad HILD. VISSCHER.

(f) CARTHEUSER l. c. p. 469. MEAD. of. pois. p. 34.

(g) VISSCHER n. 45. NARCISS. n. 8. Habet etiam In bile aer fixus partus est MACBRI-
DE p. 240. HEUERMAN III. p. 783. & HAYMAN Comm. III. p. 458.

(h) Hamburger Magaz. T. VI. p. 399.

(i) De triumvir. inest.

(j) L. II. p. 88.

(k) Post acroam. Exp. 6.

(l) Giorn. di Parm. 1687. p. 193.

(m) Ibid.

(n) De bile med. & veneno.

(o) De bile.

(p) De bile.

(q) Ibid.

(r) Epimetr. de lien.

dem. (r), Cl. SCHAPER partes (s) 116. Multum non addito pondere alii (t).

Digesta bilis dedit aquam magis urinosam, ut quæ fecerit viridescere syrupum violarum, ad partes 88. (u).

Et bilis ex pecoribus lue consuetis aquæ dedit partes fere 102. (w).

Post Cl. VISSCHERI experimenta sapia, sive extractum superfuit, quale diximus (x). Ejus dosis fere fuit quartæ partes totius bilis.

§. XV. Spiritus.

Putredo aquæ falem volatilem præmittit.

Recens post bilis aquam dat aquæ multo fale volatili (a) imprægnatæ, fætidx & lixiviosæ portionem aliquam, ignei coloris. Ejus liquoris pondus pauci dederunt. Habuit tamen BARCHUSEN ejus partes 2. HARTMAN (b); sed cum oleo misti spiritus partes 4. CASSIUS partes pene 5. (c). D. KNIGHT pene 3. (d). Cl. SPIELMANNUS spiritus alcalini non minus quam 40. & spiritus medii 32. partes (e) BARCHUSEN. VISSCHERUS cum fale volatili partes $6\frac{2}{3}$ (f). BRUNO pene 7. HOFMANNUS pene 11. Clar. SCHAPER $14\frac{1}{2}$. Olei cum fale volatili, puto & spiritu mistis, $5\frac{1}{2}$. DRELINCOURT (g), VERHEYEN pene 17. HARTMAN alias pene 32. (h).

§. XVI. Oleum.

Multis modis oleum in bile ostenditur, quod in eo liquore abundat,

(q) *Metam. Apoll. & Aesculap.* p. 199.

(r) *Anc. Mém.* II. p. 27.

(s) *De corpusc. sang.* p. 28.

(t) VISSCHER NARCISSUS.

(u) p. 1254.

(w) l. c. p. 399.

(x) p. 559. 560.

(a) EDIT. DEM. CHRIST. l. c. Cum falem tartari addidisset extracto sanguinis spiritus alcalinus prodiit HOFMAN l. c.

(b) Per alembicum.

(c) l. c.

(d) l. c.

(e) *Instit Chim.* p. 1791.

(f) VISSCHER n. 46. Ad sanguinis spiritum uti. 10 12.

(g) p. 805. Unciam in 14. unciis.

(h) Per retortam. Bilis putridæ spiritus obscure alcalescit MACBRIDE p. 101. 102. parte, ut puto, urinosi volatilis salis per ipsam putredinem abacta.

dat, nam & *extractum* debile inspissatum ardet (a), & calculi fellei plerique flammam concipiunt (b) atque deflagrant, & HOMBERGIUS alumine cum bile concusso (c) solidum de ea adipem ad fundum vasis dejecit. Sic ex unciis duabus bilis cum drachmis duabus tartari elixatis habuit scrupulos duos amari adipis (d). Loco vesiculæ fellis, quæ nulla aderat, HARTMANNUS in suis plusculis adipis globum reperit (e).

Porro quando humor de bile pene omnis abactus est, adscendit oleum (f), levius primum spiritu, & flavum, rubrum, lentum: deinde alterum gravius quam spiritus est, piceum, nigrum, empyreumaticum (g).

GAUBIUS oleum leve seorsim appendit & invenit fuisse partium quatuor (h). Oleum vero grave GAUBIUS partis (h*), non integræ & fere ad $\frac{2}{3}$. Parum TACONUS (i). Reliqui commiscuerunt: BARCHUSEN olei fætidissimi, ut vocat, habuit $5\frac{1}{3}$. & olei crassi CASSIUS pene 10. Cl. KNIGHT partes fere $3\frac{1}{2}$. (k). VERHEYENIUS non penitus 3. sed perierat plusculum, præter id oleum, quod in spiritu hæret. PARISINI $4\frac{1}{3}$. DRELINCOURT supra 5. Cl. SPIELMANN 4. Olei cum spiritu misti SCHAPER partes 3. Etiam in putrida superest bile. In felle animalium a lue occisorum nondum 2. Cl. STIEF minus, quam in sanis armentis. Suilla bilis dedit 11 160 mas sive fere 8 (l). HARTMANNUS non separavit.

§. XVII.

(a) p. 560.

(b) p. 567.

(c) l. c. p. 360.

(d) SCHAPER p. 28.

(e) *Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 7. obs. 23.*

(f) VISSCHER n. 46. DOSSIE l. p. 460. HARTMAN.

(g) VISSCHER 46. HARTMAN. In altera analysi totum oleum in spiritu natavit.

(h) VISSCHER n. 46. Rubrum non fætidum *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs. 91.*

(h*) Nigrum fætidissimum *Eph. Nat. Cur. l. c.*

(i) *Opusc. med. phys. II. p. 311. ex femina.*

(k) IDEM semidrachmas 49. ex unciis. 110.

(l) Du HAMEL. *Hist. Acad. p. 247.*

§. XVII. *Sal volatilis.*

Plusculi auctores, qui bilis analysin sunt adgressi, omnino salem volatilem separare non potuerunt (a). Pauculum alii admiscerunt (b), & abundius auctores *Collect. Chym. Leidens.* (c). NEUMANNUS invenit $\frac{1}{3}$. BRUNO non supra $\frac{1}{6}$.

In bile animalium lue enectorum habuit Cl. STIEF, fere ad $\frac{1}{4}$.

§. XVIII. *Carbo.*

Postquam abactum est oleum, carbo superest, uti de sanguine solet, nigerrimus (a), falso sapore. Copiam NEUMANNUS fecit $4\frac{1}{3}$. VISSCHERUS 4. SCHAPER fere perinde. Ex eo incenso fuligo (b), fere insipida ad colum (c) retortæ aliqua surgit. Is carbo incensus deflagrat, cineremque relinquit, in quo est salis fixi exigua portio (d), ejus lixivium cum acidis effervescebat (e). Invenit $\frac{1}{10}$. fere NEUMANNUS (e*). Cl. STIEF æstimavit ad $\frac{1}{23}$. (f). C. DRELINCOURT pene ad $\frac{2}{8}$. (g). Minus dimidia parte (h) PARISINI (i). F. HOFMAN omnino ad integram partem (k): sic BARCHUSEN. Tantumdem BRUNO & paulo ultra. Sic etiam HARTMANNUS (l), non tantum, sed tamen ultra 1. SCHAPER ad 1. & $1\frac{1}{2}$. KNIGHT. fere $1\frac{1}{2}$. (m).
A pu-

(a) HARTMAN, VERHEYEN II. p. 90. BARCHUSEN TACONI, GAUBIUS *Comm. Norl. c.*

(b) DOSSIE, VERHEYEN p. 88.

(c) p. 131. 132.

(a) DEMOCR. CHRIST. VISSCHER n. 46. HENNING 52, n. 4. TACONI. DOSSIE. SPIELMANN *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs.* 94.

(b) HARTMAN, TACONI ad $\frac{23}{96}$.

(c) HARTMAN l. c. HEUERMAN.

(d) VISSCHER n. 46. NARCISSUS l. c. HEUERMAN T. III. p. 785. *Comm. Litt.* TACONI Abunde DEMOCR. CHRIST.

(e) *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs.* 91.

(e) p. 1254.

(f) Drachma in 192. partibus p. 805.

(g) VERHEYEN p. 88. impuri vero duplum.

(h) *Anc. Mém.* II, p. 27. nempe 5. dr. ex Lib. VI.

(i) l. c.

(k) Unc. 18. gr. 73. Aliastantum $\frac{1}{2}$. nempe gr. 7. ex drachmis 77. & gr. 7.

(l) Drachmas 10. ex drachmis 880.

(m) VISSCHER n. 47. NARCISS.

A putrida bile nullus carbo superest (*n*), cum ea degeneratio omnes sales volatiles reddat. Ex sale marino ortum esse nuperi (*o*).

Cum eo sale etiam terræ (*g*) aliquid de lixivio superest. Eam ad 2. æstimat BARCHUSEN.

§. XIX. *Analysis calculorum vesiculæ felleæ.*

Cum ii, certe qui sunt de classe inflammabili, bilis fere sint inspissata, non putavi id præsidium detegendi veri negligi debere, quod potest a calculorum analysi colligi. Insipidi fere sunt (*a*), tamen etiam amari, certe nucleus (*b*). Aliqui in aqua solvuntur, non quidem omnes (*c*) Solvuntur etiam a salibus lixiviosis, quale tartari oleum est (*d*).

In spiritu terebinthinæ optime colliquescent (*e*), etiam in oleo, certe aliqui (*f*).

In spiritu vini aliqui solvuntur (*g*), alii non mutantur (*h*); aliqui tamen dederunt tincturam amaram (*i*), fere ut succinum. In spiritu nitri tenescunt (*k*), & solvuntur, & nonnunquam cum acore saturato fervent (*l*). Cum oleo vitrioli non fervere lego.

Etiam in raphani rusticani succo (*m*), crusta exterior mollescit, & in succo cochleariæ (*n*), atque nasturcinarum plantarum hi calculi solvuntur, ut arena sit in alvi excrementis (*o*).

Etiam

(*n*) STRUVE *Exerc.* III. p. 159.

(*o*) Ibid.

(*p*) *Comm. Litt.* Nor. l. c. TACONI. SCHAPER.

(*a*) *Mém. de Chir.* T. II. p. 586. Non amarus esse HARTMAN c. 5.

(*b*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. obs. 91.

(*c*) MOSEDER p. 14.

(*d*) HALES p. 192. WISLICHEN.

(*e*) *Giorn. de Letter.* T. XXXII. p. 146. 147.

(*f*) TACONI p. 320.

(*g*) STROHLEIN. *Comm. Litt.* 1737. h. I. Fervere cum eo spiritu GREW p. 252.

(*h*) VALISNER.

(*i*) KNOLLE.

(*k*) TACONI *Mém. di Fific.* II. p. 398.

(*l*) De nucleo VIEUSSSENS *obs.* p. 223. de calculo GREW p. 252. qui de spiritu vitrioli negat. Etiam cum aqua forti fervent le Roi. Negat solvi de suis, nitidis, per anum ejectis inflammabilibus calculis VALISNER. III. p. 593. Negat *Comm. Lit.* 1743 *hebd.* 28. Negat Cl. BETZOLD.

(*m*) VRISS p. 27.

(*n*) p. 28.

(*o*) BOERHAAVE *de calcul.* p. 8.

Etiam in universum succus vegetabilium recentium icterum sanat (*p*), & fecit, ut calculi fragmenta prodirent (*q*); & in hungaricis bobus, adeo crustis bilariis infestatis, uti diximus, recens & vernale gramen malum ita solvit, ut Viennæ nullus calculus supersit (*r*), quo aguntur.

Porro, qui calculi inflammantur, solent carbonis aliquantum cinerisve (*s*) relinquere.

Igni subjecto calculi mollescent & liquefcent, ut cera sigillaris; deinde phlegma adscendit (*t*), ad paucas guttas, & oleum flavum (*u*), porro rubrum, denique nigrum empyreumaticum, oleo tartari simile: & mansit carbo ater (*w*) & splendidus.

Plus omnino olei continent, quam urinarii calculi (*x*). Id oleum ob empyreumate repurgatum gratum odorem spirat (*y*). Idem cum spiritu acido minerali coit (*z*), inque crystallos abit.

Bilis in vesicula felle reperta, cujus ductus obstructi erant, insipida, nauseosa, ad ignem coagulabilis, ab admisto oleo destillato deponerat terram calcariam, dabatque spiritus salis odorem (*a*).

Totum hepar cum vesicula destillatum dedit spiritus alcalini partes $\frac{11}{13}$, olei flavi non tenacis $\frac{7}{104}$. (*b*).

§. XX. Horum experimentorum corollaria.

Supereſt, ut quantum ejus fieri poterit, ex iis, quæ produximus, experimentis indolem bilis definire tentemus.

Qui non sit, primum dicemus (*a*). Nempe non acida est bilis, &

(*p*) CHESELDEN p. 167.

(*q*) G. v. SWIETEN p. 111. 134.

(*r*) KRAMER l. c.

(*s*) MEKEL p. 96. COE p. 99. BETZOLD.

(*t*) STROHLEIN & ex eo, ut puto, KNOLLE *Oeconom. Anmerk* p. 578.

(*u*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. obs. 91.

(*w*) STROHLEIN.

(*x*) HALES l. c.

(*y*) *Eph. Nat. Cur.* l. c.

(*z*) Pumici comparat WESLIGENUS.

(*a*) LUDWIG *de viis bilis cyst.*

(*b*) SPIELMANN. p. 179. Pondus calculi bilarii facit ad aquam, ut ad 1. 220 & 1. 346. ad 1000. MUSSCHENBROEK p. 557. multo certe urinosi lapilli pondere minus.

(*a*) VALISNERI l. c. Acidam esse, cura ex verv ece sumta cum spiritu vitrioli lactescet VIEUSSENS *Phil. transf.* n. 241. Sed id experimentum nullum acorem demonstrat. Tinctoriâ partem acidam esse cum oleo, FLOYER.

& adeo vehementer ab ea indole recedit, ut nullum acoris (*b*) vestigium, in ea sola inter humores humanos, reperiamus, ne in oleo quidem, cujus elementum salinum acidum esse solet. Quod cum terra fervet in atra bile (*b**), videtur ex cibis in acorem conversis esse.

Neque est alcalina. Qui Cl. Viri magnam in bile falis volatilis (*c*) copiam dixerunt, vehementer aberrarunt ab experimentis. Cum enim ex sanguine, urina, aliisque partibus humani corporis manifestus adscendat, & copia, de sanguine, non exigua (*d*) prodeat, ex bile aut nullus obtinetur, aut nulli proximus (*e*).

Etsi nunc porro de bile spiritus volatilis adscendit, in quo volatilis sal cum oleo mistus contemperatur, etiam a sanguine bilis vincitur; sunt enim in bile, secundum optima experimenta, partes similes decem (*f*), quarum ex sanguine partes similes prodierunt duodecim (*g*).

Contra bilis olei copia vincit, quæ sit, per eadem experimenta 7. partium, quod in sanguine quatuor partes paulum superet; cum tamen GAUBIANÆ (*h*) rationes sint inter eas, quæ olei in sanguine copiam parcissimam faciunt. Bilis est adeps lymphæ mistus VIEUSSENS (*i*).

Neque in sanguine is odor moschatus (*k*) est, qui in bile: sed neque eadem terræ copia. Etsi enim non valde certa de ejus elementi ex bileeducti portione experimenta habemus, manifesto tamen calculi in bile adeo frequentes, in sanguine vero ejusque polypis nunquam visi ostendunt portionem terræ in bile superare.

Inde etiam pondus, quo cum suo multo oleo tamen sanguinem aliquando excedit (*k**).

Acrior

(*b*) DEMOC. CHRIST. p. 52. Spiritum tamen medium SPIELMANUS vocat. GALEN.

(*b**) *method. medend.* L. XIV.

(*c*) SYLV. *diff.* II. c. IX. n. 30. de Ictero p. 492. *Collect. Chem. Leid.* BONNTEKOE I. p. 17 Sola continet alcali COLBATCH. *doctrine of acids asserted.* p. 443.

(*d*) Ad usque $\frac{1}{2}$ sive $2\frac{1}{2}$ nostri calculi, quo hic usi sumus L. V. p. 105. 106.

(*e*) p. 574.

(*f*) VISSCHER p. n. 60. Conf. L. V. p. 103.

(*g*) Ibid. VISSCHER.

(*h*) VISSCHER l. c.

(*i*) *Obs.* p. 215.

(*k*) p. 558. 560.

(*k**) p. 547.

Acrior est sanguine, cum sapore sit vehementissimo, qui in cruore modice salius sit. Etiam magis penetrabilis est, cum sanguis raro ex suis viis exfudet, bilis facillime.

Habet adeo id peculiare inter humores humanos, quod cum eadem fere aquæ copia portionem olei amari & penetrabilis majorem admistam possideat, cui sal volatilis urinosus admistus est.

Cum præterea per experimenta bilis olea aquæ reddat miscibilia (1), tiam ea dote ad saponem accedit, cum quo a Cl. viris numerata est (m), etsi utique sapo, qui ficcus, sit, in eodem pondere multo plus salis continet (n). Oleum etiam, quod in sapone salis lixivi portionem æquat, superat in bile. Habet enim se ad spiritum ut 7. ad 10. (o) Sed spiritus maxima pars aqua est, ut ea portio vix adpendi possit, quæ ad sallem pertinet.

Cum acor concentratus calculos felleos resolvat, non credas ab acore eos nasci. Ob vinum acidum certis locis abundare legi (p); & in bibacibus frequentes esse. Sed ostendi (q), in regione cerevisia pene solutente maxime frequentes esse, tum nostris in feminis, quæ tamen vulgo solam aquam bibunt.

§. XXI. *Motus bilis. I. Per ductum choledochum in duodenum.*

Cum de hoc motu diversissimæ sententiæ fere a primis medicinæ temporibus per scholas regnaverint, oportebat caute in his litibus progredi, neque admittere quidquam, nisi quod fuerit irrefragabile.

Et primo ex hepate bilis per ductum hepaticum in choledochum, hinc in duodenum fluit,

Etsi hæc valde evidentia videntur, tamen, cum & olim (a), & nuper (b) fit propositum, bilem de hepate omnem prius in vesiculam divertere

(1) p. 549. 550.

(m) BOERHAAVE &c.

(n) IDEM *Elem Chem.* II. prop. 73.

(o) In GAUBIANIS.

(p) *Journ. de medec.* T. III. n. 5.

(q) *Obs. patholog.*

(a) GALEN. *us part.* L. I. c. 3. *Facult. nat.* L. II. c. 5.

(b) LAURENTIUS p. 315. G. Gole *secret anim.* c. 14. LISTER *de humor.* p. 369. BIANCHUS P. I. c. 18. 19. SEGER n. 6. LIEUTAUD *physiol.* p. 142. *Essay.* p. 305.

vertere , quam ad intestinum veniat , oportet addere aliqua ex communi lege fluentium corporum sumpta.

Canalem hic habemus , ab hepate ad duodenum continuum (*c*) , absque ullo angulo (*d*) , aut ulla valvula , viamque rectissimam & deorsum ducentem in duodenum usque. Hæc via est , quam proponimus. Eam cur bilis de hepate non sequatur , adversarii nostri tenentur ostendere.

Difficilius (*f*) , equidem bilem ex hepate in vesiculam fluere credas , per viam sursum ducentem , valvulis impeditam , anfractuosam , ad angulum omni fere alio angulo minorem (*g*). Damus tamen fluere , sed certe per hepaticum facilius fluet in choledochum.

Porro ductus hepaticus cystico quidem major est (*h*) , aut minor choledochus , qui est communis utriusque truncus. Id argumento est , & hepaticam bilem , & cysticam , in choledochum convenire , cysticum vero ductum hepaticam bilem non omnem recipere.

Denique , si reponas (*i*) , ductum choledochum in vivo animale ab intestino certis temporibus stringi , quod continuo admittemus , non ideo in vesiculam omnis & perpetuo fluet. Id , si fieret , equidem & hepatica bilis , & cystica , nullam haberent viam , per quam id receptaculum inaniretur , quod quidem a vero abludit. Si adeo tempus est aliquod , in quo bilis cystica libere in duodenum intestinum effluit , eodem tempore etiam bilem hepaticam æquum est , viam in intestinum habere facilem.

Neque experimenta dissentiunt. Quoties enim ductus choledochus in fine suo contractus fuit (*k*) ; aut a scirrhuso (*l*) , pancreate coarctatus ; aut ab alia quacunque causa angustior ; aut demum a manu incisoris (*m*)
vinculo

(*c*) p. 505.

(*d*) Conf. p. 506.

(*f*) Vide p. 582.

(*g*) p. 529.

(*h*) p. 530.

(*i*) LIEUTAUD & alii Cl. Viri.

(*k*) *Mém. de l'Acad.* 1704. p. 157.

(*l*) CHESELDEN p. 166.

(*m*) CABROL. *obs.* p. 16.

vinculo (*n*) constrictus, aut tota vesicula excisa (*o*), aut ea alioquin inutilis est (*p*): toties etiam & ductus hepaticus intumuit, & quidquid choledochi supra vinculum fuit. Etiam aer in hepaticum porum impulsus choledochum facilius subiit (*r*). Interceptus denique a calculo ductus choledochus sub ea sede in funiculum abiit (*t*).

Iterum in vivo animale iter bilis ad duodenum ad oculum adparuit, quando ductus cysticus vinculo interceptus (*u*), aut vesicula fellea evulsa fuit (*w*). Bilis enim sub oculis incisoris choledochum ductum tumefecit (*x*), & in duodenum defluxit, idque replevit (*y*), aut in phialam, ductui choledochi appensam (*z*) stillavit. Cum callus porum choledochum constrinxisset, fuit amplissimus (*a*).

Cum denique adversarii objicere possint, adstricta legitima in vesiculam via non aliam superfuisse, etiam absque eo vinculo in aliis experimentis hepatica bilis, per suas dotes facile adgnosenda (*b*), de ductu choledochi vivi animalis in duodenum intestinum effluxit, aut in abdomen (*c*), quando id iter interceptum fuerat, aut demum in phialam experiendi causa appensam (*d*). Presso etiam hepate bilis in idem intestinum effluit (*e*). Cum hepaticus ductus dilatatus esset præter morem, choledochus pari ratione dilatatus fuit (*f*).

Recte

(*n*) BOHN p. 232. MALPIGH. *de liene* p. 120. SEGER p. 21.

(*o*) VERHEYEN II. p. 80. FIZES *de liene* p. 145. GEUDER *de ferment.* p. 211. EYSEL *de morb. reg.* BOHN. p. 232. & in primis EWALD *de somno*, ubi bilis multa fuit.

(*p*) LUDWIG.

(*r*) GIERING p. 360. 361. 362.

(*t*) ALBIN. apud SAVASTO *specim. lithogenes*.

(*u*) VERHEYEN l. c. MALPIGH. l. c. BOHN. p. 232.

(*w*) In cane BARTHOL. *Cent. II. hist.* 82.

(*x*) MALPIGH. *de hep.* p. 71. VERHEYEN p. 80.

(*y*) VERHEYEN, MALPIGH. *hep.* p. 72. *de liene* p. 120.

(*z*) TECCOP apud PECHLIN. *purgant.* p. 502. 503.

(*a*) In cane BARTHOL. *Cent. II. hist.* 82.

(*b*) BOHN. p. 236. SEGERUS ipse n. 5. *Metam apoll. & asculop.* p. 15.

(*c*) MALPIGH. *hep.* p. 72. BOHN. p. 232.

(*d*) REVERNORST p. 32. MURALT *vademec.* p. 78.

(*e*) GIERING l. c. p. 360. CALDESI p. 39.

(*f*) LUDWIG l. c.

Recte ita RUPUS (*g*), FAILLOPIUS (*h*), & Julius JASOLINUS (*i*), & plerique (*k*) nuperorum, bilem per ductum choledochum perpetuo excerni docuerunt, tum qui nuper de industria inquisivit Cl. GIERING (*l*). Sed etiam VESALIUS (*m*) admiratus est, cur bilis non recta ex jecore in duodenum veniret.

§. XXII. II. Ex vesicula fellea, fluit in duodenum.

Minus est dubii in hac thesi. Pressa certe vesicula vel in vivo animale (*a*) vel in cadavere (*b*), bilis in ductum choledochum & duodenum (*c*) intestinum exit; ægriusculæ nonnunquam, ob valvulosum ductum cysticum [*d*], & aer etiam vesiculæ impulsus intestina subit (*e*): vicissim flatus de ductu choledocho [*f*], aut aer de intestino redux [*g*], etiam spiritus vini [*h*] vesiculam subit, neque id facillime [*i*]. Sæpissime eam, suo viridissimo colore conspicuam, in ventriculis avium, pisciumque vidi.

Hinc a scirrho ductum choledochum [*k*] comprimente, vesicula re-tenta bile turgidissima fuit, & similia fiunt ductu choledocho filo inter-cepto

(*g*) *Par. hom.* II. p. 58.

(*h*) *Obs. anat.* p. 377. & *Sal. ALBERTI* I. p. 74.

(*i*) c. 5.

(*k*) RIOLAN. in LAURENT. p. 660. GLISSON c. 17. 20. BOHN. p. 243. *Act. Erud.* ann. 1683. BELLINUS HEFTER *Primit. Polon.* II. p. 115.

(*l*) *Select. Francf.* T. III. p. 371. &c.

(*m*) L. V. c. 8.

(*a*) BARTHOL. *anat.* p. 150. pars ejus BOHN. p. 241. perfacile PEYER p. 33. 70.

(*b*) Semper vidi succedere, & facile.

(*c*) GIERING p. 361.

(*d*) IDEM p. 362.

(*e*) SANCTOR. in I. Fen. p. 469.

(*f*) GIERING p. 361.

(*g*) In rachiticis BUCHNER de eo morbo p. 10 11. His bilis nulla.

(*h*) Tubuli hepatis concreti in homine, qui solo spiritu vini vixerat BEHRENS *diatet.* p. 394. ex DRELINCOURTIO.

(*i*) p. 364.

(*k*) HARDER *apiar.* n. 62. MIEG. *Thef. anat botan.* CHESELDEN l. c. KER-KRING *obs.* 65. RIDLEY *obs.* p. 167. VATER *divertic. bil.* p. 28. & BLAS *miscell. anat.* p. 297. *obs.* 4. p. 11. Pene manifesto enim, quem dixit cysticum, fuit choledochus.

cepto [l]. Et cum glandulæ cysticæ scirrosæ essent, vesicula plenissima [m] fuit. Cum ostium ductus biliaris ad duodenum scirrhus clausum esset, vesicula fellis ampla [m*]. Addunt aliqui, stylum facilius ex vesicula in cysticum ductum duci [n], & valvulas ejus ductus apertas esse versus duodenum, non ita in vesiculam [o].

Neque penitus contemni debet choledochi ductus diameter major diametro ductus hepatici. Ejus enim prærogativæ causam oportet in cysticæ bilis adfluxu quærere, cui junctæ cum hepatica major canalis debetur, quam quidem hepaticæ soli.

§. XXIII. N. III. *Ex hepate in vesiculam.*

Possit id iter improbabile videri, solas rationes aquilegum audienti. Cum enim ductus cysticus cum hepatico parallelus [a] fere sit, & ad angulum minimum cum eo coeat, possit videri, infinites faciliorem & ex hepate & ex vesicula in duodenum iter esse, quam ex folliculo in jecur aut vicissim. Videtur etiam ductum bilis ex hepate advenientis adeo parvum angulum cum cystico ductu facere, ut in ea parte bilis, quæ hunc cysticum ductum subeat, vix quidquam supersit virium [b].

Et tamen hepate in cadavere humano pressa, bilis facillime [c] in vesiculam venit, ut ipse repetito vidi [c*].

Aer in ductum hepaticum missus, & ipse eam viam non difficulter sequitur [d].

Sed & bilis in vivo animale ex hepate adeo certo vesiculam subit, ut ea revincta cysticus ductus versus hepar mire intumescat [e], ex-

que

(l) SEGER p. 21.

(m) BERTRANDI p. 24.

(m*) MIEG. thes. anat. bot. & in ea, puto, ob moram calculi 18.

(n) SCHELHAMMER physiolog. p. CCXIV.

(o) LORENZINI p. 23. 24. CALDESI p. 40. Naturalis hæc lex vesicula via est GLISSON. p. 184. Ad iter bilis ex vesicula in duodenum. Ductus choledochus constrictus, angustus, in lue vaccarum, et vesicula distentissima TURSEN de lue bovin. Duodeni ostium a scirrhus clausum, vesicula perampla MIEG thes. anat. bot. Pancreas tumidum, vesicula plenissima RIDLEY obs. p. 162. Pancreas induratum, tum, vesicula triplo major CLOSSY. Nuper in voluoloso puero, quem mori vidi, vesicula viridissima, quam, incertam ob causam, premendo non posses de vesicula expellere.

(a) p. 529.

(b) L. VI. Utebatur eo argumento CL. PALFYN anat. chir. p. 146.

(c) In putorio &c. CALDESI p. 39. in erinaceo FANTON. diss. anat. p. 263.

(c*) Negat, non bene CALDESI p. 39.

(d) Difficilius GIERING p. 362.

(e) BOHN. p. 134. BIANCHI T. I. 105.

que eo, qua parte ad hepar pertinet, intra sex horas unica una bilis effluxerit, & semuncia in una hora (f): Vifa est etiam bilis in laceratum folliculum apertum se effudisse (g), eumque replevisse (h). Cum in vesicula fellea calculi essent, dilatatus fuit ductus hepaticus (i), & cum vesicula destructa foret, & ductus cysticus filo interceptus, choledochus, qui solus nunc bilem hepaticam efferebat, major fuit (k), & cis vinculum cysticus intumuit. Contra, cum vesicula absque bile contracta esset, ductus tamen cysticus liber erat, ut bilis ab hepate advenire posset (l). Cum ductus cysticus coaluisset, hepaticus latior fuit, & recta via cum choledochus continuus (l*).

Sed in primis bilis de hepate in vesiculam venit, quoties via ad intestinum non patet. Potest autem intercipi, ob ductum choledochum finumque imprimis cum pancreatico canali communem compressum, dum intestinum flatu distenditur (m). Neque enim de duodeno inflato aer in ductum choledochum venit (n). Dudum vidit FALLOPIUS (o), ea ex causa bilem ad hepar venire. Cum fungis comestis (p), duodenum mire distentum esset, ductus choledochus quasi ligamento strangulatus fuit. Et cum ductus choledochus inflaretur, primo distentum est intestinum, denique aer in cystidem subiit (q).

Porro potest intestinum contrahi vi peristaltica, ut angustum, durumque fiat, & circulares fibræ undique villosam tunicam ad mutuos contractus urgeant: malim enim hac ratione uti, quam subtiliori (r) illo ductus per hiatus fibrarum carnearum transitu. Quare in diastole (s), bilem in duodenum evacuari, non in systole, in systole autem vesiculam adire (t),

- (f) SEGER p. 23. 24.
 (g) BOHN. p. 134. BIANCHI.
 (h) LANG. *physiol.* p. 9.
 (i) LUDWIG.
 (k) EWALD de somno.
 (l) SCHMIDT. I. c.
 (l*) ORTIUS. *diar. venet.* I. p. 102.
 (m) GIERING p. 364. Conf. de ductus choledochi compressione HAMBERGER *physiolog.* p. 310.
 (n) I. c. GIERING p. 369. 370.
 (o) Et alii, ut LIEUTAUD *physiol.* p. 142. *Essays* p. 305.
 (p) *Mém. de l'Acad.* 1749.
 (q) GIERING p. 264. neque tamen facillime.
 (r) Duo anulos, dilatantem a fibris longitudinalibus, stringentem, a circularibus factum SEGERIUS habet p. 25. 26.
 (s) GIERING p. 371. SEGER p. 9.

re (*t*), scriptum est. Constrictione certe intestini, quocunque modo ita interceptum vidi vir ductum choledochum, ut neque bilis effluere posset, neque pancreaticus succus.

In ejusmodi casu, ut in colica pictonum (*u*), in quo intestina mire arctantur, biliaria vesicula bile turgēt: sic in morbo boum (*w*), cum duodenum inflammatum est, & a pharmaco quasi graviori (*x*), tumet eadem; sic a croci metallorum usu (*y*), & a venenis (*z*), quæ WEPFERUS (*a*) suis bestiis obtrusit.

Huc etiam icterum infantilem referas, qui rheo aufertur. Ductus choledochus videtur a coagulo caseoso obstrui (*a**).

Quare communi scriptorum anatomicorum consensu bilis ab hepate in vesiculam venit: tantum ut multi, eosque inter & nos, partem aliquam eo venire statuunt, iis temporibus, quibus impeditus est bilis in duodenum exitus. Credas autem tantam bilis portionem ad vesiculam venire, quantam cysticus ductus (*b*) admittat.

Alii perpetuo, & omnem bilem ea via ducunt, contra quos diximus.

§. XXIV. *Num alias per vias bilis ex hepate ad vesiculam veniat.*

Ostendimus alio loco (*a*), anatomen nullos ductus admittere, qui ab hepate in vesiculam bilem ducant, præter cysticum, quem diximus; ne tamen objici possit, ignoratas nobis, & nimis forte subtiles vias aliquas occultasque latere, per quas hepar in vesiculam bilem suam mittat, neve, ut sæpe factum est, respondeant nobis adversarii, non ideo non adesse eos canales, quia oculis non patent, audiendæ sunt, quas præferunt Cl. Viri rationes.

Primum

(*t*) GIERING p. 373. CASSEBOHM. LORENZ. l. c. p. 22.

(*u*) Journ. med. 1762. m. Mars.

(*w*) LANGGUTH de morbo boum.

(*x*) HOFMAN Med. Conf. T. IV. Dec. IV. c. 7.

(*y*) HILD. Cent. IV. n. 79. 80.

(*z*) De cicut. p. 118. 143. 155. 159. 162. 180. 185. 201. 242. 243. 336.

(*a*) FALLOPIUS, BERGER l. c. p. 222. RIOLANUS p. 660. LUDWIG progr. Hi ob idipsum in exitu obstaculum. add. JASOLINUS. PETIT apud PALFYN II. p. 139. Thes. Paris. ann. 1744. editæ.

(*a**) STORCH Kinderkrankheit. p. 379.

(*b*) VERHEYEN II. p. 79. Conf. GLISSON p. 159. 160.

(*a*) p. 541.

Primum ergo ajunt, plurimis in exemplis, cum ductus cysticus a calculis clausus esset, tamen vesiculæ bile plenam, & permagnam (b) fuisse: & cum eodem impedimento, bilem de ulcere prodiisse (c), quam non alia via credunt advenisse. Nam, & liceret quidem Cl. Viris eo argumento uti, in folliculo ipso nulla bilis generatur.

Ad hæc reponimus, nunquam fabricam aliquam debere ad necessitatem hypotheseos fingi, oculisque fidendum esse in iis, quæ oculi detegere possunt. Deinde ligato, quod dudum citavimus, ductu cystico (d), vesiculam inanem reperiri, & perinde inanem, quando hepar ob ductum cysticum obstructum, aut certe mucosum (e) plenum, aut ob proprium scirrhum bilem non poterat submittere (f). Ita neque flatus per ductum hepaticum in folliculum penetrat, quando cysticus (g) ligatus fuit.

Et bilem, quæ dicitur in vesicula fuisse (b), cum calculus ductum cysticum clauderet, eam quidem iners fuisse feri (i) insipidi genus, mucosæ (k) puto, quale procul dubio vesiculæ glandulæ mucosæ (l) generant, & cum ductus cysticus a calculo obstrueretur, cis lapillum versus
hepar

(b) REINHART de ictero ROEDERER progr. ann. 1758. SENAC. in *Heister.* p. 172. FANTON. *diff. anat.* p. 263. Duarum librarum. capax RAYMOND l. c. II. p. 242. 244. Septem uncias longa LUDWIG l. c. BLAS *misc.* p. 298. Perampla MIEG. *Thes. anat.* In ea sesquipinta bilis RUYSCH *obs.* Etiam cum callus ductum cysticum comprimeret BAGLIV p. 579. Cum ductus cysticus connatus esset HENKEL VII. *Saml.* p. 22. 23. BLAS L. II. *obs.* 4.

(c) TACONUS *Comm. Bonon.* T. II. P. I. p. 216.

(d) SEGER p. 14. 20. quod egregium experimentum est, ORTLOB p. 135.

(e) SEGER p. 14.

(f) KERKRING *obs.* 82. LUDWIG. HORST *obs.* 7.

(g) *Primit. Polon.* II. p. 122.

(h) 7. 12. 14.

(i) Ad ignem coagulabile BENNET p. 58. LUDWIG.

(k) WAINEWRIGTH p. 72. *Obs. nostr.* 33. h. 1. 2. 3. 4. COEP. 90. 91. TACON *memor. diff.* II. p. 314. HOFMAN *Med. Consult* T. II. Dec. V. *cas.* 9. Subfalsus vix amarus liquor ad libram SWIETEN III. p. 101. Cum rob. comparat REINHART *Amurca mera* BARTH. *Act. Hafn.* T. III. *obs.* 38. Aqueus humor RUYSCH *Centur.* n. 87. LIEUT. p. 306. Serum RAYMOND l. c. Liquor a bile alienus LUDWIG *Pituita Act. Lit. Soc. Suec.* 1726. p. 156. Nulla bilis JUCH. *de fero & bile Journ. med.* 1759. Novembr. *Phil. transf.* n. 142. *Eph. Nat. Cur.* Vol. VII. n. 3. Vix. quidquam PETERMAN.

(l) FANTON. *anat.* p. 111.

hepar idem bile plenius fuit, vesicula inanis (*m*). Cum vesicula fellea nulla appareret in cadavere, reperta est contracta, inanis, limpida, aqua plena, calculo in cellula latente (*m**). Cum calculi obstruunt ostium vesiculæ, intus non bilis, sed serum fuit (*m***). Cum calculi essent in vesica fellea & in ductibus, nulla bilis (*m†*) aut paucae in ea guttæ (*n*) fuerunt. Pallidum etiam pro bile serum fuisse, cum hepar indurisset, inanemque vesiculam (*o*); aut bilem inertem reperio (*p*), qualis etiam est in vesicula vermibus plena (*q*).

Et non negamus quidem, posse a calculo ductum cysticum exquisite claudi (*r*). Non ideo tamen fuerit demonstratum, perfecte clausum fuisse, in iis exemplis, in quibus bilis in folliculo erat (*s*). Veram bilem in calculosa vesicula reperi, quoties aditus per ductum cysticum apertus erat (*t*).

BLASII cysticus ductus, ut semel repetam, videtur choledochus fuisse (*u*).

FANTONUS fatitur (*w*) obturato ductu cystico, in bove potissimum, vesiculam grandescere.

§. XXV. An vesicula fellea propriam bilem generet.

Altera præter cysticum ductum via, qua possis suspicari bilem in folliculum

(*m*). PALFYN *Ital.* II. p. 198 PETIT *Mém. Chir.* I. 286. FONTAN. ad VESAL. p. 21. Cum hepate maximo FANTON. *obs.* 5. LIEUTAUD *Mém. de* 1735. h. 1. *Essays* p. 305. STRÖHLEIN p. 17. Fere similia habet CHESELD. p. 166. LANCIS. *Epist. in Galen. di Minerv.* T. VII. p. 198.

(*m**) LIEUTAUD *essays* p. 306.

(*m***) TACONUS *mém. di físic.* I. p. 313. 314.

(*m†*) *Phil. transf.* n. 142.

(*n*) BETZOLD K. *Swensk. Acad. Handling* 1752. *Trim.* I. Pauca & lenta SAUBERLICH, BAYNARD cum choledochus ductus conglutinator effect. Cum hepate duro vesicula alba parva BUCHWALD *quadr. obs.* 2. NIETNER *de gland. natur* p. 25. & cum in eo septem essent calculi DILTHEY *obs.* 8.

(*o*) HEUERMAN, T. IV. p. 35.

(*p*). *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs.* 143. PLANCUS *de monstr.* Consumta in scirrhus hepatis vesicula KERKRING *obs.* 82.

(*q*) WIER ad HILDANUM.

(*r*) REVERHORST in ic. & COE. MEHEL p. 95. BARTHOL. *Hist.* 54. *Cent.* II. ROEDERER.

(*s*) HENKEL.

(*t*) l. c. *Hist.* 11. 13.

(*u*) L. II. *obs.* 4.

(*w*) l. c.

culum venire, ipsa est vesicula, in qua magni viri propriam bilem generari docuerunt (a).

Eam Cl. in belgio (b) viri ita ornaverunt, ut omnis omnino bilis in folliculo nata, tunc in hepar transfret, inque duodenum, etsi postea Vir ILL. (c), in hepate particulam bilis separari fassus est.

Exemplum anguillæ produci video (c*), in qua non aliam bilem ajunt esse, nisi cysticam: tum argumentum exhalationis injectæ in arteriam hepaticam aquæ, aerisve impulsæ, quæ fit in vesiculam (d).

Omniem quidem in vesicula bilem generari, opinio est dudum deserta. Tot enim tum animalia sunt, quæ solo ex hepate (e) bilem separatam habeant, omnino repugnat, aliis in animalibus simillimis & congeneribus (f), hepar bilem non gignere. Neque folliculo naturam egere, ex eo ostenditur, quod vera, amarissima, bilis absque ejus adminiculo generetur, vel in nonnullorum animalium hepate (g), vel in hominis ductibus bilariis, dum mora accesserit (h).

An vero aliqua bilis portio, eaque amarior, in vesicula generetur, magis quæri potest; cum folliculo in ea videamus, & facile ea exhalantes arterias, admittamus, etsi GALEACIO (i) ea exsudantia ostiola non contigit videre.

Sed neque hanc partem hujus liceret admittere hypotheseos, proxime priori capite propositæ: vincto nempe cystico ductu in sano animali: aut in homine morbofo obstructo, non alius nisi insipidus mucus (k),
in

(a) FRANKEN *de hepate* 21. ALBINUS pater apud ARDINOIS *fund med. anat.* Aliquam GALEACIUS *Comm. Bon.* T. II. P. 2. p. 236. aliquam perpauca BERGER p. 223. BOHN. p. 242.

(b) BACK. *de corde* f. II. c. 6. SYLV. *Disp. med.* VI. p. 27. 28. tum VIEUSSENS *tr. des liq.* p. 355. *Obss. post.* VERHEYEN p. 36.

(c) *Prax Méd.* L. I. c. 44. p. 296. & similiter aliquam bilem in hepate concavo parari VIEUSS. post VERHEYEN T. I. p. 36.

(c*) Ten. RHYNE *art. med.* p. 122.

(d) SYLV. *Disp. med.* VI. n. 53. ORTLOB n. 12. FRANKEN l. c. HALES *hamastat* p. 129.

(e) p. 519. 520.

(f) p. 521.

(g) p. 544.

(h) Ibid. LUDWIG *progr.*

(i) *Comm. Bonon.*

(k) WAINWRIGHT, BIANCHI p. 978. 1089. Mucus subniger, CALDESI p. 41. cum valvulæ deletæ essent.

(l) p. 374.

in vesicula reperitur, quum oporteret copiosam & sincerissimam bilem in folliculo esse, postquam blandior hepatica bilis a vesicula averfa fuit.

Ita nobiscum CL. GIERING (*l*), SEGERUS, aliique (*m*). Mucum certe mollem lenemve in glandulas depositum, & exhalabilem ab arteriolis aquam in hanc vesiculam credo deponi, ut in urinariam. Quam rationem ipsam olim protuli, dari animalia vesicula bilem fundente, absque canali, qui ab hepate eam bilem adferat, eam nunc antiquo rectius, ex comparatis animalium exemplis (*n*) doctior.

Manifestum contra mihi videtur, etiam collato vesicæ urinariæ exemplo, bilariam vesiculam receptaculi loco esse, in quo tamdiu per jejunia animalis, in laxum folliculum collectus, is liquor adservetur, donec uberior copia, quæ sufficiat, sub ipsa necessaria coquendi cibi tempora effundatur.

Neque dubito, moram, exhalationem venosam, calorem, vicini intestini coli putredinosum halitum, humorum humanorum stagnantium ad putredinem naturalem inclinationem, hepaticam bilem aquosam, tenuemque in amarum (*o*), acre, viscidumque fel convertere, quales utilitates vitæ animalis requirunt. Nam eas dotes ipsa bilis stagnando acquirit (*p*), & ad fine cerumen.

§. XXVI. IV. *A vesicula ad hepar.*

Hoc iter & ipsum parum probabile videtur: ob angulum acutissimum (*a*), quem cysticus ductus cum hepatico intercipit: ob resistantiam, quam, credas, cysticam bilem reperire, quando per canalem minus latum adveniens superandum habet momentum majus bilis hepaticæ, & per majorem canalem advenientis, & acceleratæ ex venosa ratione, cum totius visceris pressio ex innumeris, conjunctis, multo latioribus canalibus, bilem in unum angustiolem ductum urgeat.

Et tamen pressa vesicula (*b*), bilis in cadavere æque facile in hepar redit,

(*m*) WAINWRIGHT & c.

(*n*) p. 532. seqq. Plurimis exemplis confirmo, bilem absque amarore esse, quæ in vesicula, cum calculis felleis, nonnunquam superest.

(*o*) L. VII. p. 454.

(*p*) Ibid.

(*a*) p. 529 530.

(*b*) BOHN. p. 247.

redit, ut in duodenum effluit. Idem iter in lutra legit (c); neque necesse est ligasse ductum choledochum (d).

In aliis etiam animalibus hepaticus ductus cum cystico ita unitur, ut huc & illuc, ad hepar & ad duodenum, pari libertate bilis fluat (e).

Impulsus etiam vesiculæ humor & per duodenum & per ductus hepaticos effluxit (f).

Non ideo credo in sano homine bilem cysticam ad hepar venire. Non video, ut superare possit bilis advenientis de hepate per rectam viam flumen, a quo versus duodenum depellitur.

Quando vero pertinax obstructio ductum choledochum clausit, calculusve iter ad intestinum obsedit, videtur de ipsa cystide fellea bilis in ductus hepaticos, perque eos, in venam cavam, & in universum corpus se diffundere. Id etiam iter liquor injectus in choledochum ductum legisse visus est (g).

Bilem enim cysticam esse credas, quod ea multo quam ab hepate expectaretur, magis amara, magisque tinctoria adpareat in venis & in arteriis (h); in sanguine (i), fero (k), urina (l), in saliva (m),
spuito

(c) *Mém. des sav. étrang.* T. II. p. 201.

(d) Ut CALDESI p. 45. inque putorio aliisque animalibus p. 38. 39.

(f) FANTON. *diff. anat.* p. 263.

(f) SEGER p. 10.

(g) SYLV. *diff.* VI. n. 51.

(h) VESAL. *Chin.* p. 252. STORK *ann.* p. 150. 151.

(i) Absque rubore WOLF *obs.* 22. Pallens viridis DAVIDS p. 40. Flavus PETERMAN, SCHULZ *de ictero* p. 17.

(k) SCHWENKE p. 181. (etiam amarum BIANCHI p. 76. CHEYNE *method.* p. 116. Tingens QUESNAY. Flavum se reperisse amarum nunquam STUBBE *phlebotom.* p. 116.

(l) Prima tingitur SWIETEN T. III. p. 141. Flavissima VIEUSSENS *obs.* p. 251. COE p. 143. CAVALLERI *de morb. nolan* VIEUSS *obs.* p. 351. PLEMP *munit. fund.* p. 97. Amara MEAD *pois.* p. 34. 35. Amarissima WOODWARD *cases* p. 189. Tinctoria STORK. *Eff. of a societ. at Edimb.* I. BERGER. WILLIS *urin.* p. 350. SCHULZE *de ictero* p. 8. BIANCHI p. 181. QUESNAY. Acerrima, linteâ erodens SALMUTH II. n. 4. Negabat tingere MALPIGHIIUS *posth.* p. 253. Recte VATER *uromant.* p. 13. nonnunquam tingere. Niger icterus a bile nigra *Eph. Nat. Cur. Dec. VIII. obs.* 30.

(m) Amara *Eff. of a societ. at Edimb.* T. I. p. 310. SWIETEN l. c. Crocea VALGAR *med. ration.* p. 241.

sputo (*n*), in sudore (*o*), in aqua abdominali (*p*), in adipe (*q*), & cellulosa tela (*r*), in femine (*s*), in intestinis (*t*), & membranis; in adnata imprimis (*u*) oculi tunica, qua sede prima flavedo adparet (*w*): nonnunquam in ipsa cornea oculi tunica (*x*), & in tenuis meningis cerebri parte cellulosa (*y*): demum in ipsis ossibus (*z*).

Non ideo omnis icterus est a cystica bile. Credas omnino longe plerumque esse ab hepatica, retrorsum revoluta, quoties eadem obstaculum habeat in ductu choledochi (*a*). Huc icterus nuper natorum (*a**) pertinet, quem vulgo, & recte puto, choledochi ductui per caseosa concrementa obstructo tribuunt (*a***), in calidis insulis frequens (*a*†). Non tingit oculos ob bilem forte blandiorem (*a*††). Aut in hepatico (*b*),
aut

(*n*) BRASSAVOL. in aphor.

(*o*) *Essay of a societ. at Edimb.* T. I. p. 310. BORELL. *Cent. I. obs.* 68. Huc odor ictericorum violatus MEAD. *pois.* p. 34. 35.

(*p*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 4. 5. *obs.* 195. Et ipse vidi.

(*q*) MEAD *monit.* p. 162. Facile flavescit ab ictero adeps MORGAGN. p. 74. Pus flavesceus ex hepatis ulcere DEFIEU p. 475.

(*r*) *Edimb. Eff.* I. Ed. 4. p. 259. in febribus malignis flavus liquor.

(*s*) PETERMAN *Dec. I. obs.* 6. Non in lacte, ut humore exotico. G. v. SWIETEN T. III. p. 141.

(*t*) GUARINONI.

(*u*) LISTER *aq. med.* II. *Angl.* p. 125.

(*w*) COE p. 186. 187.

(*x*) Non vidit MORGAGN. II. p. 75. Sed ex aliis exempla refert. Inde, puto, flavescentia vident, sed raro icterici GALEN. *symptom. caus.* L. I. F. HOFMAN.

(*y*) MORGAGN. *ibid.* p. 74. Serum cerebri STORCK. Cerebrum flavum FANTON. *obs.* XI.

(*z*) KERRKING. de HAEN *rat. medend.* IV. p. 121. PETERMAN, STORCK I. c. p. 150. etiam cartilagineas PETERMAN. STORCK; & ossium membranas VALISNER. *oper.* T. III. p. 197.

(*a*) BONNET *obs.* 11. 12. 13. 14. 15. *Eff. of Edimb.* T. I. p. 314. In eo ductu tumor & calculus PETERMAN. II. asteatomate amplexente ductus bilarios a collo vesiculæ ad intestinum icterus. HENKEL II. *Saml.* p. 22. Ostium scirrhi clausum MIEG. *Thef. anat. bot.* ad finem adstrictum CABROL. *obs.* 10. Scirrhus conprimens ostium *Eph. Nat. Cur.* VIII. *obs.* 20. A strictura ductus choledochi ex fungo venenato *Mém. de l'Acad.* 1749. A pancreate cartilagineo comprimente ductum choledochum BARTOLETTI p. 267. 268. A ductu choledochi obstructo toto *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. *obs.* 70. A calculis ductum choledochum obstruentibus COITER p. 122. A pancreate, duodeno & jejuni parte induratis, hinc ostio intestinali ductus choledochi obstructo *Eff. of a Societ. at Edimb.* I. Ed. 4. p. 265. 266.

(*a**) SYLVIVS. HECQUET. *Méd. des pauvres* II. 271. MONRO *Edimb. Eff.* II. p. 245. BAGLIV. *Prax. méd.* T. I. p. 83.

(*a***) MONRO. BAGLIV.

(*a*†) Barbados HILLARY p. 61.

(*a*††) *Edimb. Eff.* I. Ed. 4. p. 259.

(*b*) MORGAGN. *sed. & caus. morb.* II. p. 86. I. c. Finis constrictus CABROL. *obs.* 1.

aut in ipso scirrhuso hepate (c), aut in ejus ulcere (d), aut denum ipsa in vesicula mali causa est, in quam secundum naturæ legem bilis hepatica divertit. Nam etiam in equo, vesicula destituta, icterus est (e).

Frequenter certe (f): etsi non semper (g), cum ejusmodi lapillis icterus conjungitur (h), & iis calculis eductis sanatur (i), aut per anum expulsi (k), quos libera nunc bilis sequitur (l), aut alioquin bile per alvum fluente (m).

Hepati-

(c) ARET. *diut.* I. c. 5. CAEL. *tard. affect.* L. III. c. 4. 5. LEIGH. *Exerc.* V. p. 125. VESAL. p. 628. SCHAARSCHMIDT 1740. n. 31. DODON. *prax.* p. 592. BOERHAAV. ex v. SWIETEN I. p. 355. LANCIS *Diff.* III. PISONI *spicil.* p. 149. WOODWARD *cases* p. 196. 197. *Select. Francf.* Vol. IV. CAMER. *hepat. defunct. exstispic.* LANCIS. *Galer. di Minerv.* T. III. p. 198. KERRERING *obs.* 82. In ictero nigro *Sel. Francf.* Vol. IV.

(d) La MOTTE *obs.* 134. DODON *post. hist. vitis* c. 15. Ab hepate inflammato ARETAIUS, FANTON.

(e) GIBSON p. 297. in oculo conspicuus.

(f) Frequenter SANCTOR. *meth. vitand. error.* p. 354. HOFMAN *bilis med. & venen.* BAGLIV. p. 433. Add. exempla GUIDETI apud BIANCHUM *hist. hepat.* 321. T. II. p. 328. CHESELD p. 166. COE p. 186. 187. Plerumque veram esse causam icteri *Eff. of Edimb.* I. p. 265. DUVERNEY.

(g) MORGAGN. I. c. II. p. 45. 84. *Sed. caus.* II. p. 217. 355. 443. PECHLIN I. *obs.* 58. VALCARENGHI *med. rat.* I. c. p. 1137. RIOLAN. p. 127. F. SYLVIUS. PETERMAN. Neque in exemplis BETZOLD *de cholelith.* WEPFER *cicut.* p. 176. *apoplex.* p. 356. RUESEL p. 163. *Phil. transf.* Vol. 50. P. II. p. 546. 547. VALISNERI *oper.* T. III. p. 595. STORK *ann.* I. p. 129. RAYMOND II. p. 242. 244. VIDAL. *Journ. des Sav.* 1723. Jan. Non fuit ictericus F. WILHELMUS elector, cum suo calculo felleo gallæ æquali BIERWIRTH *struct. hepat.* Neque cum 180. calculis alius GMELIN p. 7.

(h) Fere semper COE p. 123. Add. POZZI p. 69. G. v SWIETEN T. III. p. 107. PANAROL *Pentec.* V. *obs.* 22. BIELESAULT *Journ. med.* 1756. BONNET *seq.* T. III. S. 8. n. 36. S. 18. *obs.* 4. 8. 25. Addit. *obs.* 11. BLENY *Zod. Gall.* I. p. 95. BORELL *obs.* 4. *Cent.* I. MARCHETTI p. 27. *Phil. transf.* n. 142. & 306. HILD. *Cent.* I. *obs.* 60. ROBINSON *of the stone.* COITER p. 122. GEUDER I. c. KUNDMAN p. 908. TACON p. 316. PETERMAN *Journ. de med.* 1756. m. Nov. *Journ. Sav.* 1697. n. 30. MEERMAN *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. *obs.* 70. *Eff. of Edimb.* T. II. n. 28. 29. SCHNEIDER *catarrh.* L. III. ORTESCHI *diar. vener.* p. 213. PRESSEUX *obs. med.* p. 69. 70. TROTTER *de lethargo.* RUSSEL *tab. gland.* p. 163. BAGLIV. p. 433. VALISNER. *oper.* T. III p. 197. 198. TIMEUS L. III. *cas.* 28. STORK *ann.* I. p. 150. BUCHNER *misc.* 1729. p. 52. Cum calculis vesiculæ icterus COE *concret.* p. 222. 223. VESAL. *Chin.* p. 152. PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 260. 261. Icterus funestus, cum calculis in vesicula G. v. SWIETEN III. p. 107. Calculi in vesicula, & in ductibus bilariis MATANI *excerpt. lit.* 1761. P. IV.

(i) VARNIER *Journ. med.* T. III. n. 1. CHESELD. p. 166.

(k) Sal. ALBERTI *Orat.* II. IENTIL. apud BIANCHI p. 189. 190. *Eff. of a Societ. at Edimb.* II. n. 28. *Phil. transf.* n. 306. RUSSEL. SORBAIT PETERMAN *scrutin. icter.* HOOKE *Exp.* p. 79. *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. *obs.* 26. *Journ. des Savans* 1725. m. Janv. PETIT *Mém. de l'Acad.* I. p. 308. *Assemblée de Beziers* 1731. 6. Des. SCHURIG *lithol.* p. 167. FISCHER *de calc.* p. 3. 4. CHESELDEN p. 166. La METRIE *obs.* 66. *Comm. in Boerh.* T. III. p. 391. VIEUSSSENS *obs.* p. 251. TACON *Mém di fific.* T. II. p. 314. 315. GEUDER *ferment.* p. 108.

Hepaticum eo in casu ductum cum cystico obstrui credit Cl. AINSLIE ob viciniam parallelam (*n*). Cysticus certe ductus obstructus solus icterum fecit (*o*).

Alias strictura in concursu cystici & hepatici ductus fuit (*p*), aut demum in cystico, calculis pleno (*q*), angusto (*q**). Magnum autem esse oportet calculum, qui iter intercipiat (*q***). Est ubi cum scirrhus hepatis calculus felleus conjungitur (*r*), aut hepatis scirrhus vesiculam & ductus bilarios compressit, ut in ea 145 essent lapilli (*r**).

Denique neque bilis iter obstructum (*s*) solum (*t*), est causa icteri: non certe ejusmodi, quem oculi medicis possint ostendere. Nascitur enim icterus, & bilis adeo retrograda in sanguinem refluit plurimas ob causas, quarum aliquæ vix corporeæ sunt, ut ex ira (*u*), quæ etiam in chamæleonte cutem vitare (*w*) videtur. In lampetra ajunt vesiculam fellis mole augeri (*x*) quando irascitur. Huc moeror profundior, terror

p. 108. SCHACHT *ager ictericus phthisi laborans* BETZOLD n. 2. *Journ. med.* 1760. Aout. VIDAL. *Journ. Sav.* 1723. Jan. Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 9. obs. 190. *Comm. Nor.* 1740. heb. 19. G. v. SWIETEN III. p. 132. 133. SCHULZE in se ipso apud HEFTER *Primit. Polon.* II. p. 115. HORNUNG in cista. *Phil. trans.* n. 306. TACON. p. 314. 315. A medicamento BIANCHI p. 321 HORNUNG. RUSSEL p. 163. Per vomitum. *Comm. Litt.* 1737. heb. 36. COE p. 74. Icterus cum calculis vesiculæ felleæ sæpissime reperio. Periodicus, ab ea causa natus, sanatur legestis lapillis IMBERT *calcul. Bilar.* p. 7. neque aliter ejusmodi icteri conquiescunt G. v. SWIETEN.

(*l*) HOOKE &c. Sola bilis ad tres pintas PETIT *Mém. de l'Acad. de Chir.* T. I. p. 261.

(*m*) PETIT p. 260. 261. cum fluctuatio fuisset ad sedem vesiculæ PECHLIN *obs.* p. 138.

(*n*) *Ict.* p. 10. 11.

(*o*) CAVALLERI *de morb. nolan.* in morbo. Connatus HENKEL VII. p. 22. 23. Pene clausus ad cervicem crassa membrana GAL. MIN. VII. p. 229. 230.

(*p*) MEAD. *monit. med.* p. 162. Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs. 91. Vesicula fellei ob eam causam nihil emittebat.

(*q*) MORGAGN. l. c. p. 67. WEPFER *apoplex.* p. 356.

(*q**) In eo immobilis calculus, & parca in vesicula bilis STORK I. p. 150.

(*q***) VALISNERI T. III. p. 197. 198.

(*r*) VESAL. *Chin.* p. 152. TACONUS *Mém. di fific.* II. p. 313. 314. 316. WOLF *obs.* 22. p. 76. MATANI *Excerpt. Lit.* 1761. IV.

(*r**) TACONI p. 316. seq. Frequentissimus etiam cum scirrhus & cum abscessu hepatis icterus. Exempla non addo, quod nemo repugnet.

(*s*) ARETAEUS *diuturn.* II. c. 5. *Ess. of a Societ. at Edimb.* I. p. 260. DUVERNEY T. II. p. 229.

(*t*) PECHLIN I. *obs.* 58. *Ess. of Edimb.* I. p. 262.

(*u*) In iracunda calculi vesiculæ 200. FABRIC. *progr. ad Disp.* HOFMANN.

(*w*) HASSELQUIST p. 297. 298.

(*x*) RICHTER *Ichthyothol.* p. 867.

terror (*y*), vulnus cerebri (*z*), febris acuta, vulnus astlopo illatum (*a*), tumor in pleura natus (*b*): comesti fructus solani (*c*), demum ipse vi-peræ morsus, a quo cutis cum periculo flavescit (*d*), quod subitum malum (*e*) est.

In harum causarum nonnullis, ut in febre acuta, a vulnere cerebri, possit subesse latens hepatis inflammatio, quam abscessus ex ejusmodi in capite læsionibus supervenientes prodant [*f*], aut refluxus sanguinis, cujus causa non satis nota est [*f**].

In aliis malis bilis motus videtur incitari. Nam etiam ad intestina, adque ventriculum ex ira confluit [*g*], per experimentorum fidem.

In aliis credas tardari bilem, & ejus motum lentescere, ut angustas & rugosas vias cysticas superare nequeat, ut in dolore animi.

In nonnullis suspicari possis, ductus choledochi exitum arctatum fuisse [*h*].

§. XXVII. *Ea via est præter naturam.*

Non ideo potest aut cum veteribus (*a*) aut cum *Francisco SYLVIO* recipi, partem aliquam bilis in sano homine per hepar in sanguinem venosum refluere [*b*].

Nunquam

(*y*) MORGAG. *sed. morb.* II. p. 73.

(*z*) Fractura cranii *Mém. de Chir.* III. p. 506. MORGAGN. II. p. 288. cum pure inter os & duram vulnera cerebri ARÆUS L. V. c. 6.

(*a*) BARTHOLINUS *Hist.* 85. Cent. VI.

(*b*) *Hist. de l'Acad.* 1722. p. 18.

(*c*) WAINWRIGHT p. 37. In isto casu strictura ductus choledochi potuit subesse

(*d*) GALEN. MARCELL. EMPIR I. c. 9. MEAD. *de venen.* p. 9. CARDAN. *aphor.* 312. POUTEAU *melang.* p. 155. VERCELLONI ad BIANCHI T. II. p. 786. lethali iste eventus. *Fränk. Anmerck.* II. p. 244.

(*e*) Intra horam MEAD.

(*f*) *Mém. de Chir.* III. p. 484. seq. 507. seqq.

(*f**) Cum apoplectici sanguinis effusione, hepar inflatum, turgidum, gangrænosum. In phrenitico hepar inflammatum, & icterus FANTON. *obs.* 11. Nuper cum viri optime meriti trepano calvæ terebrarent, ut maniacis mederentur, perierunt omnes ex inflammatione, uti relatum est, viscerum abdominis.

(*g*) FELICE *Dissert.* p. 138. In iracunda supra 200. vesiculæ calculi FABRIC. *Progr.* ad HOFMAN,

(*h*) Ut a fructibus solani.

(*a*) AVICENNA L. I. *Fen.* I. *doctr.* 4.

(*b*) *Diss.* VI. p. 35. &c.

Nunquam enim sine morbo, plerumque cum vehemente convulsione bilis eam viam sibi aperit. Nimis sæpe vidi, & etiam nunc video, homines, quibus biliaræ viæ obstructæ sunt, & calculo quidem potissimum. Iis hominibus, aliquamdiu absque ullo dolore [*b**], calculi in vesicula habitant [*c*]. Verum denique bilis collecta vias suas nimium distendit, & colici dolores (*e*) vehementissimi, & sanguinis ad caput compulsio (*f*), & ad mortem usque diræ anxietates superveniunt, quæ cum vomitu repetito (*g*) frequentes vices repetunt.

Ea symptomata in nonnullis ægris tacite evanescunt, forte, quod in suas fæces non curiosè inquirant, dum retenta bilis erumpit (*b*).

In aliis calculus per anum eductus (*i*), uti diximus, finem facit paroxismi

(*b**) Non ergo perpetuus circa cartilaginem mucronatam dolor adest, ut CL. TACONI l. c. p. 324. *Eff. of Edimb.* II. n. 28. Negat in latus sinistrum posse decumbere COE p. 144.

(*c*) De VRIES *calc. bilar.* p. 24. STEIN *lithograph.* p. 45.

(*e*) Eum dolorem & ejus accessiones jam CÆLIUS vidit *tard.* L. III. c. 4. Inter nuperos exempla habent HOFMAN *med syst* IV. S. II. c. 3. *bil. med. & venen. Med. conf.* V. IX. Dec. II. c. 10. MORTON *phthiolog.* L. III. c. 13. GLISSON p. 265. BÖERHAAVE *Prælect.* T. III. p. 163. KALTSCHMIDT *progr.* GÖCKEL *Cent.* II. *obs.* 99. VALISNER. *consil.* n. 9. & *oper.* T. III. p. 595. 596. RHOD c. 3. l. c. SCHURIG *lith.* p. 167. 239. 240. PETERMAN, LISTER l. c. COE *introduc.* p. 46. VIEUSSENS p. 449. RUSSEL *tab. gland.* p. 163. 166. VIEUSSENS *obs.* p. 419. & c. DUVERNEY T. II. p. 225. FISCHER *de calculo* 43. *Journ. med.* 1756. mens. Nov. ORTESCHI *diar. venet.* p. 283. MEZGER *de lithogenes* SABATIER *Journ. med.* 1758. m. Nov. TACONI p. 315. *Act. Edimb.* II. n. 29. *Obs. med. fascic. obs.* 11. RHOD *Cent.* III. *Eph. Nat. Cur.* Vol. X. *obs.* 26. *Mém. de Chir.* I. p. 308. 502. *Phil. trans.* Vol. L. P. 2. p. 545. & n. 282. BIANCHI *hist. hep.* p. 484. RIDLEY *obs.* n. 24. HARDER *ap. obs.* 59. *Jour. Sav.* 1723. Janv. *Comm. Nor.* 1733. h. 36. Funestum exemplum VALENTIN. *Chir. med.* p. 229. Colicæ felleæ a calculis natæ innumera exempla, et in libris et in civibus etiam meis reperio. Ecce aliqua & soluti per ejectos calculos mali IMBERT p. 7. 10. 20. 22. 51. *obs.* 6. ORTESCHI *diar. venet.* II. p. 89. 90.

(*f*) Inde hæmorrhagiæ narium funestæ COE p. 222. 223. Hæmorrhagia obnoxius, cui calculi 82. in vesicula COLLOT. p. 6.

(*g*) COITER l. c. GREULICH, TACCONI, HAHN, PETIT p. 32. NEIFELD nuci moschatae æqualis ORTESCHI *ibid.* & ovi gallinacei mole HEISTER *anat.* 1726. mens. Aug. Raro tamen majores ea via calculi prodeunt ORTESCHI *diar.* p. 287.

(*b*) PETIT *Acad. Chir.* I. p. 260. 261. DUVERNEY II. p. 225. Per vomitum *Eff. of a Societ. at Edimb.* I. p. 266. COITER. GREULICH. Quadraginta libræ bilis per vomitum & clysteris ope egestæ VALENTIN *Chir. Med.* p. 229.

(*i*) *Eph. Nat. Cur.* Dec. I. ann. 9. 10. *obs.* 90. Vol. X. *obs.* 26. MEZGER *de lithogenes.* NEIFELD p. 203. BETZOLD n. 2. VIEUSSENS *obs.* p. 234. *Journ. de medec.* 1760. m. Aug. *Comm. Litt.* 1737. h. 36. PETIT *Mém. de l'Acad.* I. p. 308. FISCHER l. c. G. v. SWIETEN p. 134. *Journ. Sav.* ann. 1723. Janv. *Obs. med.* XI. TACON. p. 314. 315. PETERMAN. SABATIER. G. HORST COE p. 108. ARNOULT *in act. Trivult.* p. 1110. *Phil. trans.* l. c. SCHURIG. RUSSEL p. 63. *Edimb. Eff.* T. II. n. 28. RIDLEY

roxysmi (*k*). Neque pauci sunt, quibus per latus vesicula ab ulcere aperta calculos (*l*) emittit, pari cum orthostadia. Calculi fellei ex tumore umbilici (*m*). Calculus moriformis exiguus per ulcus prope umbilicum (*n*). Vesicula fellis adhærens in abdomine fecit fonticulum, per quem (*o*), lymphæ flavescens stillavit. Post excretiones biliosas vesicula adhærens, plena calculo pariter adhærente absque bile (*p*). Calculus felleus rupit tegumenta in abdominis & per hypochondria exiit (*q*). Per ruptum abscessum abdominis exhibant angulosi calculi (*q**). Scirrhus in hypochondrio. Subinde, sponte aperta vesicula, bilis effluxit, & per intervalla recidivæ redierunt fistulæ, alterne apertæ & clausæ (*r*). Abscessus epigastrii, per quem sensim numerosi calculi exierunt (*s*).

Primum legi apud CHESELDENUM (*t*), & erupisse calculos & salutariter fuisse excisos.

Multam

Calculi 200. in longo morbo salutari eventu per alvum educti VOGEL v. *Anmerk.* & supra 400. RUSSEL p. 163. adde BILLEBAULT *Journ. de medec.* 1756. m. Nov. & 1760. m. Aquit TITSINGH *steensnyden* p. 16. 17. qui magnas vocat tesserat Ex vesicula lapillos esse, quos intestina emittunt BIRCH T. IV. p. 371.

(*k*) BETZOLD. SWIETEN *Eph. Nat. Cur. Phil. transf.* l. c. PETERMAN. SCHURIG. RUSSEL.

(*l*) TACONI *Mém. di ffsic.* II. p. 315. *Mém. de Chir.* l. c. I. p. 298. 300. NEBEL *coagul. bil.* WISLIGEN *lapid. bilios. lymph. Select. Francof* Vol. IV. KNIGHT. *on catholic.* p. 121. 122. VALISNER *off. var.* T. III. p. 338. *Fränk. Anmerk.* IV. p. 480. *Journ. de med.* 1757. m. May. *Comm. Nor.* 1743. n. 1. ANEL. *malad. extraord.* p. 64. *Mém. de Berl.* XI. p. 31. *Eph. Nat. Cur. Vol. VI. obs.* 69. Vol. VIII. *obs.* 10 Ex intestino, cum una cibi exirent, LITRE *hist de* 1704 n. 15. Ex ventriculo *Phil transf.* T. L. P. II. p. 549.

(*m*) HAGEDORN *Cent.* II. Ad 130. BLACAARD *oper.* p. 390. Sic VALISNER. *offerv.* T. III. p. 338. II. p. 53.

(*n*) *Fränk. Anmerk.* T. IV. p. 480.

(*o*) *Sel. Francof.* Vol. IV.

(*p*) *Mém. de Chir.* I. p. 286.

(*q*) ELLER *Mém. de Berlin.* T. XI. p. 31.

(*q**) WISLIGEN. *lapid. bilios. lymphat.*

(*r*) *Mém. de l'Acad de Chir.* I. p. 298.

(*s*) *Eph. Nat. Cur. Vol. X. obs.* 91.

(*t*) p. 166.

Multam hic laudem meruit *J. Lud. PETIT* (u), qui vidit posse chirurgum naturam imitari, dirissimoque malo ægrum liberare; dedit idem signa ex situ, fluctuatione (w) &c. & monuit, ut vesicula incidi possit necesse esse, ut tumor (x) circumscriptus sit & adhæreat. Neque imprudenter primum ægrum dimisit, non ausus novum inventum in homine periclitari (y). Inde proposuit aperturam vesiculæ, tum styli (z) introductionem (a), & demum calculum exemit, non periculoso eventu (b).

Eum nuper alii Cl. Viri (c) sunt imitati, & potissimum etiam Cl. Vir *J. Zacharias VOGEL* (d).

Iterum in aliis, qui huc potissimum pertinent, icterus erumpens est pro levamine (e).

Mireris sæpe ut possint ovi columbini æquales calculi per anum, adeoque per ductum choledochum, descendere (f).

Sed neque longa plerumque pax est. Nam fellis canales denuo repleti similia tormina reducunt (g), & aliquoties ægri similibus crisi- bus liberantur, ut omnino non abs re has periodicas colicarum & supervenientis malaciæ vices pro signis certioribus (h), bilarii calculi Clari Viri habuerint.

Solent

(u) *Mém. de Chir. T. I.*

(w) 266. 267.

(x) p. 265.

(y) p. 257.

(z) p. 290.

(a) p. 292.

(b) p. 293. 300.

(c) *Journ. med.* 1757. m. Mars. 1759. m. Maj. & T. III. n. 1. (ni fallor).

(d) IV. *Anmerk. Hamburger Magazin* T. XIV. add. M. *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. obs. 61. 68. 69.

(e) BARTHOL. *Hist.* 62. Cent. V. Cent. III. *hist.* 4. RIDLEY LISTER *aq. med.* II. p. 128. *G. di Parm.* 1688. p. 68. BRUNO *de bile* p. 35. DUVERNEY *posth.* T. II. p. 225. RHOD. Cent. III. n. 19. PETERMAN. SCHURIG. RYSEL. KALTSCHMIDT *Ess. of. a societ. at Edimb.* II. n. 28. PASTA *in aphor.* p. 214. Post colicam icterus RHOD. Cent. III. n. 19.

(f) VIEUSSSENS. FISCHER. HEISTER ann. Jul. 1726. Aug. Ovi mole *Act. Philoxotie.* & ovo columbino major *Journ. med.* 1756. Grandis lamellatus pondere drachmarum 18½. de ano eductus *Mém. de Chir. T. III.* p. 55. 56. Ovi gallinacei mole per vomitum, & alius per alvum HEISTER. Aliud exemplum MEERMANN III. Per anum, sequente multa bile HOOKE *Exp.* p. 79.

(g) FISCHER. BIANCHI l. c. &c. HOFMAN. PETERMAN *Scrutin icter.* *Journ. med.* 1746. KALTSCHMIDT *progr.* ORTESCHI p. 283. Quarta die DUVERNEY l. c. MATANI l. c.

(h) BAGLIV. *Prax. Med.* L. I. p. 83. GUIDETTI apud BIANCHUM *hist. hep.* p. 322. G. v. SWIETEN III. p. 132. 133.

Solent ad finem erosa forte vesicula, aut hepate in partem mali tracto, ex diuturna phthisi (i) febrigue perire (k), ut non raro vidi.

Dolorum sedem credas esse inprimis in ipso (l) transitu per duodenum, deinde in toto eorum calculorum ductu (m): illud præferas, quod etiam parvi calculi, ipso non majores, dum transibant, dolores summos fecerint (n).

§. XXVIII. *Bilis in hepate ex vena portarum generatur.*

Per subtractionem ad verum hic conati sumus accedere. Siquidem ergo bilis ex vesicula non nascitur (a), neque ab ea in hepar sani hominis convehitur (b); siquidem porro ab hepate ad intestinum, aque eodem ad vesiculam venit (c), ut per ductum suum in idem intestinum redeat; superest, ut ejus in hepate unicus fons sit, universo quidem, etiam ex membranis (d). Cum porro advehentia vasa sanguinea in hepate tria sint, vena umbilicalis (e); vena portarum (f) & hepatica arteria (g), quæri oportet, num ex arteria potius, num ex venis bilis decedat.

Ex arteriis bilem nasci analogia (h) suadere possit, cum ubique ex eo vasorum genere proprii cuique parti humores in vasa excretoria secedant. Addi licet, ex arteria in ductus bilarios apertam viam esse (i). Et cerumen, qui fuscus bilis est simillimus, ex arteriis omnium carotide parari. Ea sententia olim SYLVIO placuit, pro ea particula bilis, quam hepati reliquerat: dicitur etiam nunc magno viro placere, cujus merito summa auctoritas fuerit.

(Res

(i) A CASTRO *pest. Rom.* p. 78.

(k) STORK *ann.* II. p. 153. *Phil. transf.* n. 300. *Fränk. Anmerk.* T. III. p. 340. seqq.

(l) Ibi dolor fuit *Hist. de l'Acad.* 1710. n. 3.

(m) VIEUSSENS *obss.* p. 449. VALISNER. T. III. p. 595. 596.

(n) COE p. 108. SCHURIG l. c.

(a) p. 586 seqq. Bilem in hepate generari. Cum scirrho hepatis nihil, nisi mucus in vesicula fuscus & ductus bilarii connati BRESL. SAML. 1724. p. 432. Scirrhi in hepate frequentissime icterum faciunt, quos non repeto.

(b) p. 589.

(c) p. 578. 582.

(d) p. 504.

(e) p. 479.

(f) p. 489.

(g) p. 472.

(h) SYLVIVS eo argumento usus est.

(i) p. 508.

Res demonstrationem quidem non admittit. Cæterum rationes proferre liceat, cur venæ portarum causa videatur probabilior.

Ea vena multa habet peculiaris, eaque omnia ad bilem generandam idonea videntur.

Sanguinem habet, etsi experimenta nondum nos convincunt, tamen per suas causas ejusdem indolis particulis plenior, quæ in bile abundant. Oleo primum, quod non potest non ab omentis (*k*), mesenterio. & mesocolis (*l*), abunde revehi.

Deinde sub putrido humore, qui videatur eam ad alcalinam naturam adque putredinem concipiendam aptam indolem (*m*) adjuvare posse, quæ est in bile. Nam, ut alias ostendimus, venæ ad portas euntes de ventriculo (*n*), de intestinis, & de crassis quidem potissimum, denique de abdominali cavo (*o*), subfætidum, & vehementer denique alcaliscentem humorem referunt. Dum enim fæces alvi in crassis intestinis ficcantur, fætida & putrida (*p*), aqua per venas hæmorrhoides in portarum venam venit.

Dudum autem est animadversum, amara (*q*) reddi olea, quæcunque initia putredinis fenserunt, ut de butyro, de oleo cocto, de aliis est notissimum.

Nunc porro bilis viscidior est, quam plerique humores humani. Est autem etiam ejus proprietatis in vena portarum peculiaris causa. Notum est, eam venam sanguinem suum ab arteriis minimis, latissime sparsis, habere, ut adeo in principiis suis lente moveatur. Non quidem 14613. (*r*), lentius quam sanguinem aorticum moveri putem, ut in aliquot horis vix unciam progrediatur. Nam etiam injecta in vivis animalibus vincula, & potissimum microscopium (*s*), ad intuenda vasa mesenterica ranarum adhibita, ostendunt, de eo lentore nimis magnifice Cl. Viros sensisse.

Nunc

(*k*) p. 495.

(*l*) p. 496.

(*m*) p. 557. FIZES p. 132. LOESECKE *physiol.* p. 173.

(*n*) L. XVIII. p. 338.

(*o*) p. 342.

(*p*) LXXIV.

(*q*) L. VII. p. 462. GLISSON &c.

(*r*) KEIL *secret. anim.* p. 93. in editione anglica 27682es & p. 41. 42. 43. nempe 66. X 177. add. QUESNAI *æcon.* p. 234. 235.

Nunc quidem, dum is late collectus sanguis in venam ad portas confluit, recuperat aliquam partem suæ celeritatis (*t*), tantam quanta ratio est venæ portarum ad simul sumpta arteriarum lumina (*u*), quorum sanguinem advehit, mesentericæ utriusque, & cœliacæ. Debet ea ratio se habere ut 5625. ad 2316. (*w*) non penitus uti 5. ad 2. adeoque fons celeritatis in hepate, & supremus gradus plusquam duplo minor est, quam in aliis visceribus, is enim fons est in venæ portarum trunco.

Sed nunc immensum est, quod de ea celeritate in hepate decedit, quando ea vena ex portis per universum hepar in ramos innumerabiles dividitur. Mensura iniri non potest. Si vero divisiones totidem esse tibi sumas, ac sunt in arteriis, si in quaque divisione luminis conjuncti ramorum rationem tibi sumas, quæ est in arteriis; fiet, ut in 20. divisionibus celeritas venæ portarum, quæ erat velocitatis arteriosæ minor quam subdupla, reducatur ad portionem (*y*), certe perparvam, dignitatis 20. numeri 2, ad dignitatem 20. numeri 3. ductam in celeritatem arteriosam. Cl. DAVID, qui sanguinem in hepate per frictionem arteriosam calefcere & decomponi scripsit, quod ego intelligo pro putredine, non ostendit, frictionem esse in ratione celeritatis transfluentis liquidi, adeoque in hepate exiguam (*z*).

Neque hæ meræ theoriæ sunt. Ab omni tempore animadversum est, super omnia alia viscera hepar scirrhis esse obnoxium (*a*), ut & ossea in eo concrementa (*b*), & faxea durities non rara sit (*c*).

Sed

(*s*) L. VI. p. 195. 196. *Opusc. anat.* I. p. 206.

(*t*) L. VI. p. 324. 325. 326.

(*u*) L. VI. p. 344.

(*w*) p. 488.

(*y*) L. VI. p. 171.

(*z*) *De la saignée* p. 222.

(*a*) GALEN. *meth. med.* L. XIII. D. SINOP. *parerg.* p. 33. 250. Sæpe BARTHOL. *dub. in lymphat. solut. defens.* in RIOL. p. 142. 143. In cachexia scirrhus hepatis ID. WOLF *obs.* 22. LIEUTAUD. *Prax.* p. 91. Hepar magnum, durum plenum tuberculis etiam lapideis BURCHARD *de bile* p. 83. In hydrope scirrhus hepatis PAU *obs.* 28. DODON *prax.* p. 592. PANAROL. *Pentecost.* IV. *obs.* 24. HILD. III. p. 53. ZACUT. *la Motte obs.* 120. ANEL. *lib. propr.* p. 45. HARDER *apiar.* p. 218. *Mém. de Berlin* T. XI. p. 32. BECKET *obs.* 34. PETZOLD *obs.* 77. KLAUNIG *obs.* 11. BUDDEUS. *cas.* 35. de HAEN *rat. med.* T. IV. p. 90. FABRIC. *progr. ann.* 1759. p. 14. *Bresl Saml.* 1721. m. Jan. 1724. p. 132. 433. STORK *ann.* I. p. 145. 132. HOME *factis* G. v. SWIETEN I. 855. *Eff. of a Societ. at Edimb.* II. n. 30. LEIGH. *Exerc.* V. p. 125. post iæterum nigrum. PISONI *spicil.* & ipse demum vidi, & sæpius, & *Journ. de Trev.* 1707. m. Janv. STORK *ann.* p. 132. Hepar in hydrope compactum de HAEN V. p. 51. Magnum BETZOLD

Sed & steatomata (*d*) in hepate frequentia sunt, collecto ibi adipe, & restagnante: & hydatides (*e*) sæpissime visæ: & membrana crassa cartilaginea (*f*): & sanguis in hepate collectus (*g*), & plena vasa mesenterica cum vena cava vacua esset.

Notum

BETZOLD *obs.* 88. FABRIC. *progr.* 1759. In hydrope pectoris PETZOLD *obs.* 61. NARDI *hort. Genial.* L. VI. Hydropem pro jecoris morbo habet ERASISTRATUS apud CELSUM III. c. 21. & WAINWRIGHT p. 21. In ascite plerumque adfectum esse LIEUTAUD *precis.* p. 416. Post dolores colicos hepatis scirrhus, puto biliosos RIOLAN. p. 110. In diarrhœa alba BIERLING *advers.* n. 51. In melancholia CHIFFLET *obs.* 38. In rachitide hepar grande ZELLER *strict. glandul.* In atrophia GOELIKE *Obs. Phys. Med.* III. HILD. *Nuz. der. Anat.* TISSOT *Epist.* p. 28. 29. ubi lapideum. HEUERMAN T. IV. p. 35. BECK *de palpit. cord.* p. 34. Post febres MADAI *Wechselfieber* p. 70. & vena portarum tumidissima SENAC. *febr. intern.* p. 129. Post perpetuos vomitus *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. 1. obs.* 103. In fluxu hepatico epidemico *Act. Balth.* ann. 1701. p. 118. Add. ad eos scirrhos HILDAN. L. III. *obs.* 50. BUCHWALD *quadriga obs.* n. 2. FABRIC. *progr.* KERKRING *obs.* 82. & in ictero p. 591.

(*b*) DEIDIER *Conf.* T. III. p. 122. 105. *physiol.* p. 41. 42.

(*c*) TISSOT *Epist.* p. 28. 29. CÆL. *tard.* L. III. c. 5. Hepar plenum calcariis tumoribus TITSINGH. *rust. uuren.* p. 289. Hepar fabulo indurato plenum CAMERAR. *extisp. hepat. defunct.* In equis tubercula GIBSON p. 301.

(*d*) STORK p. 130. 134. II. p. 260. ut 9. lib. penderet FANTON. *obs.* 73. Ovi mole in hepate steatomata WENKER *de vuln. venteric.* In ILL. Viro J. PUIATO jecur steatomatibus abfessum erat, absque ictero ORTESCHI *diar.* p. 76. Tumor ad hepar cysticus quasi melle plenus parte in os nutata VALSALV. L. III. n. 9. In diabete frequentia esse steatomata. MEAD. *pois.* p. 33.

(*e*) Sæpe reperit GALENUS *meth. med.* L. VII. n. 55. In exteriori ambitu MANGET *bibl.* p. 624. SBARAGLIV p. 31. CHESELDEN p. 212. FANTON. *diff. anat.* p. 68. In ipso hepate BIANCHI p. 154 *Bresl Saml.* 1725. Aug. VALSALV. *Diff.* III. n. 7. 8. ejusque cavea COURTIAL *Journ. Sav.* 1688. n. 24. de HAEN *rat. medend.* VII. p. 126. Maximæ hydatides *Gæl. min.* VII. p. 198. LITRE *hist. de* 1704. *obs.* 18. HEUERMAN II. p. 317. MORAND 1719. *hist.* p. 38. *Phil. transf.* n. 475. ad 4. quartas aquæ continentes PACCHION *Epist.* p. 191. Aliquot sibi ordinibus incumbentes bullæ BIANCHI p. 139. Sphæricæ duplici membrana factæ &c. VALSALV. *Ep.* II. LINDEN *physiolog.* p. 108. n. 9. Humore bilioso repletæ VALIS. n. 8. & lymphæ n. 7. Racemosæ racemis propria membrana obvolutis. ACT. HAEN. *Vol.* III. n. 76. Ad anum descendunt ex hepate per ductum choledochum VALSALV. n. 10. & puto LINDEN *select.* p. 184.

In bove hydatides hepatis VALSALV. *Diff.* II. p. 47. sed intus febun. Maxima novem librarum FANTON. *Diff.* In lue boum *Act. Hafn.* III. *obs.* 76. *Bresl Saml.* 1725. m. Aug. & ovi struthiocameli æqualis in bove CALDESI p. 58. In ovibus morbofis frequentes LINDEN *physiol.* p. 108. Hydatidis plena vermibus WAINWRIGHT p. 34. In equis ranunculo pastis hepar vesiculis plenum le NOBLE p. 12. In equi hepate BARTHO-LIN p. 130.

(*f*) G. v. SWIETEN III. p. 88. CHESELDEN p. 212. In hydropico mesenterium, pericardium, intestina crassiora SINOPEI *prorag.* p. 50. 51.

(*g*) Cum calculis felleis *Eph. Nat. Cur. Vol.* VIII. *obs.* 70. Cum hydatidibus, & sanguine in eam effusi 5. gallons CHESELDEN p. 212.

(*h*) SPIGEL *semitert.*

Notum est præterea, quam facile in hepate hominis (*i*), & animalium (*k*), faginatorum adeps enormi copia colligatur, ut inde bilis vires minuantur (*l*).

Quare si motus sanguinis in hepate lentissimus est, fient, quæ alias ostendimus, trahent se particulæ (*m*) pingues, quæ bilem generant, & is lentor conjunctus cum circuitu tardiore, aptissimus erit generando viscido humori (*n*) qualis est in bile.

Multa ergo præcipua vena portarum habet, ex quibus persuadearis, ab ea bilem secerni, quæ omnia non sunt in arteria, cui sanguis idem est, qui in renibus, & idem pari celeritate movetur.

Sed etiam experimento constitit, cum arteria hepatis vinculo intercepta fuisset, bilem perinde natam fuisse (*o*).

§. XXIX. *Vires quæ sanguinis per hepar motum accelerant.*

Si lentus in hepate sanguinis motus est (*a*), si impediti canales, & reticulo (*b*) scrobiculoso pleni: si vesicula bilem recipit, in qua motus omnis perit, & bilis in quietem reducitur: si viscida (*c*) ipsa, & minime forte inter fluentes humores meabilis; si periculum obstructionis maximum, fuit certe ex creatoris sapientia, vires moventes alias præter cor hepati largiri.

Earum aliæ constantes sunt, aliæ ad certa tempora restringuntur.

Perpetuus est motus respirationis. Hepar, uti dudum monuimus, pene
totum

(*i*) Cum victu lauto augetur moles hepatis & totum abdomen replet CHEYNE *di-
fess. ob body and mind* p. 188. Ex adipe suffocati C. GEMMA.

(*k*) ROBINSON *of food and dish.* p. 109. 110. Hepar avibus cortinis, quam feris majus
Id. majus feli domesticæ, quam feræ, corpus magis exercenti BUFFON T. VI. p. 27. An
ergo hepar magnum carnivoris SCHRADER p. 9.

(*l*) FLOYER p. 112. Bilis macilentæ ovis acrior & profundius colorata ROBINSON *of
medit.* p. 198.

(*m*) L. VII. p. 449. 452.

(*n*) L. VII. p. 462. *Prim. Polon.* III. p. 40. SPOLETI in *opusculo Venetiis an 1685.* edito,
quod nunquam vidi..

(*o*) MALPIGH. *de liene* p. 120.

(*a*) p. 598. 599.

(*b*) p. 506. 507. 530. 531.

(*c*) p. 545.

totum diaphragmate continetur, tamquam cavo modulo. Id diaphragma in omni inspiratione descendit, urget hepar (*d*), deorsumque pellit, deque plenissimo viscere humores omnes exprimit, vi quidem in respiratione vulgari modica; majori quando per cursum, laborem, vel nixum eadem incitatur, maxima in vomitu, in tussi.

Quare adparet, ut motu musculofo demto, animalium hepata in inmensum excrescant (*e*), & in carceribus per nostram observationem (*f*), & in desidiosis calculi (*g*) bilarii coalescant, ut vicissim motu musculari excitato obstructions jecoris solvantur (*h*) & hepar reddatur minus.

Huc referas, quod negat bilem in pueris ad intestina descendere ILL. de BUFFON (*l*). Huc etiam, quod apertis musculis abdominis vasa mesenterica intumescant & varicibus (*m*) varietantur.

Non autem oportuerat hanc potentiam respirationis adeo manifestam in juvando circuitu per portas rejecisse (*n*).

Per expirationem hepar pariter urgetur, dum costæ ad se invicem accedentes hypochondria arctant: & vesicula fellea ab expiratione inanitur. Quare etiam, dato emetico medicamento, hepar scirrhum depletum icterum subitum fecit (*n*^{*}): in aliis vero ægris, vel a medicamento (*n*[†]), calculi & bilis ictericorum promoventur; vel per vomitum ab ipsa natura productum, quo fere semper paroxysmi biliosæ colicæ fovuntur. Tanta in vomente (*o*), in vesiculam est pressio, ut vesicula

(*d*) SPIGEL p. 217. GLISSON p. 56. DRELINCOURT *canicid.* VII. WAINEWRIGHT p. 31. *Exper. nostr. Opusc. minor.* 15. 32. 34. 37. 41. 44. 50. 51. 52. 54. 55.

(*e*) p. 455.

(*f*) Ut ipse vidi.

(*g*) ADOLPHI *oper.* p. 667. ROBINSON *food. axd. discharg.*

(*h*) Senes, feminae, homines sedentarii *Script. Societ. Danic.* II. p. 386.

(*l*) *Hist. natur.* T. II p. 456.

(*m*) SWAMMERDAM *respir.* p. 104.

(*n*) HAMBERGER *physiol.* p. 303. seqq.

(*n*^{*}) SENAC. *Eff. de phys.* p. 170.

(*n*[†]) CHEYNE *diseases* &c. p. 189. Hinc in icterico emetica laudat HOFMAN *Med. Conf.* T. V. Dec. IV. c. 7.

(*o*) A vomitu bilis iter vehementer acceleratur ejusque enormis vis subito egeritur; ad res libras in febre petechiali VALCARENGHI *med. rat.* p. 168. etiam ad 15. libras cum bonie ægri rebus RAYMOND *malad. danger.* II. p. 47.

cula rupta visa sit (*p*). In expiratione certe bilem effluxisse vidi (*q*). Dum muscoli abdominis hepar retrorsum pellunt, vesiculam certe expriment. In nixu rapidius fluit, tunc enim diaphragma resistit. In homine, periodica convulsione pulmonis laborante, in ipso paroxysmo magna copia bilis effundebatur (*r*) Laxatur idem in utriusque actionis intervallis.

Videtur respirationis effectus in hepar, quam in vesiculam promptior esse. In omni vomitu ventriculi primum contenta projiciuntur, tunc flava bilis, semper autem novissima, quæ saturato colore, & amarore, & viscore se demonstrat ex cystide fluere. Ita in navibus videas, ita in morbis. Ex ordine reddebatur pallida, vitellina, æruginosa bilis & isatodes (*s*). Impedita via cystici ductus, eademque angusta, hujus phænomeni causa fuisse potest. Celerius eadem profluit, quo cysticus ductus angustior est, quam vesicula.

Habet autem vesicula fellea suam peculiarem compressionem a visceribus cibum recipientibus; a ventriculo potissimum flatu turgente (*t*), ab intestino duodeno, quod proxime vesiculam contingit, & a colo (*u*) cui eadem incumbit. Hi enim tubi dilatari nequeunt, quin vesicula exprimatur. Non quod hepar nihil ab iis causis patiatur, nam certe & ipse ventriculus (*w*), & colon distentum hepar urgent. (*w**)

Hæ vires non sunt perpetuæ (*x*): ita bilis & tempus nata est, quo in vesicula perficiatur, & tempus, quo ex ea prodeat melior: extra tempus ejus compressionis quiescit eadem, & videtur resorptione venosa (*y*), calore, fotu subputrido, inspissari, alcalescere, amarescere (*z*).

Etsi adeo non (*a*) velim unice per digestionis tempora vesiculam
evacuari

(*p*) SALMUTH I. *obs.* 43. DEUSING *de usu bilis app.* p. 374. Etiam rupta cum in ductu cystico esset introfusceptio MEKERN *obs.* 73.

(*q*) *De respir.* p. 55. tum SEGER p. 30. & in duodenum ut ego, & in vesiculam, cum ventriculus a vi diaphragmatis descenderet.

(*r*) SIMSON p. 166.

(*s*) COBER *Silesiac.* V. p. 18.

(*t*) p. 524. GIANELLA *orat.* p XVI. non semper.

(*u*) p. 523.

(*w*) WAINWRIGHT p. 3.

(*w**) Pressionis in vesiculam argumenta multa sunt. Ab ea polygoniæ figuræ, et politæ fariiculæ calculorum felleorum. Ab ea herniæ vesiculæ, in quibus calculi IMBERT p. 39. & RUYSCH *in obs.* et denique calculi vesiculam perforantes IMBERT p. 13. 51.

(*x*) BOHN p. 243. VERDIER II. p. 105. Bis de die vesiculam repleri, bis inaniri JASOLIN. c. 6.

(*y*) p. 528.

(*z*) p. 546.

(*a*) BOHN. p. 243.

evacuari, tamen non potest negari, quin a pleno ventriculo (*b*), & quidem tantum bilis adveniat, quantum copia ciborum requirit, ut enim premitur vesicula, ita bilem dat (*c*).

Non certe inficetum est monitum, bilem acriorem, cysticam, tunc adfluere, quando massa ciborum intestinum replet, alias ex sua penetrabili natura tormina facturam (*d*).

Quare in animalibus famelicis, (*e*) bilis vesicula non inanitur (*f*).

Video secundum alios CL Viros bilem, quando vesiculam replevit, suum receptaculum ad contractionem stimulare (*g*), ita crispari fundum, hinc motum in reliquam vesiculam se diffudisse, bilemque prodiiisse, cum butyro antimonii tangeretur (*h*). Sed etiam vini contractilem ductus choledochi (*k*), & *introsusceptionem* (*l*) ductus cystici huc referunt (*m*).

Quibus ego (*n*) parum utique tribuo, cum ductus & vesicula a solo veneno ad motum cieantur (*o*), cumque fibras conspicuas nullas possideant. Nemo certe in quadrupede, aut folliculum se constrinxisse vidit, aut eos ductus. Et omnino aliqui bilem exprimi negaverunt (*i*).

§. XXX. *Copia bilis secretæ.*

In his mensuris nihil quidquam est perpetui. Qui portione ductuum bilis ad venam portarum usus est BORELLUS (*a*), non bilem sed sanguinem invenit, qui flueret de ramo venæ portarum ejusdem cum cystico ductu diamentri. Eam mensuram fecit librarum 3.4. quod vehementer nimium videtur.

Qui

(*b*) GIERING p. 376. BIANCHI P. I. c. 19. GORTER *dè fame* p. 18.

(*c*) LIEUTAUD *essays*. p. 314.

(*d*) GIERING p. 882.

(*e*) p. 525.

(*f*) Frequens est, etsi non perpetuum, ut vidi, & MORGAGNUS *adv.* II. p. 55.

(*g*) BOHN. p. 245. BORDEU p. 426.

(*h*) PAGANI & BONIOLI p. 193.

(*i*) BORDEU.

(*k*) FANTON. *anat.* p. 262. in columba.

(*l*) MEKERN *obs.* 43.

(*m*) Neque SEGERUS p. 29.

(*n*) p. 526.

(*o*) Ibid. 527.

(*a*) L. II. c. 10 *prop.* 48. 307.

Qui experimenta aut fecerunt, aut adnotarunt, possint videri propius ad verum accessisse, & in cane quidem *Petrus* TECKOPIUS (*b*), brevi tempore [sed non definito] uncias tres quatuorve hepaticæ bilis folius obtinuit; GRAAFIUS ex cane pariter sex drachmas in octo horis (*c*); Porro J KEIL ex molosso drachmas duas (*d*) in hora; deinde MAURITIUS van REVERHORST (*e*), ex choledochoductu prima & secunda hora ad semuncem: & paulo minus tribus horis proximis, ut æstimaret ad sex in 24. horis uncias. J. G. HEVERMAN (*f*) quinque vel sex uncias ex cane in 24. horis collegit. Cl. SEGERUS ex solo ductu cystico (*g*), intra sex horas plus uncia, intra semihoram drachmas duas habuit, cui experimento plus tribuit, quam reliquis. In homine, cui latus apertum bilem ex vesicula emittebat, CAJETANUS TACCONUS (*h*) cysticæ bilis folius 4. uncias vidit eodem tempore fluxisse.

Parcus admodum BIANCHIUS (*i*) fuit, qui intra 24. horas unciam unam duasve numerat; uncias aliquot NICOLAI (*k*). Pauca drachmas LISTERUS (*l*)..

Recte certe & ad experimentorum normam MALPIGHIUS copiam non exiguam esse docuit, cum SEGERUS bilem celeriter sibi de tubulo in cystidem inmisso succedere viderit: & vesiculam in cane inanem altero die bile repletam WEPFERUS (*m*). Et in homine, cui periodici dolores colici quinto die redibant, per icterum finem inventuri, videtur totum systema vasorum biliariorum intra eum diem ad summam & intolerabilem distensionem retenta bile intumuisse (*n*). Sed etiam magnitudo hepatis, tanto renibus superior, aut salivalibus glandulis, uberem secretionem promittit, etiam si omnia lentiora feceris.

Propius

- (*b*) Apud PECHLIN' p. 502.
- (*c*) Succ. pancreat. p. 66.
- (*d*) Secret. anim. p. 72. compend. p. 77.
- (*e*) De circul. bil. p. 32.
- (*f*) Physiolog. T. III. p. 776.
- (*g*) p. 23. 24.
- (*h*) Mém. di fisica II. p. 309.
- (*i*) c. 41.
- (*k*) Mat. med. p. 177. 179.
- (*l*) Fund. med. II. p. 118.
- (*m*) Cicut. p. 252.
- (*n*) EX TACCONO.

Propius nequeo ad verum accedere: si tamen canis pondus humani sub quadruplum ex REVERHORSTI experimento ad humanos calculos traduxeris, poterit bilis copia in 24. horis nata ad 24. uncias pervenire, cujus credas sextam (o) partem in cystidem recipi, quinque reliquas ad intestinum deponi.

In morbis abundior generatur. In febre petechiali bilis meracæ tres libræ rejectæ (p) leguntur, & enormis bilis copia in febre flava egesta.

Acceleratur autem is motus potissimum ex ira, quæ subitas quandoque alvi laxationes & diarrhœas salubri effectû facit. Et ira mors, & rupta vesicula bilis (p*). Morsus viperæ eandem fere vim exercet, & biliosos vomitus facit (q). Ostendi, quam celeriter & quanta copia in morbis vomitu edatur (q*).

Est in situ universi corporis discrimen. Homo, erecto trunco corporis, aut stans, aut sedens, habet vesiculam transversam (r), collo paulum adscendente (s): & eo magis inferiorem fundum, quo fetui propior est. Ei ergo homini vesicula se paulo difficilius deplet. Contra homini supino (t) vesicula ex fundo descendit, ut facillime se evacuet.

Ita etiam in homine in sinistra (u) decumbente melius inanitur, cum etiam tunc fundum habeat superiorem.

Contra laxari credit Cl. DUVERNEY, & ductum etiam laxiorem esse, quando in dextrum latus decumbimus (x).

§. XXXI. Quo bilis abeat.

Ex duodeno intestino, aut semper, aut sæpe tamen, portio bilis in ventriculum (a) redit, perpetuo quidem in nonnullis animalibus (b). Major vero pars ad intestina se convertit, eorumque totum ductum sequitur,

(o) VALCARENGHI l. c.

(d) HEUCHER p. 373. Colica biliosa libris 24. bilis vomitu rejectis Superata DIAR. VERET. II. p. 89. 90.

(p*) p. 602.

(q) POUTEAU *melang* p. 155.

(q*) p. 602.

(r) p. 523. 460.

(s) Ibid.

(t) Quia retrorsum tendit.

(u) Quia sinistrorsum.

(x) II. p. 233.

(a) p. 307.

(b) p. 308.

quitur, ut & intestina undique tingat, tenuia quidem mágis, & fæces ipsas alvinas flavo suo colore imbuat, infantibus lætiori, saturato in adultis, perque totum fyrma intestini sequatur.

Etsi enim de ea bilis vi tingente aliqui dubitarunt (c), ob fæcum alvi dulcedinem, aut fatuum potius saporem: res tamen ex antiquissima illa adnotatione manifesta est, per quam fæces ictericorum albæ (d), argillaceæ, aut certe cinereæ (e) sunt. Cum calculis vesiculæ albæ esse solent (f), fellis enim tinctura carent. Hinc educto bilario calculo fæces prius albæ (g), nunc naturalem colorem recuperant. Et infantum albæ fæces, rheo dato apertoque ductu choledocho tinguntur (h).

In nonnullis equidem corporibus ictericorum flavæ sunt (i), nihil enim impedit, quin in exemplo, bilis hepatica ab obstructa cystide aver-
sa, partim ad duodenum intestinum veniat, partim in sanguinem redeat. Etiam in pueris, quibus acor abundat, & per vomitum viridia (k) rejiciuntur, & virides sunt fæces alvi, quæ quidem cum experimentis satis consentiunt (l).

Dulcedo fatua per putredinem ex omnibus omnino saporibus nascitur, & tamen vestigia bilis in stercore humano manifesta LEEUWENHOECKIUS reperit (m), & ipsum amarorem, si quando acrior erat, BOERHAAVIUS (n).

De intestinis pars utique cum excrementis disperit. Pars a magnis vi-
ris creditur per venas potissimum mesentericas (o), etiam per vasa lac-
teal

(c) HELMONT in virgine furiosa, & in puero cum propria excrementa devorarent *sex-
tupl. digest.* n. 36. 37. Addidisset ex LAMPRIDIO COMMODUM, ex nuperis PAPARELLUM
ἐναποφάγους.

(d) HIPPOC. *Cæc.* I. n. 38. 70. ARETÆUS *diut.* I. c. 15. RUFUS II. p. 58. CÆLIUS
tard. L. III. c. 5. RHAZE *divis.* p. 49. *Munit. feud.* PLEMP. p. 97. KERKING *obs.* 82.
Ess. of a Societ. at Edimb. I. p. 261. GEUDER *ferment.* p. 108. *Hist. morbi uratislav.*
1699. p. 16. BORRICH *Cent.* III. *Epist.* 97. REVERHORST p. 40.

(e) VIEUSSSENS *obs.* p. 228. *Morb. uratislav.* 1699. p. 16.

(f) TACCON *Comm. Litt. Nor.* 1742. *bebd.* 32. add. 1740. *hcbd.* 19. GEUDER. COE
p. 143.

(g) *Comm. Litt. Nor.* 1740. *bebd.* 19.

(h) SENNERT *infant. curat.* c. 22. &c.

(i) RIOLAN. *enchirid.* p. 132. MEAD. *pois* p. 32. qui eo in casu diarrhœam conjungi
monet, de HAEN T. IV. p. 121.

(k) Add. FLOYER p. 115. HUXHAM *de colica damnon.* p. 20.

(l) p. 553. 554.

(m) *Epist. Physiolog.* p. 374. 376.

(n) *Disp. inaugur.* p. m. 195.

(o) BOERHAAVE J. R. M. n. 106. M. v. REVERHORST p. 36. ZENDEINI *de cortice
chin.* p. 23. seq.

ctea (p), resorberi, & ad sanguinem redire, cum aliqua quasi naturæ parsimonia, ut semel nata bilis sæpius usibus humanis inserviat, acrior ex consuetudine cum fæcibus alvinis, & ex fotu perpetui caloris.

Res in controversiam vocata est (q), neque satis certo potest defini. Occurrit statim acrem esse bilem, & si verum est, intestina ad excretionem stimulare, stimulatorum etiam villos contractiles, in quibus vascula sunt resorbentia, quos ostendemus utique acrimoniæ impatientes propria vi se claudere, ne subeat.

Etiam hic liceret reponere, bilem, quæ resorbetur, nunc non acrem esse, vimque suam nimiam amisisse.

Mesenterium flavum vidit LIEBERKUHNIIUS (r), vasa lactea bile plena GALEACIUS (s).

§. XXXII. *Bilis utilitas.*

Tantum viscus (a), & vena propria ad hos unice fines destinata (b), peculiaris fabricæ, in pene omnibus animalibus repetita (c), non possunt non ad magnas utilitates a natura destinari.

Prima videtur, inservire dissolutioni ciborum (c*) Intrita nempe cum cibo bilis per alternas motus peristaltici vices, accurate & cum mucositate, & cum oleo, & cum aqua miscetur (d), eaque omnia alioquin hostiliter se repulsa, in unum homogeneous magma solvit. Lac in ventriculo acidum & coactum perfecte colliquat, ut sub ductus bilarii insertionem nullum coagulum supersit. Sed etiam facit, ut ex aqua & adipe emulsio nasci possit, quæ chylus dicitur. Pisces, quibus neque diaphragmatis vires ullæ sunt, neque musculorum abdominis, neque calor, neque robur musculorum ventriculi, tamen (e) difficillimos cibos coquunt; sed iis magna hepata sunt, & bilis est acerrima (f). Ipsa ossa putat CL. DOSSIE a bile dissolvi, in cane, cujus fel ab acore admisto minus debilitatur (f*).

Sed

(p) ZENDEINL.

(q) LISTER *aq. medicat. angl.* II. p. 116. BIANCHI c. 16.

(r) *De villos. tun. intest.*

(s) *Comm. Bonon.* T. II. P. I. p. 157. 158.

(a) p. 454. 455.

(b) p. 495.

(c) Ibid.

(c*) Cum carne & pane confusa, tardius quem saliva, bilis fermentationem ciet, Sed diuturniorem MACBRIDE p. 53. 56.

(d) p. 549.

(e) p. 312. 313.

(f) p. 547.

(f*) L. p. 488.

Sed etiam experiendo constitit, supra bilis accessionem materiem intestino contentam magis grumofam, inferius constanter fluidam esse (g). Etiam in limacibus panis devoratus digeritur, qua hepar ventriculo cohæret (h). Et bilem peculiariter oleosa solvere, tum ex prioribus illis (i) adparet, tum ex peculiari morbo.

In ægrô icterico fæces albæ erant, super natante pinguedine [cui solvens liquor defuerat]: cum vero medicamentis exhibitis calculus per anum decessisset, porro fæces oleosæ esse desierunt (k). Diarrhœæ chylosæ a calculis (l).

Porro in cane, cum intestinum duodenum lino interceptum fuisset, intestinum (m) supra vinculum grumis griseis plenum fuit, inferius massâ homogenea. Et caseosas esse puerorum fæces, quibus albæ sunt, a non subacto oleo, notissimum est. Et in ictericis argillacea sunt tenacitate. Neque dici debebat, in duodeno lactea vasa esse ante admistam bilem, cum adeo frequenter ea etiam in ventriculum veniat (n).

Non credo adeo absque experimento Cl. Viros oleosa a bile dixisse cum aqua misceri (o).

Villos lacteos abstergere, ne obstruantur, Cl. Viri est opinio, quæ non valde a priori diffidet (p).

Minime hic decet dissimulare, nuper virum Cl. *Philippum Georgium Schroeder* per propria experimenta (q) aliqua *Boerhaaviana* de bile placita hæud parum labefactasse. Bilem nempe imprimis bubulam, tamen & aliam, cum variis liquoribus composuit, calorem addidit, bacillo, quæ miscuerat, agitavit. Inde confectum est, cum lacte commistam bilem, neque cremoris secessionem impedivisse (r), neque acorem, qui lacti spontaneus supervenit (s). Cum oleo mistam minimo tempore confusam mansisse.

(g) *Mém. avant.* 1699. II. p. 24. du HAMEL p. 249.

(h) GAUTIER *obss.* T. III. p. 284.

(i) p. 549. 550.

(k) GEUDER *de ferment.* p. 108.

(l) BIERLING *adv.* n. 51.

(m) ASTRUC *digest.* p. 249.

(n) BERGER *de flux. chyl.* p. 5. Negat J. Henricus SCHULZE supra insertionem ejus ductus reperiri *de ictero* 13, & SCHMIDT *de bile* n. 10.

(o) Ad Cl. RAMSAY.

(p) COLE *of secretion* p. 252.

(q) *Experimentorum ad veriorem cysticæ bilis indolem explorandam captorum* sect. I. Gotting. ann. 1764.

(r) p. 13.

(s) p. 26.

fisse, ut paulo post oleum summa peteret, seque a bile (*t*) liberaret; neque majorem vim fuisse bilis humanæ: neque sale admisto diuturniorem fuisse mistionis constantiam (*u*); neque demum, cum spiritum salis ammoniaci adjecisset (*w*). In oleo terebinthinæ aliquanto majorem, non tamen plenam bilis potestatem adparuisse (*x*). Cum saliva & oleo tritam ne tunc quidem oleum fideliter solvisse (*y*), neque butyrum (*z*). Myrrhæ partem certe solvisse (*a*), ut posses sperare, majori dosi adfusam plus de eo amaro gummi solutarum, lac coagulatum imperfecte cum bile colliquescere (*b*); Eamque aliquando potius ad oleum extricandum aliquid conferre (*c*). Saponis adeo virtutibus non gaudere (*d*).

Altera pars officii bilis videtur ad acidi subactionem pertinere, quod in cibis animalium herbivororum, etiam sæpe in carnivoris, dominatur, canibus (*e*) etiam & felibus, & cujus tamen vix vestigium in fecibus alvinis superest. HELMONTII hæc sententia fuit, non absque experimento sagacis viri (*f*).

Sic etiam puerorum fæces acidum spirant, quando albæ sunt & caseosæ.

Dominabatur acor in cadavere, cum nulla bilis adesset (*g*).

Non ideo continuo, etsi utique alcalinæ naturæ proxima est, destruit totam ad acidum cibi propensionem, nam in chylo ea superest.

Denique antiquissimi jam medici docuerunt, bilem intestina ad contractionem stimulare, & clysteris naturalis loco esse (*h*).

Hæc iterum ex morbis demonstrantur. Pertinacissime alvus pigrescit, quando ex quacunque causa bilis vel nulla advenit, vel justo certe debilior.

Ex calculis bilariis (*i*), aut obstructo ductu (*k*) bilis, ex hepatis scirrho (*l*), & abscessu (*l*^{*}): ex ictero (*m*): ex vulnere demum vesiculæ felleæ,

nulla

(*t*) p. 29. (*w*) p. 32. (*y*) p. 34. (*a*) p. 40. (*c*) p. 43.

(*u*) p. 30. (*x*) p. 33. (*z*) p. 35. (*b*) p. 42. (*d*) p. 45.

(*e*) p. 316. FLOYER *præternat. state of hum.* p. 122.

(*f*) *Sextupl. digest.* n. 23. Acidum in similem bili falsam & volatilem naturam converti. Inde BOERHAAVE, FLOYER l. c.

(*g*) *Eph. Nat. Cur.* Vol. VIII. obs. 10.

(*h*) GALENUS *de usu part.* L. V. c. 3. 5. *diet. acut.* p. 241. RHAZE ad MANSOR. L. I. c. 22. VESAL. L. V. c. 8. GREULICH, WILLIS *pharm. rat.* p. 43. PECQUET *Diff.* p. 91. Etiam ad occidenda insecta, aut a cute arcenda, & ad impediendam evolutionem ovulorum, fellis aliquam utilitatem esse putes, cum in ea affecta adeo frequenter per ductus bilarios animalcula subnascentur VALISNER II. p. 48. quod ovium vitium vulgo notum sit.

(*i*) HOFMAN *med. syst.* Tom. IV. *Seç. II.* c. 9. PALFYN *anat. chir.* Ed. *Italic.* T. II. p. 198. *Eff. off. Edimb.* T. II. n. 30. ORTLOB n. 17. BROMEL *Act. Lit. Suec.* 1726. p. 133. Ad octavum diem LUDWIG l. c. & scybala durissima Id. *Eventu funesto Comm. Lit. Nor.* 1738. n. 18.

(*k*) Fæces congestæ ab obstructo ductu cystico COYTER p. 114. BARTHOL. *Hist.* 43. Cent. IV.

(*l*) Alvus rarissima KERKRING obs. 82. (*l*^{*}) *Act. Lit. Suec.* 1733. p. 110.

(*m*) FANTON *diff. anat.* p. 39. Ad mortem usque *Comm. Lit. Nor.* 1738. n. 18.

nulla clysterum vi alvus liberari potuit (*n*), & ex averso ad vomitus bilis itinere (*n**).

Etiam tympanites a destructo motu peristaltico nascitur. Sed in eo hydrope calculus in vesicula moschatae mole visus est (*o*), & hepar maximum 36. lib. cum abscessibus (*o**). In elephanto, cum bilis deficeret, alvus sicca fuit (*p*). Et contra intestina valde contracta, cum bilis plurima (*p**) foret.

Cysticae vero bilis hoc potissimum officium videtur. Nam aperto ductu hepatico, cum cysticus clausus esset, ob bilis fatuam dulcedinem alvus non fuit liberata (*q*). Inde explices, ut icterici possint esse alvo laxa (*r*).

Contra bilis nimis acris, fluida, & copiosa fuit in diarrhoea (*s*), dysenteria (*t*), cholera (*u*), febre flava (*x*), lipyria (*y*) lue maligna (*z*), petechiali (*a*), peste (*b*); etiam piscium (*c*), in morbo gangraenoso secalino (*d*); in morbo bovino (*d**), in hydrophobia (*e*).

Non

- (*n*) STUART *Phil. transf.* n. 414. & cum vesicula nulla fuisset SCHURIG. p. 232. *hamatol.*
 (*n**) VALCARENGHI *med. rat.* 1737. p. 105.
 (*o*) DANGEAU ad BAGLIV. p. 197.
 (*o**) ZACUT *prax med. mirabil.* L. II. obs. 45.
 (*p*) STUKELEY p. 96.
 (*p**) MORGAGN. *sed. caus.* II. *Epist.* 30.
 (*q*) TACONI *hep. affect.* l. c. p. 329.
 (*r*) PISONI *spicileg. curat.* p. 157. qui ab ea observatione contra receptam opinionem ratiocinetur: Vitiata ciborum coctio a bilis vitiis. Ab ea pene deficiente diarrhoea chylosa. EYSEL *de gland.* p. 25. Alvus dura, sapor amarus, cibi averfatio, ab hepate mole aucto, cum pancreate scirrhus, BADER obs. 23. Cum calculis vesiculæ felleæ colon quintuplo amplius IMBERT p. 13. Cum iisdem alvus durissima *Phil. Transf.* vol. LIII. faeces albæ CLOSSY p. 71. alvus dura, morbus hystericus, hydrops PALFYN. l. cit.
 (*s*) MALPIGH. *posth.* p. 21. DIEMERBROECK p. 31. Etiam ductus pancreaticus eo in casu bile plenus GRAAF p. 25. In fluxu hepatico VALISN. III. p. 167.
 (*t*) SPIGEL. p. 85. Eum morbum bili tribuit DEGNERUS: adde BARTHOL. *hist.* 80. Cent. III. Multoties se ipsa maior vesicula SPIGEL.
 (*u*) PECHLIN *purg.* p. 109.
 (*x*) *Eff. of Edimb.* II. p. 284. In febribus biliosis americanæ tropicæ acerrima & abundantissima BISSET *medic. confit.* p. 212.
 (*y*) BARRERE *nov.* p. 133. seq.
 (*z*) *Journ. med.* 1758. Tertiana maligna CLEGHORNE p. 165.
 (*a*) Bilis meracæ tribus libris rejectis sanata VALGARENGHI l. c.
 (*b*) SOULIER *de la peste* p. 264. 261. COUZIER *ibid.* p. 402. SCHREIBER *obs.* 12. ut vesicula rumperetur p. 201.
 (*c*) SCHEUCHZER ad DEIDIER p. 934.
 (*d*) *Disp.* P. D. LONGOLII p. 32.
 (*d**) Fatida, eruginosa GOELIKE *de ea lue.* Nigra & corrupta RAUDOT p. 22. Vesicula fellis maxima GIANELLA *Phil. transf.* n. 356. *Gal. min.* VII. p. 120. BORROM *epidem.* p. 27. SALCHOW. *Mém. de l'Acad.* 1748. p. 137. PLANQUE III. p. 31. Pro 8. & 11. uncis uncia 12. 15. STIEF *Hamb. Magaz.* l. c. p. 398. ad octo libras BUCHWALD *Act. Dan.* II. p. 93. Quadruplo major. MANGET *reflex.* p. 161. Triplo SAUVAGES *mem.* p. 16. triplo, quadruplo GOELIKE.
 (*e*) FANTON. *diff. anat.* p. 39. CHIFFLET *obs.* 41.

Non ideo hæc unica causa est motus peristaltici, qui fit in insectis, quibus nullum est hepar, neque bilis ulla. Sed motus omnes insectis vividiores sunt, quam majoribus animalibus, & stimulo minus indigent.

Quare videtur ad coctionem ciborum omnino bona bilis requiri.

Credas etiam ventriculum ab ea stimulari, ut famem percipiat (*e**). Nam ab ictericis plerumque appetitus abest, & nausea nascitur (*f*), & digestio debilis (*g*), & peculiaris languor (*h*), quem in nullo alterius visceris morbo tantum adnotavi. Idem eventus est calculorum biliariorum (*i*).

Et contra famelicis animalibus magna vesicula, bilis acris & amarissima (*k*). Ab amplissimo hepate appetitus egregius (*l*), & bulimus (*m*).

§. XXXIII. Num. sanguinem dissolvat (*n*).

Hæc fere sunt, quæ certa fide de bilis utilitate innotuerunt. Inde fit, procul dubio, ut deficiente bile vel inerte, vel ex hepatis ulcere (*a*), vel ex calculis felleam vesiculam replentibus, cibus nunc parum recte coctis, aquosus primum corpus languor occupet (*b*), deinde plenus & perfectus hydrops (*c*).

Non quod bilis acrimonia sua sanguinem, & humores omnes solvat (*d*), ut quidem creditum est. Eam enim violentiam ab amara & acri bile expectes. Sed in hydropicis & cachecticis eadem plerumque iners est (*e*).

aut

(*e**) Nam etiam medicamenta amara appetitum excitant, ut aloë, alia.

(*f*) LANCIS. *Diff. X.* in HO. ALBANO. *VIRIDET bon chyle* p. 632.

(*g*) A calculis felleis *Eph. Nat. Cur. Vol. IX. obs. 106.*

(*h*) *VIRIDET bon chyle* p. 632. SCHURIG *lithol.*

(*i*) PRESSEUX *obs. med. p. 69. 70.* hic quidem cum ulcere hepatis. Post nauseam crustæ lapideæ per fæces CONTULI *lap. & podagr. p. 60.*

(*k*) p. 525. &c.

(*l*) SPIGEL p. 215. Falconi BARTOL. *dub. contr. Lymph. Sol. p. 157.*

(*m*) CORNELIUS GEMMA.

(*a*) LEIGH *Exerc. V. p. 131. 132.* FONTAN. *Analec. p. 90. Act. Lit. Suec. 1733. p. 110. Zod. Med. Gal. I. p. 127. BARTHOL. Cent. IV. hist. 25.* Hepar in hydrope ascite fere adfectum est. LIEUT. *precis. p. 416.*

(*b*) Cachexia WEPFER *apopl. p. 342. LIEUTAUD ibid. p. 91.*

(*c*) Hydrops *Comm. Lit. 1742. hebdom. 32. Phil. trans. n. 299. FONTANUS ad VESAL. p. 21. SAUBERLICH Act. Erud. Suppl. T. X. S. IX. SACHS lapid. p. 102. HOFMAN Med. conf. T. II. D. V. c. 9. Hist. morb. uratisl. p. 211. BAGLIV. p. 577. in Card. NORRIS. Eff. of a Societ. at Edimb. II. n. 30.*

(*d*) ANC. MEM. II. p. 92. DIPPEL. p. 63. SEGER. n. 19. Caninam bilem ossa solvere. DOSSIE p. 488.

(*e*) HOFMAN. LIEUTAUD *precis. l. c. Frequenter Phil. trans. n. 133. Eff. of a Societ. at Edimb. II. n. 38. VATER hepar in fons. Tenulis IDEM ibid.*

aut pauca (*f*), aut omnino nulla (*g*), etiam ictericis sæpe subfalsa & vix amara (*h*).

Rectius existimes, cibis minus coctis, oleo cum aqua non rite misto, non compacto in gelatinosam lympham mucosam, discedere partem tenuiorem, in cellulosas telas, in urinæ vias (*i*), denique in caveas corporis humani.

Non ideo non aliæ hydropis (*k*) causæ sunt, eademque morbus cum sano (*l*) hepate conjungitur, ut ipse non semel vidi; siue quacunque via sanguinis nimium amissum fuerit (*m*); siue scirrhus aliud præcipuum viscus occupaverit; siue nimia venus, siue convulsiones hystericae corpus debilitaverint; siue vasa lymphatica a quacunque causa (*m**) impedita fuerint (*n*) succum resorbtum revehere (*n**).

§. XXXIV. *An aliæ sint bilis dotes.*

Non penitus improbabilis conjectura fuerit, plus esse in bile, & propiore ad vitam sustentandam utilitatem. Vulnèra nempe vesiculæ, cum non alia parte corporis læsa, funesta fuerunt, aut celeriter omnino (*a*), aut aliquot post dies (*b*), & pleraque animalia (*c*), quibus incisores vesiculam experiundi causa exciderunt, & ipsa interierunt. Insomnem etiam fuisse lego (*d*), cui vesiculam vulnus aperuerat.

Videtur

(*f*) SAUBERLICH *Ad. erud. Suppl.* X. S. IX.

(*g*) FONTAN. HOFMAN *acid. viscid.* p. 9. 10. *K. Svenska Wetensk. Acad. Handl.* 1752. *Trim.* I.

(*h*) De cystide sermo est G. v. SWIETEN III. p. 107. *Mucus Bresl. Saml.* 1724. p. 432. vide p. 543. 544. &c.

(*i*) Diabetes ex vitio bilis fere sit MEAD. *of pois.* p. 33.

(*k*) CÆLIUS *tard.* L. III. c. 8. A calculis vesiculæ felleæ plurimos enatos hydropes collegi; & à bile utcumque deficiente *Bresl. Saml.* 1724. p. 432. *K. Svensk. Wetensk. Handl.* 1752. *Trim.* I.

(*l*) BUDDÆI L. IV. c. V. WILLIS *stupend. abd. tum.* PETZOLD *obs.* 65. BAGLIV *Diff.* p. 577. CÖCCHI *bagni di Pisa* p. 262. LEIGH *natur. hist. of Lancashire* II. p. 76. KLAUNIG *obs.* 15. ut tamen nimis magnum esset. SCHNEIDER *de liene Thes.* 37. BONTEKOE *Thée* p. 207. SEVERIN. *abscess. noviss.* MAUCORDATUS p. 334. Fluxus alvi cruentus VATER *hepar inf.*

(*m*) L. II. p. 150.

(*m**) Sæpe in hydrope viscera solidiora SAVIARD *obs.* 93. Ex hydatidum immenso numero per omnia viscera ZENGVAARDIN *Anmerkingen* p. 35.

(*n*) In L. II. p. 168.

(*n**) M. CORD *hipp. morb. annal.* p. 316.

(*a*) AMMAN hora 27ma Intra paucas horas ALBERTI.

(*b*) ORTLOB l. c. n. 17. AMMAN *prax.* p. 254. STUART *Phil. transf.* n. 414. BIERWIRTH *stru. hepat.* p. 19. ALBERTI *Jurisprud. med. leg.* T. VI. p. 309. BIANCHI p. 491.

(*c*) BOHN I. ALBERTI, quem continuo citavimus.

(*d*) STUART *ibid.*

Videtur autem ad adeo velocem mortem solam in coquendis cibis diminutionem aliquam non sufficere: neque sudores frigidos & animi deliquia, ex ea causa supervenire, quæ post vesiculæ vulnera a Cl. Viris adnotata sunt (e).

Ea phænomena ut explicent Cl. Viri, suas offerunt hypothesen SYLVIVS quidem (f), in sanguinem resumtam bilem repetito in corde dextro configere, alereque adeo vitalem cordis ignem: hinc sanguinem fetus (g), quod bilem inertem non effervesce, esseque bilem oleum pro lampade cordis (h). Vel etiam absque eo fervore bilem in sanguinem redeuntem corpori universo animalis sensum, calorem, vigorem impartire (i), causam esse pene omnis in eo corpore motus, etiam cordis, & somni, & quæ alia.

Verum hæc omnia nimia sunt, cum in sano animale bilis in sanguinem non redeat, & lenta, ut narravimus, ab obstructo, hepate, aut inutili vesicula, mors sequatur, sive calculis obsessa nihil ad intestina dimiserit (k), sive ulcere aperta bilem siverit de lateris vulnere elabi.

Quare eas a vulnerata vesicula mortes a summa acrimonia putridæ bilis (l) forte repetas, quam ILL. Auctor citat, & historia chirurgi confirmat, cui manus intumuerunt, & mors epileptica vitæ finem fuit, cum bilis, de læsa vesicula effusæ, aliquantum in digiti sui vulnusculum recepisset (m).

Quare animalia vesicula fellis excisa omnino aliquando superfuerunt (n), & cum BOHNIO duo canes ab extirpata vesicula periissent, tertius per aliquot hebdomades supervixit, cui ductus cysticus lino interceptus fuerat neque bilis effluerat (o).

Balsamicam naturam HELMONTIANAM omitto, quæ cum putrescibili bilis indole nequeat consistere.

S. XXXV.

(e) BIERWIRTH.

(f) *Diff.* X. n. 55. 56. vide L. nostr. VI. p. 288. DUCINI p. 242.

(g) SWAMMERDAM *respir.* p. 113.

(h) DUCINI.

(i) WOODWARD *cases* p. 201. & conf. BYFIELD *letter to* WOODWARD Lond. 1719. 8.

(k) p. 569. &c.

(l) G. v. SWIETEN T. III. p. 500.

(m) ORTLOB l. c.

(n) CRAMER apud HAMER *medic. renunciat.* n. 40.

(o) BOHN *lethalat. vuln.* p. 154.

§. XXXV. *Num bilis sit excrementum.*

Nimium aliqui bilem laudaverunt; sequuntur qui nimium deprefferunt. Eo omnes eos scriptores refero, qui bilem dixerunt esse excrementum (a), de chylo separatum, dum per hepatis vires in sanguinem coquitur.

Nuper etiam aliqui huic humori omnem utilitatem negarunt (b).

Aliqui etiam causam morborum fecerunt, ut a bile morborum acutorum (c), podagræ (d), & calculorum (e) origo, & corruptela sanguinis (f) repeti posset.

Neque penitus improbabile videri possit, sanguinem per bilaria vasa aliquam particularum ad putredinem vergentium partem deponere.

Et tamen non ausim, etiam hanc admittere accusationem. Retenta enim bile, ut vidimus, sanguis non ideo aut putrescit aut alcalinus fit: sed longi sequuntur morbi, quales a coagulo, a lentore, ab acido aucto demum exspectes (g).

Excrementum vero id solum recte dixeris, quod excernitur. Bilem, si natura voluisset de sanguine expurgare, effudisset in vicinia intestini recti (h); ne chylum sua admistione temeraret. Sed in omnibus animalibus bilis in principium intestini adfunditur, ut nihil fere alimenti ad sanguinem veniat, quod cum ea non mistum sit. In vipera non (h*) est venenatum (i).

S E C T.

(a) Auctor *περί νοσούντων* L. IV. p. 59. ARISTOTELES *part. anim.* L. V. c. 2. p. 77. *Isag. anat.* c. 20. GALENUS *us. part.* L. 5. c. 3. etiam PARACELUS, qui floribus cheiri hoc excrementum jubet tollere; & de altera parte bilis, quæ in duodenum ablègatur. NENTER *physiolog.* p. 170. COLBATCH *doctrine of acids assert* p. 443.

(b) LISTER *font. med. Angl.* II. p. 116. qui etiam ad chylum faciendum inutilem dixit.

(c) ARISTOTELES l. c.

(d) PINELLI *de podagr.* p. 54.

(e) IDEM *ibid.*

(f) BERINGER in *disp. Heidelb. defensa* 1740.

(g) p. 612. &c.

(h) PERRAULT *Eff.* III. p. 220. BOERHAAVE.

(h*) Venenatum putabat ALDROVANDUS *Dracon & serpent.* p. 118.

(i) VESLING *Epist.* IV. HODIerna ad SEVERIN *viper.* p. 358. SEVERIN experimento facto p. 288.

S E C T I O I V.

HEPATIS UTILITATES.

§. I.

PRima, quæ inquirenti se offert, est omnino generatio bilis, tamquam succi, absque quo cibi coqui nequeunt.

Facile etiam adparet, hepâr diaphragma replere, & sustentare, ut & in expiratione plenus sit ejus fornix, & inter inspirandum diaphragmatis descendens pressionem excipiat, adque subjecta viscera, ventriculû, colon, renes, alia perferat.

Sed etiam calore (a) sui sanguinis, qui est plurimus, ventriculû, & colon intestinum fovere diximus.

Neque tamen penitus in his quasi minutioribus officiis mens adquiescit, quæ tantû viscus, tam late per animalium diversas classes dominans, lubenter credat, ad maximas vitæ humanæ utilitatis natum esse.

Ergo GALENUS (b) totaque antiquitas, ad usque RUDBECKII & BARTHOLINI tempora, nobilissimum officium viscerum maximo detulerunt. Chylum nempe de intestinis per venas mesentericas, cum nondum viæ lacteæ innotuissent ad hepâr venire (c). Ibi a facultate propria chylum quasi coqui, & partem excrementitiâ bilis nomine ad intestinum ferri. Partem utilem a ruberrima visceris carne in sanguinem perfici (d); quem porro hepâr in GALENICA hypothesi, & cordi traderet, per venam cavam, per diaphragma penetrantem; & deorsum per inferiorem venam cavam visceribus mitteret, membrisque reliquis. Hepâr ergo venis sanguinem dare (e), & radicem esse venarum (f).

Neque

(a) p. 295.

(b) HIPPOCR. & PLAT. decret. L. IV. c. 4.

(c) De usu part. L. IV. c. 19. 20.

(d) Ibid. c. 12.

(e) ARETÆUS Acut. cur. II. c. 7.

(f) ARETÆUS ibid. diuturn. I. c. 13. GALEN. hipp. & PLAT. decret. L. VI. & alibi ORIBAS. p. 116. HIPPOCR. περί τρεφής Sanguinis est fons jecur ARETÆUS cur diuturn. I. c. 5.

Neque subito ea opinio eversa fuit, etsi vasa lactea detecta fuerunt, quæ chylum sorberent. ASSELIUS eadem ad hepar more majorum duxit.

In eo dissentiebat ARISTOTELES (*g*), quod venarum, perinde uti arteriarum, originem ex corde deduceret, quæ etiam ERASISTRATI, & inter nuperos ANDREÆ CÆSALPINI (*h*), & C. HOFMANNI opinio fuit (*i*).

Verum interim *Guilielmus* HARVEIUS partem ejus theoriæ diruit, cum sanguinem quidem de hepate ad cor per venam cavam venire admitteret, cæterum sanguinem partium infra hepar positarum ita negaret ab hepate venire, ut ostenderet, ad hepar potius confluere.

Neque longa mora fuit, quando PECQUETUS ostendit, vasa lactea, quæ in hepar crederentur chylum ducere, ea quidem in ductum thoracicum & in venam subclaviam tendere. Chylum adeo ad hepar omnino non venire.

Denique BARTHOLINUS (*k*) invenit, & RUDBECKIUS, quæ vasa in hepate pro lacteis habita fuissent, ea vere lymphatica esse, & ab hepate lympham avehere, in hepar autem omnino nihil ducere (*l*).

Ita hepar, cum ab intestinis succum alimentarium non accipiat, neque coquere potest, neque in sanguinem convertere.

Restitit aliquamdiu BILSIUS (*m*), qui vasorum lymphaticorum itinera invertit, ut pars chyli a ductu thoracico ad hepar perinde ut ad alias partes iret.

Alio modo SWAMMERDAMIUS (*n*), utique chyli partem, neque eam exiguum, per venas mesentericas ad hepar tendere contendit, ut quidem hactenus veterum sententiam sublevaret.

Verum cum lympham ad hepar non venire dudum sit ostensum, &

(*g*) *Hist. anim.* L. III. c. 4. &c. POLLUX p. 261.

(*h*) *Quæst. peripatet.* L. V. c. 3.

(*i*) *Thorac.* L. II. c. 23. 26. &c.

(*k*) In libb. *de vasis lymphaticis; hepatis desperata causa: Exsequia Epitaphium.*

(*l*) Conf. potissimum GLISSONIUM p. 314.

(*m*) Conf. L. III. p. 253.

(*n*) Not. in prodr. J. v. HORNE p. 20. 29. Repete L. XXIV.

cum per venas mesentericas alii nihil de intestinis forberi malint, alii certe non chylum: cum præterea fabrica jecoris nihil habeat, quod peculiariter ad sanguificationem videatur idoneum esse: cum rubor hepatis non magis proprius (o) sit, quam alteri visceri, & absit ab hepate fetus, & nonnullorum animalium (p), quibus sanguis pulcherrime rubet; ob has causas nunc quidem hæc veterum opinio tota derelicta jacet.

Magna cæterum hæc fuit rerum conversio, & late per ipsas morborum causas & curationes omnia commutavit.

§. II. *An non sanguinis circuitum hepar moderetur.*

Quando mecum reputo, nullum bilis in fetu usum esse, cum cibum vel nullum capiat, si Cl. Viris credimus (a), vel certe ejusmodi, ut nulla vi digerente indigeat; quando porro in eo tamen fetu hepar video grandissimum, non ut pulmo quidem futuris destinatum nati hominis usibus exiguum: non possum non suspicari, præter bilis secretionem esse hepatis peculiarem utilitatem, quæ ad fetum propius spectet.

Et continuo occurrit meditati, sanguinem ab uterina placenta redeuntem cum sanguine intestinorum, lienis, ventriculi, pancreatis, & omentorum omnium, ingens certe sanguinis flumen efficere.

Id non licebat conjunctum in cavam venam inmittere: nimis inde amplam futuram, ut vel tantum torrentem male contineret, vel viribus eam venam donari oporteret, quæ non sint venosi ordinis, & moraturæ fuissent sanguinem de pedibus refluxum.

Neque oportebat sanguinem viscerum chylopojeticorum separatum ad venam cavam mittere, quod in adulto homine bilis melior perfectio ejusmodi posceret sanguinem, in quo horum omnium viscerum sanguis conjungeretur.

In fetu adeo fatis certum est, hepar fervire frangendo sanguinis ab umbilicali fune redeuntis impetui, ut per hepar, arterioso more distri-

(o) GLISSON l. c.

(p) BRONZER de *Lampetra*.

(a) De iis agitur L. XXIX. Aliam etiam hepatis utilitatem esse, quod in cochleis non amarum sit (SWAMMERDAM p. 123.) olim conjectura fuit MARTINI LISTER *cochl.* p. 50.

butus, multa parte sui impetus per frictiones (*b*) necessarias amissa, lentior per venas reduces in venam cavam rediret, sitque hepar tutelæ auriculæ dextræ præpositum, quæ tantæ sanguinis innitentis pressioni male resisteret, nisi eam hepar debilitaret. Neque credo, male huc pulli exemplum referri, in quo periculum ejus pressioni confirmatur. Frequens enim in avibus (*c*), dum ovo continentur, & funestus morbus est nimia ejus auriculæ distentio.

Ab adulto homine magna pars necessariæ hujus in sanguinis impetu diminutionis abest, cum totum illud maximæ venæ umbilicalis flumen nunc siccum sit (*d*).

Siquidem tamen etiam venæ portarum multum de celeritate sui sanguinis amittit, dum per hepar universum ramos suos dispergit (*e*); si ostensum est, vere ejus venæ sanguinem lentius fluere (*f*) etiam ejus lentoris sua erit utilitas; eadem, ut videtur, quam in fetu, ut nempe sanguis systematis viscerum chylopojeticorum minori cum impetu in venam cavam, proximamque dextram cordis auriculam nitatur.

Alias utilitates hepatis prætereo, ut lymphæ esse colum (*g*).

(*b*) L. VI. p. 192.

(*c*) *Format. du poulet.* II. p. 195.

(*d*) p. 482. 483.

(*e*) p. 489. seqq.

(*f*) p. 599.

(*g*) VIEUSSENS *obf.* p. 218.

I N D E X

ELEMENTORUM PHYSIOLOGIÆ

T O M I S E X T I.

LIBER XVIII.

C I B I I T E R A D V E N T R I C U L U M.

S E C T I O I.

M A N D U C A T I O.

1. N ECESSITAS ciborum	pag. 1	Temporalis	pag. 12
2. C ibus in os sumitur	2	10. Masseter	13
3. I bi eum subigi oportet	2	Exterior	ibid.
4. Organa quibus adteritur	ibid.	Profundior	ibid.
Maxilla superior, ut mobilis sit	ibid.	11. Pterygoideus internus	ibid.
Tamen imprimis maxilla inferior	4	12. Vires musculorum levatorum	15 16
Canalis incisivus	ibid.	magnæ, per exempla & pondera	16
Non vere cavus est	5	13. Vires ad latus deducentes	16
An in bestiis	ibid.	Pterygoideus externus	16 17
Alia ad os maxillæ superioris	ibid.	Musculi qui os aperiunt.	17
5. Maxilla inferior	ibid.	14. Colli latissimus	17 18
Unicum ejus os.	6	15. Dentes in universum	19
Figura	ibid.	In animalibus	21
Processus	ibid.	16. Eorum fabrica in universum	21 22
Canalis	ibid.	Sensus	22
6. Ossis temporum ad recipiendam		Incrementum	23
maxillam sedes cartilagine crustata	7	Crusta durior	ibid.
meniscus interpositus	7. 8	Fibrosa	ibid.
Ejus variata sedes in manducando	8	Alveolus.	24
Num maxilla inferior ad cavam partem		17. Dentium classēs.	ibid.
ossis temporum adaptetur	ibid.	Incisores	25
Num ad eminentiam transversam	ibid.	Eorum fabrica	25 26
Utrinque	9	Utilitas	26
7. Ligamentum laterale	ibid.	18. Canini	ibid.
Alia	10	Fabrica	27
8. Motus maxillæ inferioris	ibid.	19. Molares	ibid.
Deorsum lenius	ibid.	Anteriores	28
Valide	ibid.	Posteriores	29
Antrorsum	ibid.	Dentium varietates	ibid.
Retrorsum	ibid.	20. Arteriæ dentium	30
Ad latera	11	Superiorum. I. Ab alveolari	ibid.
9. Levatores musculi	12	II. Ab infraorbitali	30 31
		Inferiorum	31
		Venæ	31
		Nervi	31 seq.

21. Buccæ	pag. 32	9. Liquor oris exhalans	pag. 52
Labiorum fissura	ibid.	10. Salva in universum	52 53
Genæ	ibid.	Neque acida est	53
Ligamenta labiorum	ibid.	Neque alcalina	54
Os buccale	ibid.	Ejus phenomena cum admittis corpo-	
Os minus	33	ribus	54
22. Musculi buccarum	ibid.	Analysis	55
Nasales labii superioris	ibid.	Aer.	ibid.
Levatores alarum nasi & labii supe-		Aqua	ibid.
rioris	ibid.	Lixiviosus liquor	ibid.
Levator labii superioris proprius	ibid.	Oleum	ibid.
Alius vicinus musculus	34	Terra	ibid.
Fasciculus ab orbiculari palpebrarum	ibid.	Ab ea frequentes salivæ calculi	56
23. Zygomaticus major	ibid.	11. Motus salivæ	ibid.
Minor	ibid.	In parotide, glandula maxillari, sub-	
24. Levator labiorum communis	ibid.	linguali	57
Risorius.	ibid.	Num a sola irritatione fluat	ibid.
Triangularis	36	Tamen etiam a compressione	58
25. Transversus menti	ibid.	12. Qua copia saliva excernatur	ibid.
Quadratus	ibid.	Copia aucta	59
Levator menti	ibid.	Diminuta	ibid.
26. Buccinator	37	Mensuræ per experimenta sumtæ	ibid.
Triplex ejus origo	ibid.	Abundantia ex morbis	60
27. Orbicularis labiorum	38	13. Utilitas	61
Fibræ ab osse natæ superiores	39	Cum detrimento expuitur	ibid.
Interiores	ibid.	Utilitas salivæ a morbis abundius ex-	
28. Manducatio ipsa	ibid.	pulsæ	62
Ejus necessitas	40	14. Reforbtio, quæ in ore fit	63

S E C T. II.

S A L I V A. 40 41

1. Humor oris varius	41 seq.
2. Glandulæ salivales	42
Parotis	ibid.
Glandula accessoria	42 43
3. Ductus stensonianus	43
Adferitur stenonio	ibid.
Ductus accessorius	44
Insertio	45
4. Glandula maxillaris	ibid.
Sub ingualis	ibid.
5. Ductus excretorius glandulæ maxil-	
laris	46 47
6. Et glandulæ sublingualis major	47 48
Minores	49
Alii	ibid.
7. Glandulæ buccales	ibid.
Molares	50
Palatinæ.	ibid.
8. An & alii ductus salivam generent	51
De COSCHWIZIANO ductu	52
De NUCKIANO	ibid.

S E C T. III.

D E G L U T I T I O.

1. In universum	63
2. Velum palatinum	63 64
Uvula	64 65
3. Arcus faucium anterior	65
— posterior	ibid.
Tonillæ	ibid.
Sinus majores	ibid.
— minores.	ibid.
Tonillæ secundæ	ibid.
4. Pharynx	66 seq.
Ejus fabrica, in universum.	67
Latera	ibid.
Vicina anterior	68
5. Musculi pharyngis	68 seq.
Pterygopharyngæi	68 69
6. Fibræ a buccinatore	69
Mylopharyngæi	ibid.
7. Glossopharyngæi	70
8. Hyopharyngæi	ibid.
9. Thyreopharyngæi	ibid.

Cricopharyngæi	72
10. Stylopharyngæi	72 73
11. Levatores pharyngis alii	73
Num dentur cephalopharyngæi	73 74
Et salpingopharyngæi	74
12. Pharyngopalatini	74 seq.
Origo	75
Arcus	ibid.
Columnæ	ibid.
Actio	76
13. Glossopalatini	77
14. Levatores palati molliis	78
15. Circumflexi palati	79
Origo	ibid.
tendo circumflexus	79 80
musculus accessorius	80
16. Azygos	80 81
17. Glandulæ pharyngææ	82
18. Arteriæ pharyngis	83
— propriæ	ibid.
— palati molliis.	ibid.
— tonsillares	84
— palati duri	ibid.
— buccarum	ibid.
19. Venæ pharyngis	84 85
Minor	84
major	85
aliæ	ibid.
Buccales	ibid.
20. Nervi ab octavo pare	ibid.
— ab intercostali	ibid.
— a tertio quinti paris ramo	ibid.
Nervi buccarum	86
21. Iter cibi per os.	ibid.
Linguae officium	87
22. Larynx clauditur	87 88
dum elevatur	ibid.
Quid lingua conferat	88
Clauditur Glottis	89
Ne tussis fiat.	ibid.
Num aliquid de potu in asperam arteriam veniat	89 90
De minimis guttulis non recusatur	90
23. Cibus in pharyngem recipitur	ibid.
& potus	91
24. Cibus in gulam pellitur	91 seq.
& pharynx constringitur	ibid.
Quare vitia veli palatini periculosa sint	92 93
Quare non semper	93
25. Deglutitio operose peragitur	ibid.

& multa vi muscutorum	94
Muci utilitas	95
& epidermidis	ibid.

S E C T. I V.


[ŒSOPHAGUS.

1. Varietates in animalibus	95 96
Iter secundum vertebrae	96
per collum	ibid.
per pectus	ibid.
per abdomen	97
2. Fabrica carnea œsophagi	ibid.
exteriores fibræ	ibid.
interiores	ibid.
In bestiis spirales	ibid.
Non in homine	98
Gula valde dilatabilis	ibid.
3. Cellulosa tela externa	98
Tunica nervea	98 seq.
Sensilis est	99
epidermis seu villosa	ibid.
4. Arteriolæ exhalantes	100
Glandulæ cœglobatæ adjacentes	ibid.
Earum frequens scirrhus	101
Glandulæ veræ seu cryptæ	101 102
5. Arteriæ œsophageæ	102
in collo	ibid.
in superiori parte thoracis	103
in inferiori	ibid.
in abdomine	ibid.
distributio arteriolarum	ibid.
6. Venæ œsophagi	103 104
trunculi varii	104
in collo	ibid.
pectore	ibid.
abdomine	ibid.
Vasa lymphatica	ibid.
7. Nervi	ibid.
a recurrente nervo	ibid.
a trunco vago.	ibid.
8. Actio œsophagi	105
promovere cibum	ibid.
omnino contrahitur	105 106
9. Motus a diaphragmate	106
Stringitur inter inspirandum gula	ibid.
Sphincter nullus est	107
Consensus inter ventriculum & diaphragma	ibid.

LIBER XIX. VENTRICULUS.

SECTIO I.

FABRICA.

1.  UÆ animalia ventriculū nacta fint pag. 108	109
Aliqua intestino carent	110
2. Ventriculus simplex & multiplex	ibid.
Avidus triplex	ibid.
Ingluvies	110 111
Quibus data sit	111
etiam rapacibus	112
Quibus nulla sit	ibid.
Bulbus œsophagi	112 seq.
in quibus speciebus reperiatur	113
Ventriculus carnosus	114
aves in quibus reperitur	ibid.
ventriculus membranaceus	ibid.
magis validus	115
firmissimus	115 116
Ventriculus quadrupedum	116
unicus	ibid.
multiplex	117
2. Situs ventriculi humani	117 seq.
Situs morbosus	118
Vicinia varia	ibid.
Orificia	119
Situs mutabilis	120
in cadavere	ibid.
vivo homine	ibid.
Ventriculo pleno	121
3. Ventriculi figura	ibid.
amplitudo	122
angusti ventriculi	123
ampli	ibid.
4. Fabrica ventriculi	123 seq.
Peritonæum seu tunica prima	124
unde absit	ibid.
5. Cellulosa tela prima	ibid.
Glandulæ conglobatæ	125
superiores	ibid.
inferiores	ibid.
qua cellulosa tela laxa sit & stricta	126 seq.
6. Fibræ musculosæ ventriculi	ibid.
Stratum extimum inter duo orificia	ibid.
descendentes	127
finistrorsum redeuntes	ibid.
stratum transversum.	ibid.

stratum intimum	127 128
Quæ ligamenta dicta sint	128
7. Ventriculus animalium, quadrupedum	ibid.
avium granivorarum	129
describitur	130
8. Cellulosa tela secunda	ibid.
in ea morboſa concrementa	131
9. Nervea tunica	ibid.
10. Cellulosa tertia	ibid.
Sedes inflammationis	132 seq.
11. Villosa	133
est epidermis	ibid.
12. Plicæ ventriculi	ibid.
stellatæ, quæ ex œsophago descendunt	134
Longitudinem sequentes	ibid.
Anulus pylori	135
an claudat pylorum	136
13. Rugæ minimæ ventriculi	ibid.
Villi	137
exhalant liquorem arteriosum	ibid.
Papillæ	ibid.
in homine dubiæ	138
14. Glandulæ ventriculi	ibid.
in avibus	ibid.
in quadrupedibus	139
serpentibus & infectis	ibid.
in homine	139 140
15. Ventriculi succus	140
admiscetur ei peregrinæ dotes	ibid.
acida natura	141
ex corrupto cibo	ibid.
& putrida	ibid.
& bilis	142
Purus ventriculi succus, ut se habeat	142 143.
Experimenta Cl. RAST in ovemulo	143
Compositus est ex variis	ibid.
16. Arteriæ ventriculi	144
Cœliacæ truncus	seq.
divisio	ibid.
Coronaria major	ibid.
17. Splenica	145 146
Ex ea gastæpiploica sinistra	146
Brevis	ibid.
Arteria ventriculi posterior	148
Splenicæ diameter	ibid.
	149

18. Hepatica	pag. 149	SECTION II.
Coronaria minor	150	
Gastricoduodenalis	ibid.	F A M E S E T S I T I S.
Pylorica superior	ibid.	
inferior	ibid.	
Pancreaticoduodenalis	ibid.	
Transversa pancreatis	ibid.	
Duodenalis	151	
Gastroepiploica dextra	ibid.	
Epiploica dextra	ibid.	
Duodena superior	152	
19. Arteriarum ventriculi communia	ibid.	
multæ sunt	ibid.	
Vasorum distributio per tunicas ven-		
triculi	153	
Vasa exhalantia arteriosa	ibid.	
Venosa	ibid.	
20. Venæ ventriculi	153 seq.	
ex splenica	154	
ex trunco venæ portarum	ibid.	
ex gastrocolica	ibid.	
Aliæ	ibid.	
Venæ breves	154 seq.	
An sanguinem dent in ventriculum	155	
Qui dare sibi persuaferint	ibid.	
Morbus niger	156	
Non dant	ibid.	
Neque acor in sanguine earum vena-		
rum est	ibid.	
21. Nervi ventriculi	157	
Inde acris sensus	ibid.	
acrior, quam cuti	158	
& linguæ	ibid.	
Inflammatiō ab acribus	ibid.	
a frigore	159	
& flatu	ibid.	
Opium ventriculi sensum tollit.	ibid.	
Homines minus sensibilis ventriculi	ibid.	
Sic animalia	160	
Ut consuetudo venena reddat tolera-		
bilis	ibid.	
22. Vasa lymphatica ventriculi	ibid.	
hominis	ibid.	
animalium	161	
an & lactea vasa	162	
non constat	ibid.	
23. Pori inorganici	ibid.	
ducentes in ventriculum	ibid.	
ex ventriculo	ibid.	
non a vasis resectis	ibid.	
veri pori sunt	ibid.	
In vivo animale non videntur pa-		
tere	164	
		2. Neccessitas cibi & potus pag. 164 165
		3. Ob amissam partem corporis anima-
		lis 165 166
		& virium ibid.
		4. Ob acrimoniam spontaneam humo-
		rum 166 167
		Pereunt homines ex fame 168
		5. Aliqui tamen serius intereunt 168 169
		Insecta hiemale per frigus. 169
		Insecta in ultima metamorphosi ibid.
		Quadrupeda frigida ibid.
		Quadrupeda calida in hibernaculis 170
		etiam alia calida animalia ibid.
		6. Demum passim homines 171
		exempla certa habentur ibid.
		ad diem octavum usque ibid.
		ad diem quadragesimum 172
		ad octavum mensem 173
		ad decem annos 174
		& ultra 175
		7. Inter abstinentes plurimæ hystericae ibid.
		etiam stultæ ibid.
		& lecturariæ ibid.
		Fæces, perspiratio, urina vix ulla 175 176
		Plerique a siti potus habuerunt usum 176
		8. Magna est neccessitas diluendi san-
		guinis 177
		Ideo sitis animali data ibid.
		Aliqua animalia potu abstinent ibid.
		etiam homines nonnulli 178
		Quare ii sitim toleraverint 179
		9. Celerior est sitis neccessitas ibid.
		Quæ sitim augeant ibid.
		Natura est in siccitate oris 180
		faucium ibid.
		etiam ventriculi ibid.
		Incisiones eorum qui siti perierunt ibid.
		10. Aqua sola non nutrit 181
		inde cibi neccessitas ibid.
		& famis ibid.
		11. Phænomena famis 182
		& intolerabilis crudelitas ibid.
		Ventriculus arctatur 183
		12. Causæ quæ famem augent ibid.
		Robur animalis. 184
		vermes ibid.
		acida ibid.
		aliæ causæ ibid.

homines

homines nimiae famis	pag.	184
fames est a tritu jugorum ventriculi		185
De succo gastrico ambigitur		186
13. Quae famem auferant	ibid.	
cibus ipse	ibid.	
tum quae censum ventriculi delent	187	
& putrida varia	ibid.	
Nausea quid fit	ibid.	

S E C T I O I I I.

C I B U S E T P O T U S.

1. Auscultare oportet fami	188
& siti	ibid.
Salubria etiam sunt, quae valide appetuntur	188 189
etiam quae absurda videntur	189
2. Homo est omnivorus	ibid.
Fabrica instrumenti in homine cibos subigentis ambigit inter herbivora & carnivora	ibid.
dentibus	190
intestinis	ibid.
cæco	ibid.
Tamen etiam alia animalia fere utroque victu utuntur	ibid.
etiam herbivora carnes non detrectant	191
neque enim natura vegetabilis adeo multum ab animale dissidet	ibid.
Farinae indoles	192
pars amylacea, quae ad acorem vergit	ibid.
pars gelatinosa, quae ad urinosum qua sunt in variis farinis portione	193
3. Cibus vegetabilis	194
primævi fuit hominis	ibid.
& fructuum potissimum arboreorum	195
deinde aliorum, quae vegetant	ibid.
radicum	ibid.
Cerealium	196
lactis	ibid.
exempla eorum, qui folis plantis sustentantur	197
lacte solo	198
integræ gentes victu vegetabili	ibid.
4. Cur tamen ad carnes sit ventum	199
Et si victus vegetabilis bene alit	ibid.
debilitat tamen	200

& minus habet alibilis materiei	pag.	200
minus dat roboris		201
& morbos aliquos facit		ibid.
inque borealibus regionibus vix est		
parabilis		202
5. Pisces primi in usum tracti		203
Eorum natura		203
Multi homines folis piscibus vivunt		
	203	204
etiam eorum ovis		204
& garo	204	205
etiam infectis		205
Noxa victus pisculenti		ibid.
6. Ut sit ad carniū usum ventum		206
Eduntur animalium herbivororum car-		
nes		ibid.
carnivororum non facile		207
Aves quæ in cibum recipiuntur		ibid.
& rejiciuntur		ibid.
7. Carniū commoda	207	208
nurriunt magis		208
& plus dant roboris		ibid.
Porro homines, qui crudis folisve		
carnibus vixerint, validi sunt	209	210
8. Victus carnei vitia		ibid.
acrimonia putrescens		211
scorbutus		ibid.
vitia adipis		212
9. Cibus mistus		ibid.
Vegetabilia vitia victus carnosī minue-		
runt		ibid.
oportet utrumque victum contempe-		
rare		ibid.
in calidis regionibus plus adhibere ve-		
getabilis		213
in frigidis plus carniū		ibid.
Consuetudo quid possit		ibid.
10. Fossilia non alunt	213	114
nisi animalcula aliqua		214
non hominem		ibid.
Metalla non alunt		215
Ferrum quidem ad sanguinem venit		ibid.
& hydrargyrus		ibid.
de auro & argento dubitatur		216
Plumbum venenum habet		ibid.
& cuprum		ibid.
11. Sal marinus		ibid.
est de fossili regno		217
Ejus terra		ibid.
acidum elementum		ibid.

Ad solem coctus	pag.	217	Vitriolum	pag.	335
ad ignem, iste deterior		218	Cuprum		ibid.
in condendis carnibus usus		ibid.	Bitumen		ibid.
plerique mortales sale utuntur		ibid.	Sulfur		ibid.
qui abstineant		219	Ferrum		ibid.
12. Condimenta acida		220	Elementa plantarum & animalium pu-		
eorum benefica natura		ibid.	tridorum		ibid.
saccharum		ibid.	19. An omnia ex aqua generentur		236
Mel		221	Experimenta quibus id vincitur		237
Butyrum		ibid.	Ex sola aqua plantæ vivunt	236	237
Fumus lignorum		ibid.	Aqua transit in terram salem &		
13. Ciborum præparatio		ibid.	oleum		ibid.
qui ea abstineant		222	Qui omnia ex aqua derivent		238
Cruda alunt		ibid.	20. Aqua est potus naturalis		239
etiam valenter		ibid.	& saluberrimus		ibid.
nocent tamen aere plurimo	222	223	etiam cruda & frigida		240
Carnes ut tenerescant		223	Cur aliquando frigida nocuerit		ibid.
gratia ab igne		224	Solo frigore		241
affatio		ibid.	non elemento aqueo		ibid.
elixatio		ibid.	21. Cocta deterior fit		ibid.
Aromata		ibid.	Aquæ impuræ noxa		242
Aromata Europææ		225	& aquæ calidæ		ibid.
Calida condimenta		ibid.	aquæ depuratio		243
14. POTUS. Aqua	225	seq.	aquarum diversarum ratio diversa		ibid.
ex pluvia provenit	225	226	22. Vinum		244
Aquæ pluviae indoles		226	uti inventum fit		ibid.
Roris		227	ex quibus fructibus paretur		245
Nivalis aquæ		ibid.	23. Ejus qualitates		ibid.
hæc bona		ibid.	roborat		246
Rupestris		228	inebriat		ibid.
Frigore non congelabilis		ibid.	creditur podagram facere		ibid.
levissima		ibid.	24 Cerevisia		247
Pondus aquæ		229	ubi inventa		248
15. Aquæ fluviales		ibid.	ut paretur		ibid.
puteales		ibid.	ejus indoles		249
duræ quibus multum sedimenti		230	utilitas		ibid.
molles quibus parum		ibid.	vitia		249
16. Aqua est genus vitri		231	25. Acetum		250
certo calore fusilis		ibid.	ejus utilitas		251
sponte se adtrahit		ibid.	26 Spiritus vini		ibid.
calore dilatatur		ibid.	ejus vires		252
frigore contrahitur		ibid.	calefacit		ibid.
emittit vapores elasticos		ibid.	coagulat		ibid.
17. Admixta ad aquam elementa pere-			indurat		253
grina	232	seq.	Magnæ ejus noxæ		254
Ignis		ibid.	neque coctionem adjuvat		ibid.
Aer		233	27. Cibi & potus mensura		254
18. Terra varii generis		ibid.	cibi paucitas reddit salubrem	254	255
Sal. marinus		234	Exempla mensuræ cibi		ibid.
Nitrum		ibid.	Sobrietas ALOYSII CORNARI		256
Nitrum calcarium		ibid.	utilitas ejus sobrietatis		ibid.
Sales lixiviosi		ibid.	28. Mensura potus sensim considerata		ibid.
Acor		335	varia in variis		257

29. Mensura cibi	257	258
in prandio major		258

S E C T I O I V.

P H Æ N O M E N A V I V I
V E N T R I C U L I.

1. Ordo dicendorum		258
2. Pressio diaphragmatis		259
Musculorum abdominis	259	260
In vomitu evidens		260
3. Ventriculi ipsius	260	seq.
Est irritabilis.		261
Ostia clausa		ibid.
Natura nervea ad irritabilem confert		262
5. Mensura contractionis		seq.
qui parvam faciant		ibid.
nimis parvam fecerunt aliqui	262	263
accuratissime constringitur		263
& aciculas promovet		264
atque calculos figurat contractione		
sua	265	266
6. Vis contractilis in avibus præpotens		266
Experimenta minora	266	267
& maxima	267	268
Vires æstimatæ ad pondus 534 l.		268
Calculi devorati		269
num ad tritum	269	270
7. Motus peristalticus ventriculi carni-		
vori		270
multum debilius est	271	272
adeft tamen		273
absque aeris stimulo		ibid.
Distentus in debilibus stomachus		274
8. Non tamen robur habet, quod ei tri-		
buatur		ibid.
quantum in cane valeat	274	275
in homine		275
9. Ejus phænomena		seq.
alternæ contractiones & laxationes		275
Contractio varia		276
Angustatio		ibid.
decurtatio		ibid.
10. Contractio secundum certum ductum ib.		
deorsum ad pylorum		ibid.
Motus mistus ex eo & ex motu sur-		
sum agente		277
Causa in pylori resistentia		ibid.
Pyloro laxo, cibus exit		278
adjuvatur erectione duodeni		ibid.

11. Quo tempore cibus de ventriculo		
exeat		279
valde lente si crudus		ibid.
fere in ordine ut coctus est & sub-		
actus		ibid.
Experimenta WALÆI		280
— J. VIRIDET		ibid.
— B. S. ALBINI		ibid.
— L. de BILS		ibid.
aliis præ aliis celerius ventriculus va-		
cuatur		281
12. Motus antiperistalticus		ibid.
Ructus		ibid.
Initium motus in duodeno		282
Pyloro		ibid.
ventriculo		ibid.
Singultus		283
13. Causæ vomendi		ibid.
plenitudo ventriculi		ibid.
obstaculum exituro cibo		284
incitatio ventriculi	285	286
etiam mechanica		286
& a stimulo persubtili		287
14. Diaphragmatis in vomitu partes		ibid.
num eum solum faciat		ibid.
certe concurrat ad faciendum		288
num musculi abdominis		ibid.
Quid a ventriculo sit		289
& quid a respirationis instrumento		ibid.
Quare utriusque causæ suæ sunt partes	290	
& voluntatis est in vomitum impe-		
rium		ibid.
non tamen unicum		ibid.
Ut aves vomant	290	291
& pisces		ibid.
& quadrupeda carnivora		ibid.
herbivora difficulter vomant		292
15. Ruminatio	292	seq.
est cornigerorum		ibid.
Causa ruminandi		293
Angustia itineris ad tertium ventri-		
culum		ibid.
Non potest transire cibus nisi sub-		
actus		ibid.
Potus tamen transit		294
De aliis animalibus ruminantibus	294	295
etiam hominibus		ibid.
16. Aliæ causæ coctionis ciborum		295
calor		ibid.
ejus gradus		ibid.
17. Aer deglutitus		296
ut resolvat cibos		ibid.

Aeris in fermentatione actio	297	granivoris	316
& in putredine	ibid.	carnivoris	ibid.
Distendit aer ventriculum	298	Acor cum putredine perinde regnat	ibid.
ut crepet	ibid.	inde phænomena aeris erosi	317
cur non frequenter	ibid.	ferrique	ibid.
ob virium resolutionem	ibid.	etiam in homine	318
Distentus ventriculus premit vesiculam		28. §. II. Fermentatio suboritur	ibid.
fellis	ibid.	In herboribus	319
hinc plena est, quando alvus inanis	299	etiam in carnivoris nonnullis	ibid.
ex fame, inedia	ibid.	aer generatur	ibid.
ob morbos	ibid.	& vapor inflammabilis	320
Premittit etiam renem	ibid.	etiam absque vini spiritu	ibid.
lienem	ibid.	per experimenta	ibid.
pancreas	ibid.	Sed raro fermentatio perficitur	321
hepar	ibid.	29. §. III. Putredo	ibid.
magis in debilibus	300	In animalibus ventriculi contenta fæ-	
18. Vapor in ventriculum resorbtus	ibid.	tent	322
ex eo exhalans	ibid.	nonnunquam in homine	ibid.
19. Saliva	ibid.	etiam in herbivoris	ibid.
Mucus	ibid.	Veteres qui dixerunt, cibum, putres-	
unde copiosior	ibid.	cendo, coquere	ibid.
20. Succus gastricus	301	non penitus abs re	ibid.
copia ejus incerta	ibid.	in homine sano cibi non putrescunt	323
sed magna	ibid.	neque inde calor	ibid.
21. Appendices pyloricæ piscium	seq.	30. Rancida degeneratio	324
non sunt cibi receptacula	302	oleosorum	ibid.
Numerus in variis speciebus	303 304 305	eorum abusus	324 325
etiam infectis	306	31. Cibis in massam informem misce-	
22. Bilis etiam in ventriculum venit	307	antur	325
& vomitu redditur	ibid.	& figuræ ciborum delentur	ibid.
in quibusdam etiam animalibus in ven-		etiam calculus in ventriculo nasci-	
triculum ductus bilarius se immittit	308	tur	326
etiam in homine	308 309		
nisi error est	309		
etiam pancreaticus succus in ventri-			
culum venit	ibid.		
23. An spiritus admisceatur	309 310		
24. Mutationes cibi, quæ fiunt in ven-			
triculo	310		
emolliuntur	ibid.		
dissolvuntur membranæ	311		
& omnia in pultem abeunt	ibid.		
In carnivoris avibus ossa ipsa conta-			
bescunt	312		
& in piscibus	ibid.		
Oesophagi minor potestas	313		
25. Tamen aliqua	314		
fibras tamen in quadrupedibus non			
destrui	ibid.		
26. Succus extrahitur	315		
27. Ut corrumpatur in ventriculo cibus	ibid.		
aescit	ibid.		
in herbivoris	ibid.		

SECTION V.

CAUSÆ COCTIONIS
CIBORUM.

1. Liquor macerans	327
absque eo nullum animal cibum co-	
quit	ibid.
tritu potest carere	ibid.
etiam mora	ibid.
Is liquor fit ex succo gastrico	328
& muco	ibid.
muci etiam in solutione ciborum partes	
sunt	ibid.
etiam mitia solvere apta sunt	329
Saliva	ibid.
2. Vires corruptionis spontaneæ	ibid.
Acoris	330
non est vera causa coctionis	ibid.
3. Putredo	

3. Putredo resolvit partes solidas	331	inde nomen coctionis	335
Sed in ventriculo non plena obtinet	ibid.	tamen ejus non maxima est necessitas	336
4. Tritus	332	6. repudiantur ciborum reliquiae	ibid.
in avibus efficax	ibid.	7. Alia ventriculi munia	ibid.
tamen cum maceratione conjunctus	ibid.	resorbere humorem tenuem	ibid.
in avibus insectivoris minor	333	Utique locum habet	337
iterum in carnivoris minor	ibid.	quare ab obstructo pyloro non statim mors	ibid.
& in quadrupedibus carnivoris non magnus	ibid.	Valvulae ad resorptionem succi factae	337 338
nec homini	334	tenuis est quod resorbetur	338
tamen aliquis	ibid.	non sufficit ad alendum	339
Non abest tritus totus a coctione cibi	ibid.	8. Num in ventriculo sedes sit animae	ibid.
neque id ostendunt morbi	ibid.	certe tener sensus est	ibid.
neque succus ventriculi solus cibos coquit	335		
5. Calor	ibid.		
infectis facit famem	335		

LIBER XX. VELAMENTA ABDOMINIS.

S E C T I O I.

M E M B R A N A E.

1. PERITONÆI in universum descriptio	pag. 340	finis cæcus in feminis	pag. 349
Sensu caret	ibid.	in viris	350
Extus telam cellulosa circumpositum habet	341	4. Ligamenta in universum	ibid.
Simplex membrana est	ibid.	5. Ligamenta hepatis	350 seq.
neque duplicaturæ vox bona est	ibid.	Ligamentum suspensorium	351
2. Humor peritonæi	342	dextrum	351 352
exhalat de superficie viscerum	ibid.	Continuatio peritonæi	352
& peritonæi	ibid.	Ligamentum sinistrum	ibid.
non ponitur in glandulis	343	secundum	ibid.
quæ nullæ sint	ibid.	Adhæsiō cellulosa seu ligamentum co-	
resorbetur in venulas	ibid.	ronarium	ibid.
In eum via est inorganica	344	Plica a pancreate ad hepar	353
de ventriculo, & intestinis	ibid.	a rene ad hepar	ibid.
Is humor viscera mobilia reddit	ibid.	Omentum minus	ibid.
inspissatur	ibid.	Peritonæum se super hepar diffundit	ibid.
inde vitiosæ adhæsiōes viscerum	ibid.	animalibus hepar minus firmum	354
exempla	345 346	6. Peritonæum se gulæ circumjicit	ibid.
3. Peritonæi descriptio & ambitus	347	Dextrum vinculum œsophagi	ibid.
Potest totum nudari	ibid.	Sinistrum	ibid.
incipit a septo transversō	347 348	Verticale ligamentum lienis	ibid.
per lumbos descendit & ilia	348	posterius lienis	ibid.
ut se habeat in pelvi	349	a liene ad renem	355
Ligamenta semilunaria	ibid.	a rene ad colon	ibid.
———— lata	ibid.	Ligamentum latum ovarii	ibid.
		7. Mesenteria	ibid.
		Mesocolon iliaceum	ibid.
		———— sinistrum	356
		8. Mesocolon transversum	ibid.
		in universum	357
		Ligamentum sustentans lienem	ibid.

Lamina superior mesocoli transversi			Animalia quadrupeda omentum ha-	
	pag.	357	bent	pag. 371
inferior		ibid.	omnia	ibid.
Inter utramque est duodeni pars		ibid.	& sola	ibid.
& pancreas		ibid.	17. Mesocoli cavea laminis ejus com-	
Lamina superior habetur pro omenti			prehenfa	372
lamina posteriori		358	Appendices epiploicæ	ibid.
Id admitti nequit		ibid.	18. Cellulosæ telæ peritonæo circumpo-	
9. Mesocolon dextrum		359	sitæ	373
Mesenteriolum appendiculæ cæcæ		359	Appendix in scrotum ducens	ibid.
10. Mesenterium		ibid.	Foramina non vera	ibid.
ut nascatur		ibid.	Cellulosæ circumjectæ	374
ejus amplitudo		360	Adeps renalis	374 375
laminæ		ibid.	alius	375
11. Non est sensile		ibid.	Fasciculi cellulosi ad alias partes con-	
nec irritabile		ibid.	tinuati	ibid.
cellulosa ejus pars		ibid.	cum aorta	ibid.
Glandulæ mesentericæ		361	gula	ibid.
sæpe scirrhusæ		ibid.	in lumbos	ibid.
& inde atrophia		ibid.	scrotum	ibid.
Pancreas aselli		362	femur	ibid.
unde natum		ibid.	nates	ibid.
12. Peritonæi processus secundi generis			cum urethra	ibid.
OMENTA		ibid.	Herniarum in universum natura	376
in universum		363	Abcessuum communicatio	ibid.
cæca sunt & humores continent		ibid.	16. Peritonæi vasa	ibid.
sunt duplices membranæ		ibid.	Mesenterii	377
vasculosæ		ibid.	Mesocoli	ibid.
Adeps secundum vascula		364	20. Arteriæ omenti Colicogastrici & la-	
Glandulæ conglobatæ		ibid.	minæ anterioris	ibid.
an vasa lymphatica		ibid.	posterioris	ibid.
13. Omentorum communis porta		ibid.	Hepaticogastrici omenti	378
Inventor hujus portæ		365	Colici	ibid.
14. Omenta sigillatim		ibid.	Venæ omenti	ibid.
Hepaticogastricum seu <i>minus</i>		ibid.	Sudant arteriæ	ibid.
initium in dextro latere		ibid.	21. Nervi omenti	ibid.
finis in sinistro		ibid.	mesenterii	379
Vestigia apud veteres		366	Vasa lymphatica omenti	ibid.
Inventor		ibid.		
15. Omentum majus. Colicogastricum		367		
sedes quam tenet		ibid.		
tenuæ		ibid.		
crassum		ibid.		
morbosum		ibid.		
Laminæ duæ		368		
anterior		ibid.		
posterior		ibid.		
finis sinister		ibid.		
dexter		369		
saccus medius		370		
16. Omentum <i>colicum</i>		ibid.		
Cl. LIEUTAUD de eo omento me-				
rita		ibid.		

S E C T I O I I.

H A R U M P A R T I U M
U T I L I T A S.

1. Peritonæum coercet partes abdomine	
contentat	380
vapore suo frictionem mollit	ibid.
impedit coalitum	ibid.
ligamentis viscera sustinet	ibid.
2. Mesenterii utilitas	381
in omnibus animalibus reperitur	ibid.
intestina cum mobilitate continet.	ibid.

3. Omenti utilitas	pag.	381	nam ad portas congerit	pag.	382
Animalia, quæ eo destituuntur, habent ejus vice adipem	ibid.		argumenta pro ea theoria		383
mobilitatem intestinorum tuetur		382	objectiones	383	384
& impedit ne conserveant	ibid.		tamen probabilis videtur		384
Sanguinem adipe prægnantem in ve-			humorem resorbet	ibid.	

LIBER XXI. LIEN.

SECTIO I.

VISCERIS FABRICA.

1. QUIBUS in animalibus reperiatur	pag.	385
Quadrupedibus calidi sanguinis	ibid.	
Analogum quid in avibus	ibid.	
quadrupedibus frigidis		386
piscibus	ibid.	
Ut diversum a liene	386	387
2. Numerus	ibid.	
nonnullis animalibus duo dicuntur esse	ibid.	
duo in homine non rarissimi		387
etiam numerosiores		388
3. Figura in homine	388	389
etiam ludit, lobis incisa		389
in animalibus varia		390
4. Situs	ibid.	
in homine	ibid.	
cum ventriculo mutabilis	ibid.	
A diaphragmate deorsum premitur		392
descendit per morbos	ibid.	
in animalibus		393
5. Magnitudo	ibid.	
incerta	ibid.	
mutatur à ventriculo	ibid.	
eoque tumente, lien minor est	ibid.	
& vicissim	ibid.	
ejus pondus varium		394
magnum aliquando		395
In morbis magnum	ibid.	
per libras		396
scirrhus frequens		397
membrana ossea	ibid.	
Lien mollis & putrido similis	ibid.	
raro suppuratur		398
Lien parvus	ibid.	
6. Natura spongiæ	ibid.	
Calor		399
pondus cum aqua comparatum	ibid.	
7. Membrana lienis		400

Simplex est	pag.	400
perspirat		ibid.
8. Arteriæ lienis		ibid.
major, splenica		ibid.
ejus diameter insignis		ibid.
robur		401
arteriæ aliæ lienis		ibid.
9. Vena splenica		ibid.
diameter		402
iter		ibid.
Rami præter lienem		403
Aliæ venæ lienis		ibid.
Iter humorum per eam venam laxum	ibid.	
Sanguinis à liene ad hepar venit		404
non habet valvulas		ibid.
nec venæ arterias in suum cavum recipiunt		ibid.
10. Sanguis lienalis		ibid.
plus habet aquæ		405
& falis volatilis		ibid.
olei crassi minus		ibid.
Plurimum sanguinem continet lien	ibid.	
11. Nervi lienis		406
parvi		ibid.
Lien parum sentit	ibid.	
neque irritabilis est	ibid.	
12. Vasa lymphatica		ibid.
in vitulis		ibid.
in aliis animalibus.		ibid.
in homine		ibid.
13. Ductus excretorius		ibid.
non confirmatur		408
14. Fabrica lienis interior		ibid.
Vasa		ibid.
Cellulosa tela		ibid.
Cellulosa tela alia, exterior peritonæi		409
Hæ fibræ & cellulæ lienis	ibid.	
In eas aer per vasa penetrat	ibid.	
15. Lien vituli		410
Fibræ manifestiores	ibid.	
In eas, ex vena aperta, via	ibid.	

Fibræ lienis vitulini	pag.	410.	411
rejectæ ab humana fabrica			411
16. Acini lienis		ibid.	
in animalibus		ibid.	
esse cavos			412
vasculosos		ibid.	
renovati sunt a Cl. nupero scriptore		ibid.	
Eorum vasculosa fabrica			413
17. Quæ contra acinos dicta sint		ibid.	
Meros esse vasculorum glomeros			414

S E C T I O I I.

P A R T I U M U T I L I T A S.

1. Præmium		414
2. Sanguis in liene pro hepate mu-		
tatur		415
tenuior est		ibid.
& magis lixiviosus		ibid.
Quare sit ejusmodi		416
A majiori portione ramorum ad truncos		ibid.
hinc acior		ibid.
3. Lien, vacuo ventriculo, laxatur &		
sanguine repletur		417
Inter plenum ventriculum & dia-		
phragma conuallatur		418

4. An alias habeat utilitates	pag.	418
An possit ex morbis aliquid disci		419
non habet perpetuam ad hepar ratio-		
nem		ibid.
neque in hydropse semper magnus		420
aut scirrhus		ibid.
neque in morbo hypochondriaco		ibid.
Difficultas argumenti a morbis sumti		ibid.
5. An possit utilitas lienis disci ex vitiis		
quæ ejus evulsionem sequuntur		421
frequenter evulsus fuit		ibid.
in homine		ibid.
& in bestiis		ibid.
non pereunt animalia		422
Qui inde morbi fiant		ibid.
Videtur hepar nonnihil pati		ibid.
6. Hypotheses		ibid.
Num tamen aliquis succus in liene		
secernatur		ibid.
num acidus		424
num atrabilis		ibid.
alteriusve generis		ibid.
Aliæ conjecturæ		425
Nihil habent firmi		ibid.
Iterum aliæ		425
Num lien inutilis sit		426

L I B E R X X I I. P A N C R E A S.

1. VETERIBUS notum	pag.	427
Ut se habeat in avibus		
piscibus		
quadrupedibus frigidis		
& calidis		428
homine		
Caput pancreatis		ibid.
Situs		429
inter laminas mesocoli		ibid.
Magnitudo		430
Pondus		ibid.
2. Fabrica		ibid.
Glandula est conglobata		ibid.
frequenter scirrhusa		431
3. Vasa		ibid.
Arteriæ variæ		ibid.
Pancreaticus arcus anterior		ibid.
posterior		ibid.
Pancreatica transversa		432
superior		ibid.
aliæ minores		ibid.

Venæ	pag.	433
Nervi		ibid.
4. Ductus excretorius		ibid.
notus antiquis		ibid.
renovatus a M. HOFMAN		434
& J. G. WIRSUNG		ibid.
a quibus porro ornatus sit		ibid.
reperitur in quadrupedibus		ibid.
etiam frigidis		435
avibus	435	436
forte & piscibus		436
5. In homine fabrica		seq.
Ductus principis historia		437
ductus minor		ibid.
insertio in intestinum		ibid.
Sinus cum ductu choledochocommu-		
nis		ibid.
Rima qua aperitur		438
absque valvula		ibid.
Quid sit bilis diverticulum		439
Simplex in homine		ibid.
		quadru.

quadrupedibus nonnullis	439	ejus copia	446
avibus	439	fuit perpetuo	447
piscibus	440	Hypothesis de succo SYLVIANA	ibid.
6. Duplex in aliis	ibid.	acidum esse	ibid.
in homine	441	& cum bile fervere	ibid.
in quadrupedibus	442	Per experimenta	448
in avibus	ibid.	Qui putarint acidum se reperisse	ibid.
triplex in iisdem	ibid.	Nuperrimi in hypothesos adfectæ	ibid.
7. Conjunctio cum ductu bilario	ibid.	10. Qui primi contra has hypothesos	
in homine	ibid.	scripserint	449
in quadrupedibus	443	Non est acidus	450
avibus	ibid.	Quare neque cum bile fervet	ibid.
piscibus	ibid.	Experimentum SCHUYLLI nihil de-	
Diversa utrorumque ostia	444	monstrat	ibid.
longa distantia	ibid.	Pancreas extirpatur absque magnis ani-	
Ut se habeant tres ductus pancrea-		malis malis	451
tici	445	Quænam sit verior ejus succi utilitas	452
Qui longe a pyloro inferantur	ibid.	cysticam bilem acrem & viscidam	
8. Succus pancreaticus	445 seq.	diluere	ibid.
ægre obtinetur	445	Etiam massam ciborum tenuare	453
& tamen salivæ adfinis est	446	alia	ibid.

LIBER XXIII. HEPAR ET BILIS.

SECTIO I.

HEPAR IPSUM.

1. I n quibus animalibus reperiatur	pag.	454	varietates in situ	pag.	460
magnum homini		455	per respirationem		ibid.
non tamen maximum		ibid.	4. Hepar in quibus animalibus sim-		
pondus in homine varium		ibid.	plex	461	462
circa 45. unicas		ibid.	homine		461
Duplex hepar		456	& paucis fere herbivoris		462
& nullum		ibid.	Multilobum in carnivoris		463
2. Color varius in variis animalibus		ibid.	ut in piscibus se habeat		464
etiam in ejusdem animalis fetu		457	in avibus		ibid.
3. Situs		ibid.	oviparis frigidis		465
in fetu		ibid.	Nihil inde potest erui de finibus		ibid.
in adulto homine		458	5. Hepatis figura in universum		466
per partes ; Ut ad septem transver-			posterior massa		ibid.
sum se habeat		459	anterior margo		ibid.
ad colon		ibid.	6. Pars gibba		467
renem		ibid.	lobi magni		ibid.
ventriculum		ibid.	dexter		ibid.
Porro de situ		460	sinister		ibid.
			7. pars sima		ibid.
			Faciacula colica		468
			renalis		ibid.
			fissura horizontalis		ibid.
			pars quæ venam umbilicalem continet		ibid.

quæ ductum venosum	468	Tum ductus venosus	483	484
Sulcus transversus	469	Aliquando a partu aliquandiu pa-		
Fossa vesiculæ felleæ	ibid.	tet		ibid.
Semicanalis venæ portarum	ibid.	Ob eam hepar in fetu majus	485	
Portæ	469	Minus in puero & adulto	ibid.	
Sulcus venæ cavæ	470	13. 3. Vena portarum	ibid.	
aliæ rimæ	ibid.	Nomina	ibid.	
8. Lobuli hepatis	471	Ejus magnæ radices	486	
posterior	ibid.	Vena mesenterica	ibid.	
pars ejus radiata	ibid.	Ramus gastrocolicus	ibid.	
pars papillaris	ibid.	Ramus circumeuns arcum duodeni	ibid.	
insula est	472	Epiploica dextra	ibid.	
Lobulus anonymus	ibid.	Gastroepiploica dextra	ibid.	
Lobi varii aberrantes	ibid.	Colica media	487	
9. Vasa 1. adducentia	ibid.	Rami minores mesentericæ	ibid.	
1. arteriæ hepaticæ	ibid.	Colica sinistra	ibid.	
1. a cœliaca	473	Splenica	ibid.	
Princeps truncus hepaticus	ibid.	Truncus venæ portarum	488	
ramus dexter	ibid.	Ejus rami	ibid.	
Arteria cystica	474	Et diametri	ibid.	
finis trunci dextri	ibid.	14. Venæ portarum rami figillatim	489	
Ramuli ad superficiem	475	Dexter	490	
Sinistra arteria hepatica	ibid.	Sinister	ibid.	
ejus rami	476	Ejus furculi	ibid.	
Surculi superficiales	ibid.	Minores anastomoses cum ramis venæ		
Arteria superficialis media	476	cavæ	491	
Hepatica arteria non parva est	ibid.	15. Quæ peculiaris sint in vena por-		
10. 2. Aliæ arteriæ hepatis	477	tarum	ibid.	
a mesenterica	ibid.	Robur inter omnia vasa maximum	492	
a mammaria prima	478	Capfula GLISSONII	ibid.	
altera	ibid.	Sive cellulosa tela venam ambeuns	493	
a phrenica dextra	ibid.	Nimium hæc ornantur	493	494
a sinistra	478	Neque est cor abdominale	494	
a capsularibus	479	Qui verum agnoverit	ibid.	
a spermaticis	ibid.	16. Sanguis venæ portarum	495	
ab epigastrica	ibid.	Est miscellaneus	ibid.	
11. 2. Vena umbilicalis	479	Plenus adipe	ibid.	
advenit ad ligamentum suspensorium	480	Vapore putrido ab intestinis re-		
in sulcum horizontalem	ibid.	forbito	ibid.	
ejus tumor in eo sulco	ibid.	Vapore abdominali	496	
ex eo tumore rami hepatici	ibid.	Sanguine lienali	ibid.	
ad venam umbilicalem pertinent	481	Num experimenta aliquam diversam		
Ductus venosus	ibid.	hujus sanguinis indolem demonf-		
An aliquid valvulosi in principio &		trent	ibid.	
fine sit	481	Argumentum adfirmantium	ibid.	
parvus est	482	Per experimenta nondum constat	497	
multo minor quam vena umbilicali	ibid.	17. Vasa de hepate avehentia	498	seq.
Omnino sanguis venæ umbilicalis in		I. Vena cava	498	
fetu per hepar trajicitur	483	Foramen in septo transverso	ibid.	
12. Vena umbilicalis in adulto claudi-		Etiam duo	ibid.	
tur	ibid.	Rami hepatici	ibid.	
Aliquando serius nonnunquam, neque		Valvulæ ad eorum ostia	ibid.	
statim a partu	483	Iter sanguinis per venam portarum	499	

In ramos venæ cavæ	pag. 499
Et venam cavam	ibid.
Et cor	500
Sic ex arteria hepatica	ibid.
Plures sunt rami venæ portarum quam cavæ	ibid.
Acceleratur sanguis in cava	501
28. II. Vasa lymphatica	ibid.
Primum in hepate visa	ibid.
In parte hepatis cava	502
In parte gibba	503
Liquorem habent etiam ab arteria	ibid.
Et vena portarum	ibid.
29. III. Ductus bilarii in universum	504
Ad essentiam pertinent hepatis	ibid.
Eorum trunci	505
Ductus bilarius hepaticus	505
Choledochus	ibid.
Ostium in duodeno	ibid.
Fabrica	ibid.
Non est irritabilis	507
Videtur acriter sentire	ibid.
20. Ex vena portarum humor	508
In ductum bilarium transit	ibid.
Etiam ex arteria hepatica	ibid.
21. Aliæ anastomoses inter venam portarum	508 509
Et arteriam hepaticam	ibid.
Inter ductus bilarios, & venam cavam	ibid.
Inter eosdem & vasa lymphatica	510
Inter eosdem & cellulosa telam	ibid.
22. Nervi hepatis dextri	ibid.
Sinistri	511
23. Membrana externa	ibid.
Subjecta cellulosa tela	ibid.
24. Fasciculi vasorum hepatis	512
Cellulosa vagina peculiaris	ibid.
Communis	ibid.
Caro hepatis	ibid.
Firmior est & sero computrescit	513
25. Hepatis acini	ibid.
In homine	ibid.
Et animalibus	514
Quibus partibus acinus conficitur	ibid.
26. Num cavi sint	515
Sintve glandulosi	ibid.
Ita MALPIGHIUS	ibid.
Esse glandulas per morbos plenas aqua	516
Gypso	ibid.
Bile	ibid.
Manifestas glandulas	ibid.

Bilis viscida	pag. 517
27. Contra hepatis glandulas	ibid.
Acini sunt lobuli	ibid.
Noduli nulli intercepti inter arteriam & ductum	518
Cryptas non posse utiliter in solidam massam congeri	ibid.

S E C T. II.

V E S I C U L A F E L L I S.

1. Desideratur in nonnullis animalibus	519
Subinde in homine	520
Quare bilis absque vesicula potest parari	ibid.
Cur aliqua animalia vesicula careant	521
Non omnibus deest, quibus negatur Conjecturæ	522
2. Situs vesiculæ	523
Figura pyriformis	ibid.
In se ipsam curvatur	524
Duæ fuerunt	ibid.
Magnitudo per morbos augetur	525
3. Fabrica. Membrana extima	ibid.
Cellulosa tela prima	526
Membrana quam musculosam dicunt	ibid.
Irritabilitas modica	527
Sensus sat acer	ibid.
Cellulosa secunda	ibid.
Nervea	ibid.
Cellulosa tertia	ibid.
Interna	ibid.
Reticulata	ibid.
Folliculi mucosi	ibid.
Vascula exhalantia	528
Pori inorganici	ibid.
4. Ductus cysticus	ibid.
Conjunctio cum hepatico	529
Fabrica humana	ibid.
Contortio in ductus exitu	ibid.
Angulus cum hepatico	ibid.
Fabrica ductus cystici	530
Valvulæ	530 531
Ut in avibus se habeat	531
Piscibus	532
5. Vesicula ab hepate libera	ibid.
Ductus ex hepate in cystidem	ibid.
Ductus ex hepatico in cystidem	533
Eadem per gradus paulum mutata fabrica est	ibid.

in omnibus animalibus	pag. 534
6. Canales hepaticystici quadrupedum	ibid.
Ductus ex hepate grandes in vesiculam immissi	535
Et ex ductu hepatico	535 536
7. An in homine ejusmodi ductus sint	537
Qui admitterint	537 538
9. Dubia cur nondum admittant. Cl. Viri	539
Neque ego	540 541

S E C T. III.

B I L I S.

1. Num detur duplex bilis	542	Novus tamen morbus est, aut nuper adnotatus	pag. 565
Hepatica mitis.	ibid.	Classes duæ grandes subrotundi	ibid.
Cystica amarior	ibid.	Eorum dotes	ibid.
Experimenta adfirmantium	ibid.	Crystallina species	567
Negantium rationes.	544	Ad ignem, ut se habeant	567 568
2. Bilis indoles.	545 seq.	Calculi minores angulosi	568
Viscida est	ibid.	Numerosi	ibid.
In morbis viscidior	ibid.	In ductu cystico	ibid.
Pondus magnum	546	Et hepatico	570
3. Amara est.	546 547	Ipsoque hepate	ibid.
Non acida	547	13. Analysis bilis	570 seq.
Per morbos insipida	ibid.	Aer in bile	570 571
4. Color viridis	547 548	Copiosus	ibid.
Flavus	548	14. Aquæ maxima ubertas inest	571
Expallefcit in morbis	ibid.	15. Spiritus bilis	572
5. Pars exhalans	549	16. Oleum	572 573
6. Miscela cum aliis humoribus	ibid.	Duorum generum	573
Aqua	ibid.	17. Sal volatilis parcissimus	574
Oleo	ibid.	18. Carbo	ibid.
Solvit adiposa	550	19. Calculorum felleorum analysi	575 576
Inde medicata est	551	20. In bile non est acor	576 577
Per morbos venata	551	Non tamen alcalina est	577
7. Ut se ad acorem habeat	552	Sed olei ratio superat	ibid.
Cum eo meraco cogitur	ibid.	Et terræ	ibid.
Etiâ in spiritibus acidis	553	Acrimonia vincit	578
Coit cum vini spiritu	555	Saponacea est	ibid.
Cum alcali vix mutatur	556	Calculi non ab acore	ibid.
Sibi relicta putrescit	557	De bilis motu	578
Sed foetor in moschi odorem mitescit	ibid.	I. Venit de ductu choledochi in duodenum	579
10. sapor bilis	559 560	Per experimenta	ibid.
11. Calculi bilarii	560 seq.	Et morbos	ibid.
Mollia concrementa	561	Et vincula	580
Duri	562	21. II. Ex vesicula fellea in duodenum	581 582
Genera duo. Crustacei calculi	ibid.	22. III. Ex hepate in vesiculam	582
Calculi figurati, lamellati	563	Per morbos id ostenditur	ibid.
In variis animalibus	564	Iter ad intestinum potest stringi	583 584
12. In homine	ibid.	23. Num bilis per ductus occultos ex hepate venit in vesiculam	584
Frequentes sunt	ibid.	Bilis in sanguinem retrorsum	592 593
		Causæ variæ	593
		27. IV. Neque tamen secundum naturam bilis in hepar redit	ibid.
		Symptomata bilis a suo vero itinere averfæ	594
		demum eas aperientis	ibid.
		Vesiculæ ulcera spontanea a calculis	595
		Et incisio	596
		Calculi magni ad intestina descendentes	ibid.
		Ubi doloris sit sedes	597

28. Bilis ex quo vase generetur	p. 597
Num ex arteria hepatica	ibid.
Potius ex vena portarum	598
Cujus sanguis bili sit propior	ibid.
Num valde lentus sit sanguinis per eam venam motus	598 599
Nimii hic lentor æstimatus est	ibid.
Tamen sanguis lentius per hepar fluit	599 600
Ut ex morbis ostenditur	600
Scirrhis	ibid.
Hydatidibus	ibid.
29. Vires, quæ sanguinis iter per hepar accelerant	601
Respiratio	ibid.
Inspiratio	602
Expiratio	ibid.
Vomitibus	ibid.
Ut patiat a diaphragmate hepar	603
Et vesicula	ibid.
Tum ista ab aliis causis	ibid.
Et ventriculo	ibid.
An etiam a propria membrana stringatur	604
30. Qua copia secernatur	ibid.
Calculi varii	604 605
Celeriter generantur	605
Et in morbis	606
Ab ira	ibid.
Descrimen a corporis situ	ibid.
31. Quo bilis abeat	ibid.
In ventriculum	ibid.
Intestina	ibid.
Ad anum usque	607
An resorbeatur per villos intestinales	ibid.
Res satis dubia videtur	608

32. Ejus utilitas	608
Solvere mucum	ibid.
— oleum	ibid.
Per experimenta in vivis etiam animalibus	609
Hæc aliis contrariis experimentis refutantur	ibid.
Acidum videtur subigere	610
per experimenta	610
& morbos	ibid.
Cystica magis	611
Motus peristalticus etiam absque bile nascitur	612
An famem faciat in ventriculo	612
33. Num dissolvat sanguinem	ibid.
non videtur	ibid.
neque id morbi offendunt	613
34. Suspicieris plus esse in bile	ibid.
ob mortes subitas a viis bilis læsis	ibid.
Forte pereunt ob acrimoniam bilis	614
35. Num bilis sit excrementum	615
non videtur	ibid.

S E C T I O I V.

H E P A T I S U T I L I T A T E S.

1. Calor	616
Num sanguinem coquat	ibid.
qui docuerint	616 617
Contra quæ dicta sint	ibid.
Non videtur	618
2. Sed videtur sanguinis ad cor redeuntis impetum minuere	ibid.
in fetu potissimum	ibid.
etiam in adulto homine	619

Figuræ ad Tom. VI. Spectantes.

FIG. I.

*Ventriculus & duodenum suo in situ
ex infante.*

- A. Ventriculus
- B. Sedes anti pylori.
- C. Initium pylori.
- D. E. F. Duodeni Pars transversa.
- E. Ejus pars prima.
- F. Pars descendens.
- G. Colon intestinum.
- H. Duodeni finis & initium jejuni.
- I. Pars mesocoli tegentis pancreas.
- K. Lobus hepatis dexter.
- L. Sinister a ventriculo remotus.
- M. Vesicula.
- N. Ejus ductus.
- O. Hepaticus ductus.
- P. Arteria hepatis.
- Q. Ramus dexter.
- R. Sinister.
- S. Fossa umbilicalis.

FIG. II.


Hepar in situ tenens Epigastrii partem.


- A. Lobus dexter.
- B. Sinister.
- C. Sedes ligamenti lati.
- D. Pars cava, ejusque fovea renalis.
- E. Vesicula fellis.
- F. Rhen.
- G. Ventriculus sub hepate eminens.
- T. Vasa Gastræpiploica & arcus major.
- H. Sedes valvulæ pylori.
- I. Duodenum oriens.
- K. Pancreas.
- L. Mesenterium resectum.
- M. Vena mesenterica
- N. Arteria.
- O. Intestinum duodenum.
- P. Vena cava.
- Q. Aorta.

FIG. III.

Hepar ex facie cava.

- A. Lobus dexter.
- B. Peritonæum relinquens hepar ad
ambitum ligamenti coronarii.
- C. Finis anterior.
- D. Fissura recipiens venæ portarum
ramum dextrum.
- E. Vesicula fellea.
- F. Ductus cysticus reclinatus.
- G. Lobulus accessorius.
- H. Peritonæum conjicit se super vesicu-
lam.
- I. Lobuli anonymi facies obversa fis-
suræ transversæ.
- K. Lobus sinister.
- L. Ligamentum.
- M. Lobi sinistri crepido ad ductum
venosum spectans.
- N. Lobulus lobi sinistri.
- O. Processus caudatus.
- P. Pars integra lobi SPIGELII.
- Q. Papilla ejus.
- R. Vena cava tecta processu caudato.
- S. Arteria eo loco erumpens ex phre-
nicks.
- T. Vena portarum in portis.
- V. Ramus dexter.
- X. Sinister.
- Y. Pars tecta lobulo.
- Z. Ramus ad eum lobulum.
- a. Ductus venosus in sua fossa.
- b. Truncus venæ umbicalis hepate
textus.
- c. Ramus ad sinistrum lobum.
- d. Alius.
- e. Rami ad lobum anonymum.
- f. Vena umbilicalis pergens antror-
sum.
- g. Emersa de hepate.






T. VI.

F 2.

G. P. T. sc



F. 3.

T. VI.

G. P. T. sc.

